



3-4


John Adams
Library.




IN THE CUSTODY OF THE
BOSTON PUBLIC LIBRARY.




SHELF N^o
★ ADAMS
★ 83.10





Digitized by the Internet Archive
in 2010




PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA.

AUCTORE

ISAACO NEWTONO,
EQUITE AURATO.

EDITIO ULTIMA

Cui accedit ANALYSIS per Quantitatum SERIES, FLUXIONES ac DIFFERENTIAS cum enumeratione LINEARUM TERTII ORDINIS.



AMSTÆLODAMI,
SUMPTIBUS SOCIETATIS.

M. D. CCXXIII.

PHILOSOPHIAE
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA.

AUCTORE
ISAACO NEWTONO,
EQVITE ANGLATO.
EDITIO ULTIMA

On account of the Analysis of the Philosophical Series, the following is the
this new edition of the Philosophical Series.



AMSTELÆDAMI
SUMPTIBUS SOCIETATIS

M. D. CEXXIII.

ILLUSTRISSIMÆ
SOCIETATI REGALI,

A
SERENISSIMO REGE

CAROLO II

AD PHILOSOPHIAM PROMOVEDAM

FUNDATÆ,

ET

AUSPICIIS
AUGUSTISSIMÆ REGINÆ

ANNÆ

FLORENTI,

TRACTATUM HUNC D.D.D.

IS. NEWTONUS.

ILLUSTRISSIMAE
SOCIETATI REGALI

SERENISSIMO REGE

CAROLO II

ADAMS 87.10

AD PHILOSOPHIAM PROMOVENDAM

FUNDATAE

ET

AUSPICIS

AUGUSTISSIMAE REGINAE

ANNAE

FLORENTI

TRACTATUM HUNC D.D.D.

IS. NEWTONUS.

I N
VIRI PRÆSTANTISSIMI
ISAACI NEWTONI

OPUS HOCCE
MATHEMATICO-PHYSICUM

Seculi Gentisque nostræ Decus egregium.

EN tibi norma Poli, & divæ libramina Molis,
Computus en Jovis; & quas, dum primordia rerum
Conderet, omnipotens sibi Leges ipse Creator
Dixerit, atque operum quæ fundamenta locarit.
Intima panduntur victi penetralia Cœli,
Nec latet, extremos quæ Vis circumrotet Orbes.
Sol folio residens ad se jubet omnia prono
Tendere descensu, nec recto tramite currus
Sidereos patitur vastum per inane moveri;
Sed rapit immotis, se centro, singula gyris.
Hinc patet, horrificis qua sit via flexa Cometis:
Discimus hinc tandem, qua causâ argentea Phœbe
Passibus haud æquis eat, & cur subdita nulli
Hactenus Astronomo numerorum fræna recuset:
Cur remeent Nodi, curque Auges progrediantur.
Discimus, & quantis refluxum vaga Cynthia Pontum
Viribus impellat; fessis dum fluctibus ulvam
Deserit, ac nautis suspectas nudat arenas;
Alternisve ruens spumantia littora pulsat.

Quæ

Quæ toties animos veterum torfere Sophorum,
Quæque Scholas hodie rauco certamine vexant
Obvia conspicimus; nubem pellente Mathesi:
Quæ superas penetrare domos, atque ardua Coeli,
NEWTONI auspiciis, jam dat contingere Tempora.

Surgite Mortales, terrenas mittite curas;
Atque hinc cœligenæ vires cognoscite Mentis,
A pecudum vita longe queque remotæ.

Qui scriptis primus Tabulis compefcere Cædes,
Furta & Adulteria, & perjuræ crimina Fraûdis;

Quive vagis populis circumdari mœnibus Urbes
Auctor erat; Cererisve beavit munere gentes;

Vel qui curarum lenimen preffit ab Uva;

Vel qui Niliaca monstravit arundine pictos

Confociare sonos, oculisque exponere Voces;

Humanam sortem minus extulit; utpote pauca

In commune ferens miseræ solatia vitæ.

Jam vero Superis convivæ admittimur, alti

Jura poli tractare licet, jamque abdita diæ

Claustra patent Naturæ, & rerum immobilis ordo;

Et quæ præteritis latuere incognita sæclis.

Talia monstrantem justis celebrate Camænis,

Vos qui cœlesti gaudetis nectare vesci,

NEWTONUM clausi referantem scrinia Veri,

NEWTONUM Musis carum, qui pectore puro

Phœbus adest, totoque incessit Numine mentem:

Nec fas est propius Mortali attingere Divos.

ED. HALLEY.

AUCTORIS
PRÆFATIO

A D

LECTOREM.

Cum Veteres Mechanicam (uti auctor est Pappus) in re-
rum Naturalium investigatione maximi fecerint; & Re-
centiores, missis formis substantialibus & qualitatibus occultis,
Phænomena Naturæ ad leges Mathematicas revocare aggres-
si sint: Visum est in hoc Tractatu Mathesin excolere, quate-
nus ea ad Philosophiam spectat. Mechanicam vero duplicem
Veteres constituerunt: Rationalem quæ per Demonstrationes
accurate procedit, & Practicam. Ad Practicam spectant
Artes omnes Manuales, a quibus utique Mechanica nomen
mutuata est. Cum autem Artifices parum accurate operari
soleant, fit ut Mechanica omnis a Geometria ita distinguatur,
ut quicquid accuratum sit ad Geometriam referatur, quic-
quid minus accuratum ad Mechanicam. Attamen errores
non sunt Artis sed Artificum. Qui minus accurate operatur,
imperfectior est Mechanicus, & si quis accuratissime opera-
ri posset, hic foret Mechanicus omnium perfectissimus. Nam
& Linearum rectarum & Circulorum descriptiones in qui-
bus Geometria fundatur, ad Mechanicam pertinent. Has
lineas describere Geometria non docet sed postulat. Postulat
enim ut Tyro easdem accurate describere prius didicerit
quam limen attingat Geometriæ; dein, quomodo per has o-
perationes Problemata solvantur, docet. Rectas & Circulos
describere Problemata sunt, sed non Geometrica. Ex Me-
chanica postulatur horum solutio, in Geometria docetur so-
lutorum usus. Ac gloriatur Geometria quod tam paucis prin-
cipiis aliunde petitis tam multa præstet. Fundatur igitur
Geo.

Geometria in praxi Mechanica, & nihil aliud est quam
 Mechanicæ universalis pars illa quæ artem mensurandi ac-
 curate proponit ac demonstrat. Cum autem artes Manua-
 les in corporibus movendis præcipue versentur, fit ut Geo-
 metria ad magnitudinem, Mechanica ad motum vulgo refe-
 ratur. Quo sensu Mechanica rationalis erit Scientia Mo-
 tuum qui ex viribus quibuscunque resultant, & Virium quæ
 ad motus quoscunque requiruntur, accurate proposita ac de-
 monstrata. Pars hæc Mechanicæ a Veteribus in Potentiis
 quinque ad artes manuales spectantibus exculta fuit, qui
 Gravitatem (cum potentia manualis non sit) vix aliter quam
 in ponderibus per potentias illas movendis considerarunt. Nos
 autem non Artibus sed Philosophiæ consulentes, deque po-
 tentiis non manualibus sed naturalibus scribes, ea maxi-
 me tractamus quæ ad Gravitatem, Levitatem, vim Elasti-
 cam, resistantiam Fluidorum & ejusmodi vires seu attrac-
 tivas seu impulsivas spectant: & ea propter, hæc nostra tan-
 quam Philosophiæ principia Mathematica proponimus. Om-
 nis enim Philosophiæ difficultas in eo versari videtur, ut a
 Phenomenis motuum investigemus vires Naturæ, deinde ab
 his viribus demonstremus phenomena reliqua. Et huc spec-
 tant Propositiones generales quas Libro primo & secundo
 pertractavimus. In Libro autem tertio Exemplum hujus rei
 proposuimus per explicationem Systematis mundani. Ibi
 enim, ex Phenomenis cœlestibus, per Propositiones in Libris
 prioribus Mathematicè demonstratas, derivantur vires Gra-
 vitatis quibus corpora ad Solem & Planetas singulos ten-
 dunt. Deinde ex his viribus per Propositiones etiam Ma-
 thematicas, deducuntur motus Planetarum, Cometarum,
 Lunæ & Maris. Utinam cætera Naturæ phenomena ex
 principiis Mechanicis eodem argumentandi genere derivare
 liceret. Nam multa me movent ut nonnihil suspicer ea om-
 nia

PRÆFATIO.

nia ex viribus quibusdam pendere posse, quibus corporum particulae per causas nondum cognitae vel in se mutuo impelluntur & secundum figuras regulares coherent, vel ab invicem fugantur & recedunt: quibus viribus ignotis, Philosophi hactenus Naturam frustra tentarunt. Spero autem quod vel huic Philosophandi modo, vel veriori alicui, Principia hic posita lucem aliquam præbent.

In his edendis, Vir acutissimus & in omne literarum genere eruditissimus Edmundus Halleus operam navavit, nec solum Typothetarum Sphalmata correxit & Schemata incidi curavit, sed etiam Auctor fuit ut horum editionem aggrederer. Quippe cum demonstratam a me Figuram Orbium cœlestium impetraverat, rogare non destitit ut eandem cum Societate Regali communicarem. Quæ deinde hortatibus & benignis suis auspiciis effecit ut de eadem in lucem emittenda cogitare inciperem. At postquam Motuum Lunarium inæqualitates aggressus essem, deinde etiam alia tentare cœpissem quæ ad leges & mensuras Gravitatis & aliarum virium, & Figuras a corporibus secundum datas quasunque leges attractis describendas, ad motus corporum plurium inter se, ad motus corporum in Mediis resistentibus, ad vires, densitates & motus Mediorum, ad Orbes Cometarum, & similia spectant, editionem in aliud tempus differendam esse putavi, ut cætera rimarer & una in publicum darem. Quæ ad motus Lunares spectant, (imperfecta cum sint,) in Corollariis Propositionis LXVI. simul complexus sum, ne singula methodo prolixiore quam pro rei dignitate proponere, & sigillatim demonstrare tenerer, & seriem reliquarum Propositionum interrumpere. Nonnulla sero inventa locis minus idoneis inferere malui, quam numerum Propositionum & citationes mutare. Ut omnia candide legantur, & defectus, in materia tam difficili non tam reprehendantur, quam novis Lectorum conatibus investigentur, & benigne suppleantur, enixe rogo.

Dabam Cantabrigiæ, e Collegio
S. Trinitatis, Maii 8, 1686.

IS. NEWTON.

AUCTORIS PRÆFATIO.

IN hac Secunda Principiorum Editione, multa sparsim emendantur & nonnulla adjiciuntur. In Libri primi Sectione II. Inventio virium quibus corpora in Orbibus datis revolvi possint, facilior redditur & amplior. In Libri secundi Sectione VII, Theoria resistentiæ Fluidorum accuratius investigatur & novis Experimentis confirmatur. In Libro tertio Theoria Lune & Præcessio Æquinoctiorum ex Principiis suis plenius deducuntur, & Theoria Cometarum pluribus & accuratius computatis Orbium exemplis confirmatur.

Dabam Londini,
Mar. 28. 1713.

IS. NEWTON.

EDI-

EDITORIS PRÆFATIO.

NEWTONIANÆ Philosophiæ novam tibi, Lector benevole, diuque desideratam Editionem, plurimum nunc emendatam atque auctiorem exhibemus. Quæ potissimum contineantur in hoc Opere celeberrimo, intelligere potes ex Indicibus adjectis: quæ vel addantur vel immutentur, ipsa te fere docebit Auctoris Præfatio. Reliquum est, ut adjiciantur nonnulla de Methodo hujus Philosophiæ.

Qui Physicam tractandam susceperunt, ad tres fere classes revocari possunt. Extiterunt enim, qui singulis rerum speciebus Qualitates específicas & occultas tribuerint; ex quibus deinde corporum singulorum operationes, ignota quadam ratione, pendere voluerunt. In hoc posita est summa doctrinæ Scholasticæ, ab *Aristotele* & Peripateticis derivatæ: Affirmant utique singulos Effectus ex corporum singularibus Naturis oriri; at unde sint illæ Naturæ non docent; nihil itaque docent. Cumque toti sint in rerum nominibus, non in ipsis rebus; Sermonem quendam Philosophicum censendi sunt adinvenisse, Philosophiam tradidisse non sunt censendi.

Alii ergo melioris diligentiae laudem consequi sperarunt, rejecta Vocabulorum inutili farragine. Statuerunt itaque Materiam universam homogeneam esse, omnem vero Formarum varietatem, quæ in corporibus cernitur, ex particularum componentium simplicissimis quibusdam & intellectu facillimis affectionibus oriri. Et recte quidem progressio instituitur a simplicioribus ad magis composita, si particularum primariis illis affectionibus non alios tribuunt modos, quam quos ipsa tribuit Natura. Verum ubi licentiam sibi assumunt, ponendi quascunque liber ignotas partium figuras & magnitudines, incertosque situs & motus; quin & fingendi Fluida quædam occulta, quæ corporum poros liberrime permeent, omnipotente prædita subtilitate, motibusque occultis agitata; jam ad somnia delabuntur, neglecta rerum constitutione vera: quæ sane frustra petenda est ex fallacibus conjecturis, cum vix etiam per certissimas Observationes investigari possit. Qui speculationum

EDITORIS

suarum fundamentum defumunt ab Hypothesibus, etiamsi deinde secundum leges Mechanicas accuratissime procedant; Fabulam quidem elegantem forte & venustam, Fabulam tamen concinnare dicendi sunt.

Relinquitur adeo tertium genus, qui Philosophiam scilicet Experimentalem profitentur. Hi quidem ex simplicissimis quibus possunt principiis rerum omnium causas derivandas esse volunt: nihil autem Principii loco assumunt, quod nondum ex Phænomenis comprobatum fuerit. Hypotheses non comminiscuntur, neque in Physicam recipiunt, nisi ut Quæstiones de quarum veritate disputetur. Duplici itaque Methodo incedunt, Analytica & Synthetica. Naturæ vires legesque virium simpliciores ex selectis quibusdam Phænomenis per Analysin deducunt, ex quibus deinde per Synthesin reliquorum constitutionem tradunt. Hæc illa est Philosophandi ratio longe optima, quam præ ceteris merito amplectendam censuit Celeberrimus Auctor noster. Hanc solam utique dignam judicavit, in qua excolenda atque adornanda operam suam collocaret. Hujus igitur illustrissimum dedit Exemplum, Mundani nempe Systematis explicationem e Theoria Gravitatis felicissime deductam. Gravitatis virtutem universis corporibus inesse, suspicati sunt vel finxerunt alii: primus Ille & solus ex Apparentiis demonstrare potuit, & speculationibus egregiis firmissimum ponere fundamentum.

Scio equidem nonnullos magni etiam nominis Viros, præjudiciis quibusdam plus æquo occupatos, huic novo Principio ægre assentiri potuisse, & certis incerta identidem prætulisse. Horum famam vellicare non est animus: Tibi potius, Benevole Lector, illa paucis exponere lubet, ex quibus Tute ipse judicium non iniquum feras.

Igitur ut Argumenti sumatur exordium a simplicissimis & proximis; despiciamus paulisper qualis sit in Terrestribus natura Gravitatis, ut deinde tutius progrediamur ubi ad corpora Cœlestia, longissime a sedibus nostris remota, perventum fuerit. Convenit jam inter omnes Philosophos, corpora universa circumterrestria gravitare in Terram. Nulla dari corpora vere levia, jamdudum confirmavit Experientia multiplex. Quæ dicitur Levitas relativa, non est vera Levitas, sed apparens solummodo: & oritur a præpollente Gravitate corporum contiguorum.

Porro, ut corpora aequaliter gravitant in Terram, ita Terra vicissim in corpora aequaliter gravitat; Gravitatis enim actionem esse mutuam & utrinque æqualem, sic ostenditur. Distinguatur Terræ
totius

P R Æ F A T I O.

totius moles in binas quascunque partes, vel æquales vel utcunque inæquales: jam si pondera partium non essent in se mutuo æqualia; cederet pondus minus majori, & partes conjunctæ pergerent recta moveri ad infinitum, versus plagam in quam tendit pondus majus: omnino contra Experientiam. Itaque dicendum erit, pondera partium in æquilibrio esse constituta: hoc est, Gravitatis actionem esse mutuam & utrinque æqualem.

Pondera corporum, æqualiter a centro Terræ distantium, sunt ut quantitates materiæ in corporibus. Hoc utique colligitur ex æquali acceleratione corporum omnium, e quiete per ponderum vires cadentium: nam vires quibus inæqualia corpora æqualiter accelerantur, debent esse proportionales quantitatis materiæ movendæ. Jam vero corpora universa cadentia æqualiter accelerari, ex eo patet, quod in Vacuo *Boyliano* temporibus æqualibus æqualia spatia cadendo describunt, sublata scilicet Aeris resistentia: accuratius autem comprobatur per Experimenta Pendulorum.

Vires attractivæ corporum, in æqualibus distantis, sunt ut quantitates materiæ in corporibus. Nam cum corpora in Terram & Terra vicissim in corpora momentis æqualibus gravitent; Terræ pondus in unumquodque corpus, seu vis qua corpus Terram attrahit, æquabitur ponderi corporis ejusdem in Terram. Hoc autem pondus erat ut quantitas materiæ in corpore: itaque vis qua corpus unumquodque Terram attrahit, sive corporis vis absoluta, erit ut eadem quantitas materiæ.

Oritur ergo & componitur vis attractiva corporum integrorum ex viribus attractivis partium: siquidem aucta vel diminuta mole materiæ, ostensum est, proportionaliter augeri vel diminui ejus virtutem. Actio itaque Telluris ex conjunctis partium Actionibus conflari censenda erit; atque adeo corpora omnia Terrestria se mutuo trahere oportet viribus absolutis, quæ sint in ratione materiæ trahentis. Hæc est natura Gravitatis apud Terram: videamus jam qualis sit in Cœlis.

Corpus omne perseverare in statu suo vel quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare; Naturæ lex est ab omnibus recepta. Philosophis. Inde vero sequitur, corpora quæ in Curvis moventur, atque adeo de lineis rectis Orbitas suas tangentibus jugiter abeunt, Vi aliqua perpetuo agente retineri in itinere curvilineo. Planetis igitur in Orbibus curvis revolvendis necessario aderit Vis aliqua, per cujus actiones repetitas indefinenter a Tangentibus deflectantur.

E D I T O R I S

Jam illud concedi æquum est, quod Mathematicis rationibus colligitur & certissime demonstratur; Corpora nempe omnia, quæ moventur in linea aliqua curva in plano descripta, quæque radio ducto ad punctum vel quiescens vel utcumque motum describunt areas circa punctum illud temporibus proportionales, urgeri a Viribus quæ ad idem punctum tendunt. Cum igitur in confessio sit apud Astronomos, Planetas primarios circum Solem, secundarios vero circum suos primarios, areas describere temporibus proportionales; consequens est ut Vis illa, qua perpetuo detorquentur a Tangentibus rectilineis, & in Orbitis curvilineis revolvi coguntur, versus corpora dirigatur quæ sita sunt in Orbitalium centris. Hæc itaque Vis non inepte vocari potest, respectu quidem corporis revolvantis, Centripeta; respectu autem corporis centralis, Attractiva; a quacunque demum causa oriri fingatur.

Quin & hæc quoque concedenda sunt, & Mathematicè demonstrantur: Si corpora plura motu æquabili revolvantur in Circulis concentricis, & quadrata temporum periodicorum sint ut cubi distantiarum a centro communi; Vires centripetas revolvantium fore reciproce ut quadrata distantiarum. Vel, si corpora revolvantur in Orbitis quæ sunt Circulis finitimæ, & quiescant Orbitalium Apfides; Vires centripetas revolvantium fore reciproce ut quadrata distantiarum. Obtinere casum alterutrum in Planetis universis consentiunt Astronomi. Itaque Vires centripetæ Planetarum omnium sunt reciproce ut quadrata distantiarum ab Orbium centris. Si quis objiciat Planetarum & Lunæ præsertim, Apfides non penitus quiescere; sed motu quodam lento ferri in consequentia: responderi potest, etiamsi concedamus hunc motum tardissimum exinde profectum esse quod Vis centripetæ proportio aberret aliquantum a duplicata, aberrationem illam per computum Mathematicum inveniri posse & plane insensibilem esse. Ipsa enim ratio Vis centripetæ Lunaræ, quæ omnium maxime turbari debet, paululum quidem duplicatam superabit; ad hanc vero sexaginta fere vicibus propius accedet quam ad triplicatam. Sed verior erit responsio, si dicamus hanc Apfidum progressionem, non ex aberratione a duplicata proportionem, sed ex alia prorsus diversa causa oriri, quemadmodum egregie demonstratur in hac Philosophia. Restat ergo ut Vires centripetæ, quibus Planetæ primarii tendunt versus Solem & secundarii versus primarios suos, sint accurate ut quadrata distantiarum reciproce.

Ex

P R Æ F A T I O.

Ex iis quæ hætenus dicta sunt, constat Planetas in Orbitis suis retineri per Vim aliquam in ipsos perpetuo agentem : constat Vim illam dirigi semper versus Orbitalium centra : constat hujus efficaciam augeri in accessu ad centrum, diminui in recessu ab eodem: & augeri quidem in eadem proportionem qua diminuitur quadratum distantiae, diminui in eadem proportionem qua distantiae quadratum augetur. Videamus jam, comparatione instituta inter Planetarum Vires centripetas & Vim Gravitatis, annon ejusdem forte sint generis. Ejusdem vero generis erunt, si deprehendantur hinc & inde leges eadem eademque affectiones. Primo itaque Lunæ, quæ nobis proxima est, vim centripetam expendamus.

Spatia rectilinea, quæ a corporibus e quiete demissis dato tempore sub ipso motus initio describuntur, ubi a viribus quibuscunque urgentur, proportionalia sunt ipsis viribus: Hoc utique consequitur ex rationibus Mathematicis. Erit igitur Vis centripeta Lunæ in Orbita sua revolvantis, ad Vim Gravitatis in superficie Terræ, ut spatium quod tempore quam minimo describeret Luna descendendo per Vim centripetam versus Terram, si circulari omni motu privari fingeretur, ad spatium quod eodem tempore quam minimo describit grave corpus in vicinia Terræ, per Vim gravitatis suæ cadendo. Horum spatiorum prius æquale est arcus a Luna per idem tempus descripti sinui verso, quippe qui Lunæ translationem de Tangente, factam a Vi centripeta, metitur; atque adeo computari potest ex datis tum Lunæ tempore periodico tum distantia ejus a centro Terræ. Spatium posterius invenitur per Experimenta Pendulorum, quemadmodum docuit *Hugenius*. Inito itaque calculo, spatium prius ad spatium posterius, seu vis centripeta Lunæ in Orbita sua revolvantis ad vim Gravitatis in superficie Terræ, erit ut quadratum semidiametri Terræ ad Orbitæ semidiametri quadratum. Eandem habet rationem, per ea quæ superius ostenduntur, vis centripeta Lunæ in Orbita sua revolvantis ad vim Lunæ centripetam prope Terræ superficiem. Vis itaque centripeta prope Terræ superficiem æqualis est vi Gravitatis. Non ergo diversæ sunt vires, sed una atque eadem: si enim diversæ essent, corpora viribus conjunctis duplo celerius in Terram caderent quam ex vi sola Gravitatis. Constat igitur Vim illam centripetam, qua Luna perpetuo de Tangente vel trahitur vel impellitur & in Orbita retinetur, ipsam esse vim Gravitatis terrestris ad Lunam usque pertingentem. Et rationi quidem consentaneum est ut ad ingentes distantias illa sese Virtus extendat, cum

E D I T O R I S

cum nullam ejus sensibilem imminutionem, vel in altissimis montium cacuminibus, observare licet. Gravitat itaque Luna in Terram: quin & actione mutua, Terra vicissim in Lunam æqualiter gravitat: id quod abunde quidem confirmatur in hac Philosophia, ubi agitur de Maris æstu & Æquinoctiorum præcessione, ab actione tum Lunæ tum Solis in Terram oriundis. Hinc & illud tandem edocemur, qua nimirum lege vis Gravitatis decreseat in majoribus a Tellure distantiiis. Nam cum Gravitatio non diversa sit a Vi centripeta Lunari, hæc vero sit reciproce proportionalis quadrato distantiae; diminuetur & Gravitatio in eadem ratione.

Progrediamur jam ad Planetas reliquos. Quoniam revolutiones primariorum circa Solem & secundariorum circa Jovem & Saturnum sunt Phænomena generis ejusdem ac revolutio Lunæ circa Terram, quoniam porro demonstratum est vires centripetas primariorum dirigi versus centrum Solis, secundariorum versus centra Jovis & Saturni, quemadmodum Lunæ vis centripeta versus Terræ centrum dirigitur; adhæc, quoniam omnes illæ vires sunt reciproce ut quadrata distantiarum a centrīs, quemadmodum vis Lunæ est ut quadratum distantiae a Terra: concludendum erit eandem esse naturam universis. Itaque ut Luna gravitat in Terram, & Terra vicissim in Lunam; sic etiam gravitabunt omnes secundarii in primarios suos, & primarii vicissim in secundarios; sic & omnes primarii in Solem, & Sol vicissim in primarios.

Igitur Sol in Planetas universos gravitat & universi in Solem. Nam secundarii dum primarios suos comitantur, revolvuntur interea circum Solem una cum primariis. Eodem itaque argumento, utriusque generis Planetæ gravitant in Solem, & Sol in ipsos. Secundarios vero Planetas in Solem gravitare abunde insuper constat ex inæqualitatibus Lunaribus; quarum accuratissimam Theoriam, admiranda sagacitate patefactam, in tertio hujus Operis libro expositam habemus.

Solis virtutem attractivam quoquoeversum propagari ad ingentes usque distantias, & sese diffundere ad singulas circumjecti spatii partes, apertissime colligi potest ex motu Cometarum; qui ab immensis intervallis profecti feruntur in viciniam Solis, & nunquam adeo ad ipsum proxime accedunt ut Globum ejus, in Periheliis suis versantes, tantum non contingere videantur. Horum Theoriam ab Astronomis antehac frustra quæsitam, nostro tandem sæculo feliciter inventam & per Observationes certissime demonstratam, Præstantissimo nostro Auctori debemus. Patet igitur

P R Æ F A T I O.

igitur Cometas in Sectionibus Conicis umbilicos in centro Solis habentibus moveri, & radiis ad Solem ductis areas temporibus proportionales describere. Ex hisce vero Phænomenis manifestum est & Mathematicè comprobatur, vires illas, quibus Cometæ retinentur in orbitis suis, respicere Solem & esse reciproce ut quadrata distantiarum ab ipsius centro. Gravitant itaque Cometæ in Solem: atque adeo Solis vis attractiva non tantum ad corpora Planetarum in datis distantis & in eodem fere plano collocata, sed etiam ad Cometas in diversissimis Cœlorum regionibus & in diversissimis distantis positos pertingit. Hæc igitur est natura corporum gravitantium, ut vires suas edant ad omnes distantias in omnia corpora gravitantia. Inde vero sequitur, Planetas & Cometas universos se mutuo trahere, & in se mutuo graves esse: quod etiam confirmatur ex perturbatione Jovis & Saturni, Astronomis non incognita, & ab actionibus horum Planetarum in se invicem oriunda; quin & ex motu illo lentissimo Apsidum, qui supra memoratus est, quique a causa consimili proficiscitur.

Eo demum pervenimus ut dicendum sit, & Terram & Solem & corpora omnia cœlestia, quæ Solem comitantur, se mutuo attrahere. Singulorum ergo particulæ quæque minimæ vires suas attractivas habebunt, pro quantitate materiæ pollentes; quemadmodum supra de Terrestribus ostensum est. In diversis autem distantis, erunt & harum vires in duplicata ratione distantiarum reciproce: nam ex particulis hac lege trahentibus componi debere Globos eadem lege trahentes, Mathematicè demonstratur.

Conclusiones præcedentes huic innituntur Axiomati, quod a nullis non recipitur Philosophis; Effectuum scilicet ejusdem generis, quorum nempe quæ cognoscuntur proprietates eadem sunt, easdem esse causas & easdem esse proprietates quæ nondum cognoscuntur. Quis enim dubitat, si Gravitatio sit causa descensus Lapidis in *Europa*, quin eadem sit causa descensus in *America*? Si Gravitatio mutua fuerit inter Lapidem & Terram in *Europa*; quis negabit mutuam esse in *America*? Si vis attractiva Lapidis & Terræ componatur, in *Europa*, ex viribus attractivis partium; quis negabit similem esse compositionem in *America*? Si attractio Terræ ad omnia corporum genera & ad omnes distantias propagetur in *Europa*; quidni pariter propagari dicamus in *America*? In hac Regula fundatur omnis Philosophia: quippe qua sublata nihil affirmare possumus de Universis. Constitutio rerum singularem innotescit per Observationes & Experimenta: inde vero non

EDITORIS

nisi per hanc Regulam de rerum universarum natura judicamus.

Jam cum Gravia sint omnia corpora, quæ apud Terram vel in Cœlis reperiuntur, de quibus Experimenta vel Observationes instituere licet; omnino dicendum erit, Gravitatem corporibus universis competere. Et quemadmodum nulla concipi debent corpora, quæ non sint Extensa, Mobilia, & Impenetrabilia; ita nulla concipi debere, quæ non sint Gravia. Corporum Extensio, Mobilitas, & Impenetrabilitas non nisi per Experimenta innotescunt: eodem plane modo Gravitatis innotescit. Corpora omnia de quibus Observationes habemus, Extensa sunt & Mobilia & Impenetrabilia: & inde concludimus corpora universa, etiam illa de quibus Observationes non habemus, Extensa esse & Mobilia & Impenetrabilia. Ita corpora omnia sunt Gravia, de quibus Observationes habemus: & inde concludimus corpora universa, etiam illa de quibus Observationes non habemus, Gravia esse. Si quis dicat corpora Stellarum inerrantium non esse Gravia, quandoquidem eorum Gravitatis nondum est observata; eodem argumento dicere licebit neque Extensa esse, nec Mobilia, nec Impenetrabilia, cum hæc Fixarum affectiones nondum sint observatæ. Quid opus est verbis? Inter primarias qualitates corporum universorum vel Gravitatis habebit locum; vel Extensio, Mobilitas, & Impenetrabilitas non habebunt. Et natura rerum vel recte explicabitur per corporum Gravitatem, vel non recte explicabitur per corporum Extensionem, Mobilitatem, & Impenetrabilitatem.

Audio nonnullos hanc improbare conclusionem, & de occultis qualitatibus nescio quid musitare. Gravitatem scilicet Occultum esse quid, perpetuo arguari solent; occultas vero causas procul esse ablegandas a Philosophia. His autem facile respondetur; occultas esse causas, non illas quidem quarum existentia per Observationes clarissime demonstratur, sed has solum quarum occulta est & ficta existentia nondum vero comprobata. Gravitatis ergo non erit occulta causa motuum cœlestium; siquidem ex Phænomenis ostensus est, hanc virtutem revera existere. Hi potius ad occultas confugiunt causas; qui nescio quos Vortices, materiæ cujusdam prorsus fictitiæ & sensibus omnino ignotæ, motibus iisdem regendis præficiunt.

Ideone autem Gravitatis occulta causa dicitur, eoque nomine rejicietur e Philosophia, quod causa ipsius Gravitatis occulta est & nondum inventa? Qui sic statuunt, videant nequid statuunt absurdum,

P R Æ F A T I O.

furdi, unde totius tandem Philosophiæ fundamenta convellantur. Etenim causæ continuo nexu procedere solent a compositis ad simpliciora: ubi ad causam simplicissimam perveneris, jam non licebit ulterius progredi. Causæ igitur simplicissimæ nulla dari potest mechanica explicatio: si daretur enim, causa nondum esset simplicissima. Has tu proinde causas simplicissimas appellabis occultas, & exulare jubebis? simul vero exulabunt & ab his proxime pendentes & quæ ab illis porro pendent, usque dum a causis omnibus vacua fuerit & probe purgata Philosophia.

Sunt qui Gravitatem præter naturam esse dicunt, & Miraculum perpetuum vocant. Itaque rejiciendam esse volunt, cum in Physica præternaturales causæ locum non habeant. Huic ineptæ prorsus objectioni diluendæ, quæ & ipsa Philosophiam subruit universam, vix operæ pretium est immorari. Vel enim Gravitatem corporibus omnibus inditam esse negabunt, quod tamen dici non potest: vel eo nomine præter naturam esse affirmabunt, quod ex aliis corporum affectionibus atque adeo ex causis Mechanicis originem non habeat. Dantur certe primariæ corporum affectiones; quæ, quoniam sunt primariæ, non pendent ab aliis. Viderint igitur annon & hæ omnes sint pariter præter naturam, eoque pariter rejiciendæ: viderint vero qualis sit deinde futura Philosophia.

Nonnulli sunt quibus hæc tota Physica cœlestis vel ideo minus placet, quod cum *Cartesii* dogmatibus pugnare & vix conciliari posse videatur. His sua licebit opinione frui; ex æquo autem agant oportet: non ergo denegabunt aliis eandem libertatem quam sibi concedi postulant. *NEWTONIANAM* itaque Philosophiam, quæ nobis verior habetur, retinere & amplecti licebit, & causas sequi per Phænomena comprobatas, potius quam fictas & nondum comprobatas. Ad veram Philosophiam pertinet, rerum naturas ex causis vere existentibus derivare: eas vero leges quærere, quibus voluit Summus Opifex hunc Mundi pulcherrimum ordinem stabilire; non eas quibus potuit, si ita visum fuisset. Rationi enim consonum est, ut a pluribus causis, ab invicem nonnihil diversis, idem possit Effectus proficisci: hæc autem vera erit causa, ex qua vere atque actu proficiscitur; reliquæ locum non habent in Philosophia vera. In Horologiis automatis idem Indicis horarii motus vel ab appenso Pondere vel ab intus concluso Elatere oriri potest. Quod si oblatum Horologium revera sit instructum Pondere;

E D I T O R I S

ridebitur qui finget Elaterem, & ex Hypothefi sic præpropere conficta motum Indicis explicare fufcipiet: oportuit enim internam Machinæ fabricam penitus perferutari, ut ita motus propofiti principium verum exploratum habere poffet. Idem vel non abfimile feretur iudicium de Philofophis illis, qui materia quadam fubtiliffima Cœlos effe repletos, hanc autem in Vortices indefinenter agi voluerunt. Nam fi Phænomenis vel accuratiffime fatisfacere poffent ex Hypothefibus fuis; veram tamen Philofophiam tradidiffè, & veras caufas motuum cœleftium inveniffè nondum dicendi funt; nifi vel has revera exiftere, vel faltem alias non exiftere demonftraverint. Igitur fi oftensum fuerit, univerforum corporum Attractionem habere verum locum in rerum natura; quin etiam oftensum fuerit, qua ratione motus omnes cœleftes abinde folutionem recipiant; vana fuerit & merito deridenda obiectio, fi quis dixerit eodẽ motus per Vortices explicari debere, etiamfi id fieri poffe vel maxime concefferimus. Non autem concedimus: Nequeunt enim ullo pacto Phænomena per Vortices explicari; quod ab Auctore noſtro abunde quidem & clariffimis rationibus evincitur; ut ſomniis plus æquo indulgeant oporteat, qui ineptiffimo figmento refarciendo, noviffque porro commentis ornando infelicem operam addicunt.

Si corpora Planetarum & Cometarum circa Solem deferantur a Vorticibus; oportet corpora delata & Vorticum partes proxime ambientes eadem velocitate eademque curfus determinatione moveri, & eandem habere denſitatem vel eandem Vim inertię pro mole materiæ. Conſtat vero Planetas & Cometas, dum verſantur in iifdem regionibus Cœlorum, velocitatibus variis variaque curfus determinatione moveri. Neceſſario itaque ſequitur, ut Fluidi cœleftis partes illæ, quæ funt ad eaſdem diſtantias a Sole revolvantur eodem tempore in plagas diverſas cum diverſis velocitatibus: etenim alia opus erit directione & velocitate, ut transire poſſint Planetæ, alia, ut transire poſſint Cometæ. Quod cum explicari nequeat; vel fatendum erit, univerſa corpora cœleftia non deferri a materia Vorticis; vel dicendum erit, eorundem motus repetendos effe non ab uno eodemque Vortice, ſed a pluribus qui ab invicem diverſi ſint, idemque ſpatium Soli circumjectum pervadant.

Si plures Vortices in eodem ſpatio contineri, & ſeſe mutuo penetrare, motibusque diverſis revolvı ponantur; quoniam hi motus debent effe conformes delatorum corporum motibus, qui ſunt

sunt summe regulares, & peraguntur in Sectionibus Conicis, nunc valde eccentricis, nunc ad Circulorum proxime formam accedentibus; jure quærendum erit, qui fieri possit, ut iidem integri conserventur, nec ab actionibus materiæ occurrentis per tot sæcula quicquam perturbentur. Sane si motus hi fictitii sunt magis compositi & difficilius explicantur, quam veri illi motus Planetarum & Cometarum; frustra mihi videntur in Philosophiam recipi: omnis enim causa debet esse Effectu suo simplicior. Concessa Fabularum licentia, affirmaverit aliquis Planetas omnes & Cometas circumcingi Atmosphæris, adinstar Telluris nostræ; quæ quidem Hypothesis rationi magis consentanea videbitur quam Hypothesis Vorticum. Affirmaverit deinde has Atmosphæras, ex natura sua, circa Solem moveri & Sectiones Conicas describere; qui sane motus multo facilius concipi potest, quam consimilis motus Vorticum se invicem permeantium. Denique Planetas ipsos & Cometas circa Solem deferri ab Atmosphæris suis credendum esse statuat, & ob repperitas motuum cœlestium causas triumphum agat. Quisquis autem hanc Fabulam rejiciendam esse putet, idem & alteram Fabulam rejiciet: nam ovum non est ovo similis, quam Hypothesis Atmosphærarum Hypothesi Vorticum.

Docuit *Galileus*, lapidis projecti & in parabola moti deflexionem a cursu rectilineo oriri a Gravitate lapidis in Terram, ab occulta scilicet qualitate. Fieri tamen potest ut alius aliquis, nasi acutioris, Philosophus causam aliquam comminiscatur. Finget igitur ille materiam quandam subtilem, quæ nec visu, nec tactu, neque ullo sensu percipitur, versari in regionibus quæ proxime contingunt Telluris superficiem. Hanc autem materiam, in diversas plagas, variis & plerumque contrariis motibus ferri, & lineas Parabolicas describere contendet. Deinde vero lapidis deflexionem pulchre sic expediet, & vulgi plausum merebitur. Lapis, inquit, in Fluido illo subtili natat; & cursui ejus obsequendo, non potest non eandem una semitam describere. Fluidum vero movetur in lineis Parabolicis; ergo lapidem in Parabola moveri necesse est. Quis nunc non mirabitur acutissimum hujusce Philosophi ingenium, ex causis Mechanicis, materia scilicet & motu, Phænomena Naturæ ad vulgi etiam captum præclare deducens? Quis vero non subsannabit bonum illum *Galileum*, qui magno molimine Mathematico qualitates occultas, e Philosophia feliciter exclusas, denuo revocare sustinuerit? sed pudet nugis diutius immorari.

E D I T O R I S

Summa rei huc tandem redit : Cometarum ingens est numerus; motus eorum sunt summe regulares, & easdem leges cum Planetarum motibus observant. Moventur in Orbibus Conicis, hi orbis sunt valde admodum eccentrici. Feruntur undique in omnes Cœlorum partes, & Planetarum regiones liberrime pertranseunt, & sæpe contra Signorum ordinem incedunt. Hæc Phænomena certissime confirmantur ex Observationibus Astronomicis : & per Vortices nequeunt explicari : Imo, ne quidem cum Vorticibus Planetarum consistere possunt. Cometarum motibus omnino locus non erit ; nisi materia illa fictitia penitus e Cœlis amoveatur.

Si enim Planetæ circum Solem a Vorticibus devehuntur ; Vorticum partes, quæ proxime ambiunt unumquemque Planetam, ejusdem densitatis erunt ac Planeta ; uti supra dictum est. Itaque materia illa omnis quæ contigua est Orbis magni perimetro, parem habebit ac Tellus densitatem : quæ vero jacet intra Orbem magnum atque Orbem Saturni, vel parem vel majorem habebit. Nam ut constitutio Vorticis permanere possit, debent partes minus densæ centrum occupare, magis densæ longius a centro abire. Cum enim Planetarum tempora periodica sint in ratione sesquuplicata distantiarum a Sole, oportet partium Vorticis periodos eandem rationem servare. Inde vero sequitur, vires centrifugas harum partium fore reciproce ut quadrata distantiarum. Quæ igitur majore intervallo distant a centro, nituntur ab eodem recedere minore vi : unde si minus densæ fuerint, necesse est ut cedant vi majori, qua partes centro propiores ascendere conantur. Ascendent ergo densiores, descendent minus densæ, & locorum fiet invicem permutatio ; donec ita fuerit disposita arque ordinata materia fluida totius Vorticis, ut conquiescere jam possit in æquilibrio constituta. Si bina Fluida, quorum diversa est densitas, in eodem vase continentur ; utique futurum est ut Fluidum, cujus major est densitas, majore vi Gravitatis infimum petat locum : & ratione non absimili omnino dicendum est, densiores Vorticis partes majore vi centrifuga petere supremum locum. Tota igitur illa & multo maxima pars Vorticis, quæ jacet extra Telluris orbem, densitatem habebit atque adeo vim inertię pro mole materiæ, quæ non minor erit quam densitas & vis inertię Telluris : inde vero Cometis trajectis orietur ingens resistentia, & valde admodum sensibilis ; ne dicam, quæ motum eorundem penitus sistere atque absorbere posse merito videatur. Constat autem ex motu Cometarum

P R Æ F A T I O.

metarum prorsus regulari, nullam ipsos resistantiam pati quæ vel minimum sentiri potest; atque adeo neutiquam in materiam ullam incurfare, cujus aliqua sit vis resistendi, vel proinde cujus aliqua sit densitas seu vis Inertiæ. Nam resistantia Mediorum oritur vel ab inertia materiæ fluidæ, vel a defectu lubricitatis. Quæ oritur a defectu lubricitatis, admodum exigua est; & sane vix observari potest in Fluidis vulgo notis, nisi valde tenacia fuerint adinstar Olei & Mellis. Resistentia quæ sentitur in Aere, Aqua, Hydrargyro, & hujusmodi Fluidis non tenacibus fere tota est prioris generis; & minui non potest per ulteriorem quemcunque gradum subtilitatis, manente Fluidi densitate vel vi inertiae, cui semper proportionalis est hæc resistantia: quemadmodum clarissime demonstratum est ab Auctore nostro in peregrina Resistentiarum Theoria, quæ paulo nunc accuratius exponitur, hac secunda vice, & per Experimenta corporum cadentium plenius confirmatur.

Corpora progrediendo motum suum Fluido ambienti paulatim communicant, & communicando amittunt, amittendo autem retardantur. Est itaque retardatio motui communicato proportionalis; motus vero communicatus, ubi datur corporis progredientis velocitas, est ut Fluidi densitas; ergo retardatio seu resistantia erit ut eadem Fluidi densitas; neque ullo pacto tolli potest, nisi a Fluido ad partes corporis posticas recurrente restituatur motus amissus. Hoc autem dici non poterit, nisi impressio Fluidi in corpus ad partes posticas æqualis fuerit impressioni corporis in Fluidum ad partes anticas, hoc est, nisi velocitas relativa qua Fluidum irruit in corpus a tergo, æqualis fuerit velocitati qua corpus irruit in Fluidum, id est, nisi velocitas absoluta Fluidi recurrentis duplo major fuerit quam velocitas absoluta Fluidi propulsi; quod fieri nequit. Nullo igitur modo tolli potest Fluidorum resistantia, quæ oritur ab eorundem densitate & vi inertiae. Itaque concludendum erit; Fluidi cœlestis nullam esse vim inertiae, cum nulla sit vis resistendi: nullam esse vim qua motus communicetur, cum nulla sit vis inertiae: nullam esse vim qua mutatio quælibet vel corporibus singulis vel pluribus inducatur, cum nulla sit vis qua motus communicetur: nullam esse omnino efficaciam, cum nulla sit facultas mutationem quamlibet inducendi. Quidni ergo hanc Hypothesin, quæ fundamento plane destituitur, quæque naturæ rerum explicandæ ne minimum quidem infervit, ineptissimam vocare liceat & Philosopho prorsus

EDITORIS

fus indignam. Qui cœlos materia fluida repletos esse volunt, hanc vero non inertem esse statuunt; Hi verbis tollunt Vacuum, re ponunt. Nam cum hujusmodi materia fluida ratione nulla fecerni possit ab inani Spatio; disputatio tota fit de rerum nominibus, non de naturis. Quod si aliqui sint adeo usque dediti Materiæ, ut Spatium a corporibus vacuum nullo pacto admittendum credere velint; videamus quo tandem oporteat illos pervenire.

Vel enim dicent hanc, quam confingunt, Mundi per omnia pleni constitutionem ex voluntate Dei profectam esse, propter eum finem, ut operationibus Naturæ subsidium præsens haberi posset ab Æthere subtilissimo cuncta permeante & implente; quod tamen dici non potest, siquidem jam ostensum est ex Cometarum phænomenis, nullam esse hujus Ætheris efficaciam: vel dicent ex voluntate Dei profectam esse, propter finem aliquem ignotum; quod neque dici debet, siquidem diversa Mundi constitutio eodem argumento pariter stabiliri posset: vel denique non dicent ex voluntate Dei profectam esse, sed ex necessitate quadam Naturæ. Tandem igitur delabi oportet in fæces sordidas Gregis impurissimi. Hi sunt qui somniant Fato universa regi, non Providentia; Materiam ex necessitate sua semper & ubique extitisse, infinitam esse & æternam. Quibus positis, erit etiam undiquaque uniformis: nam varietas formarum cum necessitate omnino pugnat. Erit etiam immota: nam si necessario moveatur in plagam aliquam determinatam, cum determinata aliqua velocitate; pari necessitate movebitur in plagam diversam cum diversa velocitate; in plagas autem diversas, cum diversis velocitatibus, moveri non potest; oportet igitur immotam esse. Neutiquam profecto potuit oriri Mundus, pulcherrima formarum & motuum varietate distinctus, nisi ex liberrima voluntate cuncta providentis & gubernantis Dei.

Ex hoc igitur fonte promanarunt illæ omnes quæ dicuntur Naturæ leges: in quibus multa sane sapientissimi consilii, nulla necessitatis apparent vestigia. Has proinde non ab incertis conjecturis petere, sed Observando atque Experiendo addiscere debemus. Qui veræ Physicæ principia Legesque rerum, sola mentis vi & interno Rationis lumine fretum, invenire se posse confidit; hunc oportet, vel statuere Mundum ex necessitate fuisse, Legesque propositas ex eadem necessitate sequi; vel si per voluntatem Dei constitutus sit ordo Naturæ, se tamen, homuncionem
misellum

P R Æ F A T I O.

misellum, quid optimum factu sit perspectum habere. Sana omnis & vera Philosophia fundatur in Phænomenis rerum: quæ si nos vel invitos & reluctantes ad hujusmodi principia deducunt, in quibus clarissime cernuntur Consilium optimum & Dominium summum sapientissimi & potentissimi Entis; non erunt hæc ideo non admittenda principia, quod quibusdam forsan hominibus minus grata sint futura. His vel Miracula vel Qualitates occultæ dicantur, quæ displicent; verum nomina malitiose indita non sunt ipsis rebus vitio vertenda; nisi illud fateri tandem velint, utique debere Philosophiam in Atheismo fundari. Horum hominum gratia non erit labefactanda Philosophia, siquidem rerum ordo non vult immutari.

Obtinebit igitur apud probos & æquos Judices præstantissima Philosophandi ratio, quæ fundatur in Experimentis & Observationibus. Huic vero, dici vix poterit, quanta lux accedat, quanta dignitas, ab hoc Opere præclaro Illustrissimi nostri Auctoris; cujus eximiam ingenii felicitatem, difficillima quæque Problemata enodantis, & ad ea porro pertingentis ad quæ nec spes erat humanam mentem assurgere potuisse, merito admirantur & suspiciunt quicumque paulo profundius in hisce rebus versati sunt. Clausuris ergo reſeratis, aditum Nobis aperuit ad pulcherrima rerum mysteria. Systematis Mundani compagem elegantissimam ita tandem patefecit & penitus perspectandam dedit; ut nec ipse, si nunc revivisceret, Rex *Alphonſus* vel simplicitatem vel harmoniæ gratiam in ea desideraret. Itaque Naturæ majestatem propius jam licet intueri, & dulcissima contemplatione frui, Conditorem vero ac Dominum Univerſorum impensius colere & venerari, qui fructus est Philosophiæ multo uberrimus. Cæcum esse oportet, qui ex optimis & sapientissimis rerum structuris non statim videat Fabricatoris Omnipotentis infinitam sapientiam & bonitatem: insanum, qui profiteri nolit.

Extabit igitur Eximium NEWTONI Opus adversus Atheorum impetus munitissimum præsidium: neque enim alicunde felicius, quam ex hac pharetra, contra impiam Catervam tela deprompseris. Hoc sensit pridem, & in pereruditis Concionibus Anglice Latineque editis, primus egregie demonstravit Vir in omni Literarum genere præclarus idemque bonarum Artium fautor eximius RICHARDUS BENTLEIUS, Sæculi sui & Academiæ nostræ magnum Ornamentum, Collegii nostri *S. Trinitatis* Magister dignissimus & integerrimus. Huic ego me pluribus nominibus obstrictum fateri

d

debeo:

EDITORIS PRÆFATIO.

debeo: Huic & Tuas quæ debentur gratias, Lector benevole; non denegabis. Is enim, cum a longo tempore Celeberrimi Auctoris amicitia intima frueretur, (qua etiam apud Posteris cenferi non minoris æstimat, quam propriis Scriptis quæ literato orbi in deliciis sunt inclarescere) Amici simul famæ & scientiarum incremento consuluit. Itaque cum Exemplaria prioris Editionis rarissima admodum & immani pretio coemenda superessent; suasit Ille crebris efflagitationibus & tantum non objurgando perpulit denique Virum Præstantissimum, nec modestia minus quam eruditione summa Insignem, ut novam hanc Operis Editionem, per omnia elimatam denuo & egregiis insuper accessionibus ditatam, suis sumptibus & auspiciis prodire pateretur: Mihi vero, pro jure suo, pensum non ingratum demandavit, ut quam posset emendate id fieri curarem.

Cantabrigiæ,
Maji 12. 1713.

ROGERUS COTES Collegii *S. Trinitatis* Socius,
Astronomiæ & Philosophiæ Experimentalis
Professor *Plumianus*.

INDEX

INDEX CAPITUM. TOTIUS OPERIS.

	PAG.
DEFINITIONES.	I
AXIOMATA, SIVE LEGES MOTUS.	12

DE MOTU CORPORUM LIBER PRIMUS.

SECT. I. D E Methodo rationum primarum & ultimarum.	24
SECT. II. De inventione Virium centripetarum.	34
SECT. III. De motu corporum in Conicis sectionibus eccentricis.	48
SECT. IV. De inventione Orbium Ellipticorum, Parabolicorum & Hyperbolicorum ex Umbilico dato.	59
SECT. V. De inventione Orbium ubi Umbilicus neuter datur.	66
SECT. VI. De inventione Motuum in Orbibus datis.	97
SECT. VII. De corporum Ascensu & Descensu rectilineo.	105
SECT. VIII. De inventione Orbium in quibus corpora Viribus quibuscunque centripetis agitata revolvuntur.	114
SECT. IX. De Motu corporum in Orbibus mobilibus, deque Motu Apsidum.	121
SECT. X. De Motu corporum in Superficiebus datis, deque Funependulorum Motu reciproco.	132
SECT. XI. De Motu corporum Viribus centripetis se mutuo petentium.	147
SECT. XII. De corporum Sphaericorum Viribus attractivis.	173
SECT.	

SECT. XIII. <i>De corporum non Sphericorum Viribus attracti-</i>	192
SECT. XIV. <i>De Motu corporum Minimorum, quæ Viribus</i>	
<i>centripetis ad singulas Magni alicujus corporis partes</i>	
<i>tendentibus agitantur.</i>	203

DE MOTU CORPORUM LIBER SECUNDUS.

SECT. I. D E Motu corporum quibus resistitur in ratione	
<i>Velocitatis.</i>	211
SECT. II. <i>De Motu corporum quibus resistitur in duplicata ra-</i>	
<i>tione Velocitatis.</i>	220
SECT. III. <i>De Motu corporum quibus resistitur partim in ratio-</i>	
<i>ne Velocitatis, partim in ejusdem ratione duplicata.</i>	245
SECT. IV. <i>De corporum Circulari motu in Mediis resistenti-</i>	
<i>bus.</i>	253
SECT. V. <i>De densitate & compressione Fluidorum, deque</i>	
<i>Hydrostatica.</i>	260
SECT. VI. <i>De Motu & Resistentia corporum Funependulo-</i>	
<i>rum.</i>	272
SECT. VII. <i>De Motu Fluidorum & resistentia Projectilium.</i>	294
SECT. VIII. <i>De Motu per Fluida propagato.</i>	329
SECT. IX. <i>De Motu Circulari Fluidorum.</i>	345

DE MUNDI SYSTEMATE LIBER TERTIUS.

R EGULÆ PHILOSOPHANDI.	357
PHENOMENA.	359
PROPOSITIONES.	362
SCHOLIUM.	481
PHILO-	

PHILOSOPHIÆ NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA.

DEFINITIONES.

DEFINITIO I.

Quantitas Materiæ est mensura ejusdem orta ex illius Densitate & Magnitudine conjunctim.

AER, densitate duplicata, in spatio etiam duplicato fit quadruplus; in triplicato sextuplus. Idem intellige de Nive & Pulveribus per compressionem vel liquefactionem condensatis. Et par est ratio corporum omnium, quæ per causas quascunque diversimode condensantur. Medii interea, si quod fuerit, interstitia partium libere pervadentis, hic nullam rationem habeo. Hanc autem Quantitatem sub nomine Corporis vel Massæ in sequentibus passim intelligo. Innotescit ea per corporis cujusque Pondus. Nam Ponderi proportionalem esse reperi per experimenta Pendulorum accuratissime instituta, uti posthac docebitur.

DEFINITIO II.

Quantitas Motus est mensura ejusdem orta ex Velocitate & Quantitate Materiæ conjunctim.

Motus totius est summa motuum in partibus singulis; adeoque in corpore duplo majore æquali cum velocitate duplus est, & dupla cum velocitate quadruplus.

A

DEFI-

DEFINITIO III.

Materiæ vis insita est potentia resistendi, qua corpus unumquodque, quantum in se est, perseverat in statu suo vel quiescendi vel movendi uniformiter in directum.

Hæc semper proportionalis est suo corpori, neque differt quicquam ab inertia massæ, nisi in modo concipiendi. Per inertiam materiæ, fit ut corpus omne de statu suo vel quiescendi vel movendi difficulter deturbetur. Unde etiam vis insita nomine significantissimo Vis Inertiæ dici possit. Exercet vero corpus hanc vim solummodo in mutatione status sui per vim aliam in se impressam facta; estque exercitium ejus sub diverso respectu & Resistentia & Impetus: resistentia, quatenus corpus ad conservandum statum suum reluctatur vi impressæ; impetus, quatenus corpus idem, vi resistentis obstaculi difficulter cedendo, conatur statum ejus mutare. Vultus resistentiam quiescentibus & impetum moventibus tribuit: sed motus & quies, uti vulgo concipiuntur, respectu solo distinguuntur ab invicem; neque semper vere quiescunt quæ vulgo tanquam quiescentia spectantur.

DEFINITIO IV.

Vis impressa est actio in corpus exercita, ad mutandum ejus statum vel quiescendi vel movendi uniformiter in directum.

Consistit hæc vis in actione sola, neque post actionem permanet in corpore. Perseverat enim corpus in statu omni novo per solam vim inertiae. Est autem vis impressa diversarum originum, ut ex Ictu, ex Pressione, ex vi Centripeta.

DEFINITIO V.

Vis Centripeta est, qua corpora versus punctum aliquod tanquam ad Centrum undique trahuntur, impelluntur, vel utcumque tendunt.

Hujus generis est Gravitās, qua corpora tendunt ad centrum terræ; Vis Magnetica, qua ferrum petit magnetem; & Vis illa, quæcumque sit, qua Planetæ perpetuo retrahuntur a motibus rectilineis, & in lineis curvis revolvi coguntur. Lapis, in funda circum-

actus,

actus, a circumagente manu abire conatur; & conatu suo fundam distendit, eoque fortius quo celerius revolvitur; & quamprimum dimittitur, avolat. Vim conatui illi contrariam, qua funda lapidem in manum perpetuo retrahit & in orbe retinet, quoniam in manum seu orbis centrum dirigitur, Centripetam appello. Et par est ratio corporum omnium, quæ in gyrum aguntur. Conantur ea omnia a centrīs orbium recedere; & nisi adsit vis aliqua conatui isti contraria, qua cohibeantur & in orbibus retineantur, quamque ideo Centripetam appello, abibunt in rectis lineis uniformi cum motu. Projectile, si vi Gravitatis destitueretur, non deflecteretur in terram, sed in linea recta abiret in cœlos; idque uniformi cum motu, si modo aeris resistentia tolleretur. Per gravitatem suam retrahitur a cursu rectilineo & in terram perpetuo flectitur, idque magis vel minus pro gravitate sua & velocitate motus. Quo minor erit ejus gravitas pro quantitate materiæ vel major velocitas quacum projicitur, eo minus deviat a cursu rectilineo & longius perget. Si Globus plumbeus, data cum velocitate secundum lineam horizontalem a montis alicujus vertice vi pulveris tormentarii projectus, pergeret in linea curva ad distantiam duorum milliarum, priusquam in terram decideret: hic dupla cum velocitate quasi duplo longius pergeret, & decupla cum velocitate quasi decuplo longius: si modo aeris resistentia tolleretur. Et augendo velocitatem augeri posset pro lubitu distantia in quam projiceretur, & minui curvatura lineæ quam describeret, ita ut tandem caderet ad distantiam graduum decem vel triginta vel nonaginta; vel etiam ut terram totam circumiret priusquam caderet; vel denique ut in terram nunquam caderet, sed in cœlos abiret & motu abeundi pergeret in infinitum. Et eadem ratione, qua Projectile vi gravitatis in orbem flecti posset & terram totam circumire, potest & Luna vel vi gravitatis, si modo gravis sit, vel alia quacunque vi, qua in terram urgeatur, retrahi semper a cursu rectilineo terram versus, & in orbem suum flecti: & absque tali vi Luna in orbe suo retineri non potest. Hæc vis, si justo minor esset, non satis flecteret Lunam de cursu rectilineo: si justo major, plus satis flecteret, ac de orbe terram versus deduceret. Requiritur quippe, ut sit justæ magnitudinis: & Mathematicorum est invenire Vim, qua corpus in dato quovis orbe data cum velocitate accurate retineri possit; & vicissim invenire Vim curvilineam, in quam corpus e dato quovis loco data cum velocitate egressum a data vi flectatur. Est autem vis hujus centripetæ Quantitas trium generum, Absoluta, Acceleratrix, & Motrix.

DEFINITIO VI.

Vis centripetæ Quantitas Absoluta est mensura ejusdem major vel minor pro Efficacia causæ eam propagantis a centro per regiones in circuitu.

Ut Vis Magnetica pro mole magnetis vel intensione virtutis major in uno magnete, minor in alio.

DEFINITIO VII.

Vis centripetæ Quantitas Acceleratrix est ipsius mensura Velocitati proportionalis, quam dato tempore generat.

Uti Virtus magnetis ejusdem major in minori distantia, minor in majori: vel vis Gravitans major in vallibus, minor in cacuminibus præaltorum montium, atque adhuc minor (ut posthac patebit) in majoribus distantis a globo terræ; in æqualibus autem distantis eadem undique, propterea quod corpora omnia cadentia (gravia an levia, magna an parva) sublata Aeris resistentia, æqualiter accelerat.

DEFINITIO VIII.

Vis centripetæ Quantitas Motrix est ipsius mensura proportionalis Motui, quem dato tempore generat.

Uti Pondus majus in majore corpore, minus in minore; inque corpore eodem majus prope terram, minus in coelis. Hæc Quantitas est corporis totius centripetentia seu propensio in centrum, & (ut ita dicam) Pondus; & innotescit semper per vim ipsi contrariam & æqualem, qua descensus corporis impediri potest.

Hæc virium quantitates brevitatis gratia nominare licet vires motrices, acceleratrices, & absolutas; & distinctionis gratia referre ad Corpora, centrum petentia, ad corporum Loca, & ad Centrum virium: nimirum vim motricem ad Corpus, tanquam conatum & propensionem totius in centrum ex propensionibus omnium partium compositam; & vim acceleratricem ad Locum corporis, tanquam efficaciam quandam, de centro per loca singula in circuitu diffusam, ad movenda corpora quæ in ipsis sunt; vim autem absolutam ad Centrum, tanquam causam aliquam præditam, sine qua vires motrices non propagantur per regiones in circuitu; sive causa illa sit corpus aliquod centrale (quale est Magnes in centro vis magneticæ, vel Terra in centro).

centro vis gravitantis) five alia aliqua quæ non apparet. Mathe-
 maticus duntaxat est hic conceptus. Nam virium causas & sedes
 Physicas jam non expendo. DEFINITIONES.

Est igitur vis acceleratrix ad vim motricem ut celeritas ad motum. Oritur enim quantitas motus ex celeritate ducta in quantitatem materiæ, & vis motrix ex vi acceleratrice ducta in quantitatem ejusdem materiæ. Nam summa actionum vis acceleratricis in singulas corporis particulas est vis motrix totius. Unde juxta superficiem Terræ, ubi gravitas acceleratrix seu vis gravitans in corporibus universis eadem est, gravitas motrix seu pondus est ut corpus: at si in regiones ascendatur ubi gravitas acceleratrix fit minor, pondus pariter minuetur, eritque semper ut corpus in gravitatem acceleratricem ductum. Sic in regionibus ubi gravitas acceleratrix duplo minor est, pondus corporis duplo vel triplo minoris erit quadruplo vel sextuplo minus.

Porro attractiones & impulsus eodem sensu acceleratrices & motrices nomino. Voces autem Attractionis, Impulsus, vel Propensionis cujuscunque in centrum, indifferenter & pro se mutuo promiscue usurpo; has vires non physice sed mathematice tantum considerando. Unde caveat lector, ne per hujusmodi voces cogitet me speciem vel modum actionis causamve aut rationem physicam alicubi definire, vel centris (quæ sunt puncta Mathematica) vires vere & physice tribuere; si forte aut centra trahere, aut vires centrorum esse dixerō.

Scholium.

Hactenus voces minus notas, quo sensu in sequentibus accipiendæ sint, explicare visum est. Nam Tempus, Spatium, Locum & Motum, ut omnibus notissima, non definio. Notandum tamen, quod vulgus quantitates hasce non aliter quam ex relatione ad sensibilia concipiat. Et inde oriuntur præjudicia quædam, quibus tollendis convenit easdem in absolutas & relativas, veras & apparentes, mathematicas & vulgares distingui.

I. Tempus Absolutum, verum, & mathematicum, in se & natura sua absque relatione ad externum quodvis, æquabiliter fluit, alioque nomine dicitur Duratio: Relativum, apparens, & vulgare est sensibilis & externa quævis Durationis per motum mensura (seu accurata seu inæquabilis) quæ vulgus vice veri temporis utitur; ut Hora, Dies, Mensis, Annus.

DEFINITIONES.

II. *Spatium Absolutum*, natura sua absque relatione ad externum quodvis, semper manet simile & immobile: *Relativum* est spatii hujus mensura seu dimensio quælibet mobilis, quæ a sensibus nostris per situm suum ad corpora definitur, & a vulgo pro spatio immobili usurpatur: uti dimensio spatii subterranei, aerei vel coelestis definita per situm suum ad Terram. Idem sunt spatium absolutum & relativum, specie & magnitudine; sed non permanent idem semper numero. Nam si Terra, verbi gratia, movetur; spatium Aeris nostri, quod relative & respectu Terræ semper manet idem, nunc erit una pars spatii absoluti in quam Aer transit, nunc alia pars ejus; & sic absolute mutabitur perpetuo.

III. *Locus* est pars spatii quam corpus occupat, estque pro ratione spatii vel Absolutus vel Relativus. Pars, inquam, spatii; non Situs corporis, vel Superficies ambiens. Nam solidorum æqualium æquales semper sunt loci; Superficies autem ob dissimilitudinem figurarum ut plurimum inæquales sunt; Situs vero proprie loquendo quantitatem non habent, neque tam sunt loca quam affectiones locorum. Motus totius idem est cum summa motuum partium, hoc est, translatio totius de suo loco eadem est cum summa translationum partium de locis suis; adeoque locus totius idem cum summa locorum partium, & propterea internus & in corpore toto.

IV. *Motus Absolutus* est translatio corporis de loco absoluto in locum absolutum, *Relativus* de relativo in relativum. Sic in navi quæ velis passis fertur, relativus corporis Locus est navigii regio illa in qua corpus versatur, seu cavitatis totius pars illa quam corpus implet, quæque adeo movetur una cum navi: & Quies relativa est permanens corporis in eadem illa navis regione vel parte cavitatis. At quies vera est permanens corporis in eadem parte spatii illius immoti in qua navis ipsa una cum cavitate sua & contentis universis movetur. Unde si Terra vere quiescit, corpus quod relative quiescit in navi, movebitur vere & absolute ea cum velocitate qua navis movetur in Terra. Sin Terra etiam movetur; orietur verus & absolutus corporis motus, partim ex Terræ motu vero in spatio immoto, partim ex navis motu relativo in Terra: & si corpus etiam movetur relative in navi; orietur verus ejus motus, partim ex vero motu Terræ in spatio immoto, partim ex relativis motibus tum navis in Terra, tum corporis in navi; & ex his motibus relativis orietur corporis motus relativus in Terra. Ut si Terræ pars illa, ubi navis versatur, moveatur vere in orientem cum velocitate partium 1000; & velis ventoque feratur navis in occidentem cum velocitate partium decem; Nauta autem ambulet in navi orientem

tem versus cum velocitatis parte una: movebitur Nauta vere & absolute in spatio immoto cum velocitatis partibus 1000 in orientem, & relative in terra occidentem versus cum velocitatis partibus novem.

DEFINITIONES.

Tempus Absolutum a relativo distinguitur in Astronomia per *Æquationem* temporis vulgi. Inæquales enim sunt dies Naturales, qui vulgo tanquam æquales pro mensura temporis habentur. Hanc inæqualitatem corrigunt Astronomi, ut ex veriore tempore mensurent motus coelestes. Possibile est, ut nullus sit motus æquabilis quo Tempus accurate mensuretur. Accelerari & retardari possunt motus omnes, sed fluxus temporis absoluti mutari nequit. Eadem est duratio seu perseverantia existentiae rerum; sive motus sint celeres, sive tardi, sive nulli: proinde hæc a mensuris suis sensibilibus merito distinguitur, & ex iisdem colligitur per *Æquationem* Astronomicam. Hujus autem æquationis in determinandis Phænomenis necessitas, tum per experimentum Horologii Oscillatorii, tum etiam per eclipses Satellitum Jovis evincitur.

Ut partium Temporis ordo est immutabilis, sic etiam ordo partium Spatii. Moveantur hæc de locis suis, & movebuntur (ut ita dicam) de seipsis. Nam tempora & spatia sunt sui ipsorum & rerum omnium quasi Loca. In Tempore quoad ordinem successivum; in Spatio quoad ordinem situs locantur universa. De illorum essentia est ut sint Loca: & loca primaria moveri absurdum est. Hæc sunt igitur absoluta Loca; & solæ translationes de his locis sunt absoluti Motus.

Verum quoniam hæc Spatii partes videri nequeunt, & ab invicem per sensus nostros distingui; earum vice adhibemus mensuras sensibiles. Ex positionibus enim & distantis rerum a corpore aliquo, quod spectamus ut immobile, definimus loca universa: deinde etiam & omnes motus æstimamus cum respectu ad prædicta loca, quatenus corpora ab iisdem transferri concipimus. Sic vice locorum & motuum absolutorum relativis utimur, nec incommode in rebus humanis: in Philosophicis autem abstrahendum est a sensibus. Fieri etenim potest, ut nullum revera quiescat corpus, ad quod loca motusque referantur.

Distinguuntur autem Quies & Motus absoluti & relativi ab invicem per Proprietates suas & Causas & Effectus. Quietis proprietas est, quod corpora vere quiescentia quiescunt inter se. Ideoque cum possibile sit, ut corpus aliquod in regionibus Fixarum, aut longe ultra, quiescat absolute; sciri autem non possit ex situ corporum ad invicem in regionibus nostris, horumne aliquod ad longinquum

DEFINITIONIS. quum illud datam positionem servet necne ; quies vera ex horum situ inter se definiri nequit.

Motus proprietas est, quod partes, quæ datas servant positiones ad tota, participant motus eorundem totorum. Nam Gyran-
tium partes omnes conantur recedere ab axe motus, & Progredientium impetus oritur ex conjunctio impetu partium singularum. Motis igitur corporibus ambientibus, moventur quæ in ambientibus relative quiescunt. Et propterea motus verus & absolutus definiri nequit per translationem e vicinia corporum, quæ tanquam quiescentia spectantur. Debent enim corpora externa non solum tanquam quiescentia spectari, sed etiam vere quiescere. Alioquin inclusa omnia, præter translationem e vicinia ambientium, participabunt etiam ambientium motus veros; & sublata illa translatione non vere quiescent, sed tanquam quiescentia solummodo spectabuntur. Sunt enim ambientia ad inclusa, ut totius pars exterior ad partem internam, vel ut cortex ad nucleum. Moto autem cortice, nucleus etiam, absque translatione de vicinia corticis, ceu pars totius movetur.

Præcedenti proprietati affinis est, quod moto Loco movetur una Locatum: adeoque corpus, quod de loco moto movetur, participat etiam loci sui motum. Motus igitur omnes, qui de locis motis fiunt, sunt partes solummodo motuum integrorum & absolutorum: & motus omnis integer componitur ex motu corporis de loco suo primo, & motu loci hujus de loco suo, & sic deinceps; usque dum perveniatur ad locum immotum, ut in exemplo Nautæ supra memorato. Unde motus integri & absoluti non nisi per loca immota definiri possunt: & propterea hos ad loca immota, relativos ad mobilia supra retuli. Loca autem immota non sunt, nisi quæ omnia ab infinito in infinitum datas servant positiones ad invicem; atque adeo semper manent immota, spatiumque constituunt quod Immobile appello.

Causæ, quibus motus veri & relativi distinguuntur ab invicem, sunt Vires in corpora impressæ ad motum generandum. Motus verus nec generatur nec mutatur; nisi per vires in ipsum corpus motum impressas: at motus relativus generari & mutari potest absque viribus impressis in hoc corpus. Sufficit enim ut imprimantur in alia solum corpora ad quæ fit relatio, ut iis cedentibus mutetur relatio illa in qua hujus quies vel motus relativus consistit. Rursum motus verus a viribus in corpus motum impressis semper mutatur; at motus relativus ab his viribus non mutatur necessario. Nam si eadem vires in alia etiam corpora, ad quæ fit relatio, sic imprimantur

mantur ut situs relativus conservetur, conservabitur relatio in qua DEFINI-
TIONES.
motus relativus consistit. Mutari igitur potest motus omnis relati-
vus ubi verus conservatur, & conservari ubi verus mutatur; & pro-
pterea motus verus in ejusmodi relationibus minime consistit.

Effectus quibus motus absoluti & relativi distinguuntur ab invicem, sunt vires recedendi ab axe motus circularis. Nam in motu circulari nude relativo hæ vires nullæ sunt, in vero autem & absoluto majores vel minores pro quantitate motus. Si pendeat situla a filo prælongo, agaturque perpetuo in orbem, donec filum a contorsione admodum rigescat, dein impleatur aqua, & una cum aqua quiescat; tum vi aliqua subitanea agatur motu contrario in orbem, & filo se relaxante, diutius perseveret in hoc motu; superficies aquæ sub initio plana erit, quemadmodum ante motum vasis: at postquam, vi in aquam paulatim impressa, efficit vas, ut hæc quoque sensibilibiter revolvi incipiat; recedet ipsa paulatim a medio, ascendetque ad latera vasis, figuram concavam induens, (ut ipse expertus sum) & incitatore semper motu ascendet magis & magis, donec revolutiones in æqualibus cum vase temporibus peragendo, quiescat in eodem relative. Indicat hic ascensus conatum recedendi ab axe motus, & per talem conatum innotescit & mensuratur motus aquæ circularis verus & absolutus, motuique relativo hic omnino contrarius. Initio, ubi maximus erat aquæ motus relativus, in vase, motus ille nullum excitabat conatum recedendi ab axe: aqua non petebat circumferentiam ascendendo ad latera vasis, sed plana manebat, & propterea motus illius circularis verus nondum inceperat. Postea vero, ubi aquæ motus relativus decrevit, ascensus ejus ad latera vasis indicabat conatum recedendi ab axe; atque hic conatus monstrabat motum illius circularem verum perpetuo crescentem, ac tandem maximum factum ubi aqua quiescebat in vase relative. Igitur conatus iste non pendet a translatione aquæ respectu corporum ambientium, & propterea motus circularis verus per tales translationes definiri nequit. Unicus est corporis cujusque revolventis motus vere circularis, conatui unico tanquam proprio & adæquato effectui respondens: motus autem relativi pro variis relationibus ad externa innumeri sunt; & relationum instar, effectibus veris omnino destituuntur, nisi quatenus verum illum & unicum motum participant. Unde & in Systemate eorum qui Coelos nostros infra Coelos Fixarum in orbem revolvi volunt, & Planetas secum deferre; singulæ Cœlorum partes, & Planetæ qui relative quidem in Coelis suis proximis quiescunt, moventur

DEFINITIONES. *tur vere.* Mutant enim positiones suas ad invicem (secus quam fit in vere quiescentibus) unaque cum coelis delati participant eorum motus, & ut partes revolvantium totorum, ab eorum axibus recedere conantur.

Igitur quantitates relativæ non sunt eæ ipsæ quantitates, quarum nomina præ se ferunt, sed earum mensuræ illæ sensibiles (veræ an errantes) quibus vulgus loco quantitatum mensurarum utitur. At si ex usu definiendæ sunt verborum significationes; per nomina illa Temporis, Spatii, Loci & Motus proprie intelligendæ erunt hæ mensuræ; & sermo erit insolens & pure Mathematicus, si quantitates mensuratæ hic intelligantur. Proinde vim inferunt Sacris Literis, qui voces hæc de quantitibus mensuratis ibi interpretantur. Neque minus contaminant Mathesin & Philosophiam, qui quantitates veras cum ipsarum relationibus & vulgaribus mensuris confundunt.

Motus quidem veros corporum singulorum cognoscere, & ab apparentibus actu discriminare, difficillimum est: propterea quod partes spatii illius immobilis, in quo corpora vere moventur, non incurrunt in sensus. Causa tamen non est prorsus desperata. Nam suppetunt argumenta, partim ex motibus apparentibus qui sunt motuum verorum differentię, partim ex viribus quæ sunt motuum verorum causæ & effectus. Ut si globi duo, ad datam ab invicem distantiam filo intercedente connexi, revolverentur circa commune gravitatis centrum; innotesceret ex tensione fili conatus globorum recedendi ab axe motus, & inde quantitas motus circularis computari posset. Deinde si vires quælibet æquales in alternas globorum facies ad motum circularem augendum vel minuendum simul imprimerentur, innotesceret ex aucta vel diminuta fili tensione augmentum vel decrementum motus, & inde tandem inveniri posset facies globorum in quas vires imprimi deberent, ut motus maxime augeretur; id est, facies posticæ, sive quæ in motu circulari sequuntur. Cognitis autem faciebus quæ sequuntur, & faciebus oppositis quæ præcedunt, cognosceretur determinatio motus. In hunc modum inveniri posset & quantitas & determinatio motus hujus circularis in vacuo quovis immenso, ubi nihil extaret externum & sensibile quocum globi conferri possent. Si jam constituerentur in spatio illo corpora aliqua longinqua datam inter se positionem servantia, qualia sunt Stellæ Fixæ in regionibus nostris: sciri quidem non posset ex relativa globorum translatione inter corpora, utrum his an illis tribuendus esset motus. At si
atten-

attenderetur ad filum, & deprenderetur tensionem ejus illam ipsam DEFINITIONES.
esse quam motus globorum requireret; concludere liceret motum esse globorum, & corpora quiescere; & tum demum ex translatione globorum inter corpora, determinationem hujus motus colligere. Motus autem veros ex eorum causis, effectibus, & apparentibus differentiis colligere; & contra ex motibus seu veris seu apparentibus eorum causas & effectus, docebitur fufius in fequentibus. Hunc enim in finem Tractatum fequentem composui.

AXIOMATA,

SIVE

LEGES MOTUS.

LEX I.

Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

Projectilia perseverant in motibus suis, nisi quatenus a resistentia aeris retardantur, & vi gravitatis impelluntur deorsum. Trochus, cujus partes cohærendo perpetuo retrahunt sese a motibus rectilineis, non cessat rotari, nisi quatenus ab aere retardatur. Majora autem Planetarum & Cometarum corpora motus suos & progressivos & circulares in spatiis minus resistentibus factos, conservant diutius.

LEX II.

Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressæ, & fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

Si vis aliqua motum quemvis generet; dupla duplum, tripla tripulum generabit, sive simul & semel, sive gradatim & successive impressa fuerit. Et hic motus (quoniam in eandem semper plagam cum vi generatrice determinatur) si corpus antea movebatur, motui ejus vel conspiranti additur, vel contrario subducitur, vel obliquo oblique adjicitur, & cum eo secundum utriusque determinationem componitur.

LEX III.

LEGES
MOTUS

Actioni contrariam semper & æqualem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse æquales & in partes contrarias dirigi.

Quicquid premit vel trahit alterum, tantundem ab eo premitur vel trahitur. Si quis lapidem digito premit, premitur & hujus digitus a lapide. Si equus lapidem funi alligatum trahit, retrahetur etiam & equus (ut ita dicam) æqualiter in lapidem: nam funis utrinque distentus eodem relaxandi se conatu urgebit equum versus lapidem, ac lapidem versus equum; tantumque impediet progressum unius quantum promovet progressum alterius. Si corpus aliquod in corpus aliud impingens, motum ejus vi sua quomodo-
cunque mutaverit, idem quoque vicissim in motu proprio eandem mutationem in partem contrariam vi alterius (ob æqualitatem pressionis mutuæ) subibit. His actionibus æquales fiunt mutationes, non velocitatum, sed motuum; scilicet in corporibus non aliunde impeditis. Mutationes enim velocitatum, in contrarias itidem partes factæ, quia motus æqualiter mutantur, sunt corporibus reciproce proportionales. Obtinet etiam hæc Lex in Attractionibus, ut in Scholio proximo probabitur.

COROLLARIUM I.


Corpus viribus conjunctis diagonalem parallelogrammi eodem tempore describere, quo latera separatis.

Si corpus dato tempore, vi sola M in loco A impressa, ferretur uniformi cum motu ab A ad B ; & vi sola N in eodem loco impressa, ferretur ab A ad C : compleatur parallelogrammum $ABDC$, & vi utraque feretur id eodem tempore in diagonali ab A ad D . Nam quoniam vis

N agit secundum lineam AC ipsi BD parallelam, hæc vis per Legem I nihil mutabit velocitatem accedendi ad lineam illam BD a vi altera genitam. Accedet igitur corpus eodem tempore ad lineam BD , sive vis N imprimatur, sive non; atque adeo in fine illius temporis reperietur alicubi in linea illa BD . Eodem argumento in fine temporis ejusdem reperietur alicubi in linea CD , & idcirco in utriusque lineæ concursu D reperiri necesse est. Perget autem motu rectilineo ab A ad D per Legem I.

B 3

COROL-




COROLLARIUM II.

Et hinc patet compositio vis directæ AD ex viribus quibusvis obliquis AB & BD, & vicissim resolutio vis cujusvis directæ AD in obliquas quascunque AB & BD. Quæ quidem compositio & resolutio abunde confirmatur ex Mechanica.

Ut si de rotæ alicujus centro O exeuntes radii inæquales OM , ON filis MA , NP sustineant pondera A & P , & quærantur vires ponderum ad movendam rotam: Per centrum O agatur recta KOL filis perpendiculariter occurrens in K & L , centroque O & intervallorum OK , OL majore OL describatur circulus occurrens filo MA in D : & actæ rectæ OD parallela sit AC , & perpendicularis DC . Quoniam nihil refert, utrum filorum puncta, K , L , D affixa sint an non affixa ad planum rotæ: pondera idem valebunt, ac si suspenderentur a punctis K & L vel D & L . Ponderis autem A exponatur vis tota per lineam AD , & hæc resolvetur in vires AC , CD , quarum AC trahendo radium OD directè a centro nihil valet ad movendam rotam; vis autem altera DC , trahendo radium DO perpendiculariter, idem valet ac si perpendiculariter traheret radium OL ipsi OD æqualem; hoc est, idem atque pondus P , si modo pondus illud sit ad pondus A ut vis DC ad vim DA , id est (ob similia triangula ADC , DOK ,) ut OK ad OD seu OL . Pondera igitur A & P , quæ sunt reciproce ut radii in directum positi OK & OL , idem pollebunt, & sic consistent in æquilibrio: quæ est proprietas notissima Libræ, Vectis, & Axis in Peritrochio. Sin pondus alterutrum sit majus quam in hac ratione, erit vis ejus ad movendam rotam tanto major.

Quod si pondus p ponderi P æquale partim suspendatur filo Np , partim incumbat plano obliquo pG : agantur pH , NH , prior horizonti, posterior plano pG perpendicularis; & si vis ponderis p deorsum tendens, exponatur per lineam pH , resolvi potest hæc in vires pN , HN . Si filo pN perpendicularare esset planum aliquod pQ , secans planum alterum pG in linea ad horizontem parallela; & pondus p his planis pQ , pG solummodo incumberet; urgeret



geret illud hæc plana viribus $p N$, HN perpendiculariter, nimirum LEGES
MOTUS.
planum $p Q$ vi $p N$, & planum $p G$ vi HN . Ideoque si tollatur planum $p Q$, ut pondus tendat filum; quoniam filum sustinendo pondus jam vicem præstat plani sublato, tendetur illud eadem vi $p N$, qua planum antea urgebatur. Unde tensio fili hujus obliqui erit ad tensionem fili alterius perpendicularis PN , ut $p N$ ad $p H$. Ideoque si pondus p sit ad pondus A in ratione quæ componitur ex ratione reciproca minimarum distantiarum filorum suorum $p N$, AM a centro rotæ, & ratione directa $p H$ ad $p N$; pondera idem valebunt ad rotam movendam, atque adeo se mutuo sustinebunt, ut quilibet experiri potest.

Pondus autem p , planis illis duobus obliquis incumbens, rationem habet cunei inter corporis fissi facies internas: & inde vires cunei & mallei innotescunt: utpote cum vis qua pondus p urget planum $p Q$ sit ad vim, qua idem vel gravitate sua vel ictu mallei impellitur secundum lineam $p H$ in plana, ut $p N$ ad $p H$; atque ad vim, qua urget planum alterum $p G$, ut $p N$ ad NH . Sed & vis Cochleæ per similem virium divisionem colligitur; quippe quæ cuneus est a vecte impulsus. Usus igitur Corollarii hujus laiffime patet, & late patendo veritatem suam evincit; cum pendeat ex jam dictis Mechanica tota ab Auctoribus diversimode demonstrata. Ex hisce enim facile derivantur vires Machinarum, quæ ex Rotis, Tympanis, Trochleis, Vectibus, nervis tensis & ponderibus directe vel oblique ascenduntibus, cæterisque potentiis Mechanicis componi solent, ut & vires Tendinum ad animalium ossa movenda.

COROLLARIUM III.

Quantitas motus quæ colligitur capiendi summam motuum factorum ad eandem partem, & differentiam factorum ad contrarias, non mutatur ab actione corporum inter se.

Etenim actio eique contraria reactio æquales sunt per Legem III, adeoque per Legem II æquales in motibus efficiunt mutationes verus contrarias partes. Ergo si motus fiunt ad eandem partem; quicquid additur motui corporis fugientis, subducetur motui corporis insequentis sic, ut summa maneat eadem quæ prius. Sin corpora obviam eant; æqualis erit subductio de motu utriusque, adeoque differentia motuum factorum in contrarias partes manebit eadem.

Ut si corpus sphæricum A sit triplo majus corpore sphærico B , habeatque duas velocitatis partes; & B sequatur in eadem recta cum ve-

locitatis

AXIOMATA,
SIVE

locitatis partibus decem, adeoque motus ipsius *A* sit ad motum ipsius *B*, ut sex ad decem: ponantur motus illis esse partium sex & partium decem, & summa erit partium sexdecim. In corporum igitur concursu, si corpus *A* lucretur motus partes tres vel quatuor vel quinque, corpus *B* amittet partes totidem. adeoque perget corpus *A* post reflexionem cum partibus novem vel decem vel undecim, & *B* cum partibus septem vel sex vel quinque, existente semper summa partium sexdecim ut prius. Si corpus *A* lucretur partes novem vel decem vel undecim vel duodecim, adeoque progrediatur post concursum cum partibus quindecim vel sexdecim vel septendecim vel octodecim, corpus *B*, amittendo tot partes quot *A* lucratur, vel cum una parte progreditur amissis partibus novem, vel quiescet amisso motu suo progressivo partium decem, vel cum una parte regreditur amisso motu suo & (ut ita dicam) una parte amplius, vel regreditur cum partibus duabus ob detractum motum progressivum partium duodecim. Atque ita summæ motuum conspirantium $15 + 1$ vel $16 + 0$, & differentiæ contrariorum $17 - 1$ & $18 - 2$ semper erunt partium sexdecim, ut ante concursum & reflexionem. Cognitis autem motibus quibuscum corpora post reflexionem pergent, invenietur cujusque velocitas, ponendo eam esse ad velocitatem ante reflexionem, ut motus post est ad motum ante. Ut in casu ultimo, ubi corporis *A* motu erat partium sex ante reflexionem & partium octodecim postea, *B* velocitas partium duarum ante reflexionem; invenietur ejus velocitas postea sex post reflexionem, dicendo, ut motus pariter sit ante reflexionem ad motus partes octodecim postea, ita velocitas partes duæ ante reflexionem ad velocitatis partes sex postea.

Quod si corpora vel non Sphærica vel diversis in rectis moventia incidant in se mutuo oblique, & requirantur eorum motus post reflexionem; cognoscendus est situs plani a quo corpora concurrentia tanguntur in puncto concursus: dein corporis utriusque motus (per Corol. 11.) distinguendus est in duos, unum huic plano perpendicularem, alterum eidem parallelum: motus autem paralleli, propterea quod corpora agant in se invicem secundum lineam huic plano perpendicularem, retinendi sunt iidem post reflexionem atque antea; & motibus perpendicularibus mutationes æquales in partes contrarias tribuendæ sunt sic, ut summa conspirantium & differentia contrariorum maneat eadem quæ prius. Ex hujusmodi reflexionibus oriri etiam solent motus circulares corporum circa centra propria. Sed hos casus in sequentibus non considero, & nimis longum esset omnia huc spectantia demonstrare.

COROL.

COROLLARIUM IV.

LEGES
MOTUS.

Commune gravitatis Centrum, corporum duorum vel plurium, ab actionibus corporum inter se non mutat statum suum vel motus vel quietis; & propterea corporum omnium in se mutuo agentium (exclusis actionibus & impedimentis externis) commune Centrum gravitatis vel quiescit vel movetur uniformiter in directum.

Nam si puncta duo progrediantur uniformi cum motu in lineis rectis, & distantia eorum dividatur in ratione data, punctum dividens vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta. Hoc postea in Lemmate xxiii demonstratur, si punctorum motus fiant in eodem plano; & eadem ratione demonstrari potest, si motus illi non fiant in eodem plano. Ergo si corpora quocunque moventur uniformiter in lineis rectis, commune centrum gravitatis duorum quorumvis vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta; propterea quod linea, horum corporum centra in rectis uniformiter progredientia jungens, dividitur ab hoc centro communi in ratione data. Similiter & commune centrum horum duorum & tertii cujusvis vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta; propterea quod ab eo dividitur distantia centri communis corporum duorum & centri corporis tertii in data ratione. Eodem modo & commune centrum horum trium & quarti cujusvis vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta; propterea quod ab eo dividitur distantia inter centrum commune trium & centrum quarti in data ratione, & sic in infinitum. Igitur in systemate corporum quæ actionibus in se invicem aliisque omnibus in se extrinsecus impressis omnino vacant, adeoque moventur singula uniformiter in rectis singulis, commune omnium centrum gravitatis vel quiescit vel movetur uniformiter in directum.

Porro in systemate duorum corporum in se invicem agentium, cum distantia centrorum utriusque a communi gravitatis centro sint reciproce ut corpora; erunt motus relativi corporum eorundem, vel accedendi ad centrum illud vel ab eodem recedendi, æquales inter se. Proinde centrum illud a motuum æqualibus mutationibus in partes contrarias factis, atque adeo ab actionibus horum corporum inter se, nec promovetur nec retardatur nec mutationem patitur in statu suo quoad motum vel quietem. In systemate autem corporum plurium, quoniam duorum quorumvis in se mutuo agentium commune gravitatis centrum ob actionem illam nullatenus

C

mutat

AXIOMATA, *mutat statum suum; & reliquorum, quibuscum actio illa non intercedit, commune gravitatis centrum nihil inde patitur; distantia autem horum duorum centrorum dividitur a communi corporum omnium centro in partes summis totalibus corporum quorum sunt centra reciproce proportionales, adeoque centrīs illis duobus statum suum moventi vel quiescendi servantibus, commune omnium centrum servat etiam statum suum: manifestum est quod commune illud omnium centrum ob actiones binorum corporum inter se nunquam mutat statum suum quoad motum & quietem. In tali autem systemate actiones omnes corporum inter se vel inter bina sunt corpora, vel ab actionibus inter bina compositæ; & propterea communi omnium centro mutationem in statu motus ejus vel quietis nunquam inducunt. Quare cum centrum illud ubi corpora non agunt in se invicem, vel quiescit, vel in recta aliqua progreditur uniformiter; perget idem non obstantibus corporum actionibus inter se, vel semper quiescere, vel semper progredi uniformiter in directum; nisi a viribus in systema extrinsecus impressis deturbetur de hoc statu. Est igitur systematis corporum plurium Lex eadem quæ corporis solitarii, quoad perseverantiam in statu motus vel quietis. Motus enim progressivus seu corporis solitarii seu systematis corporum ex motu centri gravitatis æstimari semper debet.*

COROLLARIUM V.

Corporum dato spatio inclusorum idem sunt motus inter se, sive spatium illud quiescat, sive moveatur idem uniformiter in directum absque motu circulari.

Nam differentię motuum tendentium ad eandem partem, & summa tendentium ad contrarias, eadem sunt sub initio in utroque casu (ex hypothesi) & ex his summis vel differentiis oriuntur congressus & impetus quibus corpora se mutuo feriunt. Ergo per Legem II. æquales erunt congressuum effectus in utroque casu; & propterea manebunt motus inter se in uno casu æquales motibus inter se in altero. Idem comprobatur experimento luculento. Motus omnes eodem modo se habent in Navi, sive ea quiescat, sive moveatur uniformiter in directum.

COROLLARIUM VI.


Si corpora moveantur quomodocunque inter se, & a viribus acceleratricibus æqualibus secundum lineas parallelas urgeantur; pergent omnia eodem modo moveri inter se, ac si viribus illis non essent incitata.

Nam vires illæ æqualiter (pro quantitativis movendorum corporum)

rum) & secundum lineas parallelas agendo, corpora omnia æqualiter (quoad velocitatem) movebunt per Legem II. adeoque nunquam mutabunt positiones & motus eorum inter se. LEGES
MOTUS.


Scholium.

Haftenus principia tradidi a Mathematicis recepta & experientia multiplici confirmata. Per Leges duas primas & Corollaria duo prima *Galileus* invenit descensum Graviorum esse in duplicata ratione temporis, & motum Projectilium fieri in Parabola; conspirante experientia, nisi quatenus motus illi per aeris resistentiam aliquantum retardantur. Ab iisdem Legibus & Corollariis pendent demonstrata de temporibus oscillantium Pendulorum, suffragante Horologiorum experientia quotidiana. Ex his iisdem & Legge tertia *Christophorus Wrennus* Eques Auratus, *Johannes Wallisus S. T. D.* & *Christianus Hugenius*, hujus ætatis Geometrarum facile principes, regulas congressuum & reflexionum duorum corporum seorsim invenerunt, & eodem fere tempore cum *Societate Regia* communicarunt, inter se (quoad has leges) omnino conspirantes: & primus quidem *Wallisus*, deinde *Wrennus* & *Hugenius* inventum prodiderunt. Sed & veritas comprobata est a *Wrenno* coram *Regia Societate* per experimentum Pendulorum: quod etiam *Clarissimus Mariottus* libro integro exponere mox dignatus est. Verum, ut hoc experimentum cum Theoriis ad amissum congruat, habenda est ratio cum resistentiæ aeris, tum etiam vis Elasticæ concurrentium corporum. Pendeant corpora *A, B* filis parallelis & æqualibus *AC, BD*, a centris *C, D*. His centris & intervallis describantur semicirculi *EAF, GBH* radiis *CA, DB* bisecti. Trahatur corpus *A* ad arcus *EAF* punctum quodvis *R*, & (subducto corpore *B*) demittatur inde, redeatque post unam oscillationem ad punctum *V*. Est *RV* retardatio ex resistentia aeris. Hujus *RV* fiat *ST* pars quarta sita in medio, ita scilicet ut *RS* & *TV* æquantur, sitque *RS* ad *ST* ut 3 ad 2. Et ista *ST* exhibebit retardationem in descensu ab *S* ad *A* quam proxime. Restituatur corpus *B* in locum suum. Cadat corpus *A* de puncto *S*, & velocitas ejus in loco reflexionis *A*, absque errore sensibili, tanta erit ac



AXIOMATA,
SIVE

si in vacuo cecidisset de loco T . Exponatur igitur hæc velocitas per chordam arcus TA . Nam velocitatem Penduli in puncto infimo esse ut chordam arcus quem cadendo descripsit, Propositio est Geometris notissima. Post reflexionem perveniat corpus A ad locum s , & corpus B ad locum k . Tollatur corpus B & inveniat locus v ; a quo si corpus A demittatur & post unam oscillationem redeat ad locum r , sit st pars quarta ipsius rv sita in medio, ita videlicet ut rs & tu æquantur; & per chordam arcus tA exponatur velocitas quam corpus A proxime post reflexionem habuit in loco A . Nam t erit locus ille verus & correctus, ad quem corpus A , sublata aeris resistentia, ascendere debuisset. Simili methodo corrigendus erit locus k , ad quem corpus B ascendit, & inveniens locus l , ad quem corpus illud ascendere debuisset in vacuo. Hoc pacto experiri licet omnia perinde ac si in vacuo constituti essemus. Tandem ducendum erit corpus A in chordam arcus TA (quæ velocitatem ejus exhibet) ut habeatur motus ejus in loco A proxime ante reflexionem; deinde in chordam arcus tA , ut habeatur motus ejus in loco A proxime post reflexionem. Et sic corpus B ducendum erit in chordam arcus Bl , ut habeatur motus ejus proxime post reflexionem. Et simili methodo, ubi corpora duo simul demittuntur de locis diversis, inveniendi sunt motus utriusque tam ante, quam post reflexionem; & tum demum conferendi sunt motus inter se & colligendi effectus reflexionis. Hoc modo in Pendulis pedum decem rem tentando, idque in corporibus tam inæqualibus quam æqualibus, & faciendo ut corpora de intervallis amplissimis, puta pedum octo vel duodecim vel sexdecim, concurrerent; reperi semper sine errore trium digitorum in mensuris, ubi corpora sibi mutuo directe occurrebant, quod æquales erant mutationes motuum corporibus in partes contrarias illatæ, atque adeo quod actio & reactio semper erant æquales. Ut si corpus A incidebat in corpus B cum novem partibus motus, & amissis septem partibus pergebat post reflexionem cum duabus; corpus B resiliabat cum partibus illis septem. Si corpora obviam ibant A cum duodecim partibus & B cum sex, & redibat A cum duabus; redibat B cum octo, facta detractioe partium quatuordecim utrinque. De motu ipsius A subducantur partes duodecim, & restabit nihil.




nihil: subducantur aliæ partes duæ, & fiet motus duarum partium in plagam contrariam: & sic de motu corporis *B* partium sex subducendo partes quatuordecim, fient partes octo in plagam contrariam. Quod si corpora ibant ad eandem plagam, *A* velocius cum partibus quatuordecim, & *B* tardius cum partibus quinque, & post reflexionem pergebat *A* cum quinque partibus; pergebat *B* cum quatuordecim, facta translatione partium novem de *A* in *B*. Et sic in reliquis. A congressu & collisione corporum nunquam mutabatur quantitas motus, quæ ex summa motuum conspirantium & differentia contrariorum colligebatur. Nam errorem digiti unius & alterius in mensuris tribuerim difficultati peragendi singula satis accurate. Difficile erat, tum pendula simul demittere sic, ut corpora in se mutuo impingerent in loco infimo *AB*; tum loca, *s, k* notare, ad quæ corpora ascendebant post concursum. Sed & in ipsis pilis inæqualis partium densitas, & textura aliis de causis irregularis, errores inducebant.

Porro nequis obijciat Regulam, ad quam probandam inventum est hoc experimentum, præsupponere corpora vel absolute dura esse, vel saltem perfecte elastica, cujusmodi nulla reperiuntur in compositionibus naturalibus; addo quod Experimenta jam descripta succedunt in corporibus mollibus æque ac in duris, nimirum a conditione duritiei neutiquam pendentia. Nam si Regula illa in corporibus non perfecte duris tentanda est, debet solummodo reflexio minui in certa proportionem pro quantitate vis Elasticæ. In Theoria *Wrenni* & *Hugenii* corpora absolute dura redeunt ab invicem cum velocitate congressus. Certius id affirmabitur de perfecte Elasticis. In imperfecte Elasticis velocitas reditus minuenda est simul cum vi Elasticæ; propterea quod vis illa, (nisi ubi partes corporum ex congressu læduntur, vel extensionem aliqualem quasi sub malleo patiuntur,) certa ac determinata sit (quantum sentio) faciatque corpora redire ab invicem cum velocitate relativa, quæ sit ad relativam velocitatem concursus in data ratione. Id in pilis ex lana arcte conglomerata & fortiter constricta sic tentavi. Primum demittendo Pendula & mensurando reflexionem, inveni quantitatem vis Elasticæ; deinde per hanc vim determinavi reflexiones in aliis casibus concursuum, & respondabant Experimenta. Redibant semper pilæ ab invicem cum velocitate relativa, quæ esset ad velocitatem relativam concursus ut 5 ad 9 circiter. Eadem fere cum velocitate redibant pilæ ex chalybe: aliæ ex fubere cum paulo minore: in vitreis autem proportio erat 15 ad 16 circiter. Atque hoc pacto Lex tertia quoad ictus & reflexiones per Theoriam comprobata est, quæ cum experientia plane congruit.

AXIOMATA,
SIVE

In Attractionibus rem sic breviter ostendo. Corporibus duobus quibuscvis A, B se mutuo trahentibus, concipe obstaculum quodvis interponi quo congressus eorum impediatur. Si corpus alterutrum A magis trahitur versus corpus alterum B , quam illud alterum B in prius A , obstaculum magis urgebitur pressione corporis A quam pressione corporis B ; proindeque non manebit in æquilibrio. Prævalet pressio fortior, facietque ut systema corporum duorum & obstaculi moveatur in directum in partes versus B , motuque in spatiis liberis semper accelerato abeat in infinitum. Quod est absurdum & Legi primæ contrarium. Nam per Legem primam debet systema perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, proindeque corpora æqualiter urgebunt obstaculum, & idcirco æqualiter trahentur in invicem. Tentavi hoc in Magnete & Ferro. Si hæc in vasis propriis sese contingentibus seorsim posita, in aqua stagnante juxta fluitent; neutrum propellet alterum, sed æqualitate attractionis utrinque sustinebunt conatus in se mutuos, ac tandem in æquilibrio constituta quiescent.

Sic etiam gravitas inter Terram & ejus partes, mutua est. Secetur Terra FI plano quovis EG in partes duas EGF & EGI ; & æqualia erunt harum pondera in se mutuo. Nam si plano alio HK quod priori EG parallelum sit, pars major EGI secetur in partes duas $EGKH$ & HKI , quarum HKI æqualis sit parti prius abscissæ EGF : manifestum est quod pars media $EGKH$ pondere proprio in neutram partium extremarum propendebit, sed inter utramque in æquilibrio, ut ita dicam, suspendetur, & quiescet. Pars autem extrema HKI toto suo pondere incumbet in partem mediam, & urgebit illam in partem alteram extremam EGF ; ideoque vis qua partium HKI & $EGKH$ summa EGI tendit versus partem tertiam EGF , æqualis est ponderi partis HKI , id est ponderi partis tertiæ EGF . Et propterea pondera partium duarum EGI , EGF in se mutuo sunt æqualia, uti volui ostendere. Et nisi pondera illa æqualia essent, Terra tota in libero æthere fluitans ponderi majori cederet, & ab eo fugiendo abiret in infinitum.



Ut corpora in concursu & reflexione idem pollent, quorum velocitates sunt reciproce ut vires insitæ: sic in movendis Instrumentis mechanicis agentia idem pollent & conatibus contrariis se mutuo sustinent, quorum velocitates secundum determinationem virium

virium æstimatæ, sunt reciproce ut vires. Sic pondera æquipollent ad movenda brachia Libræ, quæ oscillante Libra sunt reciproce ut eorum velocitates sursum & deorsum: hoc est pondera, si recta ascendunt & descendunt, æquipollent, quæ sunt reciproce ut punctorum a quibus suspenduntur distantia ab axe Libræ; sin planis obliquis aliisve admotis obstaculis impedita ascendunt vel descendunt oblique, æquipollent quæ sunt reciproce ut ascensus & descensus, quatenus facti secundum perpendicularum: id adeo ob determinationem gravitatis deorsum. Similiter in Trochlea seu Polyspatto vis manus funem directe trahentis, quæ sit ad pondus vel directe vel oblique ascendens ut velocitas ascensus perpendicularis ad velocitatem manus funem trahentis, sustinebit pondus. In Horologiis & similibus instrumentis, quæ ex rotulis commissis constructa sunt, vires contrariæ ad motum rotularum promovendum & impediendum, si sint reciproce ut velocitates partium rotularum in quas imprimuntur, sustinebunt se mutuo. Vis Cochleæ ad premendum corpus est ad vim manus manubrii circumagentis, ut circularis velocitas manubrii ea in parte ubi a manu urgetur, ad velocitatem progressivam cochleæ versus corpus pressum. Vires quibus Cuneus urget partes duas ligni fissi sunt ad vim mallei in cuneum, ut progressus cunei secundum determinationem vis a malleo in ipsum impressæ, ad velocitatem qua partes ligni cedunt cuneo, secundum lineas faciebus cunei perpendiculares. Et par est ratio Machinarum omnium.

Harum efficacia & usus in eo solo consistit, ut diminuendo velocitatem augeamus vim, & contra: unde solvitur in omni aptorum instrumentorum genere Problema, *Datum pondus data vi movendi*, aliamve datam resistantiam vi data superandi. Nam si Machinæ ita formentur, ut velocitates Agentis & Resistentis sint reciproce ut vires; Agens resistantiam sustinebit: & majori cum velocitatum disparitate eandem vincet. Certe si tanta sit velocitatum disparitas, ut vincatur etiam resistantia omnis, quæ tam ex continuorum & inter se labentium corporum attritione, quam ex continuorum & ab invicem separandorum cohæsiione & elevandorum ponderibus oriri solet; superata omni ea resistantia, vis redundans accelerationem motus sibi proportionalem, partim in partibus machinæ, partim in corpore resistente producet. Ceterum Mechanicam tractare non est hujus instituti. Hisce volui tantum ostendere, quam late pateat quamque certa sit Lex tertia Motus. Nam si æstimetur Agentis actio ex ejus vi & velocitate

LEGES
MOTUS.

AXIOMATA,
SIVE

tate conjunctim ; & similiter Resistentis reactio æstimetur conjunctim ex ejus partium singularum velocitatibus & viribus resistendi ab earum attritione , cohæsione , pondere , & acceleratione oriundis ; erunt actio & reactio , in omni instrumentorum usu , sibi invicem semper æquales. Et quatenus actio propagatur per instrumentum & ultimo imprimitur in corpus omne resistens , ejus ultima determinatio determinationi reactionis semper erit contraria.

D E

MOTU CORPORUM

LIBER PRIMUS.

SECTIO I.

De Methodo Rationum primarum & ultimarum , cujus ope sequentia demonstrantur.

LEMMA I.

Quantitates , ut & quantitatum rationes , quæ ad æqualitatem tempore quovis finito constanter tendunt , & ante finem temporis illius propius ad invicem accedunt quam pro data quavis differentia , fiunt ultimo æquales.


Si negas ; fiant ultimo inæquales , & sit earum ultima differentia \mathcal{D} . Ergo nequeunt propius ad æqualitatem accedere quam pro data differentia \mathcal{D} : contra hypothefin.

LEMMA

L E M M A II.

 LIBER
PRIMUS.

Si in Figura quavis $AacE$, rectis Aa , AE & curva acE comprehensa, inscribantur parallelogramma quotcunque Ab , Bc , Cd , &c. sub basibus AB , BC , CD , &c. æqualibus, & lateribus Bb , Cc , Dd , &c. Figuræ lateri Aa parallelis contenta; & compleantur parallelogramma $aKbl$, $bLcm$, $cMdn$, &c. Dein horum parallelogrammorum latitudo minuatur, & numerus augeatur in infinitum: dico quod ultimæ rationes, quas habent ad se invicem Figura inscripta $AKbLcMdD$, circumscripta $AalbmcndoE$, & curvilinea $AabcdE$, sunt rationes æqualitatis.



Nam Figuræ inscriptæ & circumscriptæ differentia est summa parallelogrammorum Kl , Lm , Mn , Do , hoc est (ob æquales omnium bases) rectangulum sub unius basi Kb & altitudinum summa Aa , id est, rectangulum $ABla$. Sed hoc rectangulum, eo quod latitudo ejus AB in infinitum minuitur, fit minus quovis dato. Ergo (per Lemma I.) Figura inscripta & circumscripta & multo magis Figura curvilinea intermedia fiunt ultimo æquales. $\mathcal{Q}E.D.$

L E M M A III.

Eadem rationes ultimæ sunt etiam rationes æqualitatis, ubi parallelogrammorum latitudines &c. AB , BC , CD , sunt inæquales, & omnes minuuntur in infinitum.

Sit enim AF æqualis latitudini maximæ, & compleatur parallelogrammum $FAaf$. Hoc erit majus quam differentia Figuræ inscriptæ & Figuræ circumscriptæ; at latitudine sua AF in infinitum diminuta, minus fiet quam datum quodvis rectangulum. $\mathcal{Q}E.D.$

Corol. 1. Hinc summa ultima parallelogrammorum evanescentium coincidit omni ex parte cum Figura curvilinea.

Corol. 2. Et multo magis Figura rectilinea, quæ chordis evanescentium

D

centium

DE MOTU
CORPORUM



centium arcuum ab , bc , cd , &c. comprehenditur, coincidit ultimo cum Figura curvilinea.

Corol. 3. Ut & Figura rectilinea circumscripta quæ tangentibus eorundem arcuum comprehenditur.

Corol. 4. Et propterea hæ Figuræ ultimæ (quoad perimetros acE ,) non sunt rectilineæ, sed rectilinearum limites curvilinei.

LEMMA IV.

Si in duabus Figuris AacE, PprT, inscribantur (ut supra) duæ parallelogrammorum series, sitque idem amborum numerus, & ubi latitudines in infinitum diminuuntur, rationes ultimæ parallelogrammorum in una Figura ad parallelogramma in altera, singulorum ad singula, sint eædem; dico quod Figuræ duæ AacE, PprT, sunt ad invicem in eadem illa ratione.



Etenim ut sunt parallelogramma singula ad singula, ita (componendo) fit summa omnium ad summam omnium, & ita Figura ad Figuram; existente nimirum Figura priore (per Lemma III) ad summam priorem, & Figura posteriore ad summam posteriorem in ratione æqualitatis. *Q. E. D.*

Corol. Hinc si duæ cujuscunque generis quantitates in eundem partium numerum utcumque dividantur; & partes illæ, ubi numerus earum augetur & magnitudo diminuitur in infinitum, datam obtineant rationem ad invicem, prima ad primam, secunda ad secundam, cæteræque suo ordine ad cæteras: erunt tota ad invicem in eadem illa data ratione. Nam si in Lemmatis hujus Figuris sumantur parallelo-


rallelogramma inter se ut partes, summæ partium semper erunt **LIBER**
ut summæ parallelogrammorum; atque adeo, ubi partium & paral- **PRIMUS.**
lelogrammorum numerus augetur & magnitudo diminuitur in infi-
nitum in ultima ratione parallelogrammi ad parallelogrammum, id
est (per hypothesin) in ultima ratione partis ad partem.

LEMMA V.

Similium Figurarum latera omnia, quæ sibi mutuo respondent, sunt proportionalia, tam curvilinea quam rectilinea; & areæ sunt in duplicata ratione laterum.

LEMMA VI.

Si arcus quilibet positione datus AB subtendatur chorda AB, & in puncto aliquo A, in medio curvaturæ continuæ, tangatur a recta utrinque producta AD; dein puncta A, B ad invicem accedant & coeant; dico quod angulus BAD, sub chorda & tangente contentus, minuetur in infinitum & ultimo evanescet.



Nam si angulus ille non evanescit, continebit arcus AB cum tangente AD angulum rectilineo æqualem, & propterea curvatura ad punctum A non erit continua, contra hypothesin.

LEMMA VII.


Iisdem positis; dico quod ultima ratio arcus, chordæ, & tangentis ad invicem est ratio æqualitatis.

Nam dum punctum B ad punctum A accedit, intelligantur semper A & AD ad puncta longinqua b ac d produci, & secanti BD parallela agatur bd . Sitque arcus Ab semper similis arcui AB . Et punctis A, B coeuntibus, angulus dAb , per Lemma superius, evanescet; adeoque rectæ semper finitæ Ab, Ad & arcus intermedius Ab coincident, & propterea æquales erunt. Unde & hisce semper proportionales rectæ $AB, A'D$, & arcus intermedius AB

De Motu
Corporum

evanescent, & rationem ultimam habebunt æqualitatis. *Q.E.D.*

Corol. 1. Unde si per B ducatur tangenti parallela BF , rectam quamvis AF per A transeuntem perpetuo secans in F , hæc BF ultimo ad arcum evanescentem AB rationem habebit æqualitatis, eo quod completo parallelogrammo $AFBD$ rationem semper habet æqualitatis ad AD .




Corol. 2. Et si per B & A ducantur plures rectæ BE , BD , AF , AG , secantes tangentem AD & ipsius parallelam BF ; ratio ultima abscissarum omnium AD , AE , BF , BG , chordæque & arcus AB ad invicem erit ratio æqualitatis.

Corol. 3. Et propterea hæc omnes lineæ, in omni de rationibus ultimis argumentatione, pro se invicem usurpari possunt.

LEMMA VIII.

Si rectæ datæ AR, BR cum arcu AB, chorda AB & tangente AD, triangula tria ARB, ARB, ARD constituunt, dein puncta A, B accedunt ad invicem: dico quod ultima forma triangulorum evanescentium est similitudinis, & ultima ratio æqualitatis.

Nam dum punctum B ad punctum A accedit, intelligantur semper AB , AD , AR ad puncta longinqua b , d & r produci, ipsique RD parallela agi rbd , & arcui AB similis semper sit arcus Ab . Et coeuntibus punctis A, B , angulus bAd evanescet, & propterea triangula tria semper finita rAb , rAb , rAd coincident, suntque eo nomine similia & æqualia. Unde & hisce semper similia & proportionalia RAB , RAB , RAD fient ultimo sibi invicem similia & æqualia. *Q.E.D.*




Corol. Et hinc triangula illa, in omni de rationibus ultimis argumentatione, pro se invicem usurpari possunt.

LEMMA

L E M M A IX.

Si recta AE & curva ABC positione datae se mutuo secent in angulo dato A , & ad rectam illam in alio dato angulo ordinatim applicentur BD , CE curvæ occurrentes in B , C ; dein puncta B , C simul accedant ad punctum A : dico quod areae triangulorum ABD , ACE erunt ultimo ad invicem in duplicata ratione laterum.

Etenim dum puncta B , C accedunt ad punctum A , intelligatur semper AD produci ad puncta longinqua d & e , ut sint Ad , Ae ipsi AD , AE proportionales, & erigantur ordinatæ db , ec ordinatis DB , EC parallelæ quæ occurrant ipsi AB , AC productis in b & c . Duci intelligatur, tum curva abc ipsi ABC similis, tum recta Ag , quæ tangat curvam utramque in A , & secet ordinatim applicatas DB , EC , db , ec in F , G , f , g . Tum manente longitudine Ae coeant puncta B , C cum puncto A ; & angulo c Ag evanescente, coincident areae curvilineæ Abd , Ace cum rectilineis Afd , Age : adeoque (per Lemma v.) erunt in duplicata ratione laterum Ad , Ae : Sed his areis proportionales semper sunt areae ABD , ACE , & his lateribus latera AD , AE . Ergo & areae ABD , ACE sunt ultimo in duplicata ratione laterum AD , AE . Q. E. D.



L E M M A X.

Spatia quæ corpus urgente quacunque Vi finita describit, sive Vis illa determinata & immutabilis sit, sive eadem continuo augeatur vel continuo diminuatur, sunt ipso motus initio in duplicata ratione Temporum.

Exponentur tempora per lineas AD , AE , & velocitates genitæ per ordinatas DB , EC ; & spatia his velocitatibus descripta, erunt ut areae ABD , ACE his ordinatis descriptæ, hoc est, ipso motus initio (per Lemma ix.) in duplicata ratione temporum AD , AE . Q. E. D.

D 3

Corol.

DE MOTU
CORPORUM

Corol. 1. Et hinc facile colligitur, quod corporum similes similibus Figurarum partes temporibus proportionalibus describentium Errores, qui viribus quibuscumque æqualibus ad corpora similiter applicatis generantur, & mensurantur per distantias corporum a Figurarum similibus locis illis ad quæ corpora eadem temporibus iisdem proportionalibus absque viribus illis pervenirent, sunt ut quadrata temporum in quibus generantur quam proxime.

Corol. 2. Errores autem qui viribus proportionalibus ad similes Figurarum similibus partes similiter applicatis generantur, sunt ut vires & quadrata temporum conjunctim.

Corol. 3. Idem intelligendum est de spatiis quibuscumque quæ corpora urgentibus diversis viribus describunt. Hæc sunt, ipso motus initio, ut vires & quadrata temporum conjunctim.

Corol. 4. Ideoque vires sunt ut spatia, ipso motus initio, descripta directe & quadrata temporum inverse.

Corol. 5. Et quadrata temporum sunt ut descripta spatia directe & vires inverse.

Scholium.

Si quantitates indeterminatæ diversorum generum conferantur inter se, & earum aliqua dicatur esse ut est alia quævis directe vel inverse: sensus est, quod prior augetur vel diminuitur in eadem ratione cum posteriore, vel cum ejus reciproca. Et si earum aliqua dicatur esse ut sunt aliæ duæ vel plures directe vel inverse; sensus est, quod prima augetur vel minuitur in ratione quæ componitur ex rationibus in quibus aliæ vel aliarum reciprocae augentur vel diminuuntur. Ut si A dicatur esse ut B directe & C directe & D inverse: sensus est, quod A augetur vel diminuitur

in eadem ratione cum $B \times C \times \frac{1}{D}$, hoc est, quod A & $\frac{BC}{D}$ sunt ad invicem in ratione data.


LEMMA XI.

Subtensa evanescens anguli contactus, in curvis omnibus curvaturam finitam ad punctum contactus habentibus, est ultimo in ratione duplicata subtensæ arcus contermini.

Cas. 1. Si arcus ille AB, tangens ejus AD, subtensa anguli contactus ad tangentem perpendicularis BD, subtensa arcus AB. Huic subtensæ AB & tangenti AD perpendiculares erigantur AG, BG, concur-

concurrentes in G; dein accedant puncta D, B, G, ad puncta d, b, g, LIBER PRIMUS.
fitque J intersectio linearum BG, AG ultimo facta ubi puncta D, B
accedunt usque ad A. Manifestum est quod distantia G J minor
esse potest quam assignata quævis. Est autem (ex natura circularum
per puncta ABG, Abg transeuntium) AB quad.
æquale AG × BD & Ab quad. æquale Ag × bd, A
adeoque ratio AB quad. ad Ab quad. componitur c
ex rationibus AG ad Ag & BD ad bd. Sed C
quoniam GJ assumi potest minor longitudine
quavis assignata, fieri potest ut ratio AG ad
Ag minus differat a ratione æqualitatis quam
pro differentia quavis assignata, adeoque ut ra-
tio AB quad. ad Ab quad. minus differat a rati-
one BD ad bd quam pro differentia quavis as-
signata. Est ergo, per Lemma I, ratio ultima
AB quad. ad Ab quad. æqualis rationi ultimæ
BD ad bd. Q. E. D.

The diagram illustrates the geometric proof. It features two circles, one centered at G (larger) and one at g (smaller), both touching a common horizontal line at point A. Points B and D lie on the larger circle, while b and d lie on the smaller circle. Lines GB, GD, gb, and gd are drawn. A vertical line segment AG is shown, with a point J located between G and A. Horizontal segments AC and ac are drawn from A to the centers G and g respectively. A horizontal line segment CD is also shown, connecting the projections of the centers onto a common vertical line passing through A.



Caf. 2. Inclinetur jam BD ad AD in angulo G
quovis dato, & eadem femper erit ratio ultima BD ad bd quæ prius,
adeoque eadem ac AB quad. ad Ab quad. *Q. E. D.*

Caf. 3. Et quamvis angulus \mathcal{D} non detur, fed recta $B\mathcal{D}$ ad datum punctum convergente, vel alia quacunque lege conftituatur; tamen anguli \mathcal{D} , d communi lege conftituti ad æqualitatem femper vergent & propius accedent ad invicem quam pro differentia quavis assignata, adeoque ultimo æquales erunt, per Lem. 1, & propterea lineæ $B\mathcal{D}$, bd funt in eadem ratione ad invicem ac prius.

Q. E. D.

Corol. 1. Unde cum tangentēs AD , Ad , arcus AB , Ab , & eorum sinus BC , bc fiant ultimo chordis AB , Ab , æquales; erunt etiam illorum quadrata ultimo ut subtensæ BD , bd .

Corol. 2. Eorundem quadrata sunt etiam ultimo ut sunt arcuum sagittæ quæ chordas bifecant & ad datum punctum convergunt. Nam sagittæ illæ sunt ut subtensæ BD , bd .

Corol. 3. Ideoque sagitta est in duplicata ratione temporis quo corpus data velocitate describit arcum.

Corol. 4. Triangula rectilinea ADB , Adb sunt ultimo in triplicata ratione laterum AD , Ad , inque sesquuplicata laterum DB , db , utpote in composita ratione laterum AD , & DB , Ad & db existentia. Sic & triangula ABC , Abc sunt ultimo in triplicata ratione laterum BC , bc . Rationem vero sesquiplicatam voco triplicatæ subduplicatam, quæ nempe ex simplici & subduplicata componitur, quamque alias sesquialteram dicunt. *Corol.*

Corol.

Corol. 5. Et quoniam DB , db sunt ultimo parallelæ & in duplicata ratione ipsarum AD , Ad : erunt areae ultimæ curvilineæ ADB , Adb (ex natura Parabolæ) duæ tertiæ partes triangulorum rectilineorum ADB , Adb ; & segmenta AB , Ab partes tertiæ eorundem triangulorum. Et inde hæ areae & hæc segmenta erunt in triplicata ratione tum tangentium AD , Ad ; tum chordarum & arcuum AB , Ab .

Scholium.

Cæterum in his omnibus supponimus angulum contactus nec infinite majorem esse angulis contactuum, quos Circuli continent cum tangentibus suis, nec iisdem infinite minorem; hoc est curvaturam ad punctum A , nec infinite parvam esse nec infinite magnam, seu intervallum AJ finitæ esse magnitudinis. Capi enim potest DB ut AD^3 : quo in casu Circulus nullus per punctum A inter tangentem AD & curvam AB duci potest, proindeque angulus contactus erit infinite minor Circularibus. Et simili argumento si fiat DB successive ut AD^4 , AD^5 , AD^6 , AD^7 , &c. habebitur series angulorum contactus pergens in infinitum, quorum quilibet posterior est infinite minor priore. Et si fiat AB successive ut AD^2 , $AD^{\frac{3}{2}}$, $AD^{\frac{4}{3}}$, $AD^{\frac{5}{4}}$, $AD^{\frac{6}{5}}$, $AD^{\frac{7}{6}}$, &c. habebitur alia series infinita angulorum contactus, quorum primus est ejusdem generis cum Circularibus, secundus infinite major, & quilibet posterior infinite major priore. Sed & inter duos quosvis ex his angulis potest series utrinque in infinitum pergens angulorum intermediorum inferi, quorum quilibet posterior erit infinite major minorve priore. Ut si inter terminos AD^2 & AD^3 inseratur series $AD^{\frac{3}{2}}$, $AD^{\frac{5}{4}}$, $AD^{\frac{6}{5}}$, $AD^{\frac{7}{6}}$, $AD^{\frac{8}{7}}$, $AD^{\frac{9}{8}}$, $BD^{\frac{1}{2}}$, $AD^{\frac{1}{4}}$, $AD^{\frac{1}{5}}$, &c. Et rursus inter binos quosvis angulos hujus seriei inferi potest series nova angulorum intermediorum ab invicem infinitis intervallis differentium. Neque novit natura limitem.

Quæ de curvis lineis deque superficiebus comprehensis demonstrata sunt, facile applicantur ad solidorum superficies curvas & contenta. Præmissi vero hæc Lemmata, ut effugerem tædium deducendi perplexas demonstrationes, more veterum Geometrarum, ad absurdum. Contractiores enim reddunt demonstrationes per methodum Indivisibilem. Sed quoniam durior est Indivisibilem hypothesis, & propterea methodus illa minus Geometrica censetur; malui demonstrationes rerum sequentium ad ultimas quantitatum

evanescentium summas & rationes, primasque nascentium, id est, ad limites summarum & rationum deducere; & propterea limitum illorum demonstrationes qua potui brevitate præmittere. His enim idem præstatur quod per methodum Indivisibilibus; & principiis demonstratis jam tutius utemur. Proinde in sequentibus, si quando quantitates tanquam ex particulis constantes consideravero, vel si pro rectis usurpavero lineolas curvas; nolim indivisibilia, sed evanescentia divisibilia, non summas & rationes partium determinatarum, sed summarum & rationum limites semper intelligi; vimque talium demonstrationum ad methodum præcedentium Lemma- tum semper revocari.

Objectio est, quod quantitatuum evanescentium nulla sit ultima proportio; quippe quæ, antequam evanuerunt, non est ultima, ubi evanuerunt, nulla est. Sed & eodem argumento æque contendì posset nullam esse corporis ad certum locum pervenientis velocitatem ultimam: hanc enim, antequam corpus attingit locum, non esse ultimam, ubi attingit, nullam esse. Et responsio facilis est: Per velocitatem ultimam intelligi eam, qua corpus movetur neque antequam attingit locum ultimum & motus cessat, neque postea, sed tunc cum attingit; id est, illam ipsam velocitatem quacum corpus attingit locum ultimum & quacum motus cessat. Et similiter per ultimam rationem quantitatuum evanescentium, intelligendam esse rationem quantitatuum non antequam evanescent, non postea, sed quacum evanescent. Pariter & ratio prima nascentium est ratio quacum nascuntur. Et summa prima & ultima est quacum esse (vel augeri & minui) incipiunt & cessant. Extat limes quem velocitas in fine motus attingere potest, non autem transgredi. Hæc est velocitas ultima. Et par est ratio limitis quantitatuum & proportionum omnium incipientium & cessantium. Cumque hic limes sit certus & definitus, Problema est vere Geometricum eundem determinare. Geometrica vero omnia in aliis Geometricis determinandis ac demonstrandis legitime usurpantur.

Contendì etiam potest, quod si dentur ultimæ quantitatuum evanescentium rationes, dabuntur & ultimæ magnitudines: & sic quantitas omnis constabit ex Indivisibilibus, contra quam *Euclides* de Incommensurabilibus, in libro decimo Elementorum, demonstravit. Verum hæc Objectio falsæ innititur hypothesi. Ultimæ rationes illæ quibuscum quantitates evanescent, revera non sunt rationes quantitatuum ultimarum, sed limites ad quos quantitatuum sine limite decreascentium rationes semper appropinquant; & quas propius assequi possunt quam pro data quavis differentia, nunquam vero

DE MOTU transgredi, neque prius attingere quam quantitates diminuuntur in
CORPORUM infinitum. Res clarius intelligetur in infinite magnis. Si quantitates duæ quarum data est differentia augeantur in infinitum, dabitur harum ultima ratio, nimirum ratio æqualitatis, nec tamen ideo dabuntur quantitates ultimæ seu maximæ quarum ista est ratio. Igitur in fequentibus, siquando facili rerum conceptui consulens dixero quantitates quam minimas, vel evanescentes, vel ultimas; cave intelligas quantitates magnitudine determinatas, sed cogita semper diminuendas sine limite.


SECTIO II.

De Inventione Virium Centripetarum.

PROPOSITIO I. THEOREMA I.

Areas, quas corpora in gyros acta radiis ad immobile centrum virium ductis describunt, & in planis immobilibus consistere, & esse temporibus proportionales.

Dividatur tempus in partes æquales, & prima temporis parte describat corpus vi insita rectam AB . Idem secunda temporis parte, si nil impediret, recta pergeret ad c , (per Leg. 1.) describens lineam Bc æqualem ipsi AB ; adeo ut radii AS, BS, cS ad centrum actis, confectæ forent æquales areæ $ASB, BS c$. Verum ubi corpus venit ad B , agat vis centripeta impulsu unico sed magno, efficiatque ut corpus de recta Bc declinet & pergat in recta BC . Ipsi BS parallela agatur cC , occurrens BC in C ; & completa secunda temporis parte, corpus (per Legum Corol. 1.) reperietur in C , in eodem



eodem plano cum triangulo ASB . Junge SC ; & triangulum SB , ob parallelas SB , Cc , æquale erit triangulo SBc , atque adeo etiam triangulo SAB . Simili argumento si vis centripeta successive agat in C , D , E , &c. faciens ut corpus singulis temporis particulis singulas describat rectas CD , DE , EF , &c. jacebunt hæ omnes in eodem plano; & triangulum SCD triangulo SB , & SDE ipsi SCD , & SEF ipsi SDE æquale erit. Æqualibus igitur temporibus æquales aræ in plano immoto describuntur: & componendo, sunt arearum summæ quævis $SADS$, $SAFS$ inter se, ut sunt tempora descriptionum. Augeatur jam numerus & minuatur latitudo triangulorum in infinitum; & eorum ultima perimeter ADF , (per Corollarium quartum Lemmatis tertii) erit linea curva: adeoque vis centripeta, qua corpus a tangente hujus curvæ perpetuo retrahitur, aget indefinenter; aræ vero quævis descriptæ $SADS$, $SAFS$ temporibus descriptionum semper proportionales, erunt iidem temporibus in hoc casu proportionales. $Q. E. D.$

Corol. 1. Velocitas corporis in centrum immobile attracti est in spatiis non resistentibus reciproce ut perpendicularum, a centro illo in Orbis tangentem rectilineam demissum. Est enim velocitas in locis illis A , B , C , D , E , ut sunt bases æqualium triangulorum AB , BC , CD , DE , EF ; & hæ bases sunt reciproce ut perpendiculara in ipsas demissa.

Corol. 2. Si arcuum duorum æqualibus temporibus in spatiis non resistentibus ab eodem corpore successive descriptorum chordæ AB , BC compleantur in parallelogrammum $ABCV$, & hujus diagonalis BV in ea positione quam ultimo habet ubi arcus illi in infinitum diminuuntur, producat utrinque; transibit eadem per centrum virium.

Corol. 3. Si arcuum æqualibus temporibus in spatiis non resistentibus descriptorum chordæ AB , BC ac DE , EF compleantur in parallelogramma $ABCV$, $DEFZ$; vires in B & E sunt ad invicem in ultima ratione diagonalium BV , EZ , ubi arcus isti in infinitum diminuuntur. Nam corporis motus BC & EF componuntur (per Legum Corol. 1.) ex motibus Bc , BU & Ef , EZ : atqui BU & EZ ipsi Cc & Ff æquales, in Demonstratione Propositionis hujus generabantur ab impulsibus vis centripetæ in B & E , ideoque sunt his impulsibus proportionales.

Corol. 4. Vires quibus corpora quælibet in spatiis non resistentibus a motibus rectilineis retrahuntur ac detorquentur in orbem curvos sunt inter se ut arcuum æqualibus temporibus descriptorum sagittæ illæ quæ convergunt ad centrum virium, & chordas bisecant

DE MOTU
CORPORUM.

ubi arcus illi in infinitum diminuuntur. Nam hæ sagittæ sunt semisses diagonalium de quibus egimus in Corollario tertio.

Corol. 5. Ideoque vires eadem sunt ad vim gravitatis, ut hæ sagittæ ad sagittas horizonti perpendiculares arcuum Parabolicorum quos projectilia eodem tempore describunt.

Corol. 6. Eadem omnia obtinent per Legum Corol. iv. ubi plana in quibus corpora moventur, una cum centrīs viriū quæ in ipsis sita sunt, non quiescunt, sed moventur uniformiter in directum.

PROPOSITIO II. THEOREMA II.

Corpus omne, quod movetur in linea aliqua curva in plano descripta, & radio ducto ad punctum vel immobile, vel motu rectilineo uniformiter progrediens, describit areas circa punctum illud temporibus proportionales, urgetur a vi centripeta tendente ad idem punctum.

Cas. 1. Nam corpus omne quod movetur in linea curva, detorquetur de cursu rectilineo per vim aliquam in ipsum agentem (per Leg. i.) Et vis illa qua corpus de cursu rectilineo detorquetur, & cogitur triangula quam minima SAB , SBC , SCD , &c. circa punctum immobile S temporibus æqualibus æqualia describere, agit in loco B secundum lineam parallelam ipsi cC (per Prop. xl. Lib. i. Elem. & Leg. ii.) hoc est, secundum lineam BS ; & in loco C secundum lineam ipsi dD parallelam, hoc est, secundum lineam SC , &c. Agit ergo semper secundum lineas tendentes ad punctum illud immobile S . *Q. E. D.*

Cas. 2. Et, per Legum Corollarium quintum, perinde est si ve quiescat superficies in qua Corpus describit figuram rectilineam, si ve moveatur eadem una cum corpore, figura descripta, & puncto suo S uniformiter in directum.

Corol. 1. In Spatiis vel Mediis non resistentibus, si aræ non sunt temporibus proportionales, vires non tendunt ad concursum radiorum; sed inde declinant in consequentia seu versus plagam in quam fit motus, si modo arearum descriptio acceleratur: sin retardatur, declinant in antecedentia.

Corol. 2. In Mediis etiam resistentibus, si arearum descriptio acceleratur, viriū directiones declinant a concursu radiorum versus plagam in quam fit motus.

Scholium.

*Scholium.*LIBER
PRIMUS.

Urgeri potest corpus a vi centripeta composita ex pluribus viribus. In hoc casu sensus Propositionis est, quod vis illa quæ ex omnibus componitur, tendit ad punctum *S*. Porro si vis aliqua agat perpetuo secundum lineam superficiæ descriptæ perpendiculari; hæc faciet ut corpus deflectatur a plano sui motus; sed quantitatem superficiæ descriptæ nec augebit nec minuet, & propterea in compositione virium negligenda est.

PROPOSITIO III. THEOREMA III.

Corpus omne, quod radio ad centrum corporis alterius utcumque moti ducto describit areas circa centrum illud temporibus proportionales, urgetur vi composita ex vi centripeta tendente ad corpus illud alterum, & ex vi omni acceleratrice qua corpus illud alterum urgetur.

Sit corpus primum *L* & corpus alterum *T*: & (per Legum Corol. vi.) si vi nova, quæ æqualis & contraria sit illi qua corpus alterum *T* urgetur, urgeatur corpus utrumque secundum lineas parallelas; perget corpus primum *L* describere circa corpus alterum *T* areas easdem ac prius: vis autem, qua corpus alterum *T* urgebatur, jam destruetur per vim sibi æqualem & contrariam; & propterea (per Leg. i.) corpus illud alterum *T* sibimet ipsi jam relictum vel quiescet vel movebitur uniformiter in directum: & corpus primum *L* urgente differentia virium, id est, urgente vi reliqua perget areas temporibus proportionales circa corpus alterum *T* describere. Tendit igitur (per Theor. ii.) differentia virium ad corpus illud alterum *T* ut centrum. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si corpus unum *L* radio ad alterum *T* ducto describit areas temporibus proportionales; atque de vi tota (sive simpliciter, sive ex viribus pluribus, juxta Legum Corollarium secundum, composita,) qua corpus prius *L* urgetur, subducatur (per idem Legum Corollarium) vis tota acceleratrix qua corpus alterum urgetur: vis omnis reliqua qua corpus prius urgetur tendet ad corpus alterum *T* ut centrum.

Corol. 2. Et, si area illæ sunt temporibus quamproxime proportionales, vis reliqua tendet ad corpus alterum *T* quamproxime.

Corol. 3. Et vice versa, si vis reliqua tendit quamproxime ad corpus

DE MOTU
CORPORUM.

corpus alterum T , erunt areae illæ temporibus quamproxime proportionales.

Corol. 4. Si corpus L radio ad alterum corpus T ducto describit areas quæ, cum temporibus collatæ, sunt valde inæquales; & corpus illud alterum T vel quiescit vel movetur uniformiter in directum: actio vis centripetæ ad corpus illud alterum T tendentis, vel nulla est, vel miscetur & componitur cum actionibus admodum potentibus aliarum virium: Visque tota ex omnibus, si plures sunt vires, composita, ad aliud (sive immobile sive mobile) centrum dirigitur. Idem obtinet, ubi corpus alterum motu quocunque movetur; si modo vis centripeta sumatur, quæ restat post subductionem vis totius in corpus illud alterum T agentis.

Scholium.

Quoniam æquabilis arearum descriptio Index est Centri, quod vis illa respicit qua corpus maxime afficitur, quaque retrahitur a motu rectilineo & in orbita sua retinetur: quidni usurpemus in sequentibus æquabilem arearum descriptionem, ut Indicem Centri circum quod motus omnis circularis in spatiis liberis peragitur?

PROPOSITIO IV. THEOREMA IV.

Corporum, quæ diversos circulos æquabili motu describunt, vires centripetas ad centra eorundem circulorum tendere; & esse inter se, ut sunt arcuum simul descriptorum quadrata applicata ad circulorum radios.

Tendunt hæ vires ad centra circulorum per Prop. II. & Corol. II. Prop. I; & sunt inter se ut arcuum æqualibus temporibus quam minimis descriptorum sinus versi per Corol. IV. Prop. I; hoc est, ut quadrata arcuum eorundem ad diametros circulorum applicata per Lem. VII: & propterea, cum hi arcus sint ut arcus temporibus quibusvis æqualibus descripti, & diametri sint ut eorum radii; vires erunt ut arcuum quorumvis simul descriptorum quadrata applicata ad radios circulorum. *Q. E. D.*

Corol. I. Igitur, cum arcus illi sint ut velocitates corporum, vires centripetæ sunt ut velocitatum quadrata applicata ad radios circulorum: hoc est, ut cum Geometris loquar, vires sunt in ratione composita ex duplicata ratione velocitatum directe & ratione simplici radiorum inverse

Corol.

Corol. 2. Et, cum tempora periodica sint in ratione composita ex ratione radiorum directe & ratione velocitatum inverse, vires centripetæ sunt reciproce ut quadrata temporum periodicorum applicata ad circulorum radios; hoc est, in ratione composita ex ratione radiorum directe & ratione duplicata temporum periodicorum inverse.

L I B E R
P R I M U S.

Corol. 3. Unde, si tempora periodica æquantur & propterea velocitates sint ut radii; erunt etiam vires centripetæ ut radii: & contra.

Corol. 4. Si & tempora periodica & velocitates sint in ratione subduplicata radiorum; æquales erunt vires centripetæ inter se: & contra.

Corol. 5. Si tempora periodica sint ut radii & propterea velocitates æquales; vires centripetæ erunt reciproce ut radii: & contra.

Corol. 6. Si tempora periodica sint in ratione sesquuplicata radiorum & propterea velocitates reciproce in radiorum ratione subduplicata; vires centripetæ erunt reciproce ut quadrata radiorum; & contra.

Corol. 7. Et universaliter, si tempus periodicum sit ut Radii R potestas quælibet R^n , & propterea velocitates reciproce ut Radii potestas R^{n-1} ; erit vis centripeta reciproce ut Radii potestas R^{2n-1} ; & contra.

Corol. 8. Eadem omnia de temporibus, velocitatibus, & viribus, quibus corpora similes figurarum quarumcunque similibus, centraque in figuris illis similiter posita habentium, partes describunt, consequuntur ex Demonstratione præcedentium ad hosce casus applicata. Applicatur autem substituendo æquabilem arearum descriptionem pro æquabili motu, & distantias corporum a centrīs pro radiis usurpando.

Corol. 9. Ex eadem demonstratione consequitur etiam; quod arcus, quem corpus in circulo data vi centripeta uniformiter revolvens tempore quovis describit, medius est proportionalis inter diametrum circuli, & descensum corporis eadem data vi eodemque tempore cadendo confectum.

Scholium.

Casus Corollarii sexti obtinet in corporibus cœlestibus (ut seorsum collegerunt etiam nostrates *Wrennus*, *Hookius* & *Hallæus*) & propterea quæ spectant ad vim centripetam decrecentem in duplicata ratione distantiarum a centrīs, decrevi fusius in sequentibus exponere.

Porro

DE MOTU
CORPORUM.

Porro præcedentis propositionis & corollariorum ejus beneficio, colligitur etiam proportio vis centripetæ ad vim quamlibet notam, qualis est ea Gravitatis. Nam si corpus in circulo Terræ concentrico vi gravitatis suæ revolvatur, hæc gravitas est ipsius vis centripetæ. Datur autem, ex descensu gravium, & tempus revolutionis unius, & arcus dato quovis tempore descriptus, per hujus Corol. 1x. Et hujusmodi propositionibus *Hugenius*, in eximio suo Tractatu de *Horologio Oscillatorio*, vim gravitatis cum revolventium viribus centrifugis contulit.

Demonstrari etiam possunt præcedentia in hunc modum. In circulo quovis describi intelligatur Polygonum laterum quocunque. Et si corpus, in polygoni lateribus data cum velocitate movendo, ad ejus angulos singulos a circulo reflectatur, vis qua singulis reflexionibus impingit in circulum erit ut ejus velocitas: adeoque summa virium in dato tempore erit ut velocitas illa & numerus reflexionum conjunctim: hoc est (si polygonum detur specie) ut longitudo dato illo tempore descripta & longitudo eadem applicata ad Radium circuli; id est, ut quadratum longitudinis illius applicatum ad Radium: adeoque, si polygonum lateribus infinite diminutis coincidat cum circulo, ut quadratum arcus dato tempore descripti applicatum ad radium. Hæc est vis centrifuga, qua corpus urget circulum: & huic æqualis est vis contraria, qua circulus continuo repellit corpus centrum versus.


PROPOSITIO IV. PROBLEMA I.

Data quibuscunque in locis velocitate, qua corpus figuram datam viribus ad commune aliquod centrum tendentibus describit, centrum illud invenire.

Figuram descriptam tangant rectæ tres PT , TQV , VR , in punctis totidem P , Q , R , concurrentes in T & V . Ad tangentes erigantur perpendiculara PA , QB , RC , velocitatibus corporis in punctis illis P , Q , R , a quibus eriguntur reciproce proportionalia; id est, ita ut sit PA ad QB , ut velocitas in Q ad velocitatem in P , & QB ad RC ut velocitas in R ad velocitatem in Q . Per perpendicularorum terminos A , B , C ad angulos rectos ducantur AD , DBE , EC concurrentes in D & E ; Et actæ TD , VE concurrent in centro quæsito S .

Nam

Nam perpendiculara a centro S in tangentes PT , QT demissa (per Corol. 1. Prop. 1.) sunt reciproce ut velocitates corporis in punctis P & Q ; adeoque per constructionem ut perpendiculara AP , BQ directe, id est ut perpendiculara a puncto D in tangentes demissa. Unde facile colligitur quod puncta S , D , T , sunt in una recta. Et simili argumento puncta S , E , V sunt etiam in una recta; & propterea centrum S in concursu rectarum TD , VE versatur. $Q. E. D.$




PROPOSITIO VI. THEOREMA V.

Si corpus in spatio non resistente circa centrum immobile in Orbe quocunque revolvatur, & arcum quemvis jamjam nascentem tempore quam minimo describat, & sagitta arcus duci intelligatur quæ chordam bisecet, & producta transeat per centrum virium: erit vis centripeta in medio arcus, ut sagitta directe & tempus bis inverse.

Nam sagitta dato tempore est ut vis (per Corol. 4. Prop. 1.) & augendo tempus in ratione quavis, ob auctum arcum in eadem ratione sagitta augetur in ratione illa duplicata (per Corol. 2. & 3. Lem. XI.) adeoque est ut vis semel & tempus bis. Subducatur duplicata ratio temporis utrinque, & fiet vis ut sagitta directe & tempus bis inverse. $Q. E. D.$

Idem facile demonstratur etiam per Corol. 4. Lem. X.

Corol. 1. Si corpus P revolvendo circa centrum S describat lineam curvam APQ , tangat vero recta ZPR curvam illam in puncto quovis P , & ad tangentem ab alio quovis Curvæ puncto Q agatur QR distantia SP parallela, ac demittatur QT perpendicularis ad distantiam illam SP : vis centripeta erit reciproce ut solidum



$\frac{SP \text{ quad} \times QT \text{ quad}}{QR}$ si modo solidi illius ea semper fumatur quantitas, quæ ultimo fit ubi coeunt puncta P & Q . Nam QR æqualis est

ac denique per punctum Q agatur LR quæ ipsi SP parallela sit & occurrat tum circulo in L tum tangenti PZ in R . Et ob similia triangula ZQR , ZTP , VPA ; erit RP quad. hoc est QRL ad QT quad. ut AV quad. ad PV quad. Ideoque $QRL \times PV$ quad.

AV quad. æquatur QT quad. Ducantur hæc æqualia in SP quad. & punctis P & Q coeuntibus, scribatur PV pro RL .

Sic fiet $\frac{SP \text{ quad.} \times PV \text{ cub.}}{AV \text{ quad.}}$ æquale $\frac{SP \text{ quad.} \times QT \text{ quad.}}{QR}$. Ergo (per


Corol. 1 & 5 Prop. vi.) vis centripeta est reciproce ut $\frac{SPq \times PV \text{ cub.}}{AV \text{ quad.}}$ id est (ob datum AV quad.) reciproce ut quadratum distantiae seu altitudinis SP & cubus chordæ PV conjunctim. $Q. E. I.$

Idem aliter.

Ad tangentem PR productam demittatur perpendicularum ST , & ob similia triangula STP , VPA ; erit AV ad PV ut SP ad ST , ideoque $\frac{SP \times PV}{AV}$ æquale ST , & $\frac{SP \text{ quad.} \times PV \text{ cub.}}{AV \text{ quad.}}$ æquale $ST \text{ quad.} \times PV$. Et propterea (per Corol. 3 & 5 Prop. vi.) vis centripeta est reciproce ut $\frac{SPq \times PV \text{ cub.}}{AVq}$ hoc est, ob datam AV , reciproce ut $SPq \times PV \text{ cub.}$ $Q. E. I.$

Corol. 1. Hinc si punctum datum S ad quod vis centripeta semper tendit, locetur in circumferentia hujus circuli, puta ad V ; erit vis centripeta reciproce ut quadrato-cubus altitudinis SP .

Corol. 2. Vis qua corpus P in circulo APT circum virium centrum S revolvitur, est ad vim qua corpusidem P in eodem circulo & eodem tempore periodico circum aliud quodvis virium centrum R revolvi potest ut $RP \text{ quad.} \times SP$ ad cubum rectæ SG quæ a primo virium centro S ad orbis tangentem PG ducitur, & distantiae corporis a secundo virium centro parallela est. Nam, per constructionem hujus Propositionis, vis prior est ad vim posteriorem, ut $RPq \times PT \text{ cub.}$ ad $SPq \times PV \text{ cub.}$



Sunto CA, CB femiaxes Ellipseos; GP, DK diametri conjugatæ; PF, Qt perpendiculara ad diametros; Qv ordinatim appli-

Idem aliter.

In PG ab altera parte puncti t posita intelligatur tu æqualis ipsi tv ; deinde cape uV quæ sit ad vG ut est DC quad. ad PC quad. Et quoniam ex Conicis est Qv quad. ad PvG , ut DC quad. ad PC quad. erit Qv quad. æquale $Pv \times uV$. Unde quadratum chor-

dæ arcus PQ erit æquale rectangulo VPv ; adeoque Circulus qui tangit Sectionem Conicam in P & transit per punctum Q , transibit etiam per punctum V . Coeant puncta P & Q , & hic circulus ejusdem erit curvaturæ cum sectione conica in P , & PV æqualis erit

$\frac{2DCq}{PC}$. Proinde vis qua corpus P in Ellipfi revolvitur erit reci-

proce ut $\frac{2DCq}{PC}$ in PFq (per Corol. 3. Prop. VI.) hoc est (ob datum

$2DCq$ in PFq) directe ut PC . $Q. E. I.$

Corol. 1. Est igitur vis ut distantia corporis a centro Ellipseos : & vicissim, si vis sit ut distantia, movebitur corpus in Ellipfi centrum habente in centro virum, aut forte in circulo, in quem utique Ellipsis migrare potest.

Corol. 2. Et æqualia erunt revolutionum in Ellipsis universis circum centrum idem factarum periodica tempora. Nam tempora illa in Ellipsis similibus æqualia sunt per Corol. 3. & 8, Prop. IV: in Ellipsis autem communem habentibus axem majorem, sunt ad invicem ut Ellipseon areæ totæ directe & arearum particula simul descriptæ inverse; id est, ut axes minores directe & corporum velocitates in verticibus principalibus inverse; hoc est, ut axes illi minores directe & ordinatim applicatæ ad axes alteros inverse; & propterea (ob æqualitatem rationum directarum & inversarum) in ratione æqualitatis.

Scholium.

Si Ellipsis centro in infinitum abeunte vertatur in Parabolam, corpus movebitur in hac Parabola, & vis ad centrum infinite distans jam tendens evadet æquabilis. Hoc est Theorema Galilæi. Et si coni sectio Parabolica, inclinatione plani ad conum sectum mutata, vertatur in Hyperbolam, movebitur corpus in hujus perimetro, vi centripeta in centrifugam versa. Et quemadmodum in Circulo vel Ellipfi, si vires tendunt ad centrum figuræ in Abscissa positum, hæ vires augendo vel diminuendo Ordinatæ in ratione quacunque data, vel etiam mutando angulum inclinationis Ordinarum ad Abscissam, semper augentur vel diminuuntur in ratione distantiarum a centro, si modo tempora periodica maneant æqualia: sic etiam in figuris universis, si Ordinatæ augeantur vel diminuuntur in ratione quacunque data, vel angulus ordinationis utcumque mutetur, manente tempore periodico; vires ad centrum quodcumque in Abscissa positum tendentes a binis quibusvis figurarum locis, ad quæ terminantur Ordinatæ correspondentibus Abscissarum punctis insistentes, augentur vel diminuuntur in ratione distantiarum a centro.

SECTIO


S E C T I O III.

De motu Corporum in Conicis Sectionibus excentricis.

PROPOSITIO XI. PROBLEMA VI.

Revolvatur corpus in Ellipsi: requiritur Lex vis centripetæ tendentis ad umbilicum Ellipseos.

Est Ellipseos umbilicus S . Agatur SP secans Ellipseos tum diametrum DK in E , tum ordinatim applicatam Qv in x , & compleatur parallelogrammum $QxPR$. Patet EP æqualem esse semiaxi majori AC , eo quod acta ab altero Ellipseos umbilico H linea HI ipsi EC parallela, (ob æquales CS , CH) æquantur ES , EI , adeo ut EP semisumma sit ipsarum PS , PI , id est (ob parallelas HI , PR & angulos æquales IPR , HPZ) ipsarum PS , PH , quæ conjunctim axem totum $2AC$ adæquant. Ad SP demittatur perpendicularis



ris QT , & Ellipseos latere recto principali (seu $\frac{2BCquad.}{AC}$) dicto L , erit $L \times QR$ ad $L \times Pv$ ut QR ad Pv , id est ut PE seu AC ad PC ; & $L \times Pv$ ad GvP ut L ad Gv ; & GvP ad $Qv quad.$ ut $PC quad.$ ad $CD quad.$; & (per Corol. 2 Lem. VII.) $Qv quad.$ ad $Qx quad.$ punctis Q & P coeuntibus, est ratio æqualitatis; & $Qx quad.$ seu $Qv quad.$ est ad $QT quad.$ ut $EP quad.$ ad $PF quad.$ id est ut $CA quad.$ ad $PF quad.$ live (per Lem. XII.) ut $CD quad.$ ad $CB quad.$ Et conjunctis his omnibus rationibus, $L \times QR$ fit ad $QT quad.$ ut $AC \times L \times PCq. \times CDq.$ seu $2CBq. \times PCq. \times CDq.$ ad $PC \times Gv \times CDq. \times CBq.$ live ut $2PC$ ad Gv .
Sed,

Sed, punctis Q & P coeuntibus, æquantur $2PC$ & Gv . Ergo & his proportionalia $L \times QR$ & QT quad. æquantur. Ducantur hæc æqualia in $\frac{SPq}{QR}$ & fiet $L \times SPq$. æquale $\frac{SPq. \times QTq.}{QR}$. Ergo (per Corol. 1. & 5. Prop. VI.) vis centripeta reciproce est ut $L \times SPq$. id est, reciproce in ratione duplicata distantiae SP . $Q.E.I.$

LIBER
PRIMUS

Idem aliter.

Cum vis ad centrum Ellipseos tendens qua corpus P in Ellipsi illa revolvi potest, sit (per Corol. 1. Prop. x.) ut CP distantia corporis ab Ellipseos centro C ; ducatur CE parallela Ellipseos tangenti PR : & vis qua corpus idem P , circum aliud quodvis Ellipseos punctum S revolvi potest, si CE & PS concurrant in E , erit ut $\frac{PE \text{ cub.}}{SPq}$ (per Corol. 3. Prop. VII.) hoc est, si punctum S sit umbilicus Ellipseos, adeoque PE detur, ut SPq reciproce. $Q.E.I.$

Eadem brevitate qua traduximus Problema quintum ad Parabolam, & Hyperbolam, liceret idem hic facere: verum ob dignitatem Problematis & usum ejus in sequentibus, non pigebit causus ceteros demonstratione confirmare.

PROPOSITIO XII. PROBLEMA VII.

Moveatur corpus in Hyperbola: requiritur Lex vis centripetæ tendentis ad umbilicum figuræ.

Sunto CA , CB semi-axes Hyperbolæ; PG , KD diametri conjugatæ; PF , Qt perpendicularia ad diametros; & Qv ordinatim applicata ad diametrum GP . Agatur SP secans cum diametrum DK in E , tum ordinatim applicatam Qv in x , & compleatur parallelogrammum $QRPx$. Patet EP æqualem esse semiaxi transverso AC , eo quod, acta ab altero Hyperbolæ umbilico H linea HI ipsi EC parallela, ob æquales CS , CH , æquantur ES , EI ; adeo ut EP semidifferentia sit ipsarum PS , PI , id est (ob parallelas IH , PR & angulos æquales IPR , HPZ) ipsarum PS , PH , quarum differentia axem totum $2AC$ adæquat. Ad SP demittatur perpendicularis QT . Et Hyperbolæ latere recto principali (seu $\frac{2BCq}{AC}$) dicto L , erit $L \times QR$ ad $L \times Pv$ ut QR ad Pv , id est, ut PE seu AC ad PC ; Et $L \times Pv$ ad GvP ut L ad Gv ;

Idem aliter.

LIBER
PRIMUS.

Inveniatur vis quæ tendit ab Hyperbolæ centro *C*. Prodiabit hæc distantia *CP* proportionalis. Inde vero (per Corol. 3. Prop. vii.) vis ad umbilicum *S* tendens erit ut $\frac{PE^3}{SPq}$, hoc est, ob datam *PE*, reciproce ut *SPq*. Q. E. I.

Eodem modo demonstratur quod corpus, hac vi centripeta in centrifugam versa, movebitur in Hyperbola conjugata.

LEMMA XIII.

Latus rectum Parabolæ ad verticem quemvis pertinens, est quadruplum distantia verticis illius ab umbilico figuræ. Patet ex Conicis.

LEMMA XIV.

Perpendicularum quod ab umbilico Parabolæ ad tangentem ejus demittitur, medium est proportionale inter distantias umbilici a puncto contactus & a vertice principali figuræ.


Sit enim *AP* Parabola, *S* umbilicus ejus, *A* vertex principalis, *P* punctum contactus, *TO* ordinatim applicata ad diametrum principalem, *PM* tangens diametro principali occurrens in *M*, & *SN*, linea perpendicularis ab umbilico in tangentem. Jungatur *AN*, & ob æquales *MS* & *SP*, *MN* & *NP*, *MA* & *AO*, parallelæ erunt rectæ *AN* & *OP*, & inde triangulum *SAN* rectangulum erit ad *A* & simile triangulis æqualibus *SNM*, *SNP*. Ergo *PS* est ad *SN*, ut *SN* ad *SA*. Q. E. D.

Corol. 1. PSq est ad *SNq* ut *PS* ad *SA*.

Corol. 2. Et ob datam *SA*, est *SNq* ut *PS*.

G 2

Corol.




PROPOSITIO XIII. PROBLEMA VIII.

*Moveatur corpus in perimetro Parabole: requiritur Lex
vis centripetæ tendentis ad umbilicum hujus figuræ.*

Maneat constructio Lemmatis, sitque P corpus in perimetro Parabolæ, & a loco Q in quem corpus proxime movetur, age ipsi SP parallelam QR & perpendiculararem QT , nec non Qv tangenti parallelam & occurrentem tum diametro TPG in v , tum distantiae SP in x . Jam ob similia triangula Pxv , SPM & æqualia unius latera SM , SP , æqualia sunt alterius latera Px seu QR & Pv . Sed, ex Conicis, quadratum ordinatæ Qv æquale est rectangulo sub latere recto & segmento diametri Pv , id est (per Lem. XIII.) rectangulo $4PS \times Pv$, seu $4PS \times QR$; & punctis P & Q coeuntibus, ratio Qv ad Qx (per Corol. 2. Lem. VII.) fit ratio æqualitatis. Ergo

$Q \times quad.$ eoin
casu, æquale
est rectangulo
 $4 P S \times Q R$.
Est autem (ob
similia trian-
gula $Q \times T$,
 SPN) $Q \times q$.
ad QTq . ut
 PSq . ad SNq .
hoc est (per



Corol. i. Lem. xiv.) ut PS ad SA , id est ut $4 PS \times QR$ ad $4 SA \times QR$, & inde (per Prop. ix. Lib. v. Elem.) QTq . & $4 SA \times QR$ æquantur. Ducantur hæc æqualia in $\frac{SPq}{QR}$, & fiet $\frac{SPq \times QTq}{QR}$. æquale $SPq. \times 4 SA$: & propterea (per Corol. i & 5.

Prop. VI.) vis centripeta est reciproce ut $SPq \times SA$, id est, ob datam SA , reciproce in duplicata ratione distantiae SP . Q.E.I.

Corol.

Corol. 1. Ex tribus novissimis Propositionibus consequens est, ^{LIBER PRIMUS.} quod si corpus quodvis P , secundum lineam quamvis rectam PR , quacunque cum velocitate exeat de loco P , & vi centripeta quæ sit reciproce proportionalis quadrato distantiae locorum a centro, simul agitetur; movebitur hoc corpus in aliqua sectionum Conicarum umbilicum habente in centro virium; & contra. Nam datis umbilico & puncto contactus & positione tangentis, describi potest sectio Conica quæ curvaturam datam ad punctum illud habebit. Datur autem curvatura ex data vi centripeta: & Orbes duo se mutuo tangentes, eadem vi centripeta describi non possunt.

Corol. 2. Si velocitas, quacum corpus exit de loco suo P , ea sit, qua lineola PR in minima aliqua temporis particula describi possit, & vis centripeta potis sit eodem tempore corpus idem movere per spatium QR : movebitur hoc corpus in Conica aliqua sectione, cujus latus rectum principale est quantitas illa $\frac{QTq}{QR}$ quæ ultimo fit ubi lineolæ PR , QR in infinitum diminuuntur. Circulum in his Corollariis refero ad Ellipsin, & casum excipio ubi corpus recta descendit ad centrum.

PROPOSITIO XIV. THEOREMA VI.

Si corpora plura revolvantur circa centrum commune, & vis centripeta sit reciproce in duplicata ratione distantiae locorum a centro; dico quod Orbium Latera recta principalia sunt in duplicata ratione arearum quas corpora, radiis ad centrum ductis, eodem tempore describunt.

Nam, per Corol. 2. Prop. XIII. Latus rectum L æquale est quantitati $\frac{QTq}{QR}$ quæ ultimo fit ubi coeunt puncta P & Q . Sed linea minima QR , dato tempore, est ut vis centripeta generans, hoc est (per Hypothesin) reciproce ut SPq . Ergo $\frac{QTq}{QR}$ est ut $QTq \times SPq$. hoc est, latus rectum L in duplicata ratione areæ $QT \times SP$. *Q.E.D.*

DE MOTU
CORPORUM.

Corol. Hinc ellipseos area tota, eique proportionale rectangulum sub axibus, est in ratione composita ex subduplicata ratione lateris recti & ratione temporis periodici. Namque area tota est ut area $QT \times SP$, quæ dato tempore describitur, ducta in tempus periodicum.

PROPOSITIO XV. THEOREMA VII.

Iisdem positis, dico quod Tempora periodica in Ellipsis sunt in ratione sesquuplicata majorum axium.

Namque axis minor est medius proportionalis inter axem majorem & latus rectum, atque adeo rectangulum sub axibus est in ratione composita ex subduplicata ratione lateris recti & sesquuplicata ratione axis majoris. Sed hoc rectangulum, per Corollarium Prop. XIV. est in ratione composita ex subduplicata ratione lateris recti & ratione periodici temporis. Dematur utrobique subduplicata ratio lateris recti, & manebit sesquuplicata ratio majoris axis æqualis rationi periodici temporis. *Q. E. D.*

Corol. Sunt igitur tempora periodica in Ellipsis eadem ac in Circulis, quorum diametri æquantur majoribus axibus Ellipseon.


PROPOSITIO XVI. THEOREMA VIII.

Iisdem positis, & actis ad corpora lineis rectis, quæ ibidem tangant Orbitas, demissisque ab umbilico communi ad has tangentes perpendicularibus: dico quod Velocitates corporum sunt in ratione composita ex ratione perpendicularorum inverse & subduplicata ratione laterum rectorum principalium directe.

Ab umbilico S ad tangentem PR demitte perpendicularum ST & velocitas corporis P erit reciproce in subduplicata ratione quantitatis $\frac{STq}{L}$. Nam velocitas illa est ut arcus quam minimus PQ in data temporis particula descriptus, hoc est (per Lem. VII.) ut tangens PR , id est (ob proportionales PR ad QT & SP ad ST) ut $\frac{SP \times QT}{ST}$, five ut ST reciproce & $SP \times QT$ directe; estque

SP

SPXQT ut area dato tempore descripta, id est, per Prop. XIV. LIBER PRIMUS.
in subduplicata ratione lateris recti. *Q. E. D.*



Corol. 1. Latera recta principalia sunt in ratione composita ex duplicata ratione perpendicularorum & duplicata ratione velocitatum.

Corol. 2. Velocitates corporum in maximis & minimis ab umbilico communi distantis, sunt in ratione composita ex ratione distantiarum inverſe & ſubduplicata ratione laterum rectorum principalium directe. Nam perpendiculara jam ſunt ipſæ diſtantiæ.

Corol. 3. Ideoque velocitas in Conica sectione, in maxima vel minima ab umbilico distantia, est ad velocitatem in Circulo in eadem à centro distantia, in subduplicata ratione lateris recti principalis ad duplam illam distantiam.

Corol. 4. Corporum in Ellipsis gyantium velocitates in mediocribus distantis ab umbilico communi sunt eadem quæ corporum gyantium in Circulis ad eandem distantias; hoc est (per Corol. 6. Prop. iv.) reciproce in subduplicata ratione distantiarum. Nam perpendiculara jam sunt semi-axes minores; & hi sunt ut mediæ proportionales inter distantias & latera recta. Componatur hæc ratio inverse cum subduplicata ratione laterum rectorum directe, & fiet ratio subduplicata distantiarum inverse.

Corol. 5. In eadem figura, vel etiam in figuris diversis, quarum
latera

DE MOTU
CORPORUM.

latera recta principalia sunt æqualia, velocitas corporis est reciproce ut perpendicularum demissum ab umbilico ad tangentem.

Corol. 6. In Parabola, velocitas est reciproce in subduplicata ratione distantiae corporis ab umbilico figuræ; in Ellipsi magis variatur, in Hyperbola minus, quam in hac ratione. Nam (per Corol. 2. Lem. xiv.) perpendicularum demissum ab umbilico ad tangentem Parabolæ est in subduplicata ratione distantiae. In Hyperbola perpendicularum minus variatur, in Ellipsi magis.

Corol. 7. In Parabola velocitas corporis ad quamvis ab umbilico distantiam, est ad velocitatem corporis revolvantis in Circulo ad eandem a centro distantiam, in subduplicata ratione numeri binarii ad unitatem; in Ellipsi minor est, in Hyperbola major quam in hac ratione. Nam per hujus Corollarium secundum, velocitas in vertice Parabolæ est in hac ratione, & per Corollaria sexta hujus & Propositionis quartæ, servatur eadem proportio in omnibus distantiiis. Hinc etiam in Parabola velocitas ubique æqualis est velocitati corporis revolvantis in Circulo ad dimidiam distantiam, in Ellipsi minor est, in Hyperbola major.

Corol. 8. Velocitas gyantis in Sectione quavis Conica est ad velocitatem gyantis in Circulo in distantia dimidii lateris recti principalis Sectionis, ut distantia illa ad perpendicularum ab umbilico in tangentem Sectionis demissum. Patet per Corollarium quintum.

Corol. 9. Unde cum (per Corol. 6. Prop. iv.) velocitas gyantis in hoc Circulo sit ad velocitatem gyantis in Circulo quovis alio, reciproce in subduplicata ratione distantiarum; fiet ex æquo velocitas gyantis in Conica sectione ad velocitatem gyantis in Circulo in eadem distantia, ut media proportionalis inter distantiam illam communem & semissem principalis lateris recti sectionis, ad perpendicularum ab umbilico communi in tangentem sectionis demissum.

PROPOSITIO XVII. PROBLEMA IX.

Posito quod vis centripeta sit reciproce proportionalis quadrato distantiae locorum a centro, & quod vis illius quantitas absoluta sit cognita; requiritur Linea quam corpus describit, de loco dato, cum data velocitate, secundum datam rectam egrediens.


Vis centripeta tendens ad punctum S ea sit qua corpus p in orbita quavis data pq gyretur, & cognoscatur hujus velocitas in loco p .

De

De loco P , secundum lineam PR , exeat corpus P , cum data velocitate, & mox inde, cogente vi centripeta, deflectat illud in Coni-
sectionem PQ . Hanc igitur recta PR tanget in P . Tangat itidem
recta aliqua pr Orbitam pq in p , & si ab S ad eas tangentes demitti
intelligantur perpendiculara, erit (per Corol. 1. Prop. xvi.) latus rec-
tum principale Conisectionis ad latus rectum principale Orbitæ, in
ratione composita ex duplicata ratione perpendicularorum & dupli-
cata ratione velocitatum, atque adeo datur. Sit istud L . Datur
præterea Coni-
sectionis umbilicus S .

Anguli RPS comple-
 mentum ad duos
 rectos fiat angulus
 RPH , & dabitur
 positione linea PH ,
 in qua umbilicus al-
 ter H locatur. De-
 missio ad PH perpen-
 diculo SK , erigi intelligatur semiaxis conjugatus BC , & erit
 $SPq. - 2KPH + PHq. = SHq. = 4CHq. = 4BHQ. - 4BCq. =$
 $\overline{SP + PH. quad.} - L \times \overline{SP + PH} = SPq. + 2SPH + PHq.$
 $- L \times \overline{SP + PH}$. Addantur utrobique $2KPH - SPq. - PHq.$
 $+ L \times \overline{SP + PH}$, & fiet $L \times \overline{SP + PH} = 2SPH + 2KPH$,
 seu $SP + PH$, ad PH , ut $2SP + 2KP$ ad L . Unde datur PH
 tam longitudine quam positione. Nimirum si ea sit corporis in P
 velocitas, ut latus rectum L minus fuerit quam $2SP + 2KP$,
 jacebit PH ad eandem partem tangentis PR cum linea PS , adeo-
 que figura erit Ellipsis, & ex datis umbilicis S , H , & axe princi-
 pali $SP + PH$, dabitur: Sin tanta sit corporis velocitas ut latus
 rectum L æquale fuerit $2SP + 2KP$, longitudo PH infinita erit,
 & propterea figura erit Parabola axem habens SH parallelum lineæ
 PK , & inde dabitur. Quod si corpus majori adhuc cum veloci-
 tate de loco suo P exeat, capienda erit longitudo PH ad alte-
 ram partem tangentis, adeoque tangente inter umbilicos pergente,
 figura erit Hyperbola axem habens principalem æqualem differen-
 tiæ linearum SP & PH , & inde dabitur. Q. E. I.

Corol. 1. Hinc in omni Confectione ex dato vertice principali \mathcal{D} , latere recto L , & umbilico \mathcal{S} , datur umbilicus alter H capiend^o $\mathcal{D}H$, ad $\mathcal{D}\mathcal{S}$ ut est latus rectum ad differentiam inter latus rectum & $4\mathcal{D}\mathcal{S}$. Nam proportio $SP + PH$ ad PH ut $2SP + 2KP$ ad L ,
H



in casu hujus Corollarii, fit $\mathcal{DS} + \mathcal{DH}$ ad \mathcal{DH} ut 4 \mathcal{DS} ad L & divisum \mathcal{DS} ad \mathcal{DH} ut 4 $\mathcal{DS} - L$ ad L .

Corol. 2. Unde si datur corporis velocitas in vertice principali \mathcal{D} , invenietur Orbita expedite, capiendo scilicet latus rectum ejus, ad duplam distantiam \mathcal{DS} , in duplicata ratione velocitatis hujus datæ ad velocitatem corporis in Circulo, ad distantiam \mathcal{DS} , gyrantis (per Corol. 3. Prop. xvi.) dein \mathcal{DH} ad \mathcal{DS} ut latus rectum ad differentiam inter latus rectum & 4 \mathcal{DS} .


Corol. 3. Hinc etiam si corpus moveatur in Sectione quacunque Conica, & ex Orbe suo impulsu quocunque exturbetur; cognosci potest Orbis in quo postea cursum suum peraget. Nam componendo proprium corporis motum cum motu illo quem impulsus solus generaret, habebitur motus quocum corpus de dato impulsu loco, secundum rectam positione datam, exhibit.

Corol. 4. Et si corpus illud vi aliqua extrinsecus impressa continuo perturbetur, innotescet cursus quam proxime, colligendo mutationes quas vis illa in punctis quibusdam inducit, & ex seriei analogia mutationes continuas in locis intermediis æstimando.

Scholium.

Si corpus P vi centripeta ad punctum quodcunque datum R tendente moveatur in perimetro datæ cujuscunque Sectionis conicæ cujus centrum sit C , & requiratur Lex vis centripetæ: ducatur CG radio RP parallela, & Orbis tangenti PG occurrens in G ; & vis illa (per Corol. 1 & Schol. Prop. x; & Corol. 3. Prop. vii.) erit ut CG cub.

RP quad.



SECTIO


S E C T I O I V.

 LIBER
PRIMUS.

De Inventione Orbium Ellipticorum, Parabolicorum & Hyperbolicorum ex umbilico dato.

L E M M A X V.

Si ab Ellipseos vel Hyperbole cujusvis umbilicis duobus S, H, ad punctum quodvis tertium V inflectantur rectæ duæ SV, HV, quarum una HV æqualis sit axi principali figuræ, altera SV a perpendicularo TR in se demisso bisecetur in T; perpendicularum illud TR sectionem Conicam alicubi tanget: & contra, si tangit, erit HV æqualis axi principali figuræ.



Secet enim perpendicularum TR rectam HV productam, si opus fuerit, in R , & jungatur SR . Ob æquales TS , TV , æquales erunt & rectæ SR , VR & anguli TRS , TRV . Unde punctum R erit ad Sectionem Conicam, & perpendicularum TR tanget eandem: & contra. *Q. E. D.*

PROPOSITIO XVIII. PROBLEMA X.

Datis umbilico & axibus principalibus describere Trajectorias Ellipticas & Hyperbolicas, quæ transibunt per puncta data, & rectas positione datas contingent.

Sit S communis umbilicus figurarum; AB longitudo axis principalis Trajectoriæ cujusvis; P punctum per quod Trajectoria debet transire; & TR recta quam debet tangere. Centro P intervallo $AB - SP$, si orbita sit ellipsis, vel $AB + SP$, si ea sit Hyperbola, describatur circulus HG . Ad tangentem TR demittatur perpendicularum ST , & producat idem ad V , ut sit TV æqualis ST ; centroque V & intervallo AB describatur circulus FH . Hac

H 2

methodo

PROPOSITIO XX. PROBLEMA XII.

LIBER
PRIMUS.



Circa datum umbilicum Trajectoriam quamvis specie datam describere, quæ per data puncta transibit & rectas tangens positione datas.

Cas. 1. Dato umbilico S , describenda sit Trajectoria ABC per puncta duo B, C . Quoniam Trajectoria datur specie, dabitur ratio axis principalis ad distantiam umbilicorum. In ea ratione cape KB ad BS , & LC ad CS . Centris B, C , intervallis BK, CL , describe circulos duos & ad rectam KL , quæ tangat eosdem in K & L , demitte perpendicularum SG , idemque seca in A & a , ita ut sit GA ad AS & Ga ad aS ut est KB ad BS , & axe Aa , verticibus A, a , describatur Trajectoria. Dico factum. Sit enim H umbilicus alter Figuræ descriptæ, & cum sit GA ad AS ut Ga ad aS , erit divisim $Ga - GA$ seu Aa ad $aS - AS$ seu SH in eadem ratione, adeoque in ratione quam habet axis principalis Figuræ describendæ ad distantiam umbilicorum ejus; & propterea Figura descripta est ejusdem speciei cum describenda. Cumque sint KB ad BS & LC ad CS in eadem ratione, transibit hæc Figura per puncta B, C , ut ex Conicis manifestum est.

Cas. 2. Dato umbilico S , describenda sit Trajectoria quæ rectas duas TR, tr alicubi contingat. Ab umbilico in tangentes demitte perpendiculara ST, st & produce eadem ad V, v , ut sint TV, tv æquales TS, ts . Bifeca Vv in O , & erige perpendicularum infinitum OH , rectamque VS infinite productam seca in K & k ita, ut sit VK ad KS & Vk ad kS ut est Trajectoriæ describendæ axis principalis ad umbilicorum distantiam. Super diametro Kk describatur circulus secans OH in H ; & umbilicis S, H , axe principali ipsam VH æquante, describatur Trajectoria. Dico factum. Nam bifeca Kk in X , & junge HX, HS, HV, Hv . Quoniam est VK ad KS ut Vk ad kS ; & composite ut $VK + VK$ ad $KS + kS$; divisimque


H. 3.

ur



DE MOTU 2 Vk — VK ad kS — KS , id est ut 2 VX ad 2 KX & 2 KX ad
CORPORUM 2 SX , adeoque ut VX ad HX & HX ad SX , similia erunt tri-
angula VXH , HXS , & propterea VH erit ad SH ut VX ad XH ,
adeoque ut VK ad KS . Habet igitur Trajectoriæ descriptæ axis
principalis VH eam rationem ad ipsius umbilicorum distantiam SH ,
quam habet Trajectoriæ describendæ axis principalis ad ipsius um-
bilicorum distantiam, & propterea ejusdem est speciei. Insuper cum
 VH , vH , æquantur axi principali, & VS , vS a rectis TR , tr per-
pendiculariter bifecentur, liquet, ex Lemmate xv, rectas illas
Trajectoriam descriptam tangere. Q. E. F.


Cas. 3. Dato umbilico S describenda sit Trajectoria quæ rectam
 TR tanget in puncto dato R . In rectam TR demitte perpendicu-
larem ST , & produc eandem ad V , ut sit TV æqualis ST . Junge
 VR , & rectam VS infinite productam seca in K & k , ita ut sit
 VK ad SK & Vk ad Sk ut Ellipseos describendæ axis principalis ad
distantiam umbilicorum; circuloque super diametro Kk descripto,
secetur producta recta VR in H , & umbilicis S , H , axe principali
rectam VH æquante, describatur Trajectoria. Dico factum. Nam-
que VH esse ad SH ut VK ad
 SK , atque adeo ut axis principa-
lis Trajectoriæ describendæ ad
distantiam umbilicorum ejus, pa-
tet ex demonstratis in Casu se-
cundo, & propterea Trajecto-
riam descriptam ejusdem esse
speciei cum describenda; rectam
vero TR quæ angulus VR S bifecatur, tangere Trajectoriam in
puncto R , patet ex Conicis. Q. E. F.



Cas. 4. Circa umbilicum S describenda jam sit Trajectoria APB ,
quæ tangat rectam TR , transeatque per punctum quodvis P extra
tangentem datum, quæque similis sit Figuræ apb , axe principali
 ab & umbilicis s , b descriptæ. In tangentem TR demitte per-
pendiculum ST , & produc idem ad V , ut sit TV æqualis ST . An-
gulis autem VSP , SPV fac angulos hsq , sbq æquales; centro-
que q & intervallo quod sit ad ab ut SP ad VS describe circulum
secantem Figuram apb in p . Junge sp & age SH quæ sit ad sb
ut est SP ad sp , quæque angulum PSH angulo psb & angulum
 VSH angulo psq æquales constituat. Denique umbilicis S , H ,
& axe principali AB distantiam VH æquante, describatur sectio
Conica. Dico factum. Nam si agatur sv quæ sit ad sp ut est sb
ad

ad sq , quæque constituat angulum vsp angulo hsq & angulum ush angulo psq æquales, triangula svh , spq erunt similia & pro-
pterea vb erit ad pq ut est sb ad sq , id est (ob similia triangula

L I B E R
P R I M U S.



VSP , hsq) ut est VS ad SP seu ab ad pq . Æquantur ergo vb & ab . Porro ob similia triangula VSH , ush , est VH ad SH ut vb ad sb , id est, axis Conicæ sectionis jam descriptæ ad illius umbilicorum intervallum, ut axis ab ad umbilicorum intervallum sb ; & propterea Figura jam descripta similis est Figuræ apb . Transfit autem hæc Figura per punctum P , eo quod triangulum PSH simile sit triangulo psb ; & quia VH æquatur ipsius axi & VS bifecatur perpendiculariter a recta TR , tangit eadem rectam TR .
Q. E. F.


L E M M A XVI.

A datis tribus punctis ad quartum non datum inflectere tres rectas quarum differentiæ vel dantur vel nullæ sunt.

Cas. 1. Sunt puncta illa data A , B , C & punctum quartum Z , quod invenire oportet; Ob datam differentiam linearum AZ , BZ , locabitur punctum Z in Hyperbola cujus umbilici sunt A & B , & principalis axis differentia illa data. Sit axis ille MN . Cape P M.
ad

DE MOTU
CORPORUM

ad MA ut est MN ad AB , & erecta PR perpendiculari ad AB , demissaque ZR perpendiculari ad PR ; erit, ex natura hujus Hyperbolæ, ZR ad AZ ut est MN ad AB . Simili discursu punctum Z locabitur in alia Hyperbola, cujus umbilici sunt A, C & principalis axis differentia inter AZ & CZ , ducique potest Q S ipsi AC perpendicularis, ad quam si ab Hyperbolæ hujus puncto quovis Z demittatur normalis ZS , hæc fuerit ad AZ ut est differentia inter AZ & CZ ad AC . Dantur ergo rationes ipsarum ZR & ZS ad AZ & idcirco datur earundem ZR & ZS ratio ad invicem; ideoque si rectæ RP, SQ concurrant in T , & agatur TZ , figura $TRZS$, dabitur specie, & recta TZ in qua punctum Z alicubi locatur, dabitur positione. Eadem methodo per Hyperbolam tertiam, cujus umbilici sunt B & C & axis principalis differentia rectarum BZ, CZ , inveniri potest alia recta in qua punctum Z locatur. Habitis autem duobus Locis rectilineis, habetur punctum quaesitum Z in eorum intersectione. *Q.E.I.*



Caf. 2. Si duæ ex tribus lineis, puta AZ & BZ æquantur, punctum Z locabitur in perpendicularo bisecante distantiam AB , & locus alius rectilineus invenietur ut supra. *Q.E.I.*

Caf. 3. Si omnes tres æquantur, locabitur punctum Z in centro Circuli per puncta A, B, C transeuntis. *Q.E.I.*

Solvitur etiam hoc Lemma problematicum per Librum Tactionum *Apollonii* a *Vieta* restitutum.


PROPOSITIO XXI. PROBLEMA XIII.

Trajectoriam circa datum umbilicum describere, quæ transibit per puncta data & rectas positione datas continget.

Detur umbilicus S , punctum P , & tangens TR , & invenendus sit umbilicus alter H . Ad tangentem demitte perpendicularum ST , & produce idem ad T , ut sit TH , æqualis ST , & erit TH æqualis axi principali. Junge SP, HP , & erit SP differentia inter HP & axem principalem. Hoc modo si dentur plures tangen-


tes

tes TR vel plura puncta P , deveniatur semper ad lineas totidem TH , vel PH , a dictis punctis T vel P ad umbilicum H ductas, quæ vel æquantur axibus, vel datis longitudinibus SP differunt ab iisdem, atque adeo quæ vel æquantur sibi invicem, vel datas habent differentias; & inde, per Lemma superius, datur umbilicus ille alter H . Habitis autem umbilicis una cum axis longitudine (quæ vel TH ; vel, si Trajectoria Ellipsis est, $PH + SP$; sin Hyperbola, $PH - SP$) habetur Trajectoria. *Q. E. I.*



Scholium.

Casus ubi dantur tria puncta sic solvitur expeditius. Dentur puncta B, C, D . Junctas BC, CD produc ad E, F , ut sit EB ad EC ut SB ad SC , & FC ad FD ut SC ad SD . Ad EF ductam & productam demitte normales SG, BH , inque GS infinite producta cape GA ad AS & Ga ad aS ut est HB ad BS ; & erit A vertex, & Aa axis principalis Trajectoriæ: quæ, perinde ut GA major, æqualis, vel minor fuerit quam AS , erit Ellipsis, Parabola vel Hyperbola; puncto a in primo casu cadente ad eandem partem lineæ GF cum puncto A ; in secundo casu abeunte in infinitum; in tertio cadente ad contrariam partem lineæ GF . Nam si demittantur ad GF perpendiculara




CI, DK , erit IC ad HB ut EC ad EB , hoc est, ut SC ad SB ; & vicissim IC ad SC ut HB ad SB five ut GA ad SA . Et simili argumento probabitur esse KD ad SD in eadem ratione. Jacent ergo puncta B, C, D in Coni sectione circa umbilicum S ita descripta, ut rectæ omnes ab umbilico S ad singula Sectionis puncta ductæ, sint ad perpendiculara a punctis iisdem ad rectam GF demissa in data illa ratione.

Methodo haud multum dissimili hujus problematis solutionem tradit Clarissimus Geometra *de la Hire*, Conicorum suorum Lib. VIII. Prop. XXV.


Caf. 2. Ponamus jam Trapezii latera opposita AC & BD non esse parallela. Age Bd parallelam AC & occurrentem tum rectæ ST in t , tum Conicæ sectioni in d . Junge Cd secantem PQ in r ,

LIBER
PRIMUS

& ipsi PQ parallelam age DM fecantem Cd in M & AB in N . Jam ob similia triangu-
la BTt , DBN ; est Bt seu PQ ad Tt ut DN ad NB . Sic & Rr est ad AQ seu PS ut DM ad AN . Ergo, ducendo antecedentes in antecedentes & consequentes in consequentes, ut rectangulum PQ in Rr est ad rectangulum PS in Tt , ita rectangulum NDM est ad rectangulum ANB , & (per *Caf. 1.*) ita rectangulum PQ in Pr est ad rectangulum PS in Pt , ac divisim ita rectangulum $PQ \times PR$ est ad rectangulum $PS \times PT$. *Q. E. D.*



Caf. 3. Ponamus denique lineas quatuor PQ , PR , PS , PT non esse parallelas lateribus AC , AB , sed ad ea utcumque inclinatas. Earum vice age Pq , Pr parallelas ipsi AC ; & Ps , Pt parallelas ipsi AB ; & propter datos angulos triangulorum PQq , PRr , PSs , PTt , dabuntur rationes PQ ad Pq , PR ad Pr , PS ad Ps , & PT ad Pt ; atque adeo rationes compositæ $PQ \times PR$ ad $Pq \times Pr$, & $PS \times PT$ ad $Ps \times Pt$. Sed, per superius demonstrata, ratio $Pq \times Pr$ ad $Ps \times Pt$ data est: Ergo & ratio $PQ \times PR$ ad $PS \times PT$. *Q. E. D.*




L E M M A XVIII.

Iisdem positis, si rectangulum ductarum ad opposita duo latera Trapezii $PQ \times PR$ sit ad rectangulum ductarum ad reliqua duo latera $PS \times PT$ in data ratione; punctum P , a quo lineæ ducuntur, tanget Conicam sectionem circa Trapezium descriptam.

vertetur in geminas Rectas, quarum una est recta illa in quam punctum p incidit, & altera est recta qua alia duo ex punctis quatuor ^{LIBER PRIMUS.} junguntur. Si Trapezii anguli duo oppositi simul sumpti æquantur duobus rectis, & lineæ quatuor PQ, PR, PS, PT ducantur ad latera ejus vel perpendiculariter vel in angulis quibuscvis æqualibus, sitque rectangulum sub duabus ductis $PQ \times PR$ æquale rectangulo sub duabus aliis $PS \times PT$, Sectio conica evadet Circulus. Idem fiet si lineæ quatuor ducantur in angulis quibuscvis & rectangulum sub duabus ductis $PQ \times PR$ sit ad rectangulum sub aliis duabus $PS \times PT$ ut rectangulum sub sinibus angulorum S, T , in quibus duæ ultimæ PS, PT ducuntur, ad rectangulum sub sinibus angulorum Q, R in quibus duæ primæ PQ, PR ducuntur. Cæteris in casibus Locus puncti P erit aliqua trium figurarum quæ vulgo nominantur Sectiones Conicæ. Vice autem Trapezii $ABCD$ substitui potest Quadrilaterum cujus latera duo opposita se mutuo instar diagonalium decussant. Sed & e punctis quatuor A, B, C, D , possunt unum vel duo abire ad infinitum, eoque pacto latera figuræ quæ ad puncta illa convergunt, evadere parallela: quo in casu Sectio Conica transibit per cætera puncta, & in plagas parallelarum abit in infinitum.

L E M M A XIX.

Invenire punctum P , a quo si rectæ quatuor PQ, PR, PS, PT , ad alias totidem positione datas rectas AB, CD, AC, BD , singulæ ad singulas in datis angulis ducantur, rectangulum sub duabus ductis, $PQ \times PR$, sit ad rectangulum sub aliis duabus $PS \times PT$ in data ratione.




Lineæ AB, CD , ad quas rectæ duæ PQ, PR , unum rectangulorum continentes ducuntur, convenient cum aliis duabus positione datis lineis in punctis A, B, C, D . Ab eorum aliquo A age rectam quamlibet AH , in qua velis punctum P reperiri. Secet ea lineas oppositas BD, CD , nimirum BD in H , & CD in I , & ob datos omnes angulos figuræ, dabuntur rationes PQ ad PA & PA ad

Si Parallelogrammum quodvis ASPQ angulis duobus oppositis A & P tangit sectionem quamvis Conicam in punctis A & P; &, lateribus unius angulorum illorum infinite productis AQ, AS, occurrit eidem sectioni Conicæ in B & C; a punctis autem occursum B & C ad quintum quodvis sectionis Conicæ punctum D agantur rectæ duæ BD, CD occurrentes alteris duobus infinite productis parallelogrammi lateribus PS, PQ in T & R: erunt semper abscissæ laterum partes PR & PT ad invicem in data ratione. Et contra, si partes illæ abscissæ sunt ad invicem in data ratione, punctum D tanget Sectionem Conicam per puncta quatuor A, B, C, P transeuntem.

Caf. 1. Jungantur BP , CP & a puncto D agantur rectæ duæ DG , DE , quarum prior DG ipsi AB parallela fit & occurrat PB , PQ , CA in H , I , G ; altera DE parallela fit ipsi AC & occurrat PC , PS , AB in F , K , E : & erit (per Lemma xvii.) rectangulum $DE \times DF$ ad rectangulum $DG \times DH$ in ratione data. Sed est PQ , ad DE (feu IQ) ut PB ad HB , adeoque ut PT ad DH ; & vicissim PQ , ad PT ut DE ad DH . Est & PR ad DF ut RC ad DC , adeoque ut $(IG$ vel) PS ad DG , & vicissim PR ad PS ut DF ad DG ; & conjunctis rationibus fit rectangulum $PQ \times PR$ ad rectangulum $PS \times PT$ ut rectangulum $DE \times DF$ ad rectangulum $DG \times DH$, atque adeo in data ratione. Sed dantur PQ & PS & propterea ratio PR ad PT datur. *Q. E. D.*


Caf. 2. Quod si PR & IT ponatur in data ratione ad invicem, tum simili ratiocinio regrediendo, fequetur effe rectangulum $DE \times DF$ ad rectangulum $DG \times DH$, in ratione data, adeoque punctum D (per Lemma XVIII.) contingere Conicam fectionem tranfeuntem per puncta A, B, C, P . *Q. E. D.*

Carol.



Nam si in recta MN detur punctum N , & ubi punctum mobile M incidit in immotum N , incidat punctum mobile D in immotum P . LIBER I
PRIMUS

Junge CN , BN , CP , BP , & a puncto P age rectas PT , PR occurrentes ipsis BD , CD in T & R , & facientes angulum BPT æqualem angulo dato BNM , & angulum CPR æqualem angulo dato CNM . Cum ergo (ex Hypothefi) æquales sint anguli MBD , NBP , ut & anguli MCD , NCP ; aufer communes NBD & NCD , & restabunt æquales NBM & PBT ,



NCM & PCR : adeoque triacula NBM , BPT similia sunt, ut & triacula NCM , PCR . Quare PT est ad NM ut PB ad NB , & PR ad NM ut PC ad NC . Sunt autem puncta B , C , N , P immobilia. Ergo PT & PR datam habent rationem ad NM , proindeque datam rationem inter se; atque adeo, per Lemma xx, punctum D (perpetuus rectarum mobilium BT & CR concursus) contingit sectionem Conicam, per puncta B , C , P transeuntem. *Q. E. D.*


Et contra, si punctum mobile D contingat sectionem Conicam transeuntem per data puncta B , C , A , & sit angulus DBM semper æqualis angulo dato ABC , & angulus DCM semper æqualis angulo dato ACB , & ubi punctum D incidit successive in duo quavis sectionis puncta immobilia p , P , punctum mobile M incidat successive in puncta duo immobilia n , N : per eadem n , N agatur recta nN , & hæc erit Locus perpetuus puncti illius mobilis M . Nam, si fieri potest, versetur punctum M in linea aliqua Curva. Tanget ergo punctum D sectionem Conicam per puncta quinque B , C , A , p , P , transeuntem, ubi punctum M perpetuo tangit lineam Curvam. Sed & ex jam demonstratis tanget etiam punctum D sectionem Conicam per eadem quinque puncta B , C , A , p , P transeuntem, ubi punctum

DE MOTU tum M perpetuo tangit lineam Rectam. Ergo duæ sectiones **Co-**
CORPORUM nicæ transibunt per eadem quinque puncta, contra Corol. 3. Lem.
 xx. Igitur punctum M versari in linea Curva absurdum est. *Q. E. D.*

PROPOSITIO XXII. PROBLEMA XIV.

Trajectoriam per data quinque puncta describere.


Dentur puncta quinque A, B, C, P, D . Ab eorum aliquo A ad
 alia duo quævis B, C , quæ post poli nominentur, age rectas AB, AC ,



hisque parallelas TPS, PRQ per punctum quartum P . Deinde
 a polis duobus B, C age per punctum quintum D infinitas duas
 BDT, CRD , novissime ductis TPS, PRQ (priorem priori &
 posteriorem posteriori) occurrentes in T & R . Denique de rectis
 PT, PR , acta recta tr ipsi TR parallela, abscinde quasvis $Pt,$
 Pr ipsis PT, PR proportionales; & si per earum terminos t, r &
 polos B, C actæ Bt, Cr concurrant in d , locabitur punctum illud d
 in Trajectoria quæsitâ. Nam punctum illud d (per Lemma xx.)
 versatur in Conica Sectione per puncta quatuor A, B, C, P trans-
 eunte; & lineis Rr, Tt evanescentibus, coit punctum d cum puncto
 D . Transit ergo sectio Conica per puncta quinque A, B, C, P, D .
Q. E. D.

Idem.

E punctis datis jungere tria quævis A, B, C ; & circum duo eorum B, C ceu polos, rotando angulos magnitudine datos ABC, ACB , applicentur crura BA, CA primo ad punctum D , deinde ad punctum P , & notentur puncta M, N in quibus altera crura BL, CL casu utroque se decussant. Agatur recta infinita MN , & rotentur anguli illi mobiles circum polos suos B, C , ea lege, ut crurum BL, CL vel BM, CM intersectio quæ jam sit m , incidat semper in rectam illam infinitam MN & crurum BA, CA , vel



BD, CD intersectio, quæ jam sit d , Trajectoriam quæsitam $PADdB$ delineabit. Nam punctum d , per Lem. xxi , continget sectionem Conicam per puncta B, C transeuntem; & ubi punctum m accedit ad puncta L, M, N , punctum d (per constructionem) accedet ad puncta A, D, P . Describitur itaque sectio Conica transiens per puncta quinque A, B, C, P, D . $\mathcal{Q}. E. F.$

Corol. i. Hinc recta expedite duci potest, quæ Trajectoriam quæsitam, in puncto quovis dato B , continget. Accedat punctum d ad punctum B , & recta Bd evadet tangens quæsitæ.

Corol. 2. Unde etiam Trajectoriarum Centra, Diametri & Latera recta inveniri possunt, ut in Corollario secundo Lemmatis XIX.


Scholium.

Constructio prior evadet paulo simplicior jungendo BP , & in ea, si opus est, producta capiendo Bp ad BP ut est PR ad PT ; & per p agendo rectam infinitam pd ipsi SPT parallelam, inque ea capiendo semper pd æqualem Pr ; & agendo rectas Bd , Cr concurrentes in d . Nam cum sint Pr ad Pt , PR ad PT , pB ad PB , pd ad Pt in eadem ratione; erunt pd & Pr semper æqua-

Idem aliter.

LIBER
PRIMUS.

Revolvatur tum angulus magnitudine datus CBH circa polum B , tum radius quilibet rectilineus & utrinque productus DC circa polum C . Notentur puncta M, N in quibus anguli crus BC secat radium illum ubi crus alterum BH concurrat cum eodem radio in punctis P & D . Deinde ad actam infinitam MN concur-




rant perpetuo radius ille CP vel CD & anguli crus BC , & cruris alterius BH concursus cum radio delineabit Trajectoriam quaesitam.

Nam si in constructionibus Problematis superioris accedat punctum A ad punctum B , lineae CA & CB coincident, & linea AB in ultimo suo situ fiet tangens BH , atque adeo constructiones ibi positae evadent eadem cum constructionibus hic descriptis. Delineabit igitur cruris BH concursus cum radio sectionem Conicam per puncta C, D, P transeuntem, & rectam BH tangentem in puncto B . *Q. E. F.*

Caf. 2. Dentur puncta quatuor B, C, D, P extra tangentem HI sita. Junge bina lineis BD, CP concurrentibus in G , tangentibusque

DE MOTU
CORPORUM

tique occurrentibus in H & I . Secetur tangens in A , ita ut fit HA ad AI , ut est rectangulum sub media proportionali inter CG & CP & media proportionali inter BH & HD , ad rectangulum sub media proportionali inter DG & GB & media proportionali inter PI & IC ; & erit A punctum contactus. Nam si rectæ PI parallela HX Trajectoriam fecet in punctis quibuscvis X & Y :




erit (ex Conicis) punctum A ita locandum, ut fuerit HA quad. ad AI quad. in ratione composita ex ratione rectanguli XHY ad rectangulum BHD seu rectanguli CGP ad rectangulum DGB & ex ratione rectanguli BHD ad rectangulum PIC . Invento autem contactus puncto, A , describetur Trajectoria ut in casu primo. $Q.E.F.$ Capi autem potest punctum A vel inter puncta H & I , vel extra; & perinde Trajectoria dupliciter describi.

PROPOSITIO XXIV. PROBLEMA XVI.

Trajectoriam describere quæ transibit per data tria puncta & rectas duas positione datas continget.

Dentur tangentes HI , KL & puncta B , C , D . Per punctorum duo quævis B , D age rectam infinitam BD tangentibus occurrentem in punctis H , K . Deinde etiam per alia duo quævis C , D age infinitam CD tangentibus occurrentem in punctis I , L . Actas ita fecit in R & S , ut sit HR ad KR ut est media proportionalis inter BH & HD ad mediam proportionalem inter BK & KD ; & IS ad LS ut est media proportionalis inter CI & ID ad mediam proportionalem inter CL



&


& LD . Seca autem pro lubitu vel inter puncta K & H , I & L , vel extra eadem: dein age RS secantem tangentes in A & P , & erunt A & P puncta contactuum. Nam si A & P supponantur esse puncta contactuum alicubi in tangentibus sita; & per punctorum H , I , K , L quodvis I , in tangente alterutra HI fitum, agatur recta IY tangenti alteri KL parallela, quæ occurrat curvæ in X & T , & in ea sumatur IZ media proportionalis inter IX & IT : erit ex Conicis, rectangulum XIY seu IZ quad. ad LP quad. ut rectangulum CID ad rectangulum CLD , id est (per constructionem) ut SI quad. ad SL quad. atque adeo IZ ad LP ut SI ad SL . Jacent ergo puncta S, P, Z in una recta. Porro tangentibus concurrentibus in G , erit (ex Conicis) rectangulum XIT seu IZ quad. ad IA quad. ut GP quad. ad GA quad: adeoque IZ ad IA ut GP ad GA . Jacent ergo puncta P, Z & A in una recta, adeoque puncta S, P & A sunt in una recta. Et eodem argumento probabitur quod puncta R, P & A sunt in una recta. Jacent igitur puncta contactuum A & P in recta RS . Hisce autem inventis, Trajectoria describetur ut in casu primo Problematis superioris, Q. E. F.

LEMMA XXII.

Figuras in alias ejusdem generis figuras mutare.

Transmutanda sit figura quævis *HGI*. Ducantur pro lubitu rectæ duæ parallelæ *AO*, *BL* tertiam quamvis positione datam *AB* secantes in *A* & *B*, & a figuræ puncto quovis *G*, ad rectam *AB* ducatur quævis *GD*, ipsi *OA* parallela. Deinde a puncto aliquo *O*, in linea *OA* dato, ad punctum *D* ducatur recta *OD*, ipsi *BL* occurrens in *d*, & a puncto occursus erigatur recta *dg* datum quemvis angulum cum recta *BL* continens, atque eam habens rationem ad *Od* quam habet *DG* ad *OD*; & erit *g* punctum in figura nova *bg* i puncto *G* respondens. Eadem ratione puncta singula figuræ primæ dabunt puncta totidem figuræ novæ.

Concipe:




DE MOTU
CORPORUM

Concipe igitur punctum G motu continuo percurrere puncta omnia figuræ primæ, & punctum g motu itidem continuo percurreret puncta omnia figuræ novæ & eandem describet. Distinctionis gratia nominemus DG ordinatam primam, dg ordinatam novam; AD abscissam primam, ad abscissam novam; O polum, OD radium abscindentem, OA radium ordinatum primum, & Oa (quo parallelogrammum $OABa$ completur) radium ordinatum novum.

Dico jam quod, si punctum G tangit rectam Lineam positione datam, punctum g tanget etiam Lineam rectam positione datam. Si punctum G tangit Conicam sectionem, punctum g tanget etiam Conicam sectionem. Conicis sectionibus hic Circulum annumero.

Porro si punctum G tangit Lineam tertii ordinis Analytici, punctum g tanget Lineam tertii itidem ordinis; & sic de curvis lineis superiorum ordinum. Lineæ duæ erunt ejusdem semper ordinis Analytici quas puncta G, g tangunt. Etenim ut est ad ad OA ita sunt Od ad OD , dg ad



DG , & AB ad AD ; ideoque AD æqualis est $\frac{OA \times AB}{ad}$, & DG æqualis est $\frac{OA \times dg}{ad}$. Jam si punctum

G tangit rectam Lineam, atque adeo in æquatione quavis, qua relatio inter abscissam AD & ordinatam DG habetur, indeterminatæ illæ AD & DG ad unicam tantum dimensionem ascendunt, scribendo in hac æquatione $\frac{OA \times AB}{ad}$ pro AD , &

$\frac{OA \times dg}{ad}$ pro DG , producetur æquatio nova, in qua abscissa nova

ad & ordinata nova dg ad unicam tantum dimensionem ascendent, atque adeo quæ designat Lineam rectam. Sin AD & DG (vel earum alterutra) ascendeant ad duas dimensiones in æquatione prima, ascendent itidem ad & dg ad duas in æquatione secunda. Et sic de tribus vel pluribus dimensionibus. Indeterminatæ ab, dg in æquatione secunda & AD, DG in prima ascendent semper ad eundem dimensionum numerum & propterea Lineæ, quas puncta G, g tangunt, sunt ejusdem ordinis Analytici.

Dico

Dico præterea quod si recta aliqua tangat lineam curvam in figura prima, hæc recta eodem modo cum curva in figuram novam translata tanget lineam illam curvam in figura nova: & contra. Nam si Curvæ puncta quævis duo accedunt ad invicem & coeunt in figura prima, puncta eadem translata accedent ad invicem & coibunt in figura nova, atque adeo rectæ, quibus hæc puncta junguntur, simul evadent curvarum tangentes in figura utraque. Componi possent harum assertionum Demonstrationes more magis Geometrico. Sed brevitati consulo.

Igitur si figura rectilinea in aliam transmutanda est, sufficit rectarum a quibus conflatur intersectiones transferre, & per easdem in figura nova lineas rectas ducere. Sin curvilineam transmutare oportet, transferenda sunt puncta, tangentes & aliæ rectæ quarum ope curva linea definitur. Inservit autem hoc Lemma solutioni difficiliorum Problematum, transmutando figuras propositas in simpliciores. Nam rectæ quævis convergentes transmutantur in parallelas, adhibendo pro radio ordinato primo, lineam quamvis rectam quæ per concursum convergentium transit: id adeo quia concursus ille hoc pacto abit in infinitum, lineæ autem parallelæ sunt quæ ad punctum infinite distans tendunt. Postquam autem Problema solvitur in figura nova, si per inversas operationes transmutetur hæc figura in figuram primam, habebitur solutio quæsitæ.

Utile est etiam hoc Lemma in solutione Solidorum Problematum. Nam quoties duæ sectiones Conicæ obvenerint, quarum intersectione Problema solvi potest, transmutare licet earum alterutram, si Hyperbola sit vel Parabola, in Ellipsin: deinde Ellipsis facile mutatur in Circulum. Recta item & sectio Conica, in constructione Planorum Problematum, vertuntur in Rectam & Circulum.

PROPOSITIO XXV. PROBLEMA XVII.

*Trajectoriam describere quæ per data duo puncta transibit
& rectas tres continget positione datas.*


Per concursum tangentium quarumvis duarum cum se invicem, & concursum tangentis tertiæ cum recta illa, quæ per puncta duo data transit, age rectam infinitam; eaque adhibita pro radio ordinato primo, transmutetur figura, per Lemma superius, in figuram novam. In

L

hæc

DE MOTU
CORPORUM.

hac figura tangentes illæ duæ evadent sibi invicem parallelæ, & tangens tertia fiet parallela recta per puncta duo data transeunti. Sunt puncta bi, kl tangentes illæ duæ parallelæ, ik tangens tertia, & hl recta huic parallela transiens per puncta illa a, b , per quæ Conica sectio in hac figura nova transire debet; & parallelogrammum $bikl$ complens. Secentur rectæ bi, ik, kl in c, d, e , ita ut sit bc ad latus quadratum rectanguli abb , ic ad id , & ke ad kd ut est summa rectarum bi & kl ad summam trium linearum quarum prima est recta ik , & alteræ duæ sunt latera quadrata rectangulorum abb & alb : & erunt c, d, e puncta contactuum. Et enim, ex Conicis, sunt bc quadratum ad rectangulum abb , & ic quadratum ad id quadratum, & ke quadratum ad kd quadratum, & el quadratum ad rectangulum alb in eadem ratione; & propterea bc ad latus quadratum ipsius abb , ic ad id , ke ad kd , & el ad latus quadratum ipsius alb sunt in subduplicata illa ratione, & composite, in data ratione omnium antecedentium bi & kl ad omnes consequentes, quæ sunt latus quadratum rectanguli abb & recta ik & latus quadratum rectanguli alb . Habentur igitur ex data illa ratione puncta contactuum c, d, e , in figura nova. Per inversas operationes Lemmatis novissimi transferantur hæc puncta in figuram primam & ibi, per Probl. XIV., describetur Trajectoria. *Q. E. F.* Ceterum perinde ut puncta a, b jacent vel inter puncta b, l , vel extra, debent puncta c, d, e vel inter puncta b, i, k, l capi, vel extra. Si punctorum a, b alterutrum cadit inter puncta b, l , & alterum extra, Problema impossibile est.



PROPOSITIO XXVI. PROBLEMA XVIII.

*Trajectoriam describere quæ transibit per punctum datum
& rectas quatuor positione datas continget.*


Ab intersectione communi duarum quarumlibet tangentium ad intersectionem communem reliquarum duarum agatur recta infinita,

ta, & eadem pro radio ordinato primo adhibita, transmutetur figura (per Lem. xxii.) in figuram novam, & tangentes binæ, quæ ad radium ordinatum primum concurrebant, jam evadent parallelæ. Sumto illæ hi & kl , ik & hl continentes parallelogrammum $bikl$. Sitque p punctum in hac nova figura, puncto in figura prima dato respondens. Per figuræ centrum O agatur pq , & existente Oq æquali Op , erit q punctum alterum per quod sectio Conica in hac figura nova transire debet. Per Lemmatis xxii operationem inversam transferatur hoc punctum in figuram primam, & ibi habebuntur puncta duo per quæ Trajectoria describenda est. Per eadem vero describi potest Trajectoria illa per Probl. xvii. Q. E. F.

L E M M A XXIII.

Si rectæ duæ positione datæ AC , BD , ad data puncta A , B , terminentur, datamque habeant rationem ad invicem, & recta CD , qua puncta indeterminata C , D junguntur, secetur in ratione data in K : dico quod punctum K locabitur in recta positione data.


Concurrent enim rectæ AC , BD in E , & in BE capiatur BG ad AE ut est BD ad AC , sitque FD semper æqualis datæ EG ; & erit ex constructione EC ad GD , hoc est, ad EF ut AC ad BD , adeoque in ratione data, & propterea dabitur specie triangulum EFC . Secetur CF in L ut sit CL ad CF in ratione



CK ad CD ; &, ob datam illam rationem, dabitur etiam specie triangulum EFL ; proindeque punctum L locabitur in recta EL positione data. Junge LK , & similia erunt triangula CLK , CFD ; &, ob datam FD & datam rationem LK ad FD , dabitur LK . Huic æqualis capiatur EH , & erit semper $ELKH$ parallelogrammum. Locatur igitur punctum K in parallelogrammi illius latere positione dato HK . Q. E. D.

Si rectæ tres tangant quamcunque Conifectionem, quarum duæ parallelæ sint ac dentur positione; dico quod Sectionis semidiameter hisce duabus parallelæ, sit media proportionalis inter harum segmenta, punctis contactuum & tangenti tertiæ interjecta.

Sunto AF , GB parallelæ duæ Conifectionem ADB tangentes in A & B ; EF recta tertia Conifectionem tangens in I , & occurrens prioribus tangentibus in F & G ; fitque CD semidiameter Figuræ tangentibus parallelæ: Dico quod AF , CD , BG sunt continue proportionales.



Nam si diametri conjugatæ AB , DM tangenti FG occurrant in E & H , seque mutuo secant in C , & compleatur parallelogrammum $IKCL$; erit, ex natura Sectionum Conicarum, ut EC ad CA ita CA ad CL , & ita divisim $EC - CA$ ad $CA - CL$, seu EA ad AL , & composite EA ad $EA + AL$ seu EL ut EC ad $EC + CA$ seu EB ; adeoque (ob similitudinem triangulorum EAF , ELI , ECH , EBG) AF ad LI ut CH ad BG . Est itidem, ex natura Sectionum Conicarum, LI (seu CK) ad CD ut CD ad CH ; atque, adeo ex æquo perturbate, AF ad CD ut CD ad BG . *Q.E.D.*

Corol. 1. Hinc si tangentes duæ FG , PQ tangentibus parallelis AF , BG occurrant in F & G , P & Q , seque mutuo secant in O ; erit (ex æquo perturbate) AF ad BQ ut AP ad BG , & divisim ut FP ad GQ , atque adeo ut FO ad OG .

Corol. 2 Unde etiam rectæ duæ PG , FQ per puncta P & G , F & Q ductæ, concurrent ad rectam ACB per centrum Figuræ & puncta contactuum A , B transeuntem.

L E M.

L E M M A XXV.

 LIBER
PRIMUS.


Si parallelogrammi latera quatuor infinite producta tangant Sectionem quamcunque Conicam, & abscindantur ad tangentem quamvis quintam; sumantur autem laterum quorumvis duorum conterminorum abscissæ terminatæ ad angulos oppositos parallelogrammi: dico quod abscissa alterutra sit ad latus illud a quo est abscissa, ut pars lateris alterius contermini inter punctum contactus & latus tertium, est ad abscissarum alteram.

Tangent parallelogrammi $MLIK$ latera quatuor ML , IK , KL , MI sectionem Conicam in A , B , C , D & fecet tangens quinta FQ hæc latera in F , Q , H & E ; sumantur autem laterum MI , KI abscissæ ME , KQ , vel laterum KL , ML abscissæ KH , MF : dico quod sit ME ad MI ut BK ad KQ , & KH ad KL ut AM ad MF . Nam per Corollarium secundum Lemmatis superioris, est ME ad EI ut $(AM$ feu) BK ad BQ , & componendo ME ad MI ut BK ad KQ ; Q , E , D . Item KH ad HL ut $(BK$ feu) AM ad AF , & dividendo KH ad KL ut AM ad MF . Q , E , D .

Corol. 1. Hinc si datur parallelogrammum $IKLM$, circa datam Sectionem Conicam descriptum, dabitur rectangulum $KQ \times ME$, ut & huic æquale rectangulum $KH \times MF$.

Corol. 2. Et si sexta ducatur tangens eq tangentibus KI , MI occurrens in q & e ; rectangulum $KQ \times ME$ æquabitur rectangulo $Kq \times Me$; eritque KQ ad Me ut Kq ad ME , & divisim ut Qq ad Ee .

Corol. 3. Unde etiam si Eq , eQ jungantur & bisecentur, & recta per puncta bisectionum agatur, transibit hæc per centrum Sectionis Conicæ. Nam cum sit Qq ad Ee ut KQ ad Me , transibit ea-




DE MOTU dem recta per medium omnium Eg , eQ , MK ; (per Lem. xxiii)
CORPORUM. & medium rectæ MK est centrum Sectionis.

PROPOSITIO XXVII. PROBLEMA XIX.

*Trajectoriam describere quæ rectas quinque positione datas
continget.*

Dentur positione tangentes ABG , BCF , GCD , FDE , EA .
Figuræ quadrilateræ sub quatuor quibufvis contentæ $ABFE$ diagonales AF , BE biseca in M & N , & (per Corol. 3. Lem. xxv) recta MN per puncta bisectionum acta transibit per centrum Trajectoriæ.
Rursus Figuræ quadrilateræ $BGDF$, sub aliis quibufvis quatuor




tangentibus contentæ, diagonales (ut ita dicam) BD , GF biseca in P & Q ; & recta PQ per puncta bisectionum acta transibit per centrum Trajectoriæ. Dabitur ergo centrum in concursu bifecantium. Sit illud O . Tangenti cuius BC parallelam age KL , ad eam distantiam ut centrum O in medio inter parallelas locetur, & acta KL tanget Trajectoriam describendam. Secet hæc tangentes

gentes alias quasvis duas GCD, FDE in L & K . Per harum LIBER
tangentium non parallelarum CL, FK cum parallelis CF, KL PRIMUS.
concurfus C & K, F & L age CK, FL concurrentes in R , & rec-
ta OR ducta & producta fecabit tangentes parallelas CF, KL in
punctis contactuum. Patet hoc per Corol. 2. Lem. xxiv. Eadem
methodo invenire licet alia contactuum puncta, & tum demum
per Probl. xiv. Trajectoriam describere. *Q. E. F.*

Scholium.

Problemata, ubi dantur Trajectoriarum vel centra vel Asymptoti, includuntur in præcedentibus. Nam datis punctis & tangentibus una cum centro, dantur alia totidem puncta aliæque tangentes a centro ex altera ejus parte æqualiter distantes. Asymptotos autem pro tangente habenda est, & ejus terminus infinite distans (si ita loqui fas sit) pro puncto contactus. Concipe tangentis cujusvis punctum contactus abire in infinitum, & tangens vertetur in Asymptoton; atque constructiones Problematis xiv. & Casus primi Problematis xv. vertentur in constructiones Problematum ubi Asymptoti dantur.


Postquam Trajectoria descripta est, invenire licet axes & umbilicos ejus hac methodo. In constructione & figura Lemmatis **xxi**, fac ut angulorum mobilium PBN , PCN crura BP , CP , quorum concursu Trajectoria describatur, sint sibi invicem parallela, eumque servantia situm revolvantur circa polos suos B , C in figura illa. Interea vero describant altera angulorum illorum crura CN , BN , concursu suo K vel k , Circulum $IBKGC$. Sit Circuli hujus centrum O . Ab hoc centro ad Regulam MN , ad quam altera illa crura CN , BN interea concurrebant



DE MOTU
CORPORUM

dum Trajectoria describatur, demitte normalem OH Circulo occurrentem in K & L . Et ubi crura illa altera CK , BK concurrunt ad punctum illud K quod Regulæ propius est, crura prima CP , BP parallela erunt axi majori, & perpendicularia minori; & contrarium eveniet si crura eadem concurrunt ad punctum remotius L . Unde si detur Trajectoriæ centrum, dabuntur axes. Hisce autem datis, umbilici sunt in promptu.

Axiom vero quadrata sunt ad invicem ut KH ad LH , & inde facile est Trajectoriam specie datam per data quatuor puncta describere. Nam si duo ex punctis datis constituentur poli C , B , tertium dabit angulos mobiles PCK , PBK ; his autem datis describi potest Circulus $IBKG$. Tum ob datam specie Trajectoriam, dabitur ratio OH ad OK , adeoque ipsa OH . Centro O & intervallo OH describe alium circulum, & recta quæ tangit hunc circulum, & transit per concursum crurum CK , BK , ubi crura prima CP , BP concurrunt ad quartum datum punctum, erit Regula illa MN cujus ope Trajectoria describetur. Unde etiam vicissim Trapezium specie datum (si casus quidam impossibiles excipiantur) in data quavis Sectione Conica inscribi potest.



Sunt & alia Lemmata quorum ope Trajectoriæ specie datæ, datis punctis & tangentibus describi possunt. Ejus generis est, quod si recta linea per punctum quodvis positione datum ducatur, quæ datam Conisectionem in punctis duobus interfecet, & intersectionum intervallum bifecetur, punctum bisectionis tanget aliam Conisectionem ejusdem speciei cum priore, atque axes habentem prioris axibus parallelos. Sed propro ad magis utilia.

LEMMA



L E M M A XXVI.

 LIBER
PRIMUS.

Trianguli specie & magnitudine dati tres angulos ad rectas totidem positione datas, quæ non sunt omnes parallelæ, singulos ad singulas ponere.

Dantur positione tres rectæ infinitæ AB , AC , BC , & oportet triangulum DEF ita locare, ut angulus ejus D lineam AB , an-

gulus E lineam AC , & angulus F lineam BC tangat. Super DE , DF & EF describe tria circulorum segmenta DRE , DGF , EMF , quæ capiant angulos angulis BAC , ABC , ACB æquales respective. Describantur autem hæc segmenta ad eas partes linearum $DEDF$, EF utiliter $DRED$ eodem ordine cum literis $BACB$, literæ $DGFD$ eodem cum literis $ABCA$, & literæ $EMFE$ eodem cum literis $ACBA$ in orbem redeant; deinde compleantur hæc segmenta in circulos integros. Secent circuli duo priores se mutuo in G , sintque centra eorum P & Q . Junctis GP , PQ , cape Ga ad AB ut est GP ad PQ , & centro G , intervallo Ga



describere circulum, qui secet circulum primum DGE in a . Jungatur tum aD secans circulum secundum DFG in b , tum aE secans circulum

M


M

Corol. Hinc recta duci potest cujus partes longitudine datæ rectis ^{LIBER} tribus positione datis interjacebunt. Concipe triangulum DEF , ^{PRIMU} puncto D ad latus EF accedente, & lateribus DE , DF in directum positis, mutari in lineam rectam, cujus pars data DE rectis positione datis AB , AC , & pars data DF rectis positione datis AB , BC interponi debet; & applicando constructionem præcedentem ad hunc casum solvetur Problema.

PROPOSITIO XXVIII. PROBLEMA XX.

Trajectoriam speciei & magnitudine datam describere, cujus partes datæ rectis tribus positione datis interjacebunt.

Describenda sit Trajectoria quæ sit similis & æqualis Lineæ curvæ DEF , quæque a rectis tribus AB , AC , BC positione datis,





in partes datis hujus partibus DE & EF similes & æquales secabitur.

Age rectas DE , EF , DF , & trianguli hujus DEF pone angulos D , E , F ad rectas illas positione datas (per Lem. xxvi.) Dein circa triangulum describe Trajectoriam Curvæ DEF similem & æqualem. *Q.E.F.*

L E M M A XXVII.

Trapezium specie datum describere cujus anguli ad rectas quatuor positione datas, quæ neque omnes parallele sunt, neque ad commune punctum convergunt, singuli ad singulas consistent.

Dentur positione rectæ quatuor ABC , AD , BD , CE , quarum prima secet secundam in A , tertiam in B , & quartam in C : & describendum sit Trapezium $fgbi$ quod sit Trapezio $FGHI$



simile, & cujus angulus f . angulo dato F æqualis, tangat rectam ABC , cæterique anguli g , b , i . cæteris angulis datis G , H , I æquales, tangant cæteras lineas AD , BD , CE respective. Jungatur FH & super FG , FH , FI describantur totidem circulorum segmenta FSG , FTH , FVI , quorum primum FSG capiat angulum

Ium æqualem angulo BAD , secundum FTH capiat angulum æqualem angulo CBD , ac tertium FVI capiat angulum æqualem angulo ACE . Describi autem debent segmenta ad eas partes linearum FG , FH , FI , ut literarum $FSGF$ idem sit ordo circularis qui literarum $BADB$, utque literarum $FTHF$ eodem ordine cum literis $CBDC$, & literarum $FVIF$ eodem cum literis $ACEA$ in orbem redeant. Compleantur segmenta in circulos integros, sitque P centrum circuli primi FSG , & Q centrum secundi FTH . Jungatur & utrinque producat PQ , & in ea capiatur QR in ea ratione ad PQ quam habet BC ad AB . Capiatur autem QR ad eas partes puncti Q ut literarum P , Q , R idem sit ordo atque literarum A , B , C : centroque R & intervallo RF describatur circulus quartus FNc secans circumulum tertium FVI in c . Jungatur Fc secans circumulum primum in a & secundum in b . Agantur aG , bH , cI , & Figuræ $abcFGHI$ similis constituatur Figura $ABCfghi$: Eritque Trapezium $fghi$ illud ipsum quod constituere oportebat.

Secent enim circuli duo primi FSG , FTH se mutuo in K . Jungantur PK , QK , RK , aK , bK , cK , & producat QP ad L . Anguli ad circumferentias FaK , FbK , FcK sunt semiles angulorum FPK , FQK , FRK ad centra, adeoque angulorum illorum dimidiis LPK , LQK , LRK æquales. Est ergo Figura $PQRK$ Figuræ $abcK$ æquiangularis & similis, & propterea ab est ad bc ut PQ ad QR ; id est, ut AB ad BC . Angulis insuper FaG , FbH , FcI æquantur fAg , fBh , fCi per constructionem. Ergo Figuræ $abcFGHI$ Figura similis $ABCfghi$ compleri potest. Quo facto Trapezium $fghi$ constituetur simile Trapezio $FGHI$ & angulis suis f , g , h , i tanget rectas ABC , AD , BD , CE . Q . E . F .

Corol. Hinc recta duci potest cujus partes, rectis quatuor positione datis dato ordine interjectæ, datam habebunt proportionem ad invicem. Augeantur anguli FGH , GHI usque eo, ut rectæ FG , GH , HI in directum jaceant; & in hoc casu construendo Problema, ducetur recta $fghi$ cujus partes fg , gh , hi , rectis quatuor positione datis AB & AD , AD & BD , BD & CE interjectæ, erunt ad invicem ut lineæ FG , GH , HI , eundemque servabunt ordinem inter se. Idem vero sic fit expeditius.


In constructione Corollarii huius postquam ducitur LK secans CE in i , producere licet iE ad V , ut sit EV ad Ei ut FH ad HI , & agere Vf parallelam ipsi BD . Eodem recidit si centro i , intervallo IH , describatur circulus secans BD in X , & producat iX ad T , ut sit iT æqualis IF , & agatur Tf ipsi BD parallela.

LIBER
PRIMUS.

Problematis hujus solutiones alias *Wrennus* & *Wallisus* olim excogitarunt.

PROPOSITIO XXIX. PROBLEMA XXI.

Trajectoriam specie datam describere, quæ a rectis quatuor positione datis in partes secabitur, ordine, specie & proportionibus datis.




Describenda sit Trajectoria $fghi$, quæ similis sit Lineæ curvæ $FGHI$, & cujus partes fg , gb , bi illius partibus FG , GH , HI similes & proportionales, rectis AB & AD , AD & BD , BD & CE positione datis, prima primis, secunda secundis, tertia tertiis interjaceant. Actis rectis FG , GH , HI , FI , describatur (per Lem. xxvii.) Trapezium $fghi$ quod sit Trapezio $FGHI$ simile & cujus anguli f , g , b , i tangent rectas illas positione datas AB , AD , BD , CE , singuli singulas dicto ordine. Dein circa hoc Trapezium describatur Trajectoria curvæ Lineæ $FGHI$ confimilis.

Scholium

DE MOTU
CORPORUM.

Scholium.

Construi etiam potest hoc Problema ut sequitur. Junctis FG , GH , HI , FI produc GF ad V , jungeque FH , IG , & angulis FGH , VFH fac angulos CAK , DAL æquales. Concurrant AK , AL cum recta BD in K & L , & inde agantur KM , LN , quarum KM constituat angulum AKM æqualem angulo GHI , sitque ad AK ut est HI ad GH ; & LN constituat angulum ALN æqualem angulo FHI , sitque ad AL ut HI ad FH . Ducantur autem AK , KM , AL , LN ad eas partes linearum AD , AK , AL , ut literæ $CAKMC$, $ALKA$, $DALND$ eodem ordine cum literis $FGHIF$ in orbem redeant; & acta MN occurrat rectæ CE in i . Fac angulum iEP æqua-



lem angulo IGF , sitque PE ad Ei ut FG ad GI ; & per P agatur PQf , quæ cum recta ADE contineat angulum PQE æqualem angulo FIG , rectæque AB occurrat in f , & jungatur fi . Agantur autem PE & PQ ad eas partes linearum CE , PE , ut literarum $PEiP$ & $PEQP$ idem sit ordo circularis qui literarum $FGHIF$, & si super linea fi eodem quoque literarum ordine constitutur Trapezium $fgbi$ Trapezio $FGHI$ simile, & circumscribatur Trajectoria specie data solvetur Problema.

Hactenus de Orbibus inveniendis. Superest ut Motus corporum in Orbibus inventis determinemus.

SECTIO


S E C T I O VI.

De Inventione Motuum in Orbibus datis.

PROPOSITIO XXX. PROBLEMA XXII.

Corporis in data Trajectoria Parabolica moti invenire locum ad tempus assignatum.

Sit S umbilicus & A vertex principalis Parabolæ, fitque $4 AS \times M$ æquale areæ Parabolicæ abscindendæ APS , quæ radio SP , vel post excessum corporis de vertice descripta fuit, vel ante appulsum ejus ad verticem describenda est. Innotescit quantitas areæ illius abscindendæ ex tempore ipsi proportionali. Bifeca AS in G , erigeque perpendicularum GH æquale $3 M$, & Circulus centro H , intervallo HS descriptus fecabit Parabolam in loco quaesito P . Nam, demissa ad axem perpendiculari PO & ducta PH , est



$AGq + GHq (=HPq = AO - AG:quad. + PO - GH:quad.)$
 $= AOq + POq - 2GAO - 2GH \times PO + AGq + GHq$. Unde
 $2GH \times PO (=AOq + POq - 2GAO) = AOq + \frac{1}{2}POq$.

Pro AOq scribe $AO \times \frac{POq}{4AS}$; &, applicatis terminis omnibus ad

$3PO$ ductisque in $2AS$ fiet $\frac{1}{2}GH \times AS (= \frac{1}{2}AO \times PO + \frac{1}{2}AS \times PO)$
 $= \frac{AO + 3AS}{6} \times PO = \frac{4AO - 3SO}{6} \times PO = \text{areæ } APO - SPO$

$= \text{areæ } APS$. Sed GH erat $3M$, & inde $\frac{1}{2}GH \times AS$ est $4AS \times M$. Ergo area abscissa APS æqualis est abscindendæ $4AS \times M$. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc GH est ad AS , ut tempus quo corpus descripsit arcum AP ad tempus quo corpus descripsit arcum inter verticem A & perpendicularum ad axem ab umbilico S erectum.

Corol. 2. Et Circulo HSP per corpus motum P perpetuo transiente, velocitas puncti H est ad velocitatem quam corpus habuit in

N

in

DE MOTU in vertice A , ut 3 ad 8; adeoque in ea etiam ratione est linea GH
 CORPORUM ad lineam rectam quam corpus tempore motus sui ab A ad P , ea
 cum velocitate quam habuit in vertice A , describere posset.

Corol. 3. Hinc etiam vice versa inveniri potest tempus quo
 corpus descripsit arcum quemvis assignatum AP . Junge AP &
 ad medium ejus punctum erige perpendicularum rectæ GH occur-
 rens in H .

LEMMA XXVIII.

*Nulla extat Figura Ovalis cujus area, rectis pro lubitu ab-
 scissa, possit per æquationes numero terminorum ac di-
 mensionum finitas generaliter inveniri.*

Intra Ovalem detur punctum quodvis, circa quod ceu polum
 revolvatur perpetuo linea recta, uniformi cum motu, & interea in
 recta illa exeat punctum mobile de polo, pergatque semper ea cum
 velocitate, quæ sit ut rectæ illius intra Ovalem quadratum. Hoc
 motu punctum illud describet Spiralem gyris infinitis. Jam si aræ
 Ovalis a recta illa abscissæ incrementum per finitam æquationem
 inveniri potest, invenietur etiam per eandem æquationem distantia
 puncti a polo, quæ huic aræ proportionalis est, adeoque omnia
 Spiralis puncta per æquationem finitam inveniri possunt: & prop-
 terea rectæ cujusvis positione datæ intersectio cum Spirali inve-
 niri etiam potest per æquationem finitam. Atqui recta omnis
 infinite producta Spiralem secat in punctis numero infinitis, &
 æquatio, qua intersectio aliqua duarum linearum invenitur, exhibet
 earum intersectiones omnes radicibus totidem, adeoque ascendit ad
 tot dimensiones quot sunt intersectiones. Quoniam Circuli duo se
 mutuo secant in punctis duobus, intersectio una non invenietur
 nisi per æquationem duarum dimensionum, qua intersectio altera
 etiam inveniat. Quoniam duarum sectionum Conicarum quatuor
 esse possunt intersectiones, non potest aliqua earum generaliter in-
 veniri nisi per æquationem quatuor dimensionum, qua omnes si-
 mul inveniantur. Nam si intersectiones illæ seorsim quærantur, quo-
 niam eadem est omnium lex & conditio, idem erit calculus in casu
 unoquoque & propterea eadem semper conclusio, quæ igitur de-
 bet omnes intersectiones simul complecti & indifferenter exhibere.
 Unde

Unde etiam intersectiones Sectionum Conicarum & Curvarum tertiæ potestatis, eo quod sex esse possunt, simul prodeunt per æquationes sex dimensionum, & intersectiones duarum Curvarum tertiæ potestatis, quia novem esse possunt, simul prodeunt per æquationes dimensionum novem. Id nisi necessario fieret, reducere liceret Problemata omnia Solida ad Plana, & plusquam Solida ad Solida. Loquor hic de Curvis potestate irreducibilibus. Nam si æquatio per quam Curva definitur, ad inferiorem potestatem reduci possit, Curva non erit unica, sed ex duabus vel pluribus composita, quarum intersectiones per calculos diversos seorsim inveniri possunt. Ad eundem modum intersectiones binæ rectarum & sectionum Conicarum prodeunt semper per æquationes duarum dimensionum; ternæ rectarum & Curvarum irreducibilium tertiæ potestatis per æquationes trium, quaternæ rectarum & Curvarum irreducibilium quartæ potestatis per æquationes dimensionum quatuor, & sic in infinitum. Ergo rectæ & Spiralis intersectiones numero infinitæ, cum Curva hæc sit simplex & in Curvas plures irreducibilis, requirunt æquationes numero dimensionum & radicum infinitas, quibus intersectiones omnes possunt simul exhiberi. Est enim eadem omnium lex & idem calculus. Nam si a polo in rectam illam secantem demittatur perpendicularum, & perpendicularum illud una cum secante revolvatur circa polum, intersectiones Spiralis transibunt in se mutuo, quæque prima erat seu proxima, post unam revolutionem secunda erit, post duas tertia, & sic deinceps: nec interea mutabitur æquatio nisi pro mutata magnitudine quantitatum per quas positio secantis determinatur. Unde cum quantitates illæ post singulas revolutiones redeunt ad magnitudines primas, æquatio redibit ad formam primam; adeoque una eademque exhibebit intersectiones omnes, & propterea radices habebit numero infinitas, quibus omnes exhiberi possunt. Nequit ergo intersectio rectæ & Spiralis per æquationem finitam generaliter inveniri, & idcirco nulla extat Ovalis cujus area, rectis imperatis abscissa, possit per talem æquationem generaliter exhiberi.


Eodem argumento, si intervallum poli & puncti, quo Spiralis describitur, capiatur Ovalis perimetro abscissæ proportionale, probari potest quod longitudo perimetri nequit per finitam æquationem generaliter exhiberi. De Ovalibus autem hic loquor quæ non tanguntur a figuris conjugatis in infinitum pergentibus.

Hinc area Ellipseos, quæ radio ab umbilico ad corpus mobile ducto describitur, non prodit ex dato tempore, per æquationem finitam; & propterea per descriptionem Curvarum Geometricæ rationalium determinari nequit. Curvas Geometricæ rationales appello quarum puncta omnia per longitudines æquationibus definita, id est, per longitudinum rationes complicatas, determinari possunt; cæterasque (ut Spirales, Quadratrices, Trochoides) Geometricæ irrationales. Nam longitudines quæ sunt vel non sunt ut numerus ad numerum (quemadmodum in decimo Elementorum) sunt Arithmetice rationales vel irrationales. Aream igitur Ellipseos tempori proportionalem abscindo per Curvam Geometricæ irrationalem ut sequitur.

PROPOSITIO XXXI. PROBLEMA XXIII.

Corporis in data Trajectoria Elliptica moti invenire locum ad tempus assignatum.

Ellipseos APB fit A vertex principalis, S umbilicus, & O centrum, sitque P corporis locus inveniendus. Produca OA ad G , ut fit OG ad OA ut OA ad OS . Erige perpendiculum GH , cen-




troque O & intervallo OG describe circulum EFG , & super regula GH , ceu fundo, progrediatur Rota GEF revolvendo circa axem suum, & interea puncto suo A describendo Trochoidem ALI .
Quo

Quo facto, cape GK in ratione ad Rotæ perimetrum $GEFG$, ut L I B E R
est tempus quo corpus progrediendo ab A descripsit arcum AP , P R I M U S
ad tempus revolutionis unius in Ellipsi. Erigatur perpendicularum
 KL occurrens Trochoidi in L , & acta LP ipsi KG parallela oc-
curret Ellipsi in corporis loco quæsito P .

Nam centro O , intervallo OA describatur semicirculus AQB ,
& arcui AQ occurrat LP producta in Q , junganturque SQ , OQ .
Arcui EF occurrat OQ in F , & in eandem OQ demittatur per-
pendicularum SR . Area APS est ut area AQS , id est, ut diffe-
rentia inter sectorem OQA & triangulum OQS , five ut differen-
tia rectangulorum $\frac{1}{2} OQ \times AQ$ & $\frac{1}{2} OQ \times SR$, hoc est, ob datam
 $\frac{1}{2} OQ$, ut differentia inter arcum AQ & rectam SR , adeoque (ob
æqualitatem datarum rationum SR ad finem arcus AQ , OS ad OA ,
 OA ad OG , AQ ad GF , & divisim $AQ - SR$ ad $GF - \text{fin. arc.}$
 AQ .) ut GK differentia inter arcum GF & finem arcus AQ .
 $Q. E. D.$


Scholium.

Cæterum, cum difficilis sit hujus Curvæ descriptio, præstat so-
lutionem vero proximam adhibere. Inveniatur tum angulus quidam
 B , qui sit ad angulum graduum $57,29578$, quem arcus radio æqualis
subtendit, ut est umbilicorum distantia SH ad Ellipseos diame-
trum AB ; tum etiam longitudo quædam L , quæ sit ad radium in
eadem ratione inverſe. Quibus semel inventis, Problema deinceps
conſit per ſequentem Analyſin. Per conſtructionem quamvis (vel
utcunque conjecturam faciendo) cognoscatur corporis locus P pro-
ximus vero ejus loco p . Demissaque ad axem Ellipseos ordi-
natim applicata PR , ex propor-
tione diametrorum Ellipseos, dabitur
Circuli circumscrip-
ti AQB ordinatim applicata RQ , quæ ſinus eſt anguli AOQ exi-
ſtente AO radio. Sufficit angulum illum rudi calculo in numeris
proximis invenire. Cognoscatur etiam angulus temporis propor-
tionalis




noscat quantitas areæ abscindendæ tempori proportionalis. Sit ea LIBER
PRIMUS.
 A , & fiat conjectura de positione rectæ SP , quæ aream APS abscin-

dat veræ proximam. Jungatur OP , & ab A & P ad Asymptoton agantur AI , PK Asymptoto alteri parallelæ, & per Tabulam Logarithmorum dabitur Area $AIKP$, eique æqualis area OPA , quæ subducta de triangulo OPS relinquet aream abscissam APS . Applicando areæ abscindendæ A & abscissæ APS differentiam duplam $2APS - 2$



A vel $2A - 2APS$ ad lineam SN , quæ ab umbilico S in tangentem PT perpendicularis est, orietur longitudo chordæ PQ . Inscribatur autem chorda illa PQ inter A & P , si area abscissa APS major sit area abscindenda A , secus ad puncti P contrarias partes: & punctum Q erit locus corporis accuratior. Et computatione repetita invenietur idem accuratior in perpetuum.


Atque his calculis Problema generaliter confit Analytice. Verum usibus Astronomicis accommodatior est calculus particularis qui sequitur. Existentibus AO , OB , OD semiaxibus Ellipseos, & L ipsius latere recto, ac D differentia inter semiaxem minorem OD & lateris recti semissem $\frac{1}{2}L$; quære tum angulum Y , cujus sinus sit ad Radium ut est rectangulum sub differentia illa D , & semisumma axium $AO + OD$ ad quadratum axis majoris AB ; tum angulum Z , cujus sinus sit ad Radium ut est duplum rectangulum sub umbilicorum distantia SH & differentia illa D ad triplum quadratum semiaxis majoris AO . His angulis semel inventis;



locus corporis sic deinceps determinabitur. Sume angulum T proportionalem tempori quo arcus BP descriptus est, seu motui medio (ut loquuntur) æqualem; & angulum V (primam medii motus æquationem) ad angulum Y (æquationem maximam primam) ut est sinus dupli anguli T ad Radium: atque

DE MOTU
CORPORUM.

atque angulum X (æquationem secundam) ad angulum Z (æquationem maximam secundam) ut est cubus sinus anguli T ad cubum Radii. Angulorum T , V , X vel summæ $T + X + V$, si angulus T recto minor est, vel differentiæ $T + X - V$, si is recto major est rectisque duobus minor, æqualem cape angulum BHP (motum medium æquatum) &, si HP occurrat Ellipsi in P , acta SP abscindet aream BSP temporì proportionalem quamproxime. Hæc Praxis satis expedita videtur, propterea quod angulorum perexiguorum V & X (in minutis secundis, si placet, positorum) figuras duas tresve primas invenire sufficit. Sed & factis accurata est ad Theoriam Planetarum. Nam in Orbe vel Martis ipsius, cujus Æquatio centri maxima est graduum decem, error vix superabit minutum unum secundum. Invento autem angulo motus medii æquati BHP , angulus veri motus BSP & distantia SP in promptu sunt per *Wardi* methodum notissimam.



Haftenus de motu corporum in lineis Curvis. Fieri autem potest ut mobile recta descendat vel recta ascendat, & quæ ad istiusmodi Motus spectant, pergo jam exponere.

SECTIONO


S E C T I O VII.

De Corporum Ascensu & Descensu Rectilineo.

PROPOSITIO XXXII. PROBLEMA XXIV.


Posito quod vis centripeta sit reciproce proportionalis quadrato distantie locorum a centro, Spatia definire quæ corpus recta cadendo datis temporibus describit.

Caf. 1. Si corpus non cadit perpendiculariter describet id, per Corol. 1. Prop. XIII, Sectionem aliquam Conicam cujus umbilicus congruit cum centro virium. Sit Sectio illa Conica $ARPB$ & umbilicus ejus S . Et primo si Figura Ellipsis est, super hujus axe majore AB describatur Semicirculus ADB , & per corpus decedens transeat recta DPC perpendicularis ad axem; ac tisque DS , PS erit area ASD area ASP atque adeo etiam temporum proportionalis. Manente axe AB minuatur perpetuo latitudo Ellipseos; & semper manebit area ASD temporum proportionalis. Minuatur latitudo illa in infinitum, & Orbe APB jam coincidente cum axe AB & umbilico S cum axis termino B , descendet corpus in recta AC , & area ABD evadet temporum proportionalis. Dabitur itaque Spatium AC , quod corpus de loco A perpendiculariter cadendo tempore dato describit, si modo temporum proportionalis capiatur area ABD , & a puncto D ad rectam AB demittatur perpendicularis DC . *Q. E. I.*



DE MOTU
CORPORUM

Caf. 2. Si Figura illa RPB Hyperbola est, describatur ad eandem diametrum principalem AB Hyperbola rectangula BED ; & quoniam areae CSP , $CBfP$, $SPfB$ sunt ad areas CSD , $CBED$, $SDEB$, singulae ad singulas, in data ratione altitudinum CP , CD ; & area $SPfB$ proportionalis est tempori quo corpus P movebitur per arcum PfB ; erit etiam area $SDEB$ eidem tempori proportionalis. Minuatur latus rectum Hyperbolae RPB in infinitum manente latere transverso, & coibit arcus PB cum recta CB & umbilicus S cum vertice B & recta SD cum recta BD . Proinde area $BDEB$ proportionalis erit tempori quo corpus C recto descensu describit lineam CB . *Q.E.I.*




Caf. 3. Et simili argumento si Figura RPB Parabola est, & eodem vertice principali B describatur alia Parabola BED , quæ semper maneat data interea dum Parabola prior in cujus perimetro corpus P movetur, diminuto & in nihilum redacto ejus latere recto, conveniat cum linea CB ; fiet segmentum Parabolicum $BDEB$ proportionale tempori quo corpus illud P vel C descendet ad centrum S vel B . *Q.E.I.*

PROPOSITIO XXXIII. THEOREMA IX.

Positis jam inventis, dico quod corporis cadentis Velocitas in loco quovis C est ad velocitatem corporis centro B intervallo BC Circulum describentis, in subduplicata ratione quam AC, distantia corporis a Circuli vel Hyperbolæ rectangulæ vertice ulteriore A, habet ad Figuræ semidiametrum principalem $\frac{1}{2}$ AB.

Bifecetur AB , communis utriusque Figuræ RPB , $BDEB$ diameter, in O ; & agatur recta PT quæ tangat Figuram RPB in P , atque
etiam

etiam fecit communem illam diametrum AB (si opus est productam) in T , fitque ST ad hanc rectam, & BQ ad hanc diametrum perpendicularis, atque Figuræ RPB latus rectum ponatur L . Constat per Cor. 9. Prop. xvi, quod corporis in linea RPB circa centrum S moventis velocitas in loco quovis P sit ad velocitatem corporis intervallo SP circa idem centrum Circulum describentis in subduplicata ratione rectanguli; $L \times SP$ ad ST quadratum. Est autem ex Conicis ACB ad CPq ut $2AO$ ad L , adeoque $\frac{2CPq \times AO}{ACB}$ æquale L . Ergo velocitates illæ sunt ad invicem in subduplicata ratione $\frac{CPq \times AO \times SP}{ACB}$ ad ST quad. Porro ex Conicis est CO ad BO ut BO ad TO , & compositè vel divisim ut CB ad BT . Unde vel dividendo vel componendo fit $BO -$ vel $+ CO$ ad BO ut CT ad BT , id est




AC ad AO ut CP ad BQ ; indeque $\frac{CPq \times AO \times SP}{ACB}$ æquale est $\frac{BQq \times AC \times SP}{AO \times BC}$. Minuatur jam in infinitum Figuræ RPB lati-

tudo CP , sic ut punctum P coeat cum puncto C , punctumque S cum puncto B , & linea SP cum linea BC , lineaque ST cum linea BQ ; & corporis jam recta descendens in linea CB velocitas fiet ad velocitatem corporis centro B intervallo BC Circulum describentis, in subduplicata ratione ipsius $\frac{BQ \times AC \times SP}{AO \times BC}$ ad STq , hoc est (neglectis æqualitatis rationibus SP ad BC & BQ ad STq .) in subduplicata ratione AC ad AO five $\frac{1}{2} AB$. $Q.E.D.$

Corol. 1. Punctis B & S coeuntibus, fit TC ad TS ut AC ad AQ .

Corol. 2. Corpus ad datam a centro distantiam in Circulo quovis revolvens, motu suo sursum verso ascendet ad duplam suam a centro distantiam.

Caf. 1. Jam si Figura DES Circulus est vel Hyperbola, bisece-
 tur ejus transversa diameter AS in O , & erit
 SO dimidium lateris recti. Et quoniam est
 TC ad TD ut Cc ad Dd , & TD ad TS ut
 CD ad ST , erit ex æquo TC ad TS ut
 $CD \times Cc$ ad $ST \times Dd$. Sed per Corol. 1 Prop.
 xxxiii, est TC ad TS ut AC ad AO , puta si
 in coitu punctorum D, d , capiantur linearum
 rationes ultimæ. Ergo AC est ad (AO seu)
 SK ut $CD \times Cc$ ad $ST \times Dd$. Porro corpo-
 ris descendens velocitas in C est ad velocita-
 tem corporis Circulum intervallo SC circa cen-
 trum S describentis in subduplicata ratione
 AC ad (AO vel) SK (per Prop. xxxiii.) Et
 hæc velocitas ad velocitatem corporis descri-
 bentis Circulum OKk in subduplicata ratione
 SK ad SC per Cor. 6. Prop. iv, & ex æquo
 velocitas prima ad ultimam, hoc est lineola
 Cc ad arcum Kk in subduplicata ratione
 AC ad SC , id est in ratione AC ad CD . Quare
 est $CD \times Cc$ æquale $AC \times Kk$, & propterea
 AC ad SK ut $AC \times Kk$ ad $ST \times Dd$, inde-
 que $SK \times Kk$ æquale $ST \times Dd$, & $\frac{1}{2}$
 $SK \times Kk$ æquale $\frac{1}{2} ST \times Dd$, id est area KSk
 æqualis areae SDd . Singulis igitur temporis particulis generantur
 arearum duarum particulae KSk & SDd ; quæ, si magnitudo ea-
 rum minuat & numerus augeatur in infinitum, rationem obti-
 nent æqualitatis, & propterea (per Corollarium Lemmatis iv) areae
 totæ simul genitæ sunt semper æquales *Q. E. D.*




Caf. 2. Quod si Figura DES Parabola sit, inveniatur esse ut su-
 pra $CD \times Cc$ ad $ST \times Dd$ ut TC ad TS , hoc est ut 2 ad 1, adeo-
 que $\frac{1}{2} CD \times Cc$ æquale esse $\frac{1}{2} ST \times Dd$. Sed corporis cadentis ve-
 locitas in C æqualis est velocitati qua Circulus intervallo $\frac{1}{2} SC$ uni-
 formiter describi possit (per Prop. xxxiv.) Et hæc velocitas ad ve-
 locitatem qua Circulus radio SK describi possit, hoc est, lineola
 Cc ad arcum Kk (per Corol. 6. Prop. iv) est in subduplicata ratione
 SK ad $\frac{1}{2} SC$, id est, in ratione SK ad $\frac{1}{2} CD$. Quare est $\frac{1}{2} SK \times Kk$
 æquale $\frac{1}{2} CD \times Cc$, adeoque æquale $\frac{1}{2} ST \times Dd$, hoc est, area
 KSk æqualis areae SDd , ut supra. *Q. E. D.*

PROPOSITIO XXXVI. PROBLEMA XXV.

*Corporis de loco dato A cadentis determinare
Tempora descensus.*


Super diametro AS (distantia corporis a centro sub initio) describe Semicirculum ADS , ut & huic æqualem Semicirculum OKH circa centrum S . De corporis loco quovis C erige ordinatim applicatam CD . Junge SD , & areâ ASD æqualem constitue sectorem OSK . Patet per Prop. xxxv, quod corpus cadendo describet spatium AC eodem Tempore quo corpus aliud uniformiter circa centrum S gyrando, describere potest arcum OK . *Q.E.F.*



PROPOSITIO XXXVII. PROBLEMA XXVI.

*Corporis de loco dato sursum vel deorsum projecti definire
Tempora ascensus vel descensus.*

Exeat corpus de loco dato G secundum lineam ASG cum velocitate quacunque. In duplicata ratione hujus velocitatis ad uniformem in Circulo velocitatem, qua corpus ad intervallum datum SG circa centrum S revolvi posset, cape GA ad $\frac{1}{2} AS$. Si ratio illa est numeri binarii ad unitatem, punctum A infinite distat, quo casu parabola vertice S , axe SC , latere quovis recto describenda est. Patet hoc per Prop. xxxiv. Sin ratio illa minor vel major est quam 2 ad 1, priore casu Circulus, posteriore Hyperbola rectangula super diametro SA describi debet. Patet per Prop. xxxiii. Tum centro S , intervallo æquante dimidium lateris recti, describatur Circulus HKk , & ad corporis ascendentis vel descendentis loca duo quævis G, C , erigantur perpendiculara GI, CD occurrentia Conicæ Sectioni vel Circulo in I ac D .




Dein junctis SI , SD , fiant segmentis $SEIS$, $SEDS$, sectores HSK , HSk æquales, & per Prop. xxxv. corpus G describet spatium GC eodem Tempore quo corpus K describere potest arcum Kk . $Q.E.F.$

LIBER
PRIMUS.

PROPOSITIO XXXVIII. THEOREMA XII.

Posito quod Vis centripeta proportionalis sit altitudini seu distantie locorum a centro, dico quod cadentium Tempora, Velocitates & Spatia descripta sunt arcubus, arcuumque sinibus rectis & sinibus versis respective proportionalia.

Cadat corpus de loco quovis A secundum rectam AS ; & centro virium S , intervallo AS , describatur Circuli quadrans AE , fitque CD sinus rectus arcus cuiusvis AD ; & corpus A , Tempore AD , cadendo describet Spatium AC , inque loco C acquirat Velocitatem CD .



Demonstratur eodem modo ex Propositione x, quo Propositio xxxii, ex Propositione xi demonstrata fuit.

Corol. 1. Hinc æqualia sunt Tempora quibus corpus unum de loco A cadendo pervenit ad centrum S , & corpus aliud revolvendo describit arcum quadrantalem ADE .

Corol. 2. Proinde æqualia sunt Tempora omnia quibus corpora de locis quibuscumque ad usque centrum cadunt. Nam revolvendum tempora omnia periodica (per Corol. 3. Prop. iv.) æquantur.

PROPO-

corpus cadendo describit lineolam DE , ut lineola illa directe & velocitas V inverse, estque vis ut velocitatis incrementum I directe & tempus inverse, adeoque si primæ nascentium rationes fuman-
 tur, ut $\frac{IXV}{DE}$, hoc est, ut longitudo DF . Ergo vis ipsi DF vel
 EG proportionalis facit ut corpus ea cum Velocitate descendat, quæ
 sit ut aræ $ABGE$ latus quadratum. $Q.E.D.$

Porro cum tempus, quo quælibet longitudinis datæ lineola DE
 describitur, sit ut velocitas inverse adeoque ut aræ $ABFD$ latus
 quadratum inverse; sitque DL , atque adeo area nascens $DLME$,
 ut idem latus quadratum inverse: erit tempus ut area $DLME$, &
 summa omnium temporum ut summa omnium arearum, hoc est
 (per Corol. Lem. iv.) Tempus totum quo linea AE describitur ut
 area tota AME . $Q.E.D.$

Corol. 1. Si P sit locus de quo corpus cadere debet, ut, urgen-
 te aliqua uniformi vi centripeta nota (qualis vulgo supponitur Gra-
 vitas) velocitatem acquirit in loco D æqualem velocitati quam
 corpus aliud vi quacunque cadens acquisivit eodem loco D , & in
 perpendiculari DF capiatur DR , quæ sit ad DF ut vis illa uni-
 formis ad vim alteram in loco D , & compleatur rectangulum
 $PDRQ$, eique æqualis abscindatur area $ABFD$; erit A locus
 de quo corpus alterum cecidit. Namque completo rectangulo
 $DRSE$, cum sit area $ABFD$ ad aream $DFGE$ ut VV ad
 $2VI$, adeoque ut $\frac{1}{2}V$ ad I , id est, ut semissis velocitatis totius ad
 incrementum velocitatis corporis vi inæquabili cadentis; & simi-
 liter area $PQRD$ ad aream $DRSE$, ut semissis velocitatis totius
 ad incrementum velocitatis corporis uniformi vi cadentis; sintque
 incrementa illa (ob æqualitatem temporum nascentium) ut vires
 generatrices, id est, ut ordinatim applicatæ DF , DR , adeoque
 ut aræ nascentes $DFGE$, $DRSE$; erunt (ex æquo) aræ totæ
 $ABFD$, $PQRD$ ad invicem ut semisses totarum velocitatum,
 & propterea (ob æqualitatem velocitatum) æquantur.

Corol. 2. Unde si corpus quodlibet de loco quocunque D data
 cum velocitate vel sursum vel deorsum projiciatur, & detur lex vis
 centripetæ, inveniatur velocitas ejus in alio quovis loco e , erigen-
 do ordinatam eg , & capiendo velocitatem illam ad velocitatem in
 loco D ut est latus quadratum rectanguli $PQRD$ area curvilinea
 $DFge$ vel aucti, si locus e est loco D inferior, vel diminuti, si
 iis superior est, ad latus quadratum rectanguli solius $PQRD$, id
 est, ut $\sqrt{PQRD} + \text{vel } - \sqrt{DFge}$ ad \sqrt{PQRD} .

P

Corol.

DE MOTU
CORPORUM.

Corol. 3. Tempus quoque innotescet erigendo ordinatam *em* reciproce proportionalem lateri quadrato ex $PQRD + \text{vel} - DFge$, & capiendo tempus quo corpus descripsit lineam *De* ad tempus quo corpus alterum vi uniformi cecidit a *P* & cadendo pervenit ad *D*, ut area curvilinea $DLme$ ad rectangulum $2PD \times DL$. Namque tempus quo corpus vi uniformi descendens descripsit lineam PD est ad tempus quo corpus idem descripsit lineam PE in subduplicata ratione PD ad PE , id est (lineola DE jamjam nascente) in ratione PD ad $PD + \frac{1}{2}DE$ seu $2PD$ ad $2PD + DE$ & divisim, ad tempus quo corpus idem descripsit lineolam DE ut $2PD$ ad DE , adeoque ut rectangulum $2PD \times DL$ ad aream $DLME$; estque tempus quo corpus utrumque descripsit lineolam DE ad tempus quo corpus alterum inæquabili motu descripsit lineam *De* ut area $DLME$ ad aream $DLme$, & ex æquo tempus primum ad tempus ultimum ut rectangulum $2PD \times DL$ ad aream $DLme$.

S E C T I O VIII.

De inventione Orbium in quibus corpora Viribus quibuscunque centripetis agitata revolvuntur

PROPOSITIO XL. THEOREMA XIII.

Si corpus, cogente Vi quacunque centripeta, moveatur utcunque, & corpus aliud recta ascendat vel descendat, sintque eorum Velocitates in aliquo equalium altitudinum casu æquales, Velocitates eorum in omnibus equalibus altitudinibus erunt æquales.


Descendat corpus aliquod ab *A* per *D, E*, ad centrum *C*, & moveatur corpus aliud a *V* in linea curva $VIKk$, Centro *C* intervallis quibuscunque describantur circuli concentrici DI , EK rectæ AC in *D* & *E*, curvæque VIK in *I* & *K* occurrentes. Jungatur IC occurrens ipsi KE in *N*; & in IK demittatur perpendicularum NT ; sitque circumferentiarum circulorum intervallum DE vel IN quam minimum, & habeant corpora in *D* & *I* velocitates

DE MOTU
CORPORUM

porum velocitates in E & K & eodem argumento semper reperientur æquales in subsequentibus æqualibus distantis. *Q. E. D.*

Sed & eodem argumento corpora æquielocia & æqualiter a centro distantia, in ascensu ad æquales distantias æqualiter retardabuntur. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si corpus vel funipendulum oscilletur, vel impedimento quovis politissimo & perfecte lubrico cogatur in linea curva moveri, & corpus aliud recta ascendat vel descendat, sintque velocitates eorum in eadem quacunque altitudine æquales: erunt velocitates eorum in aliis quibuscunque æqualibus altitudinibus æquales. Namque impedimento vasis absolute lubrici idem præstatur quod vi transversa NT . Corpus eo non retardatur, non acceleratur, sed tantum cogitur de cursu rectilineo discedere.



Corol. 2. Hinc etiam si quantitas P sit maxima a centro distantia, ad quam corpus vel oscillans vel in Trajectoria quacunque revolvens, deque quovis Trajectoriæ puncto, ea quam ibi habet velocitate sursum projectum ascendere possit; sitque quantitas A distantia corporis a centro in alio quovis Orbitæ puncto, & vis centripeta semper sit ut ipsius A dignitas quælibet $A^n - 1$, cujus Index $n - 1$ est numerus quilibet n unitate diminutus; velocitas corporis in omni altitudine A erit ut $\sqrt{P^n - A^n}$, atque adeo datur. Namque velocitas recta ascendentis ac descendentis (per Prop. xxxix.) est in hac ipsa ratione.

PROPO.

PROPOSITIO XLI. PROBLEMA XXVIII.

 LIBER
PRIMUS.

Posita cujuscunque generis Vi centripeta & concessis Figurarum curvilinearum quadraturis, requiruntur tum Trajectoriæ in quibus corpora movebuntur, tum Tempora motuum in Trajectoriis inventis.

Tendat vis quælibet ad centrum C & invenienda sit Trajectoria $VITKk$. Detur Circulus VXY centro C intervallo quovis CV descriptus, centroque eodem describantur alii quivis circuli ID , KE Trajectoriam secantes in I & K rectamque CV in D & E . Age tum rectam $CNIX$ secantem circulos KE , VT in N & X , tum rectam CKT occurrentem circulo VXY in T . Sint autem puncta I & K sibi invicem vicinissima, & pergat corpus ab V per I , T & K ad k ; sitque punctum A locus ille de quo corpus aliud cadere debet ut in loco D velocitatem acquirat æqualem velocitati corporis prioris in I ; & stantibus quæ in Propositione xxxix, lineola IK , dato tempore quam minimo descripta, erit ut velocitas atque adeo ut latus quadratum areae $ABFD$, & triangulum ICK tempori proportionale dabitur, adeoque KN erit reciproce ut altitudo IC , id est, si detur quantitas aliqua Q , & altitudo IC nominetur A , ut $\frac{Q}{A}$. Hanc quantitatem $\frac{Q}{A}$ nominemus Z ,

& ponamus eam esse magnitudinem ipsius Q , ut sit in aliquo casu \sqrt{ABFD} ad Z ut est IK ad KN , & erit in omni casu \sqrt{ABFD} ad Z ut IK ad KN , & $ABFD$ ad ZZ ut IK^2 ad KN^2 . & divisim $ABFD - ZZ$ ad ZZ ut IN quad. ad KN quad; adeoque $\sqrt{ABFD - ZZ}$ ad $(Z \text{ seu } \frac{Q}{A})$ ut IN ad KN , & propterea

$A \times KN$ æquale $\frac{Q \times IN}{\sqrt{ABFD - ZZ}}$. Unde cum $TX \times XC$ sit ad $A \times KN$ ut CX^2 ad AA , erit rectangulum $TX \times XC$ æquale $\frac{Q \times IN \times CX \text{ quad.}}{AA \sqrt{ABFD - ZZ}}$. Igitur si in perpendiculo DF capiantur

semper Db , Dc ipsi $\frac{Q}{2\sqrt{ABFD - ZZ}}$ & $\frac{Q \times CX \text{ quad.}}{2AA \sqrt{ABFD - ZZ}}$ æquales respective, & describantur curvæ lineæ ab , cd , quas puncta

DE MOTU
CORPORUM.


puncta b, c perpetuo tangunt; deque puncto V ad lineam AC , erigatur perpendicularum Vad abscindens areas curvilineas $VDb a$, $VDcd$, & erigantur etiam ordinatæ Ez , Ex : quoniam rectangulum $Db \times IN$ seu $Dbz E$ æquale est dimidio rectanguli $A \times KN$, seu triangulo ICK ; & rectangulum $Dc \times IN$ seu $Dcx E$ æquale est dimidio rectanguli $IX \times XC$, seu triangulo XCT ; hoc est, quoniam arearum $VDb a$, VIC æquales semper sunt nascentes particulæ $Dbz E$, ICK , & arearum $VDcd$, VCX æquales semper sunt nascentes particulæ $Dcx E$, XCT , erit area genita $VDb a$ æqualis areae genitæ VIC , adeoque temporis proportionalis, & area genita $VDcd$ æqualis Sectori genito VCX . Dato igitur tempore quovis ex quo corpus discessit de loco V , dabitur area ipsi proportionalis $VDb a$, & inde dabitur corporis altitudo CD vel CI ; & area $VDcd$, eique æqualis Sector VCX una cum ejus angulo VCI . Datis autem angulo VCI & altitudine CI datur locus I , in quo corpus completo illo tempore reperietur. Q. E. I.

Corol. 1. Hinc maximæ minimæque corporum altitudines, id est Apfides Trajectoriarum expedite inveniri possunt. Sunt enim Apfides puncta illa in quibus recta IC per centrum ducta incidit perpendiculariter in Trajectoriam VIK : id quod fit ubi rectæ IK & NK æquantur, adeoque ubi area $ABFD$ æqualis est ZZ .

Corol. 2. Sed & angulus KIN , in quo Trajectoria alibi secat lineam illam IC , ex data corporis altitudine IC expedite invenitur; nimirum capiendi sinum ejus ad radium ut KN ad IK , id est, ut Z ad latus quadratum areae $ABFD$.

Corol. 3. Si centro C & vertice principali V describatur Sectio quælibet Conica VRS , & a quovis ejus puncto R agatur Tangens RT occurrens axi infinite productio CV in puncto T ; deinde juncta CR ducatur recta CP , quæ æqualis sit abscissæ CT , angulumque PCP Sectori PCR proportionalem constituat; tendat autem ad centrum C Vis centripeta Cubo distantiae locorum a centro reciproce proportionalis, & exeat corpus de loco V iuxta cum Velocitate secundum lineam rectæ CV perpendiculararem: progrediatur corpus illud in Trajectoria quam punctum P perpetuo tangit; adeoque si Conica sectio $CURS$ Hyperbola sit, descendet idem ad centrum: Sin ea Ellipsis sit, ascendet illud perpetuo & abibit in infinitum. Et contra, si corpus quacunque cum Velocitate exeat de loco V , & perinde ut incoeperit vel oblique descendere ad centrum, vel ab eo oblique

lique ascendere, Figura $CVRS$ vel Hyperbola sit vel Ellipsis, in- LIBER
 veniri potest Trajectoria augendo vel minuendo angulum VCP PRIMUS,
 in data aliqua ratione. Sed & Vi centripeta in centrifugam versa,



ascendet corpus oblique in Trajectoria VPQ , quæ invenitur capi-
 endo angulum VCP Sectori Elliptico $CVRC$ proportionalem, &
 longitudinem CP longitudini CT æqualem ut supra. Consequen-
 tur hæc omnia ex Propositione præcedente, per Curvæ cujusdam
 quadraturam, cujus inventionem, ut satis facilem, brevitatis gra-
 tia missam facio.

PROPOSITIO XLII. PROBLEMA XXIX.

*Data lege Vis centripetæ, requiritur motus corporis de loco
 dato cum Velocitate secundum datam rectam egressi.*

Stantibus quæ in tribus Propositionibus præcedentibus : exeat
 corpus de loco I secundum lineolam IT , ea cum Velocitate quam
 corpus aliud, vi aliqua uniformi centripeta, de loco P cadendo ac-
 quirere posset in D : sitque hæc vis uniformis ad vim qua corpus
primum


S E C T I O IX.

De Motu corporum in Orbibus mobilibus, deque motu Apſidum.

PROPOSITIO XLIII. PROBLEMA XXX.

Efficiendum eſt ut corpus in Trajectoria quacunque circa centrum Virium-revolvente perinde moveri poſſit, atque corpus aliud in eadem Trajectoria quieſcente.

In Orbe VPK poſitione dato revolvatur corpus P pergendo a V verſus K . A centro C agatur ſemper Cp , quæ ſit ipſi CP æqualis, angulumque VCP angulo VCP proportionalem conſtituat; & area quam linea Cp deſcribit erit ad aream VCP quam linea CP ſimul deſcribit, ut velocitas lineæ deſcribentis CP ad velocitatem lineæ deſcribentis Cp ;



hoc eſt, ut angulus VCP ad angulum VCP , adeoque in data ratione, & propterea tempori proportionalis. Cum area tempori proportionalis ſit quam linea Cp in plano immobili deſcribit; manifeſtum eſt quod corpus, cogente juſtæ quantitatis Vi centripe-
ta, revolvi poſſit una cum puncto p in Curva illa lineam quam punctum idem p ratione jam expoſita deſcribit in plano immobili. Fiat angulus VCP angulo VCP , & linea Cp lineæ CV , atque Figura VCP æqualis, & corpus in p ſemper exiſtens movebitur in
Q
peri-


DE MOTU
CORPORUM.

perimetro Figuræ revolvētis $u C p$, eodemque tempore describet arcum ejus $u p$ quo corpus aliud P arcum ipsi similem & æqualem VP in Figura quiescente VPK describere potest. Quærat igitur, per Corollarium quintum propositionis VI, Vis centripeta qua corpus revolvī possit in Curva illa linea quam punctum p describit in plano immobili, & solvetur Problema. Q.E.F.

PROPOSITIO XLIV. THEOREMA XIV.

Differentia Virium, quibus corpus in Orbe quiescente, & corpus aliud in eodem Orbe revolvēte æqualiter moveri possunt, est in triplicata ratione communis altitudinis inverse.

Partibus Orbis quiescentis VP , PK sunt similes & æquales Orbis revolvētis partes up , pk ; & punctorum P , K distantia intelligatur esse quam minima. A puncto k in rectam pC demitte perpendicularum kr , idemque produc ad m , ut sit mr ad kr ut angulus VCP ad angulum VCP . Quoniam corporum altitudines PC & pC , KC & kC semper æquantur, manifestum est quod linearum PC & pC incrementa vel decrementa semper sint æqualia, ideoque si corporum in locis P & p existentium distinguantur motus singuli (per Legem Corol. 2.) in binos, quorum hi versus centrum, sive secundum lineas PC , pC determinentur, & alteri prioribus transversī sint, & secundum lineas ipsis PC , pC , perpendiculares directionem habeant; motus versus centrum erunt æquales, & motus transversus corporis p erit ad motum transversum corporis P , ut motus angularis lineæ pC , ad motum angularem lineæ PC , id est,



ut

ut angulus VCP ad angulum VCP . Igitur eodem tempore quo corpus P motu suo utroque pervenit ad punctum K , corpus p æquali in centrum motu æqualiter movebitur a p versus C , adeoque completo illo tempore reperietur alicubi in linea mkr , quæ per punctum k in lineam pC perpendicularis est; & motu transverso acquireret distantiam a linea pC , quæ sit ad distantiam quam corpus alterum P acquirit a linea PC , ut est motus transversus corporis p ad motum transversum corporis alterius P . Quare cum kr æqualis sit distantiae quam corpus P acquirit a linea PC , sitque mr ad kr ut angulus VCP ad angulum VCP , hoc est, ut motus transversus corporis p ad motum transversum corporis P , manifestum est quod corpus p completo illo tempore reperietur in loco m . Hæc ita se habebunt ubi corpora p & P æqualiter secundum lineas pC & PC moventur, adeoque æqualibus Viribus secundum lineas illas urgentur. Capiatur autem angulus pCn ad angulum pCk ut est angulus VCP ad angulum VCP , sitque nC æqualis kC , & corpus p completo illo tempore revera reperietur in n ; adeoque Vi majore urgetur quam corpus P , si modo angulus mCp angulo kCp major est, id est si Orbis upk vel movetur in consequentia, vel movetur in antecedentia majore celeritate quam sit dupla ejus qua linea CP in consequentia fertur; & Vi minore si Orbis tardius movetur in antecedentia. Estque Virium differentia ut locorum intervallum mn , per quod corpus illud p ipsius actione, dato illo temporis spatio, transferri debet. Centro C intervallo Cn vel Ck describi intelligatur Circulus secans lineas mr , mn productas in s & t , & erit rectangulum $mn \times mt$ æquale rectangulo $mk \times ms$, adeoque mn æquale $\frac{mk \times ms}{mt}$. Cum autem tri-

angula pCk , pCn dentur magnitudine, sunt kr & mr , earumque differentia mk & summa ms reciproce ut altitudo pC , adeoque rectangulum $mk \times ms$ est reciproce ut quadratum altitudinis pC . Est & mt directe ut $\frac{1}{2} mt$, id est, ut altitudo pC . Hæc sunt primæ rationes linearum nascentium; & hinc fit $\frac{mk \times ms}{mt}$, id est lineo-

la nascens mn , eique proportionalis Virium differentia reciproce ut cubus altitudinis pC . Q. E. D.

Corol. 1. Hinc differentia virium in locis P & p vel K & k , est ad vim qua corpus motu Circulari revolvitur possit ab R ad K eodem tempore quo corpus P in Orbe immobili describit arcum PK , ut lineola nascens mn ad sinum versum arcus nascentis KK , id est

DE MOTU
CORPORUM

ut $\frac{mk \times ms}{mt}$ ad $\frac{rkq}{2kC}$, vel ut $mk \times ms$ ad rk quadratum; hoc est,

si capiantur datæ quantitates F , G in ea ratione ad invicem quam habet angulus VCP ad angulum VCp , ut $GG - FF$ ad FF . Et propterea, si centro C intervallo quovis CP vel Cp describatur Sector circularis æqualis areæ toti VPC , quam corpus P tempore quovis in Orbe immobili revolvens radio ad centrum ducto descripsit: differentia virium, quibus corpus P in Orbe immobili & corpus p in Orbe mobili revolvuntur, erit ad vim centripetam qua corpus aliquod radio ad centrum ducto Sectorem illum, eodem tempore quo descripta sit area VPC uniformiter describere potuisset, ut $GG - FF$ ad FF . Namque Sector ille & area pCk sunt ad invicem ut tempora quibus describuntur.

Corol. 2. Si Orbis VPK Ellipsis sit umbilicum habens C & Ap-sidem summam V ; eique similis & æqualis ponatur Ellipsis upk , ita ut sit semper pC æqualis PC , & angulus VCp sit ad angulum VCP in data ratione G ad F ; pro altitudine autem PC vel pC scribatur A , & pro Ellipseos latere recto ponatur $2R$: erit vis qua corpus in Ellipsi mobili revolvitur potest, ut $\frac{FF}{AA} + \frac{RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$ &

contra. Exponatur enim vis qua corpus revolvatur in immota Ellipsi per quantitatem $\frac{FF}{AA}$, & vis in V erit $\frac{FF}{CV \text{ quad.}}$. Vis autem

qua corpus in Circulo ad distantiam CV ea cum velocitate revolvitur posset quam corpus in Ellipsi revolvens habet in V , est ad vim qua corpus in Ellipsi revolvens urgetur in Apside V , ut dimidium lateris recti Ellipseos ad Circuli semidiametrum CV , adeoque valet $\frac{RFF}{CV \text{ cub.}}$: & vis quæ sit ad hanc ut $GG - FF$ ad

FF , valet $\frac{RGG - RFF}{CV \text{ cub.}}$: estque hæc vis (per hujus Corol. 1.)

differentia virium in V quibus corpus P in Ellipsi immota VPK , & corpus p in Ellipsi mobili upk revolvuntur. Unde cum (per hanc Prop.) differentia illa in alia quavis altitudine A sit ad ipsam in altitudine CV ut $\frac{1}{A \text{ cub.}}$ ad $\frac{1}{CV \text{ cub.}}$, eadem differentia

in omni altitudine A valebit $\frac{RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$. Igitur ad vim $\frac{FF}{AA}$

qua corpus revolvitur potest in Ellipsi immobili VPK , addatur excessus $\frac{RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$ & componetur vis tota $\frac{FF}{AA} + \frac{RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$

qua

qua corpus in Ellipſi mobili upk iſdem temporibus revolvi poſſit. LIBER PRIMUS.


Corol. 3. Ad eundem modum colligitur quod, ſi Orbis immobilis VPK Ellipſis ſit centrum habens in virium centro C ; eique ſimilis, æqualis & concentrica ponatur Ellipſis mobilis upk ; ſitque 2 R Ellipſeos huius latus rectum principale, & 2 T latus tranſverſum ſive axis major, atque angulus VCp ſemper ſit ad angulum VCP ut G ad F ; vires quibus corpora in Ellipſi immobili & mobili temporibus æqualibus revolvi poſſunt, erunt ut $\frac{FFA}{T cub.}$ & $\frac{FFA}{T cub.}$.

+ $\frac{RGG - RFF}{A cub.}$ reſpective.

Corol. 4. Et univerſaliter, ſi corporis altitudo maxima CV nominetur T , & radius curvaturæ quam Orbis VPK habet in V , id eſt radius Circuli æqualiter curvi, nominetur R , & vis centripeta qua corpus in Trajectoria quacunque immobili VPK revolvi poſteſt, in loco V dicatur $\frac{VFF}{TT}$ atque aliis in locis P indefinite dicatur X , altitudine CP nominata A , & capiatur G ad F in data ratione anguli VCp ad angulum VCP : erit vis centripeta qua corpus idem eoſdem motus in eadem Trajectoria upk circulariter mota temporibus iſdem peragere poteſt, ut ſumma virium $X + \frac{VRGG - VRFF}{A cub.}$.

Corol. 5. Dato igitur motu corporis in Orbe quocunque immobili, augeri vel minui poteſt ejus motus angularis circa centrum virium in ratione data, & inde inveniri novi Orbes immobiles in quibus corpora novis viribus centripetis gyrentur.

Corol. 6. Igitur ſi ad rectam CV poſitione datam erigatur perpendicularum VP longitudinis indeterminatæ, jungaturque CP , & ipſi æqualis agatur Cp , conſtituens angulum VCp , qui ſit ad angulum VCP in data ratione; vis qua corpus gyriari poteſt in Curva illa Vpk quam punctum p perpetuo tangit, erit reciproce ut cubus altitudinis Cp . Nam corpus P , per vim inertiae, nulla alia vi urgente, uniformiter progredi poteſt in recta VP . Addatur vis in centrum G , cubo altitudinis CP vel Cp reciproce proportionalis, & (per jam demonſtrata) detorquebitur motus ille rectilineus in lineam curvam.



curvam Vpk . Est autem hæc Curva Vpk eadem cum Curva illa VpQ in Corol. 3. Prop. xli inventa, in qua ibi diximus corpora hujusmodi viribus attracta oblique ascendere.

PROPOSITIO XLV. PROBLEMA XXXI.

Orbium qui sunt Circulis maxime finitimi requiruntur motus Apsidum.

Problema solvitur Arithmetice faciendo ut Orbis, quem corpus in Ellipsi mobili (ut in Propositionis superioris Corol. 2. vel 3.) revolvens describit in plano immobili, accedat ad formam Orbis cuius Apsides requiruntur, & quærendo Apsides Orbis quem corpus illud in plano immobili describit. Orbes autem eandem acquirerent formam, si vires centripetæ quibus describuntur, inter se collatæ, in æqualibus altitudinibus reddantur proportionales. Sit punctum V Apsis summa, & scribantur T pro altitudine maxima CV , A pro altitudine quavis alia CP vel Cp , & X pro altitudinum differentia $CV - CP$; & vis qua corpus in Ellipsi circa umbilicum suum C (ut in Corollario 2.) revolvente movetur, quæque in Corollario 2. erat ut $\frac{FF}{AA} + \frac{RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$, id est

ut $\frac{FFA + RGG - RFF}{A \text{ cub.}}$, substituendo $T - X$ pro A , erit ut $\frac{RGG - RFF + TFF - FFX}{A \text{ cub.}}$. Reducenda similiter est vis alia

quævis centripeta ad fractionem cujus denominator sit $A \text{ cub.}$, & numeratores, facta homologorum terminorum collatione, statuendi sunt analogi. Res Exemplis patebit.

Exempl. 1. Ponamus vim centripetam uniformem esse, adeoque ut $\frac{A \text{ cub.}}{A \text{ cub.}}$, sive (scribendo $T - X$ pro A in Numeratore) ut $\frac{T \text{ cub.} - 3TTX + 3TXX - X \text{ cub.}}{A \text{ cub.}}$; & collatis Numeratorum ter-

minis correspondentibus, nimirum datis cum datis & non datis cum non datis, fiet $RGG - RFF + TFF$ ad $T \text{ cub.}$ ut $-FFX$ ad $-3TTX + 3TXX - X \text{ cub.}$ sive ut $-FF$ ad $-3TT + 3TX - XX$. Jam cum Orbis ponatur Circulo quam maxime finitimus, coeat Orbis cum Circulo; & ob factas R , T æquales, atque X in infinitum

infinitum diminutam, rationes ultimæ erunt RGG ad T cub. ut — FF
 ad — 3 TT, seu GG ad TT ut FF ad 3 TT & vicissim GG ad
 FF ut TT ad 3 TT id est, ut 1 ad 3; adeoque G ad F, hoc
 est angulus $\angle VCP$ ad angulum $\angle VCP$, ut 1 ad $\sqrt{3}$. Ergo cum
 corpus in Ellipsi immobili, ab Apfide summa ad Apfidem imam
 descendendo conficiat angulum $\angle VCP$ (ut ita dicam) graduum
 180; corpus aliud in Ellipsi mobili, atque adeo in Orbe immo-
 bili de quo agimus, ab Apfide summa ad Apfidem imam descen-
 dendo conficiet angulum $\angle VCP$ graduum $\frac{180}{\sqrt{3}}$: id adeo ob simili-

tudinem Orbis hujus, quem corpus agente uniformi vi centri-
 petæ describit, & Orbis illius quem corpus in Ellipsi revolvente
 gyros peragens describit in plano quiescente. Per superiorem
 terminorum collationem similes redduntur hi Orbes, non univer-
 saliter, sed tunc cum ad formam circularem quam maxime ap-
 propinquant. Corpus igitur uniformi cum vi centripetæ in Orbe
 propemodum circulari revolvens, inter Apfidem summam & Ap-
 fidem imam conficiet semper angulum $\frac{180}{\sqrt{3}}$ graduum, seu 103 gr.

55 m. 23. sec. ad centrum; perveniens ab Apfide summa ad Apfidem
 imam ubi semel confecit hunc angulum, & inde ad Apfidem
 summam rediens ubi iterum confecit eundem angulum; & sic
 deinceps in infinitum.

Exempl. 2. Ponamus vim centripetam esse ut altitudinis A dig-
 nitas quælibet A^{n-3} seu $\frac{A^n}{A^3}$: ubi $n-3$ & n significant dignita-
 tum indices quoscumque integros vel fractos, rationales vel irratio-
 nales, affirmativos vel negativos. Numerator ille A^n seu $\sqrt[n]{T-X}^n$
 in seriem indeterminatam per Methodum nostram Serierum con-
 vergentium reducta, evadit $T^n - nXT^{n-1} + \frac{nn-n}{2}XXT^{n-2}$ &c.

Et collatis hujus terminis cum terminis Numeratoris alterius
 $RGG - RFF + TFF - FFX$, fit $RGG - RFF + TFF$ ad T^n
 ut — FF ad — $nT^{n-1} + \frac{nn-n}{2}XT^{n-2}$ &c. Et sumendo ratio-

nes ultimas ubi Orbes ad formam circularem accedunt, fit RGG
 ad T^n ut — FF ad — nT^{n-1} , seu GG ad T^{n-1} ut FF ad nT^{n-1}
 & vicissim GG ad FF ut T^{n-1} ad nT^{n-1} , id est ut 1 ad n ;
 adeoque G ad F, id est angulus $\angle VCP$ ad angulum $\angle VCP$;
 ut

DE MOTU
CORPORUM

ut 1 ad \sqrt{n} . Quare cum angulus VCP , in descensu corporis ab Apfide summa ad Apfidem imam, in Ellipsi confectus, sit graduum 180; conficietur angulus VCP , in descensu corporis ab Apfide summa ad Apfidem imam, in Orbe propemodum Circulari quem corpus quodvis vi centripeta dignitati A^{n-3} proportionali describit, æqualis angulo graduum $\frac{180}{\sqrt{n}}$; & hoc angulo repetito corpus redibit ab Apfide ima ad Apfidem summam, & sic deinceps in infinitum. Ut si vis centripeta sit ut distantia corporis a centro, id est, ut A seu $\frac{A^1}{A^1}$, erit n æqualis 4 & \sqrt{n} æqualis 2;

adeoque angulus inter Apfidem summam & Apfidem imam æqualis $\frac{180}{2}$ gr. seu 90. gr. Completa igitur quarta parte revolutionis unius, corpus perveniet ad Apfidem imam, & completa alia quarta parte ad Apfidem summam, & sic deinceps per vices in infinitum. Id quod etiam ex Propositione x. manifestum est. Nam corpus urgente hac vi centripeta revolvetur in Ellipsi immobili, cujus centrum est in centro virium. Quod si vis centripeta sit reciproce ut distantia, id est directe ut $\frac{1}{A}$ seu $\frac{A^2}{A^3}$, erit n æqualis 2. ad-

eoque inter Apfidem summam & imam angulus erit graduum $\frac{180}{\sqrt{2}}$ seu 127 gr. 16. m. 45. sec. & propterea corpus tali vi revolvens, perpetua anguli hujus repetitione, vicibus alternis ab Apfide summa ad imam & ab ima ad summam perveniet in æternum. Porro si vis centripeta sit reciproce ut latus quadrato-quadratum undecimæ dignitatis altitudinis, id est reciproce ut $A^{\frac{11}{4}}$, adeoque directe ut $\frac{1}{A^{\frac{11}{4}}}$ seu ut $\frac{A^{\frac{3}{4}}}{A^3}$, erit n æqualis $\frac{4}{3}$, & $\frac{180}{\sqrt{n}}$ gr. æqualis 360 gr. & propterea corpus de Apfide summa discedens & subinde perpetuo descendens, perveniet ad Apfidem imam ubi complevit revolutionem integram, dein perpetuo ascensu complendo aliam revolutionem integram, redibit ad Apfidem summam: & sic per vices in æternum.

Exempl. 3. Affumentes m & n pro quibusvis indicibus dignitatum Altitudinis, & b, c pro numeris quibusvis datis, ponamus vim cen-

tripetam esse ut $\frac{bA^m + cA^n}{A \text{ cub.}}$, id est, ut $\frac{b \ln T - X^m + c \ln T - X^n}{A \text{ cub.}}$

seu (per eandem Methodum nostram Serierum convergentium) ut

$$\frac{bT^m + cT^n - mbXT^{m-1} - ncXT^{n-1} + \frac{mm-m}{2}bXXT^{m-2} + \frac{nn-n}{2}cXXT^{n-2} \&c.}{A \text{ cub.}} \quad \&c.$$

& collatis numeratorum terminis, fiet $RGG - RFF + TFF$ LIBER
 ab $b T^m + c T^n$, ut $-FF$ ad $-mb T^{m-1} - nc T^{n-1}$ PRIMUS.
 $+\frac{mm-m}{2}bXT^{m-2} + \frac{nn-n}{2}cXT^{n-2}$ &c. Et fumendo rationes ul-
 timas quæ prodeunt ubi Orbes ad formam circularem accedunt, fit
 GG ad $bT^{m-1} + cT^{n-1}$, ut FF ad $mbT^{m-1} + ncT^{n-1}$, &
 vicissim GG ad FF ut $bT^{m-1} + cT^{n-1}$ ad $mbT^{m-1} + ncT^{n-1}$
 Quæ proportio, exponendo altitudinem maximam CV seu T arith-
 metice per Unitatem, fit GG ad FF ut $b+c$ ad $mb+nc$, adeoque ut
 1 ad $\frac{mb+nc}{b+c}$. Unde est G ad F , id est angulus VCP ad angulum
 VCP , ut 1 ad $\sqrt{\frac{mb+nc}{b+c}}$. Et propterea cum Angulus VCP inter
 Apfidem summam & Apfidem imam in Ellipfi immobili sit 180 . gr.
 erit angulus VCP inter easdem Apfides, in Orbe quem corpus vi
 centripeta quantitati $\frac{bA^m + cA^n}{A cub.}$ proportionali describit, æqua-
 lis angulo graduum $180 \sqrt{\frac{b+c}{mb+nc}}$. Et eodem argumento si vis cen-
 tripeta sit ut $\frac{bA^m - cA^n}{A cub.}$, angulus inter Apfides invenietur gra-
 duum $180 \sqrt{\frac{b-c}{mb-nc}}$. Nec secus resolvetur Problema in casibus
 difficilioribus. Quantitas cui vis centripeta proportionalis est, re-
 solvi semper debet in Series convergentes denominatorem habentes
 $A cub.$ Dein pars data numeratoris qui ex illa operatione prove-
 nit, ad ipsius partem alteram non datam, & pars data numeratoris
 hujus $RGG - RFF + TFF - FFX$ ad ipsius partem alte-
 ram non datam in eadem ratione ponendæ sunt: Et quantitates
 superfluas delendo, scribendoque Unitatem pro T , obtinebitur
 proportio G ad F .

Corol. 1. Hinc si vis centripeta sit ut aliqua altitudinis dignitas,
 inveniri potest dignitas illa ex motu Apfidum; & contra. Ni-
 mirum si motus totus angularis, quo corpus redit ad Apfidem
 eandem, sit ad motum angularem revolutionis unius, seu graduum
 360 , ut numerus aliquis m ad numerum alium n , & altitudo no-
 minetur A : erit vis ut altitudinis dignitas illa $A^{\frac{n}{m}}$ — 3, cujus In-

R

dex

DE MOTU
CORPORUM

dex est $\frac{nn}{mm} - 3$. Id quod per exempla secunda manifestum est.

Unde liquet vim illam in majore quam triplicata altitudinis ratione, in recessu a centro, decrescere non posse: Corpus tali vi revolvens deque Apside discedens, si coeperit descendere nunquam perveniet ad Apsidem imam seu altitudinem minimam, sed descendet usque ad centrum, describens Curvam illam lineam de qua egimus in Cor. 3. Prop. xli. Sin coeperit illud, de Apside discedens, vel minimum ascendere, ascendet in infinitum, neque unquam perveniet ad Apsidem summam. Describet enim Curvam illam lineam de qua actum est in eodem Corol. & in Corol. 6. Prop. xlii. Sic & ubi vis, in recessu a centro, decrescit in majore quam triplicata ratione altitudinis, corpus de Apside discedens, perinde ut coeperit descendere vel ascendere, vel descendet ad centrum usque vel ascendet in infinitum. At si vis, in recessu a centro, vel decrescat in minore quam triplicata ratione altitudinis, vel crescat in altitudinis ratione quacunque; corpus nunquam descendet ad centrum usque, sed ad Apsidem imam aliquando perveniet: & contra, si corpus de Apside ad Apsidem alternis vicibus descendens & ascendens nunquam appellat ad centrum; vis in recessu a centro aut augebitur, aut in minore quam triplicata altitudinis ratione decrescet: & quocitius corpus de Apside ad Apsidem redierit, eo longius ratio virium recedet a ratione illa triplicata. Ut si corpus revolutionibus 8 vel 4 vel 2 vel $1\frac{1}{2}$ de Apside summa ad Apsidem summam alterno descensu & ascensu redierit; hoc est, si fuerit m ad n ut 8 vel 4 vel 2 vel $1\frac{1}{2}$ ad 1, adeoque $\frac{nn}{mm} - 3$ valeat $\frac{1}{64} - 3$ vel $\frac{1}{16} - 3$ vel $\frac{1}{4} - 3$ vel $\frac{4}{9} - 3$: erit vis ut $A^{\frac{1}{64}} - 3$ vel $A^{\frac{1}{16}} - 3$ vel $A^{\frac{1}{4}} - 3$ vel $A^{\frac{4}{9}} - 3$, id est, reciproce ut $A^3 - \frac{1}{64}$ vel $A^3 - \frac{1}{16}$ vel $A^3 - \frac{1}{4}$ vel $A^3 - \frac{4}{9}$. Si corpus singulis revolutionibus redierit ad Apsidem eandem immotam; erit m ad n ut 1 ad 1, adeoque $A^{\frac{nn}{mm}} - 3$ æqualis $A - 2$ seu $\frac{1}{AA}$.

& propterea decrementum virium in ratione duplicata altitudinis, ut in præcedentibus demonstratum est. Si corpus partibus revolutionis unius vel tribus quartis, vel duabus tertiis, vel una tertia, vel una quarta, ad Apsidem eandem redierit; erit m ad n ut

$\frac{3}{4}$ vel $\frac{2}{3}$ vel $\frac{1}{3}$ vel $\frac{1}{4}$ ad 1, adeoque $A^{\frac{nn}{mm}} - 3$ æqualis $A^{\frac{16}{9}} - 3$ vel $A^{\frac{9}{4}} - 3$ vel $A^3 - 3$ vel $A^{16} - 3$; & propterea vis aut reciproce ut

$A^{\frac{11}{9}}$

A^3 vel $A^{\frac{3}{4}}$, aut directe ut A^6 vel A^3 . Denique si corpus pergendo ab Apfide summa ad Apfidem summam confecerit revolutionem integram, & præterea gradus tres, adeoque Apfis illa singulis corporis revolutionibus confecerit in consequentia gradus tres; erit m ad n ut

363 gr. ad 360 gr. five ut 121 ad 120, adeoque $A^{\frac{nn}{mm}} - 3$ erit æquale

$A^{\frac{29523}{14641}}$; & propterea vis centripeta reciproce ut $A^{\frac{29523}{14641}}$ seu reciproce ut $A^{\frac{4}{243}}$ proxime. Decrescit igitur vis centripeta in ratione paulo majore quam duplicata, sed quæ vicibus $59\frac{3}{4}$ propius ad duplicatam quam ad triplicatam accedit.

Corol. 2. Hinc etiam si corpus vi centripeta, quæ sit reciproce ut quadratum altitudinis, revolvatur in Ellipsi umbilicum habente in centro virium, & huic vi centripetæ addatur vel auferatur vis alia quævis extranea; cognosci potest (per Exempla tertia) motus Apfidum qui ex vi illa extranea oriatur, & contra. Ut si vis qua corpus revolvitur in Ellipsi sit ut $\frac{1}{AA}$, & vis extranea ab-

lata ut cA , adeoque vis reliqua ut $\frac{A-cA^4}{A^{cub.}}$; erit (in Exemplis ter-

tiis) b æqualis 1, m æqualis 1, n æqualis 4, adeoque angulus revolutionis inter Apfides æqualis angulo graduum $180 \sqrt{\frac{1-c}{1-4c}}$. Po-

natur vim illam extraneam esse 357, ⁴⁵ partibus minorem quam vis altera qua corpus revolvitur in Ellipsi, id est c esse $\frac{100}{35745}$, existente A

vel T æquali 1; & $180 \sqrt{\frac{1-c}{1-4c}}$ evadet $180 \sqrt{\frac{35645}{35345}}$ seu 180, 7623,

id est, 180 gr. 45. m. 44. s. Igitur corpus de Apfide summa discedens, motu angulari 180 gr. 45. m. 44. s. perveniet ad Apfidem imam, & hoc motu duplicato ad Apfidem summam redibit: adeoque Apfis summa singulis revolutionibus progrediendo conficiet 1 gr. 31 m. 28 sec.

Haftenus de Motu Corporum in Orbibus quorum plana per centrum Virium transeunt. Superest ut Motus etiam determinemus in planis excentricis. Nam Scriptores qui Motum gravium tractant, considerare solent ascensus & descensus ponderum, tam obliquos in planis quibuscunque datis, quam perpendiculares: & pari jure Motus corporum Viribus quibuscunque cen-

DE MOTU tra petentium, & planis excentricis innitentium hic consideran-
CORPORUM. dus venit. Plana autem supponimus esse politissima & absolute-
lubrica ne corpora retardent. Quinimo, in his demonstrationi-
bus, vice planorum quibus corpora incumbunt quæque tangunt
incumbendo, usurpamus plana his parallela, in quibus centra
corporum moventur & Orbitas movendo describunt. Et eadem
lege Motus corporum in superficiebus Curvis peractos subinde
determinamus.

S E C T I O X.

*De Motu Corporum in Superficiebus datis, deque Funipen-
dulorum Motu reciproco.*

PROPOSITIO XLVI. PROBLEMA XXXII.

*Posita cujuscunque generis Vi centripeta, datoque tum Vi-
rium centro tum Plano quocunque in quo corpus revolvi-
tur, & concessis Figurarum curvilinearum quadraturis:
requiritur Motus corporis de loco dato, data cum Veloci-
tate, secundum rectam in Plano illo datam egressi.*


Sit S centrum Virium, SC distantia minima centri hujus a Plano
dato, P corpus de loco P , secundum rectam PZ egrediens, Q
corpus idem in Trajectoria sua revolvens, & PQR Trajectoria il-
la, in Plano dato descripta, quam invenire oportet. Jungantur
 CQ , QS , & si in QS capiatur SV proportionalis vi centripetæ qua
corpus trahitur versus centrum S , & agatur VT quæ sit parallela
 CQ & occurrat SC in T : Vis SV resolvetur (per Legum Corol. 2.)
in vires ST , TV ; quarum ST trahendo corpus secundum lineam
plano perpendicularem, nil mutat motum ejus in hoc plano. Vis
autem altera TV , agendo secundum positionem plani, trahit corpus
directe versus punctum C in plano datum, adeoque facit illud
in hoc plano perinde moveri ac si vis ST tolleretur, & corpus vi
sola TV revolveretur circa centrum C in spatio libero. Data autem

vi centripeta TV qua corpus Q in spatio libero circa centrum da-
 tum C revolvitur, datur per Prop. XLII, tum Trajectoria PQR LIBER PRIMUS
 quam corpus describit, tum locus Q in quo corpus ad datum quod-
 vis tempus versabitur, tum denique velocitas corporis in loco illo
 Q ; & contra. $Q.E.I.$

PROPOSITIO XLVII. THEOREMA XV.

*Posito quod Vis centripeta proportionalis sit distantia corpo-
 ris a centro; corpora omnia in planis quibuscunque re-
 volventia describent Ellipses, & revolutiones Temporibus
 equalibus peragent; quæque moventur in lineis rectis, ul-
 tro citroque discurrendo, singulas eundi & redeundi perio-
 dos iisdem Temporibus absolvent.*

Nam, stantibus quæ
 in superiori Propositio-
 ne, vis SV qua corpus
 Q in plano quovis PQR
 revolvens trahitur ver-
 sus centrum S est ut dis-
 tantia SQ ; atque adeo
 ob proportionales SV
 & SQ , TV & CQ ,
 vis TV qua corpus tra-
 hitur versus punctum C
 in Orbis plano datum,
 est ut distantia CQ . Vi-
 res igitur, quibus cor-
 pora in plano PQR
 versantia trahuntur ver-
 sus punctum C , sunt
 pro ratione distantiarum æquales viribus quibus corpora undiqua-
 que trahuntur versus centrum S ; & propterea corpora movebuntur
 iisdem temporibus, in iisdem Figuris, in plano quovis PQR circa
 punctum C , atque in spatiis liberis circa centrum S ; adeoque (per
 Corol. 2. Prop. x, & Corol. 2. Prop. xxxviii) Temporibus semper
 æqua-



DE MOTU æqualibus, vel describent Ellipses in plano illo circa centrum C ,
CORPORUM vel periodos movendi ultro citroque in lineis rectis per centrum C
in plano illo ductis, complebunt. *Q. E. D.*

Scholium.

His affines sunt ascensus ac descensus corporum in superficiebus curvis. Concipe lineas curvas in plano describi, dein circa axes quosvis datos per centrum Virium transeuntes revolvi, & ea revolutione superficies curvas describere; tum corpora ita moveri ut eorum centra in his superficiebus perpetuo reperiantur. Si corpora illa oblique ascendendo & descendendo currant ultro citroque peragentur eorum motus in planis per axem transeuntibus, atque adeo in lineis curvis quarum revolutione curvæ illæ superficies genitæ sunt. Istis igitur in casibus sufficit motum in his lineis curvis considerare.

PROPOSITIO XLVIII. THEOREMA XVI.

Si Rota Globo extrinsecus ad angulos rectos insistat, & more rotarum revolvendo progrediatur in circulo maximo; longitudo Itineris curvilinei, quod punctum quodvis in Rotæ perimetro datum, ex quo Globum tetigit, confecit, (quodque Cycloidem vel Epicycloidem nominare licet) erit ad duplicatum sinum versum arcus dimidii qui Globum ex eo tempore inter eundem tetigit, ut summa diametrorum Globi & Rotæ ad semidiametrum Globi.


PROPOSITIO XLIX. THEOREMA XVII.

Si Rota Globo concavo ad rectos angulos intrinsecus insistat & revolvendo progrediatur in circulo maximo; longitudo Itineris curvilinei quod punctum quodvis in Rotæ perimetro datum, ex quo Globum tetigit, confecit, erit ad duplicatum sinum versum arcus dimidii qui Globum toto hoc tempore inter eundem tetigit, ut differentia diametrorum Globi & Rotæ ad semidiametrum Globi.

Sit

Sit ABL Globus, C centrum ejus, BPV Rota ei infistens, E centrum Rotæ, B punctum contactus, & P punctum datum in perimetro Rotæ. Concipe hanc Rotam pergere in circulo maximo ABL ab A per B versus L , & inter eundem ita revolvi ut arcus AB , PB sibi invicem semper æquantur, atque punctum illud P in perimetro Rotæ datum interea describere Viam curvilineam AP . Sit autem AP Via tota curvilinea descripta ex quo Rota Globum tetigit in A , & erit Viæ hujus longitudo AP ad duplum

LIBER PRIMUS.




sinum versum arcus $\frac{1}{2} P'B$, ut $2 CE$ ad CB . Nam recta CE (si opus est producta) occurrat Rotæ in V , junganturque CP , BP , EP , VP , & in CP productam demittatur normalis VF . Tangant PH , VH Circulum in P & V concurrentes in H , secetque PH ipsam VF in G , & ad VP demittantur normales GI , HK .

Centro

DE MOTU
CORPORUM

Centro item C & intervallo quovis describatur circulus onm , secans rectam CP in n , Rotæ perimetrum BP in o , & Viam curvilineam AP in m ; centroque V & intervallo Vo describatur circulus secans VP productam in q .

Quoniam Rota eundo semper revolvitur circa punctum contactus B , manifestum est quod recta BP perpendicularis est ad lineam



illam curvam AP quam Rotæ punctum P describit, atque adeo quod recta VP tanget hanc curvam in puncto P . Circuli onm radius sensim auctus vel diminutus æquetur tandem distantiae CP ; &, ob similitudinem Figuræ evanescentis $Pnomq$ & Figuræ $PFQVI$, ratio ultima lineolarum evanescentium Pm, Pn, Po, Pq .
id

id est ratio mutationum momentanearum curvæ AP , rectæ CP , LIBER
arcus circularis BP , ac rectæ VP , eadem erit quæ linearum PRIMUS.
 PV , PF , PG , PI , respective. Cum autem VF ad CF &
 VH ad CV perpendiculares sunt, angulique HVG , VCF prop-
terea æquales; & angulus VHG (ob angulos quadrilateri $HVEP$
ad V & P rectos) angulo CEP æqualis est, similia erunt trian-
gula VHG , CEP ; & inde fiet ut EP ad CE ita HG ad HV
seu HP & ita KI ad KP , & compositè vel divisim ut CB ad
 CE ita PI ad PK , & duplicatis consequentibus ut CB ad 2 CE
ita PI ad PV , atque ideo ut Pq ad Pm . Est igitur decremen-
tum lineæ VP , id est, incrementum lineæ $BV-VP$ ad incre-
mentum lineæ curvæ AP in data ratione CB ad 2 CE , & prop-
terea (per Corol. Lem. iv.) longitudines $BV-VP$ & AP , in-
crementis illis genitæ, sunt in eadem ratione. Sed, existente BV
radio, est VP co-sinus anguli BVP seu $\frac{1}{2} BEP$, adeoque
 $BV-VP$ sinus versus ejusdem anguli; & propterea in hac Rota,
cujus radius est $\frac{1}{2} BV$, erit $BV-VP$ duplus sinus versus arcus $\frac{1}{2} BP$.
Ergo AP est ad duplum sinum versus arcus $\frac{1}{2} BP$ ut 2 CE ad
 CB . Q. E. D.

Lineam autem AP in Propositione priore Cycloidem extra
Globum, alteram in posteriore Cycloidem intra Globum distinc-
tionis gratia nominabimus.

Corol. 1. Hinc si describatur Cyclois integra ASL & bisecetur
ea in S , erit longitudo partis PS ad longitudinem VP (quæ du-
plus est sinus anguli VBP , existente EB radio) ut 2 CE ad CB ,
atque adeo in ratione data.

Corol. 2. Et longitudo semiperimetri Cycloidis AS æquabitur li-
neæ rectæ quæ est ad Rotæ diametrum BV , ut 2 CE ad CB .


PROPOSITIO L. PROBLEMA XXXIII.

Facere ut Corpus pendulum oscilletur in Cycloide data.

Intra Globum QVS , centro C descriptum, detur Cyclois QRS
bifecta in R & punctis suis extremis Q & S superficiæ Globi hinc
inde occurrens. Agatur CR bisecans arcum QS in O , & produca-
tur ea ad A , ut sit CA ad CO ut CO ad CR . Centro C in-
tervallo
S

DE MOTU
CORPORUM

tervallo CA describatur Globus exterior ABD , & intra hunc Globum a Rota, cujus diameter sit AO , describantur duæ Semicycloides AQ , AS , quæ Globum interiorem tangant in Q & S & Globo exteriori occurrant in A . A puncto illo A , Filo APT longitudinem AR æquante, pendeat corpus T , & ita intra Semicycloides AQ , AS oscilletur, ut quoties pendulum digreditur a



perpendiculo AR , Filum parte sui superiore AP applicetur ad Semicycloidem illam APS versus quam peragitur motus, & circum eam ceu obstaculum flectatur, parteque reliqua PT cui Semicyclois nondum objicitur, protendatur in lineam rectam; & pondus T oscillabitur in Cycloide data QRS . Q, E, F .

Occurrat enim Filum PT tum Cycloidi QRS in T , tum circulo QOS in V , agaturque CV ; & ad Fili partem rectam PT , e punctis extremis P ac T , erigantur perpendicula PB , TW , occurrentia rectæ CV in B & W . Patet, ex constructione & genesi similium Figurarum AS , SR , perpendicula illa PB , TW abscindere de CV longitudines VB , VW Rotarum diametris OA , OR æquales. Est igitur TP ad VP (duplum sinum anguli $VB P$ existente $\frac{1}{2} BV$ radio)

dio) ut BW ad BV , seu $AO+OR$ ad AO , id est (cum sint CA ad CO , CO ad CR & divisim AO ad OR proportionales,) ut $CA+CO$ ad CA , vel, si bifecetur BV in E , ut $2CE$ ad CB . Proinde, (per Corol. 1. Prop. XLIX.) longitudo partis rectæ Fili PT æquatur semper Cycloidis arcui PS , & Filum totum APT æquatur semper Cycloidis arcui dimidio APS , hoc est (per Corol. 2. Prop. XLIX.) longitudini AR . Et propterea vicissim, si Filum manet semper æquale longitudini AR , movebitur punctum T in Cycloide data QRS . $Q.E.D.$

Corol. Filum AR æquatur Semicycloidi AS , adeoque ad semidiametrum AC eandem habet rationem quam similis illi Semicyclois SR habet ad semidiametrum CO .

PROPOSITIO LI. THEOREMA XVIII.

Si vis centripeta tendens undique ad Globi centrum C sit in locis singulis at distantia loci cujusque a centro, & hac sola Vi agente corpus T oscilletur (modo jam descripto) in perimetro Cycloidis QRS : dico quod oscillationum utcumque inæqualium æqualia erunt Tempora.

Nam in Cycloidis tangentem TW infinite productam cadat perpendicularum CX & jungatur CT . Quoniam vis centripeta qua corpus T impellitur versus C est ut distantia CT , atque hæc (per Legum Corol. 2.) resolvitur in partes CX , TX ; quarum CX impellendo corpus directe a P distendit filum PT & per ejus resistentiam tota cessat, nullum alium edens effectum; pars autem altera TX , urgendo corpus transversim seu versus X , directe accelerat motum ejus in Cycloide; manifestum est quod corporis acceleratio, huic vi acceleratrici proportionalis, sit singulis momentis ut longitudo TX , id est, (ob datas CV , WV iisque proportionales VX , TW ,) ut longitudo TW , hoc est (per Corol. 1. Prop. XLIX.) ut longitudo arcus Cycloidis TR . Pendulis igitur duobus APT , Apt de perpendicularo AR inæqualiter deductis & simul dimissis, accelerationes eorum semper erunt ut arcus describendi TR , tR . Sunt autem partes sub initio descriptæ ut accelerationes, hoc est, ut totæ sub initio describendæ, & propterea partes quæ manent describendæ

dæ & accelerationes subsequentes, his partibus proportionales, sunt etiam ut totæ; & sic deinceps. Sunt igitur accelerationes atque adeo velocitates genitæ & partes his velocitatibus descriptæ partefque describendæ, semper ut totæ; & propterea partes describendæ datam servant rationem ad invicem simul evanescent, id est, corpora duo oscillantia simul pervenient ad perpendicularum AR . Cumque vicissim ascensus perpendicularorum de loco infimo R , per eosdem arcus Cycloides motu retrogrado facti, retardentur in locis singulis a viribus iisdem a quibus descensus accelerabantur, patet velocitates ascensuum ac descensuum per eosdem arcus factorum æquales esse, atque adeo temporibus æqualibus fieri; & propterea, cum Cycloidis partes duæ RS & RQ ad utrumque perpendiculari latus jacentes sint similes & æquales, pendula duo oscillationes suas tam totas quam dimidias iisdem temporibus semper peragent. $Q. E. D.$

Corol. Vis qua corpus T in loco quovis T acceleratur vel retardatur in Cycloide, est ad totum corporis ejusdem Pondus in loco altissimo S vel Q , ut Cycloidis arcus TR ad ejusdem arcum SR vel QR .


PROPOSITIO LII. PROBLEMA XXXIV.

Definire & Velocitates Pendulorum in locis singulis, & Tempora quibus tum oscillationes totæ, tum singulæ oscillationum partes peraguntur.

Centro quovis G , intervallo GH Cycloidis arcum RS æquante, describe semicirculum $HKMG$ semidiametro GK bisectum. Et si vis centripeta, distantis locorum a centro proportionalis, tendat ad centrum G , sitque ea in perimetro HIK æqualis vi centripetæ in perimetro Globi QOS (*Vide Fig. Prop. Li.*) ad ipsius centrum tendenti; & eodem tempore quo pendulum T dimittitur e loco supremo S , cadat corpus aliquod L ab H ad G : quoniam vires quibus corpora urgentur sunt æquales sub initio & spatiis describendis TR , LG semper proportionales, atque adeo, si æquantur TR & LG , æquales in locis T & L ; patet corpora illa describere spatia ST , HL æqualia sub initio, adeoque subinde pergere æqualiter urgeri, & æqualia spatia describere. Quare, per Prop. xxxviii, tempus quo corpus describit arcum ST est ad tempus oscil-

oscillationis unius, ut arcus HI (tempus quo corpus H perveniet ad L) ad semiperipheriam HKM (tempus quo corpus H perveniet ad M .) Et velocitas corporis penduli in loco T est ad velocitatem ipsius in loco infimo R , (hoc est, velocitas corporis H in loco L ad velocitatem ejus in loco G , seu incrementum momentaneum lineæ HL ad incrementum momentaneum lineæ HG , arcubus HI , HK æquabili fluxu crescentibus) ut ordinatim applicata LI ad radium GK , five ut $\sqrt{SRq - TRq}$ ad SR . Unde cum, in oscillationibus inæqualibus, describantur æqualibus temporibus arcus totis oscillationum arcubus proportionales; habentur, ex datis temporibus, & velocitates & arcus descripti in oscillationibus univèrsis. Quæ erant primo inveniendæ.

Oscillantur jam Funipendula corpora in Cycloidibus diversis intra Globos diversos, quorum diversæ sunt etiam Vires absolutæ, descriptis: &, si Vis absoluta Globi cuiusvis QOS dicatur V , Vis acceleratrix qua Pendulum urgetur in circumferentia hujus Globi, ubi incipit directe versus centrum ejus moveri, erit ut distantia Corporis



penduli a centro illo & Vis absoluta Globi conjunctim, hoc est, ut $CO \times V$. Itaque lineola HT , quæ fit ut hæc Vis acceleratrix $CO \times V$, describetur dato tempore; &, si erigatur normalis TZ circumferentiæ occurrens in Z , arcus nascens HZ denotabit datum illud tempus. Est autem arcus hic nascens HZ in subduplicata ratione rectanguli GHT , adeoque ut $\sqrt{GH \times CO \times V}$. Unde Tempus oscillationis integræ in Cycloide QRS (cum sit ut semiperipheria HKM , quæ oscillationem illam integram denotat, directe, ut quæ arcus HZ , qui datum tempus similiter denotat, inverse) fiet ut GH directe & $\sqrt{GH \times CO \times V}$ inverse, hoc est, ob æquales GH

 SR
 AR

& SR , ut $\sqrt{CO \times V}$, five (per Corol. Prop. L) ut $\sqrt{AC \times V}$. Itaque Oscillationes in Globis & Cycloidibus omnibus, quibuscunque cum Viribus absolutis factæ, sunt in ratione quæ componitur ex subduplicata ratione longitudinis Fili directe, & subduplicata ratione distantie inter punctum suspensionis & centrum

DE MOTU Globi inverſe, & ſubduplicata ratione Viſ abſolutæ Globi etiam
CORPORUM inverſe. Q. E. I.

Corol. 1. Hinc etiam Oſcillantium, Cadentium & Revolventium corporum tempora poſſunt inter ſe conferri. Nam ſi Rotæ, quæ Cyclois intra globum deſcribitur, diameter conſtituatur æqualis ſemidiametro globi, Cyclois evadet Linea recta per centrum globi tranſiens, & Oſcillatio jam erit deſcenſus & ſubſequens aſcenſus in hac recta. Unde datur tum tempus deſcenſus de loco quovis ad centrum, tum tempus huic æquale quo corpus uniformiter circa centrum globi ad diſtantiā quamvis revolvens arcum quadrantalem deſcribit. Eſt enim hoc tempus (per Caſum ſecundum) ad tempus ſemioſcillationis in Cycloide quavis

$$QRS \text{ ut } 1 \text{ ad } \sqrt{\frac{AR}{AC}}$$

Corol. 2. Hinc etiam conſectantur quæ *Wrennus* & *Hugenius* de Cycloide vulgari adinvenerunt. Nam ſi Globi diameter augeatur in infinitum: mutabitur ejus ſuperficies ſphærica in planum, Viſque centripeta aget uniformiter ſecundum lineas huic plano perpendiculares, & Cyclois noſtra abibit in Cycloidem vulgi. Iſto autem in caſu longitudo arcus Cycloidis, inter planum illud & punctum deſcribens, æqualis evadet quadruplicato ſinui verſo dimidii arcus Rotæ inter idem planum & punctum deſcribens; ut invenit *Wrennus*: Et Pendulum inter duas ejuſmodi Cycloides in ſimili & æquali Cycloide temporibus æqualibus oſcillabitur, ut demonſtravit *Hugenius*. Sed & Deſcenſus gravium, tempore Oſcillationis unius, is erit quem *Hugenius* indicavit.


Aptantur autem Propositiones a nobis demonſtratae ad veram conſtitutionem Terræ, quatenus Rotæ eundo in ejus circulis maximis deſcribunt motu Clavorum, perimetris ſuis infixorum, Cycloides extra globum; & Pendula inferius in fodinis & cavernis Terræ ſuſpenſa, in Cycloidibus intra globos oſcillari debent, ut Oſcillationes omnes evadant Iſochronæ. Nam Gravitās (ut in Libro tertio docebitur) decreſcit in progreſſu a ſuperficie Terræ, ſuſum quidem in duplicata ratione diſtantiarum a centro ejus, deorſum vero in ratione ſimplici.

PROPO.

PROPOSITIO LIII. PROBLEMA XXXV.

Concessis Figurarum curvilinearum quadraturis, invenire Vires quibus corpora in datis curvis lineis Oscillationes semper Isochronas peragent.

Oscilletur Corpus T in curva quavis linea $STRQ$, cujus axis sit OR transiens per virium centrum C . Agatur TX quæ curvam illam in corporis loco quovis T contingat, inque hac tan-



gente TX capiatur TY æqualis arcui TR . Nam longitudo arcus illius ex Figurarum quadraturis (per Methodos vulgares) innotescit. De puncto T educatur recta TZ tangenti perpendicularis. Agatur CT perpendiculari illi occurrens in Z , & erit Vis centripeta proportionalis rectæ TZ . Q. E. I.

Nam

DE MOTU
CORPORUM

Nam si vis, quæ corpus trahitur de T versus C , exponatur per rectam TZ captam ipsi proportionalem, resolvetur hæc in vires TY , TZ ; quarum TZ trahendo corpus secundum longitudinem Fili PT , motum ejus nil mutat, vis autem altera TY motum ejus in curva $STRQ$ directe accelerat, vel directe retardat. Proinde cum hæc sit ut via describenda TR , accelerationes corporis vel retardationes in Oscillationum duarum (majoris & minoris) partibus proportionalibus describendis, erunt semper ut partes illæ, & propterea facient ut partes illæ simul describantur. Corpora autem quæ partes totis semper proportionales simul describunt, simul describent totas. $Q. E. D.$

Corol. 1. Hinc si corpus T Filo rectilineo AT a centro A pendens, describat arcum circula rem $STRQ$, & interea urgeatur secundum lineas parallelas deorsum a vi aliqua, quæ sit ad vim uniformem Gravitatis, ut arcus TR ad ejus sinum TN : æqualia erunt Oscillationum singularum tempora. Etenim ob parallelas TZ , AR , similia erunt triangu la ATN , ZTT ; & propterea TZ erit ad AT ut TT ad TN ; hoc est, (si Gravitatis vis uniformis exponatur per longitudinem datam AT) vis TZ , qua Oscillationes evadent Isochronæ, erit ad vim Gravitatis AT , ut arcus TR ipsi TT æqualis ad arcus illius sinum TN .


Corol. 2. Igitur in Horologiis, si vires à Machina in Pendulum ad motum conservandum impressæ ita cum vi Gravitatis componi possint, ut vis tota deorsum semper sit ut linea quæ oritur applicando rectangulum sub arcu TR & radio AR ad sinum TN , Oscillationes omnes erunt Isochronæ.

PROPOSITIO LIV. PROBLEMA XXXVI.

Concessis Figurarum curvilinearum quadraturis, invenire Tempora quibus corpora vi qualibet centripeta in lineis quibuscunque curvis, in plano per centrum Virium transiente descriptis, descendant & ascendent.

Descendat corpus de loco quovis S per lineam quamvis curvam $STtR$, in plano per virium centrum C transeunte datam. Jungatur CS & dividatur eadem in partes innumeras æquales, sitque Dd partium

partium illarum aliqua. Centro C , intervallis CD , Cd describan-
 tur circuli DT , dt , lineæ curvæ $STtR$ occurrentes in T & t .
 Et ex data tum lege vis centripetæ
 tum altitudine CS de qua corpus ce-
 cidit, dabitur velocitas corporis in
 alia quavis altitudine CT , per Prop.
 xxxix. Tempus autem, quo corpus
 describit lineolam Tt , est ut lineo-
 læ hujus longitudo (id est ut secans
 anguli tTC) directe, & velocitas
 inverse. Tempori huic proportio-
 nalis sit ordinatim applicata DN ad rec-
 tam CS per punctum D perpendicu-
 laris, & ob datam Dd erit rectan-
 gulum $Dd \times DN$, hoc est area
 $DNnd$, eidem tempori proportio-
 nale. Ergo si SNn sit curva illa li-
 nea quam punctum N perpetuo tan-
 git, erit area $SNDS$ proportio-
 nalis tempori quo corpus descendendo
 descripsit lineam ST ; proindeque ex inventa illa area dabitur
 Tempus. Q. E. I.




PROPOSITIO LV. THEOREMA XIX.

*Si corpus movetur in superficie quacunque curva, cujus axis
 per centrum Virium transit, & a corpore in axem demit-
 tatur perpendicularis, eique parallela & æqualis ab axis
 puncto quovis dato ducatur: dico quod parallela illa are-
 am tempori proportionalem describet.*

Sit $BSKL$ superficies curva, T corpus in ea revolvens, $STtR$
 Trajectoria quam corpus in eadem describit, S initium Trajecto-
 riæ, OMN axis superficiei curvæ, TN recta a corpore in axem demit-
 tatur perpendicularis, OP huic parallela & æqualis a puncto O quod in
 axe datur educta, AP vestigium Trajectoriæ a puncto P in lineæ
 volubilis OP plano AOP descriptum, A vestigii initium puncto S
 respondens, TC recta a corpore ad centrum ducta; TG pars ejus
 vi centripetæ qua corpus urgetur in centrum C proportionalis;
 TM recta ad superficiem curvam perpendicularis, TI pars ejus vi
 pressiois, qua corpus urget superficiem vicissimque urgetur versus M

DE MOTU
CORPORUM

a superficie, proportionalis; $PHTF$ recta axi parallela per corpus transiens, & GF , IH rectæ a punctis G & I in parallelam illam $PHTF$ perpendiculariter demissæ. Dico jam quod area AOP , radio OP ab initio motus descripta, sit tempori proportionalis. Nam vis TG (per Legum Corol. 2.) resolvitur in vires TF , FG ; & vis TI in vires TH , HI : Vires autem TF , TH agendo secundum lineam PF plano AOP perpendicularem mutant solummodo motum cor-



poris quatenus huic plano perpendicularem. Ideoque motus ejus quatenus secundum positionem plani factus, hoc est, motus puncti P quo Trajectoriæ vestigium AP in hoc plano describitur, idem est ac si vires TF , TH tollerentur, & corpus solis viribus FG , HI ageretur; hoc est, idem ac si corpus in plano AOP , vi centripeta ad centrum O tendente & summam virium FG & HI æquante, describeret curvam AP . Sed vi tali describitur area AOP (per Prop. 1.) tempori proportionalis. *Q. E. D.*

Corol. Eodem argumento si corpus a viribus agitatum ad centra duo vel plura in eadem quavis recta CO data tendentibus, describeret in spatio libero lineam quamcunque curvam ST ; foret area AOP tempori semper proportionalis.

PROPOSITIO LVI. PROBLEMA XXXVII.

Concessis Figurarum curvilinearum quadraturis, datisque tum lege Vis centripetæ ad centrum datum tendentis, tum superficie curva cujus axis per centrum illud transit; invenienda est Trajectoria quam corpus in eadem superficie describet, de loco dato, data cum Velocitate, versus plagam in superficie illa datam egressum.

Stan-

Stantibus quæ in superiore Propositione constructa sunt, exeat LIBER PRIMUS
 corpus de loco S in Trajectoriam inveniendam $STtR$; &, ex da-
 ta ejus velocitate in altitudine SC , dabitur ejus velocitas in alia
 quavis altitudine TC . Ea cum velocitate, dato tempore quam mi-
 nimo, describat corpus Trajectoriæ suæ particulam Tt , sitque Pp
 vestigium ejus in plano AOP descriptum. Jungatur Op , & Cir-
 celli centro T intervallo Tt in superficie curva descripti sit PpQ
 vestigium Ellipticum in eodem plano $OAPp$ descriptum. Et ob
 datum magnitudine & positione Circellum, dabitur Ellipsis illa
 PpQ . Cumque area POp sit tempori proportionalis, atque adeo
 ex dato tempore detur, dabitur Op positione, & inde dabitur
 communis ejus & Ellipseos intersectio p , una cum angulo OPp ,
 in quo Trajectoriæ vestigium APp secat lineam OP . Inde au-
 tem invenietur Trajectoriæ vestigium illud APp , eadem methodo
 qua curva linea $VIKk$ in Propositione XLI , ex similibus datis
 inventa fuit. Tum ex singulis vestigii punctis P erigendo ad pla-
 num AOP perpendiculara PT superficie curvæ occurrentia in T ,
 dabuntur singula Trajectoriæ puncta T . $Q. E. I.$

S E C T I O XI.

De Motu Corporum Viribus centripetis se mutuo petentium.

Hactenus exposui Motus corporum attractorum ad centrum im-
 mobile, quale tamen vix extat in rerum natura. Attractiones enim
 fieri solent ad corpora; & corporum trahentium & attractorum ac-
 tiones semper mutuæ sunt æquales, per Legem tertiam: adeo
 ut neque attrahens possit quiescere neque attractum, si duo sint
 corpora, sed ambo (per Legum Corollarium quartum) quasi at-
 tractione mutua, circum gravitatis centrum commune revolvantur;
 & si plura sint corpora (quæ vel ab unico attrahantur vel omnia
 se mutuo attrahant) hæc ita inter se moveri debeant, ut gravitatis
 centrum commune vel quiescat vel uniformiter moveatur in direc-
 tum. Qua de causa jam pergo Motum exponere corporum se mu-
 tuo trahentium, considerando Vires centripetas tanquam Attractio-
 nes, quamvis fortasse, si physice loquamur, verius dicantur Im-
 pulsus. In Mathematicis enim jam versamur, & propterea missis
 disputationibus Physicis, familiari utimur sermone, quo possimus
 a Lectoribus Mathematicis facilius intelligi.

PROPOSITIO LVII. THEOREMA XX.


Corpora duo se invicem trahentia describunt, & circum commune centrum gravitatis, & circum se mutuo, Figuras similes.

Sunt enim distantiae a communi gravitatis centro reciproce proportionales corporibus, atque adeo in data ratione ad invicem, & componendo in data ratione ad distantiam totam inter corpora. Feruntur autem hae distantiae circum terminos suos communi motu angulari, propterea quod in directum semper jacentes non mutant inclinationem ad se mutuo. Lineae autem rectae, quae sunt in data ratione ad invicem, & aequali motu angulari circum terminos suos feruntur, Figuras circum eisdem terminos (in planis quae una cum his terminis vel quiescunt vel motu quovis non angulari moventur) describunt omnino similes. Proinde similes sunt Figurae quae his distantis circumactis describuntur. Q. E. D.

PROPOSITIO LVIII. THEOREMA XXI.

Si corpora duo Viribus quibuscumque se mutuo trahunt, & inter ea volvantur circa gravitatis centrum commune: dico quod Figuris, quas corpora sic mota describunt circum se mutuo, potest Figura similis & aequalis, circum corpus alterutrum immotum, Viribus iisdem describi.

Revolvantur corpora S , P circa commune gravitatis centrum C , pergendo de S ad T deque P ad Q . A dato puncto s ipsis



SP , TQ aequales & parallelae ducantur semper sp , sq ; & Curva pqv quam punctum p , revolvendo circum punctum immotum s , describit,

describit, erit similis & æqualis Curvis quas corpora S , P describunt circum se mutuo : proindeque (per Theor. xx.) similis Curvis ST & PQV , quas eadem corpora describunt circum commune gravitatis centrum C : id adeo quia proportionales linearum SC , CP & SP vel sp ad invicem dantur.

Caf. 1. Commune illud Gravitatis centrum C , per Legum Corollarium quartum, vel quiescit vel movetur uniformiter in directum. Ponamus primo quod id quiescit, inque s & p locentur corpora duo, immobile in s , mobile in p , corporibus S & P similia & æqualia. Dein tangant rectæ PR & pr Curvas PQ & pq in P & p , & producantur CQ & sq ad R & r . Et, ob similitudinem Figurarum $CPRQ$, $sprq$, erit RQ ad rq ut CP ad sp , adeoque in data ratione. Proinde si vis qua corpus P versus corpus S , atque adeo versus centrum intermedium C attrahitur, esset ad vim qua corpus p versus centrum s attrahitur in eadem illa ratione data; hæ vires æqualibus temporibus attraherent semper corpora de tangentibus PR , pr ad arcus PQ , pq , per intervalla ipsius proportionalia RQ , rq ; adeoque vis posterior efficere ut corpus p gyraretur in Curva pqv , quæ similis esset Curvæ PQV , in qua vis prior efficit ut corpus P gyretur, & revolutiones iidem temporibus completerentur. At quoniam vires illæ non sunt ad invicem in ratione CP ad sp , sed (ob similitudinem & æqualitatem corporum S & s , P & p , & æqualitatem distantiarum SP , sp) sibi mutuo æquales; corpora æqualibus temporibus æqualiter trahentur de tangentibus: & propterea, ut corpus posterius p trahatur per intervallum majus rq , requiritur tempus majus, idque in subduplicata ratione intervallorum; propterea quod (per Lemma decimum) spatia, ipso motus initio descripta, sunt in duplicata ratione temporum. Ponatur igitur velocitas corporis p esse ad velocitatem corporis P in subduplicata ratione distantiarum sp ad distantiam CP , eo ut temporibus, quæ sint in eadem subduplicata ratione, describantur arcus pq , PQ , qui sunt in ratione integra: Et corpora P , p viribus æqualibus semper attracta describent circum centra quiescentia C & s Figuras similes PQV , pqv , quarum posterior pqv similis est & æqualis Figuræ quam corpus P circum corpus mobile S describit. *Q. E. D.*

Caf. 2. Ponamus jam quod commune gravitatis centrum, una cum spatio in quo corpora moventur inter se, progreditur uniformiter in directum; &, per Legum Corollarium sextum, motus omnes in hoc spatio peragentur ut prius, adeoque corpora descri-

LIBER
PRIMUS.

DE MOTU
CORPORUM

bent circum se mutuo Figuras easdem ac prius, & propterea Figuræ pqv similes & æquales. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc corpora duo Viribus distantiae suæ proportionalibus se mutuo trahentia, describunt (per Prop. x,) & circum commune gravitatis centrum, & circum se mutuo, Ellipses concentricas: & vice versa, si tales Figuræ describuntur, sunt Vires distantiae proportionales.

Corol. 2. Et corpora duo Viribus quadrato distantiae suæ reciproce proportionalibus describunt (per Prop. xi, xii, xiii.) & circum commune gravitatis centrum, & circum se mutuo, Sectiones conicas umbilicum habentes in centro circum quod Figuræ describuntur. Et vice versa, si tales Figuræ describuntur, Vires centripetæ sunt quadrato distantiae reciproce proportionales.

Corol. 3. Corpora duo quævis circum gravitatis centrum commune gyrantia, radiis & ad centrum illud & ad se mutuo ductis, describunt areas temporibus proportionales.

PROPOSITIO LIX. THEOREMA XXII.

Corporum duorum S & P circa commune gravitatis centrum C revolvantium Tempus periodicum esse ad Tempus periodicum corporis alterutrius P, circa alterum immotum S gyrantis & Figuris quæ corpora circum se mutuo describunt Figuram similem & æqualem describentis, in subduplicata ratione corporis alterius S, ad summam corporum S + P.

Namque, ex demonstratione superioris Propositionis, tempora quibus arcus quivis similes PQ & pq describuntur, sunt in subduplicata ratione distantiarum CP & SP vel sp , hoc est, in subduplicata ratione corporis S ad summam corporum $S + P$. Et componendo, summæ temporum quibus arcus omnes similes PQ & pq describuntur, hoc est, tempora tota quibus Figuræ totæ similes describuntur, sunt in eadem subduplicata ratione. *Q. E. D.*

PRO-

PROPOSITIO LX. THEOREMA XXIII.

LIBER
PRIMUS

Si corpora duo S & P, Viribus quadrato distantiae suae reciproce proportionalibus se mutuo trahentia, revolvuntur circa gravitatis centrum commune: dico quod Ellipseos, quam corpus alterutrum P hoc motu circa alterum S describit, Axis principalis erit ad Axem principalem Ellipseos, quam corpus idem P circa alterum quiescens S eodem tempore periodico describere posset, ut summa corporum duorum S + P ad primam duarum medie proportionalium inter hanc summam & corpus illud alterum S.

Nam si descriptæ Ellipses essent sibi invicem æquales, tempora periodica (per Theorema superius) forent in subduplicata ratione corporis S ad summam corporum S + P. Minuatur in hac ratione tempus periodicum in Ellipti posteriore, & tempora periodica evadent æqualia; Ellipseos autem axis principalis (per Prop. xv.) minuetur in ratione cuius hæc est sesquuplicata, id est in ratione, cuius ratio S ad S + P est triplicata; adeoque erit ad axem principalem Ellipseos alterius, ut prima duarum medie proportionalium inter S + P & S ad S + P. Et inverse, axis principalis Ellipseos circa corpus mobile descriptæ erit ad axem principalem descriptæ circa immobile, ut S + P ad primam duarum medie proportionalium inter S + P & S. Q. E. D.

PROPOSITIO LXI. THEOREMA XXIV.

Si corpora duo Viribus quibuscvis se mutuo trahentia, neque alias agitata vel impedita, quomodocunque moveantur; motus eorum perinde se habebunt ac si non traherent se mutuo, sed utrumque a corpore tertio in communi gravitatis centro constituto Viribus iisdem traheretur: Et Virium trahentium eadem erit Lex respectu distantiarum corporum a centro illo communi atque respectu distantiarum totius inter corpora.

Nam vires illæ, quibus corpora se mutuo trahunt, tendendo ad corpora, tendunt ad commune gravitatis centrum intermedium,

DE MOTU
CORPORUM

dium, adeoque eadem sunt ac si a corpore intermedio manarent.
Q. E. D.

Et quoniam data est ratio distantiae corporis utriusvis a centro illo communi ad distantiam corporis ejusdem a corpore altero, dabitur ratio cujusvis potestatis distantiae unius ad eandem potestatem distantiae alterius; ut & ratio quantitatis cujusvis, quæ ex una distantia & quantitatis datis utcumque derivatur, ad quantitatem aliam, quæ ex altera distantia & quantitatis totidem datis datamque illam distantiarum rationem ad priores habentibus similiter derivatur. Proinde si vis, qua corpus unum ab altero trahitur, sit directe vel inverse ut distantia corporum ad invicem; vel ut quælibet hujus distantiae potestas; vel denique ut quantitas quævis ex hac distantia & quantitatis datis quomodocumque derivata: erit eadem vis, qua corpus idem ad commune gravitatis centrum trahitur, directe itidem vel inverse ut corporis attracti distantia a centro illo communi, vel ut eadem distantiae hujus potestas, vel denique ut quantitas ex hac distantia & analogis quantitatis datis similiter derivata. Hoc est, Vis trahentis eadem erit Lex respectu distantiae utriusque. Q. E. D.

PROPOSITIO LXII. PROBLEMA XXXVIII.

Corporum duorum quæ Viribus quadrato distantiae suæ reciproce proportionalibus se mutuo trahunt, ac de locis datis demittuntur, determinare Motus.

Corpora (per Theorema novissimum) perinde movebuntur ac si a corpore tertio, in communi gravitatis centro constituto, traherentur; & centrum illud ipso motus initio quiescet per Hypothesin; & propterea (per Legum Corol. 4.) semper quiescet. Determinandi sunt igitur motus corporum (per Prob. xxv.) perinde ac si a viribus ad centrum illud tendentibus urgerentur, & habebuntur motus corporum se mutuo trahentium. Q. E. I.

PROPOSITIO LXIII. PROBLEMA XXXIX.

Corporum duorum quæ Viribus quadrato distantiae suæ reciproce proportionalibus se mutuo trahunt, deque locis datis, secundum datas rectas, datis cum Velocitatibus exeunt, determinare Motus.

Ex


Ex datis corporum motibus sub initio, datur uniformis motus
centri communis gravitatis, ut & motus spatii quod una cum
hoc centro movetur uniformiter in directum, nec non corporum
motus initiales respectu hujus spatii. Motus autem subsequentes
(per Legum Corollarium quintum, & Theorema novissimum)
perinde sunt in hoc spatio, ac si spatium ipsum una cum com-
muni illo gravitatis centro quiesceret, & corpora non traherent
se mutuo, sed a corpore tertio sito in centro illo traherentur.
Corporis igitur alterutrius in hoc spatio mobili, de loco dato se-
cundum datam rectam, data cum velocitate exeuntis, & vi cen-
tripeta ad centrum illud tendente correpti, determinandus est
motus per Problema nonum & vicesimum sextum: & habebitur
simul motus corporis alterius e regione. Cum hoc motu com-
ponendus est uniformis ille Systematis spatii & corporum in eo gy-
rantium motus progressivus supra inventus, & habebitur motus
absolutus corporum in spatio immobili. *Q. E. I.*

PROPOSITIO LXIV. PROBLEMA XL.

Viribus quibus Corpora se mutuo trahunt crescentibus in simplici ratione distantiarum a centris: requiruntur Motus plurium Corporum inter se.


Ponantur primo corpora duo T & L commune habentia gravitatis centrum \mathcal{D} . Describent hæc (per Corollarium primum Theorematis xxi) Ellipfes centra habentes in \mathcal{D} , quarum magnitudo, ex Problemate v , innotescit.

Trahat jam corpus tertium S priora duo T & L viribus acceleratricibus ST , SL , & ab ipsis vicissim trahatur. Vis ST (per Legum Cor. 2.) resolvitur in vires SD , DT ; & vis SL in vires SD , DL . Vires autem DT , DL , quæ sunt ut ipsarum summa TL , atque adeo ut vires acceleratrices quibus corpora T & L se mutuo trahunt, additæ his viribus corporum T & L , prior priori & posterior posteriori, componunt vires distantis DT ac DL proportionales, ut prius, sed



DE MOTU
CORPORUM.

viribus prioribus majores; adeoque (per Corol. 1. Prop. x. & Corol. 1 & 8. Prop. 1v) efficiunt ut corpora illa describant Ellipses ut prius, sed motu celeriore. Vires reliquæ acceleratrices SD & SD , actionibus motricibus $SD \times T$ & $SD \times L$, quæ sunt ut corpora, trahendo corpora illa æqualiter & secundum lineas TI , LK , ipsi DS parallelas, nil mutant situs eorum ad invicem, sed faciunt ut ipsa æqualiter accedant ad lineam IK ; quam ductam concipe per medium corporis S , & lineam DS perpendiculararem. Impedietur autem iste ad lineam IK accessus faciendo ut Systema corporum T & L ex una parte, & corpus S ex altera, iustis cum velocitatibus, gyrentur circa commune gravitatis centrum C . Tali motu corpus S (eo quod summa virium motricium $SD \times T$ & $SD \times L$, distantia CS proportionalium, tendit versus centrum C) describit Ellipsin circa idem C ; & punctum D , ob proportionales CS , CD , describet Ellipsin consimilem e regione. Corpora autem T & L viribus motricibus $SD \times T$ & $SD \times L$, (prius priore, posterius posteriore) æqualiter & secundum lineas parallelas TI & LK (ut dictum est) attracta, pergent (per Legum Corollarium quintum & sextum) circa centrum mobile D Ellipses suas describere, ut prius.



Q. E. I.

Addatur jam corpus quantum V , & simili argumento concludetur hoc & punctum C Ellipses circa omnium commune centrum gravitatis B describere; manentibus motibus priorum corporum T , L & S circa centra D & C , sed paulo acceleratis. Et eadem methodo corpora plura adjungere licebit. Q. E. I.

Hæc ita se habent ubi corpora T & L trahunt se mutuo viribus acceleratricibus majoribus vel minoribus quam quibus trahunt corpora reliqua pro ratione distantiarum. Sunt mutua omnia attractiones acceleratrices ad invicem ut distantia ducta in corpora trahentia, & ex præcedentibus facile deducetur quod corpora omnia æqualibus temporibus periodicis Ellipses varias, circa omnium commune gravitatis centrum B , in plano immobili describunt. Q. E. I.

PROPO-

PROPOSITIO LXV. THEOREMA XXV.

*Corpora plura, quorum Vires decreſcunt in duplicata ratione
distantiarum ab eorundem centrīs, moveri poſſe inter ſe in
Ellipſibus; & radiis ad umbilicos ductis areas deſcribere
temporibus proportionales quam proxime.*

In Propositione ſuperiore demonſtratus eſt caſus ubi motus plures peraguntur in Ellipſibus accurate. Quo magis recedit Lex virium a Lege ibi poſita, eo magis corpora perturbabunt mutuos motus; neque fieri poteſt ut corpora, ſecundum Legem hic poſitam ſe mutuo trahentia, moveantur in Ellipſibus accurate, niſi ſervando certam proportionem distantiarum ab invicem. In ſequentibus autem caſibus non multum ab Ellipſibus errabitur.

Caf. 1. Pone corpora plura minora circa maximum aliquod ad varias ab eo diſtantias revolvi, tendantque ad ſingula vires abſolutæ proportionales iſdem corporibus. Et quoniam omnium commune gravitatis centrum (per Legum Corol. quartum) vel quieſcit vel movetur uniformiter in directum, ſingamus corpora minora tam parva eſſe, ut corpus maximum nunquam diſtet ſenſibiliter ab hoc centro: & maximum illud vel quieſcet vel movebitur uniformiter in directum, abſque errore ſenſibili; minora autem revolvuntur circa hoc maximum in Ellipſibus, atque radiis ad idem ductis deſcribent areas temporibus proportionales; niſi quatenus errores inducuntur, vel per errorem maximi a communi illo gravitatis centro; vel per actiones minorum corporum in ſe mutuo. Diminui autem poſſunt corpora minora uſque donec error iſte & actiones mutuae ſint datis quibuſvis minores, atque adeo donec Orbes cum Ellipſibus quadrent, & areae reſpondeant temporibus abſque errore qui non ſit minor quovis dato. *Q. E. O.*

Caf. 2. ſingamus jam Syſtema corporum minorum modo jam deſcripto circa maximum revolvendum, aliudve quodvis duorum circum ſe mutuo revolvendum corporum Syſtema progredi uniformiter in directum, & interea vi corporis alterius longe maximi & ad magnam diſtantiā ſiti urgeri ad latus. Et quoniam æquales vires acceleratrices, quibus corpora ſecundum lineas parallelas urgentur, non mutant ſitus corporum ad invicem, ſed ut Syſtema totum, ſervatis partium motibus inter ſe; ſimul transferatur efficiunt: maniſeſtum eſt quod, ex attractionibus in corpus maximum,

DE MOTU
CORPORUM

nulla prorsus oriatur mutatio motus attractorum inter se, nisi vel ex attractionum acceleratricum inæqualitate, vel ex inclinatione linearum ad invicem, secundum quas attractiones fiunt. Pone ergo attractiones omnes acceleratrices in corpus maximum esse inter se reciproce ut quadrata distantiarum; &, augendo corporis maximi distantiam, donec rectarum ab hoc ad reliqua ductarum differentiæ, respectu earum longitudinis, & inclinationes ad invicem minores sint quam datæ quævis, perseverabunt motus partium Systematis inter se absque erroribus qui non sint quibuscvis datis minores. Et quoniam, ob exiguum partium illarum ab invicem distantiam, Systema totum ad modum corporis unius attrahitur; movebitur idem hac attractione ad modum corporis unius; hoc est, centro suo gravitatis describet circa corpus maximum Sectionem aliquam Conicam (*viz.* Hyperbolam vel Parabolam attractione languida, Ellipsin fortiore,) & Radio ad maximum ducto describet areas temporibus proportionales, absque aliis erroribus, nisi quas partium distantia (perexiguæ sane & pro lubitu minuendæ) valeant efficere. *Q. E. O.*

Simili argumento pergere licet ad casus magis compositos in infinitum.

Corol. 1. In casu secundo; quo propius accedit corpus omnium maximum ad Systema duorum vel plurium, eo magis turbabuntur motus partium Systematis inter se; propterea quod linearum a corpore maximo ad has ductarum jam major est inclinatio ad invicem, majorque proportionis inæqualitas.

Corol. 2. Maxime autem turbabuntur, ponendo quod attractiones acceleratrices partium Systematis versus corpus omnium maximum, non sint ad invicem reciproce ut quadrata distantiarum a corpore illo maximo; præsertim si proportionis hujus inæqualitas major sit quam inæqualitas proportionis distantiarum a corpore maximo: Nam si vis acceleratrix, æqualiter & secundum lineas parallelas agendo, nil perturbat motus inter se, necesse est ut ex actionis inæqualitate perturbatio oriatur, majorque sit vel minor pro majore vel minore inæqualitate. Excessus impulsuum majorum, agendo in aliqua corpora & non agendo in alia, necessario mutant situm eorum inter se. Et hæc perturbatio, addita perturbationi quæ ex linearum inclinatione & inæqualitate oritur, majorem reddet perturbationem totam.

Corol. 3. Unde si Systematis hujus partes in Ellipsis vel Circulis sine perturbatione insigni moveantur; manifestum est, quod eadem


eadem a viribus acceleratricibus ad alia corpora tendentibus, aut non urgentur nisi levissime, aut urgentur æqualiter secundum lineas parallelas quamproxime. LIBER PRIMUS.

PROPOSITIO LXVI. THEOREMA XXVI.

Si corpora tria, quorum Vires decrescunt in duplicata ratione distantiarum, se mutuo trahant, & attractiones acceleratrices binorum quorumcunque in tertium sint inter se reciproce ut quadrata distantiarum; minora autem circa maximum revolvantur: Dico quod interius circa intimum & maximum, radiis ad ipsum ductis, describet areas temporibus magis proportionales, & Figuram ad formam Ellipseos umbilicum in concursu radiorum habentis magis accedentem, si corpus maximum his attractionibus agitur, quam si maximum illud vel a minoribus non attractum quiescat, vel multo minus vel multo magis attractum aut multo minus aut multo magis agitetur.

Liquet fere ex demonstratione Corollarii secundi Propositionis præcedentis; sed argumento magis distincto & latius cogente sic evincitur.

Cas. 1. Revolvantur corpora minora P & S in eodem plano circa maximum T , quorum P describat Orbem interiore PAB , & S exteriorem SE . Sit SK mediocris distantia corporum P & S ; & corporis P versus S attractio acceleratrix in mediocri illa distantia exponatur per eandem.



In duplicata ratione SK ad SP capiatur SL ad SK , & erit SL attractio acceleratrix corporis P versus S in distantia quavis SP . Junge PT , eique parallelam age LM occurrentem ST in M ; & attractio SL resolvetur (per Legum Corol. 2.) in attractiones SM , LM . Et sic urgebitur corpus P vi acceleratrice triplici:

Exponatur corporis T attractio acceleratrix versus S per lineam SN ; & si attractiones acceleratrices SM , SN æquales essent; hæ, trahendo corpora T & P æqualiter & secundum lineas parallelas, nil mutarent situm eorum ad invicem. Iidem jam forent corporum illorum motus inter se (per Legum Corol. 6.) ac si hæ attractiones tollerentur. Et pari ratione si attractio SN minor esset attractione SM , tolleretur ipsa attractionis SM pars SN , & maneret pars sola MN , qua temporum & arearum proportionalitas & Orbitæ forma illa Elliptica perturbaretur. Et similiter si attractio SN major esset attractione SM , oriretur ex differentia sola MN perturbatio proportionalitatis & Orbitæ. Sic per attractionem SN reducitur semper attractio tertia superior SM ad attractionem MN , attractione prima & secunda manentibus prorsus immutatis: & propterea areæ ac tempora ad proportionalitatem, & Orbita PAB ad formam præfatam Ellipticam tum maxime accedunt, ubi attractio MN vel nulla est, vel quam fieri possit minima; hoc est, ubi corporum P & T attractiones acceleratrices, factæ versus corpus S , accedunt quantum fieri potest ad æqualitatem; id est, ubi attractio SN non est nulla, neque minor minima attractionum omnium SM , sed inter attractionum omnium SM maximam & minimam quasi mediocris, hoc est, non multo major neque multo minor attractione SK . *Q. E. D.*

Cas 2. Revolvantur jam corpora minora P , S circa maximum T in planis diversis; & vis LM , agendo secundum lineam PT in plano Orbitæ PAB sitam, eundem habebit effectum ac prius, neque corpus P de plano Orbitæ suæ deturbabit. At vis altera NM , agendo secundum lineam quæ ipsi ST parallela est, (atque adeo, quando corpus S versatur extra lineam Nodorum, inclinatur ad planum Orbitæ PAB ;) præter perturbationem motus in Longitudinem jam ante expositam, inducet perturbationem motus in Latitudinem, trahendo corpus P de plano suæ Orbitæ. Et hæc perturbatio, in dato quovis corporum P & T ad invicem situ, erit ut vis illa generans MN , adeoque minima evadet ubi MN est minima, hoc est (uti jam exposui) ubi attractio SN non est multo major, neque multo minor attractione SK . *Q. E. D.*

Corol. 1. Ex his facile colligitur quod, si corpora plura minora P , S , R , &c. revolvantur circa maximum T , motus corporis interni P minime perturbabitur attractionibus exteriorum, ubi corpus maximum T pariter a cæteris, pro ratione virium acceleratricum, attrahitur & agitur atque cætera a se mutuo.


Corol.

DE MOTU
CORPORUM

Corol. 2. In Systemate vero trium corporum T, P, S , si attractiones acceleratrices binorum quorumcunque in tertium sint ad invicem reciproce ut quadrata distantiarum; corpus P , radio PT , aream circa corpus T velocius describet prope conjunctionem A & Oppositionem B , quam prope Quadraturas C, D . Namque vis omnis qua corpus P urgetur & corpus T non urgetur, quæque non agit secundum lineam PT accelerat vel retardat descriptionem areæ, perinde ut ipsa in consequentia vel in antecedentia dirigitur. Talis est vis NM . Hæc in transitu corporis P a C ad A tendit in consequentia, motumque accelerat; dein usque ad D in antecedentia, & motum retardat; tum in consequentia usque ad B , & ultimo in antecedentia transeundo a B ad C .

Corol. 3. Et eodem argumento patet quod corpus P , cæteris paribus, velocius movetur in Conjunctione & Oppositione quam in Quadraturis.

Corol. 4. Orbita corporis P , cæteris paribus, curvior est in Quadraturis quam in Conjunctione & Oppositione. Nam corpora velociora minus defleunt a recto tramite. Et præterea vis KL vel NM , in Conjunctione & Oppositione, contraria est vi qua corpus T trahit corpus P , adeoque vim illam minuit; corpus autem P minus defleat a recto tramite, ubi minus urgetur in corpus T .



Corol. 5. Unde corpus P , cæteris paribus, longius recedet a corpore T in Quadraturis, quam in Conjunctione & Oppositione. Hæc ita se habent excluso motu Excentricitatis. Nam si Orbita corporis P excentrica sit: Excentricitas ejus (ut mox in hujus Corol. 9. ostendetur) evadet maxima ubi Apfides sunt in Syzygiis; indeque fieri potest ut corpus P , ad Apfidem summam appellens, absit longius a corpore T in Syzygiis quam in Quadraturis.

Corol. 6. Quoniam vis centripeta corporis centralis T , qua corpus P retinetur in Orbe suo, augetur in Quadraturis per additionem vis LM , ac diminuitur in Syzygiis per ablationem vis KL , & ob magnitudinem vis KL , magis diminuitur quam augetur; est autem vis illa centripeta (per Corol. 2. Prop. 1v.) in ratione composita ex ratione simplici radii TP directe & ratione duplicata temporis

ris periodici inverſe: patet hanc rationem compoſitam diminui per actionem viſ KL , adeoque tempus periodicum, ſi maneat Orbis radius TP , augeri, idque in ſubduplicata ratione qua viſ illa centripeta diminuitur: auſtoque adeo vel diminuto hoc Radio, tempus periodicum augeri magis, vel diminui minus quam in Radii huius ratione ſequiplicata, per Corol. 6. Prop. iv. Si viſ illa corporis centralis paulatim langueret, corpus P minus ſemper & minus attractum perpetuo recederet longius a centro T ; & contra, ſi viſ illa augetur, accederet propius. Ergo ſi actio corporis longinqui S , qua viſ illa diminuitur, augeatur ac diminuatur per vices; augebitur ſimul ac diminuetur Radius TP per vices, & tempus periodicum augebitur ac diminuetur in ratione compoſita ex ratione ſequiplicata Radii & ratione ſubduplicata qua viſ illa centripeta corporis centralis T , per incrementum vel decrementum actionis corporis longinqui S , diminuitur vel augetur.


Corol. 7. Ex præmiſſis conſequitur etiam quod Ellipſeos a corpore P deſcriptæ Axis, ſeu Apſidum linea, quoad motum angularem progreditur & regreditur per vices, ſed magis tamen progreditur, & in ſingulis corporis revolutionibus per exceſſum progreſſionis fertur in conſequentia. Nam viſ qua corpus P urgetur in corpus T in Quadraturis, ubi viſ MN evanuit, componitur ex vi LM & vi centripeta qua corpus T trahit corpus P . Viſ prior LM , ſi augeatur diſtantiæ PT , augetur in eadem fere ratione cum hac diſtantiæ, & viſ poſterior decreſcit in duplicata illa ratione, adeoque ſumma harum virium decreſcit in minore quam duplicata ratione diſtantiæ PT , & propterea (per Corol. 1. Prop. xlv.) efficit ut Aux, ſeu Apſis ſumma, regrediatur. In Conjunçãoe vero & Oppoſitione, viſ qua corpus P urgetur in corpus T differentia eſt inter vim qua corpus T trahit corpus P & vim KL ; & differentia illa, propterea quod viſ KL augetur quamproxime in ratione diſtantiæ PT , decreſcit in majore quam duplicata ratione diſtantiæ PT , adeoque (per Corol. 1. Prop. xlv.) efficit ut Aux progrediatur. In locis inter Syzygias & Quadraturas pendet motus Augis ex cauſa utraque conjunctim, adeo ut pro huius vel alterius exceſſu progrediatur ipſa vel regrediatur. Unde cum viſ KL in Syzygiis ſit quaſi duplo major quam viſ LM in Quadraturis, exceſſus in tota revolutione erit penes vim KL , transferetque Augem ſingulis revolutionibus in conſequentia. Veritas autem huius & præcedentis Corollarii facilius intelligetur concipiendo Systema corporum duorum T , P corporibus pluribus S , S , S , &c. in Orbe ESE conſiſtentibus, undique cingi. Namque horum actioni-

DE MOTU
CORPORUM

bus actio ipsius T minuetur undique, decrescetque in ratione plusquam duplicata distantiae.

Corol. 8. Cum autem pendeat Apfidum progressus vel regressus a decremento vis centripetæ facto in majori vel minori quam duplicata ratione distantiae TP , in transitu corporis ab Apfide ima ad Apfidem summam; ut & a simili incremento in reditu ad Apfidem imam; atque adeo maximus fit ubi proportio vis in Apfide summa ad vim in Apfide ima maxime recedit a duplicata ratione distantiarum inversa: manifestum est quod Apfides in Syzygiis suis, per vim ablatitiam KL seu $NM - LM$, progredientur velocius, inque Quadraturis suis tardius recedent per vim addititiam LM . Ob diuturnitatem vero temporis quo velocitas progressus vel tarditas regressus continuatur, fit hæc inæqualitas longe maxima.

Corol. 9. Si corpus aliquod vi reciproce proportionali quadrato distantiae suæ a centro, revolveretur circa hoc centrum in Ellipsi, & mox, in descensu ab Apfide summa seu Auge ad Apfidem imam, vis illa per accessum perpetuum vis novæ augetur in ratione plusquam duplicata distantiae diminutæ: manifestum est quod corpus, perpetuo accessu vis illius novæ impulsu semper in centrum, magis vergeret in hoc centrum, quam si urgeretur vi sola crescente in duplicata ratione distantiae diminutæ, adeoque Orbem describeret Orbe Elliptico



interiorem, & in Apfide ima propius accederet ad centrum quam prius. Orbis igitur, accessu hujus vis novæ, fiet magis excentricus. Si jam vis, in recessu corporis ab Apfide ima ad Apfidem summam, decresceret iisdem gradibus quibus ante creverat, rediret corpus ad distantiam priorem, adeoque si vis decrescat in majori ratione, corpus jam minus attractum ascenderet ad distantiam majorem & sic Orbis Excentricitas adhuc magis augebitur. Igitur si ratio incrementi & decrementi vis centripetæ singulis revolutionibus augeatur, augebitur semper Excentricitas; & e contra, diminuetur eadem si ratio illa decrescat. Jam vero in Systemate corporum T, P, S , ubi Apfides Orbis PAB sunt in Quadraturis, ratio illa incrementi ac decrementi minima est,

&

& maxima fit ubi Apfides funt in Syzygiis. Si Apfides conftituantur in Quadraturis, ratio prope Apfides minor eft & prope Syzy-
 gias major quam duplicata diftantiarum, & ex ratione illa majori
 oritur Augis motus velociffimus, uti jam dictum eft. At fi confi-
 deretur ratio incrementi vel decrementi totius in progrefſu inter
 Apfides, hæc minor eft quam duplicata diftantiarum. Vis in Ap-
 fide ima eft ad vim in Apfide fumma in minore quam duplicata ra-
 tione diftantiæ Apfidis fummæ ab umbilico Ellipſeos ad diftantiam
 Apfidis imæ ab eodem umbilico: & e contra, ubi Apfides confti-
 tuuntur in Syzygiis, vis in Apfide ima eft ad vim in Apfide fumma
 in majore quam duplicata ratione diftantiarum. Nam vires LM in
 Quadraturis additæ viribus corporis T componunt vires in ratione
 minore, & vires KL in Syzygiis ſubductæ viribus corporis T re-
 linquunt vires in ratione majore. Eft igitur ratio decrementi &
 incrementi totius, in tranſitu inter Apfides, minima in Quadratu-
 ris, maxima in Syzygiis: & propterea in tranſitu Apfidum a Qua-
 draturis ad Syzygias perpetuo augetur, augetque Excentricitatem
 Ellipſeos; inque tranſitu a Syzygiis ad Quadraturas perpetuo dimi-
 nuitur, & Excentricitatem diminuit.

Corol. 10. Ut rationem ineamus errorum in Latitudinem, ſinga-
 mus planum Orbis EST immobile manere; & ex errorum expo-
 ſita cauſa manifeſtum eſt, quod, ex viribus NM , ML , quæ funt
 cauſa illa tota, vis ML agendo ſemper ſecundum planum Orbis
 PAB , nunquam perturbat motus in Latitudinem; quodque vis
 NM , ubi Nodi funt in Syzygiis, agendo etiam ſecundum idem Or-
 bis planum, non perturbat hos motus; ubi vero funt in Quadratu-
 ris eos maxime perturbat, corpusque P de plano Orbis ſui perpetuo
 trahendo, minuit inclinationem plani in tranſitu corporis a Quadra-
 turis ad Syzygias, augetque viciffim eandem in tranſitu a Syzygiis
 ad Quadraturas. Unde fit ut corpore in Syzygiis exiſtente incli-
 natio evadat omnium minima, redeatque ad priorem magnitudi-
 nem circiter, ubi corpus ad Nodum proximum accedit. At ſi Nodi
 conſtituantur in Octantibus poſt Quadraturas, id eſt, inter C & A ,
 D & B , intelligetur ex modo expoſitis quod, in tranſitu corporis
 P a Nodo alterutro ad gradum inde nonageſimum, inclinatio pla-
 ni perpetuo minuitur; deinde in tranſitu per proximos 45 gradus,
 uſque ad Quadraturam proximam, inclinatio augetur, & poſtea de-
 nuo in tranſitu per alios 45 gradus, uſque ad Nodum proximum,
 diminuitur. Magis itaque diminuitur inclinatio quam augetur, &
 propterea minor eſt ſemper in Nodo ſubſequenti quam in præce-
 dente.

DE MOTU
CORPORUM

dente. Et simili ratiocinio, inclinatio magis augetur quam diminuitur ubi Nodi sunt in Octantibus alteris inter A & D , B & C . Inclinatio igitur ubi Nodi sunt in Syzygiis est omnium maxima. In transitu eorum a Syzygiis ad Quadraturas, in singulis corporis ad Nodos appulsibus, diminuitur, fitque omnium minima ubi Nodi sunt in Quadraturis & corpus in Syzygiis: dein crescit iisdem gradibus quibus antea decreverat, Nodisque ad Syzygias proximas appulsis ad magnitudinem primam revertitur.

Corol. 11. Quoniam corpus P ubi Nodi sunt in Quadraturis perpetuo trahitur de plano Orbis sui, idque in partem versus S , in transitu suo a Nodo C per Conjunctionem A ad Nodum D ; & in contrariam partem in transitu a Nodo D per Oppositionem B ad Nodum C ; manifestum est quod in motu suo a Nodo C , corpus perpetuo recedit ab Orbis sui plano primo CD , usque dum perventum est ad Nodum proximum; adeoque in hoc Nodo, longissime distans a plano illo primo CD , transit per planum Orbis EST non in plani illius Nodo altero D , sed in puncto quod inde vergit ad partes corporis S , quodque proinde novus est Nodi locus in anteriora vergens. Et simili argumento pergent Nodi recedere in transitu corporis de hoc Nodo in Nodum proximum. Nodi igitur in Quadraturis constituti perpetuo recedunt: in Syzygiis (ubi motus in Latitudinem nil perturbatur) quiescunt; in locis intermediis, conditionis utriusque participes, recedunt tardius; adeoque, semper vel retrogradi vel stationarii, singulis revolutionibus feruntur in antecedentia.

Corol. 12. Omnes illi in his Corollariis descripti Errores sunt paulo majores in Conjunctione corporum P , S quam in eorum Oppositione, idque ob majores vires generantes NM & ML .

Corol. 13. Cumque rationes horum Corollariorum non pendeant a magnitudine corporis S , obtinent præcedentia omnia, ubi corporis S tanta statuitur magnitudo ut circa ipsum revolvatur corporum duorum T & P Systema. Et ex aucto corpore S auctaque adeo ipsius vi centripeta, a qua errores corporis P oriuntur, evadent errores illi omnes (paribus distantis) majores in hoc casu quam in altero, ubi corpus S circum Systema corporum P & T revolvitur.

Corol. 14. Cum autem vires NM , ML , ubi corpus S longinquum est, sint quamproxime ut vis SK & ratio PT ad ST conjunctim, hoc est, si detur tum distantia PT , tum corporis S vis absoluta, ut ST cub. reciproce; sint autem vires illæ NM , ML causæ errorum & effectuum omnium de quibus actum est in præcedentibus


dentibus Corollariis: manifestum est quod effectus illi omnes, stan-
te corporum T & P Systemate, & mutatis tantum distantia ST &
vi absoluta corporis S , sint quamproxime in ratione composita ex
ratione directa vis absolutæ corporis S & ratione triplicata inversa
distantiæ ST . Unde si Systema corporum T & P revolvatur circa
corpus longinquum S , vires illæ NM , ML & earum effectus
erunt, (per Corol. 2. & 6. Prop. iv.) reciproce in duplicata ratio-
ne temporis periodici. Et inde etiam, si magnitudo corporis S pro-
portionalis sit ipsius vi absolutæ, erunt vires illæ NM , ML & ea-
rum effectus directe ut cubus diametri apparentis longinqui corpo-
ris S e corpore T spectati, & vice versa. Namque hæ rationes eæ-
dem sunt atque ratio superior composita.

Corol. 15. Et quoniam si, manentibus Orbium *ESE* & *PAB* forma, proportionibus & inclinatione ad invicem, mutetur eorum magnitudo, & si corporum *S* & *T* vel maneant vel mutantur vires in data quavis ratione, hæ vires (hoc est, vis corporis *T* qua corpus *P* de recto tramite in Orbitam *PAB* deflectere, & vis corporis *S* qua corpus idem *P* de Orbita illa deviare cogitur) agunt semper eodem modo & eadem proportionem: necesse est ut similes & proportionales sint effectus omnes & proportionalia effectuum tempora; hoc est, ut errores omnes lineares sint ut Orbium diametri, angulares vero iidem qui prius, & errorum linearium similium vel angularium æqualium tempora ut Orbium tempora periodica.

Corol. 16. Unde, si dentur Orbium formæ & inclinatio ad invicem, & mutantur utcumque corporum magnitudines, vires & distantia, ex datis erroribus & errorum temporibus in uno Casu, colligi possunt errores & errorum tempora in alio quovis, quam proxime: Sed brevius hac Methodo. Vires NM , ML , cæterisstantibus, sunt ut Radius TP , & harum effectus periodici (per Cor. 2. Lem. x.) ut vires & quadratum temporis periodici corporis P conjunctum. Hi sunt errores lineares corporis P ; & hinc errores angulares e centro T spectati (id est, tam motus Augis & Nodorum, quam omnes in Longitudinem & Latitudinem errores apparentes) sunt, in qualibet revolutione corporis P , ut quadratum temporis

X¹₃


revo-



DE MOTU
CORPORUM.

revolutionis quam proxime. Conjungantur hæ rationes cum rationibus Corollarii 14, & in quolibet corporum T , P , S Systemate, ubi P circum T sibi propinquum, & T circum S longinquum revolvitur, errores angulares corporis P , de centro T apparentes, erunt, in singulis revolutionibus corporis illius P , ut quadratum temporis periodici corporis P directe & quadratum temporis periodici corporis T inverse. Et inde motus medius Augis erit in data ratione ad motum medium Nodorum; & motus uterque erit ut tempus periodicum corporis P directe & quadratum temporis periodici corporis T inverse. Augendo vel minuendo Excentricitatem & inclinationem Orbis PAB non mutantur motus Augis & Nodorum sensibilibiter, nisi ubi eadem sunt nimis magnæ.

Corol. 17. Cum autem linea LM nunc major fit nunc minor quam radius PT , exponatur vis mediocris LM per radium illum PT : & erit hæc ad vim mediocrem SK vel SN (quam exponere licet per ST) ut longitudo PT ad longitudinem ST . Est autem vis mediocris SN vel ST , qua corpus T retinetur in Orbe suo circum S ad vim qua corpus P



retinetur in Orbe suo circum T , in ratione composita ex ratione radii ST ad radium PT , & ratione duplicata temporis periodici corporis P circum T ad tempus periodicum corporis T circum S . Et ex æquo, vis mediocris LM , ad vim qua corpus P retinetur in Orbe suo circum T (quæve corpus idem P , eodem tempore periodico, circum punctum quodvis immobile T ad distantiam PT revolvi posset) est in ratione illa duplicata periodicorum temporum. Datis igitur temporibus periodicis una cum distantia PT , datur vis mediocris LM ; & ea data, datur etiam vis MN quamproxime per analogiam linearum PT , MN .

Corol. 18. Iisdem legibus quibus corpus P circum corpus T revolvitur, fingamus corpora plura fluida circum idem T ad æquales ab ipso distantias moveri; deinde ex his contiguis factis conflari Annulum fluidum, rotundum ac corpori T concentricum; & singulæ Annuli partes, motus suos omnes ad legem corporis P peragendo,

agendo, propius accedent ad corpus T , & celerius movebuntur in Conjunctione & Oppositione ipsarum & corporis S , quam in Quadraturis. Et Nodi Annuli hujus seu intersectiones ejus cum plano Orbitæ corporis S vel T , quiescent in Syzygiis, extra Syzygias vero movebuntur in antecedentia, & velocissime quidem in Quadraturis, tardius aliis in locis. Annuli quoque inclinatio variabitur, & axis ejus singulis revolutionibus oscillabitur, completaque revolutione ad pristinum situm redibit, nisi quatenus per præcessionem Nodorum circumfertur.

Corol. 19. Fingas jam Globum corporis T , ex materia non fluida constantem, ampliari & extendi usque ad hunc Annulum, & alveo per circuitum excavato continere Aquam, motuque eodem periodico circa axem suum uniformiter revolvi. Hic liquor per vices acceleratus & retardatus (ut in superiore Corollario) in Syzygiis velocior erit, in Quadraturis tardior quam superficies Globi, & sic fluet in alveo refluetque ad modum Maris. Aqua revolviendo circa Globi centrum quiescens, si tollatur attractio corporis S nullum acquireret motum fluxus & refluxus. Par est ratio Globi uniformiter progredientis in directum & interea revolventis circa centrum suum (per Legum Corol. 5.) ut & Globi de cursu rectilineo uniformiter tracti, per Legum Corol. 6. Accedat autem corpus S , & ab ipsius inæquabili attractione mox turbabitur Aqua. Etenim major erit attractio aquæ propioris, minor ea remotioris. Vis autem LM trahet aquam deorsum in Quadraturis, facietque ipsam descendere usque ad Syzygias; & vis KL trahet eandem fursum in Syzygiis, sistetque descensum ejus & faciet ipsam ascendere usque ad Quadraturas.

Corol. 20. Si Annulus jam rigeat & minuatur Globus, cessabit motus fluendi & refluendi: sed Oscillatorius ille inclinationis motus & præcessio Nodorum manebunt. Habeat Globus eundem axem cum Annulo, gyroque compleat iisdem temporibus, & superficie sua contingat ipsum interius, eique inhæreat; & participando motum ejus, compages utriusque oscillabitur & Nodi regredientur. Nam Globus, ut mox dicetur, ad suscipiendas impressiones omnes indifferens est. Annuli Globo orbatî maximus inclinationis angulus est ubi Nodi sunt in Syzygiis. Inde in progressu Nodorum ad Quadraturas conatur is inclinationem suam minuere, & isto conatu motum imprimi Globo toti. Retinet Globus motum impressum usque dum Annulus conatu contrario motum hunc tollat, imprimatque motum novum in contrariam partem: Atque hac ratione

DE MOTU ratione maximus decrefcentis inclinationis motus fit in Quadraturis
CORPORUM. Nodorum, & minimus inclinationis angulus in Oſtantibus poſt
Quadraturas; dein maximus reclinationis motus in Syzygiis, &
maximus angulus in Oſtantibus proximis. Et eadem eſt ratio Glo-
bi Annulo nudati, qui in regionibus æquatoris vel altior eſt paulo
quam juxta polos, vel conſtat ex materia paulo denſiore. Supplet
enim vicem Annuli iſte materiæ in æquatoris regionibus exceſſus.
Et quanquam, aucta utcunq; Globi hujus vi centripeta, tendere
ſupponantur omnes ejus partes deorſum, ad modum gravitantium
partium telluris, tamen Phænomena hujus & præcedentis Corol-
larii vix inde mutabuntur.

Corol. 21. Eadem ratione qua materia Globi juxta æquatorem
redundans efficit ut Nodi regrediantur, atque adeo per hujus in-
crementum augetur iſte regreſſus, per diminutionem vero diminui-
tur & per ablationem tollitur; ſi materia pluſquam redundans tol-
latur, hoc eſt, ſi Globus juxta æquatorem vel depreſſior reddatur
vel rarior quam juxta polos, orietur motus Nodorum in conſe-
quentia.

Corol. 22. Et inde viciffim, ex motu Nodorum innotefcit con-
ſtitutio Globi. Nimirum ſi Globus polos eoſdem conſtanter ſervat,
& motus fit in antecedentia, materia juxta æquatorem redundat;
ſi in conſequentia, deficit. Pone Globum uniformem & perfecte
circinatum in ſpatiis liberis primo quieſcere; dein impetu quocun-
que oblique in ſuperficiem ſuam facto propelli, & motum inde
concipere partim circularem, partim in directum. Quoniam Glo-
bus iſte ad axes omnes per centrum ſuum tranſeuntes indifferenter
ſe habet, neque propenſior eſt in unum axem; unumve axis ſitum,
quam in alium quemvis; perſpicuum eſt quod iſ axem ſuum axis-
que inclinationem vi propria nunquam mutabit. Impellatur jam
Globus oblique, in eadem illa ſuperficie parte qua prius, impulſu
quocunq; novo; & cum citior vel ſerior impulſus effectum nil
mutet, manifeſtum eſt quod hi duo impulſus ſucceſſive impreſſi
eundem producent motum ac ſi ſimul impreſſi fuiſſent, hoc eſt,
eundem ac ſi Globus vi ſimplici ex utroque (per Legum Corol. 2.)
compoſita impulſus fuiſſet, atque adeo ſimplicem, circa axem in-
clinatione datum. Et par eſt ratio impulſus ſecundi facti in lo-
cum alium quemvis in æquatore motus primi; ut & impulſus pri-
mi facti in locum quemvis in æquatore motus, quem impulſus ſe-
cundus abſque primo generaret; atque adeo impulſuum amborum
factorum in loca quæcunq; Generabunt hi eundem motum cir-
cularem

cularem ac si simul & semel in locum intersectionis æquatorum motuum illorum, quos seorsim generarent, fuissent impressi. Globus igitur homogeneous & perfectus non retinet motus plures distinctos, sed impressos omnes componit & ad unum reducit, & quatenus in se est, gyatur semper motu simplici & uniformi circa axem unicum, inclinatione semper invariabili datum. Sed nec vis centripeta inclinationem axis, aut rotationis velocitatem mutare potest. Si Globus plano quocunque, per centrum suum & centrum in quod vis dirigitur transeunte, dividi intelligatur in duo hemisphæria; urgebit semper vis illa utrumque hemisphærium æqualiter, & propterea Globum, quoad motum rotationis, nullam in partem inclinabit. Addatur vero alicubi inter polum & æquatorem materia nova in formam montis cumulata, & hæc, perpetuo conatu recedendi a centro sui, motus, turbabit motum Globi, facietque polos ejus errare per ipsius superficiem, & circulos circum se punctumque sibi oppositum perpetuo describere. Neque corrigetur ista vagationis enormitas, nisi locando montem illum vel in polo alterutro, quo in Casu (per Corol. 21.) Nodi æquatoris progredientur; vel in æquatore, qua ratione (per Corol. 20.) Nodi regredientur; vel denique ex altera axis parte addendo materiam novam, qua mons inter movendum libretur, & hoc pacto Nodi vel progredientur, vel recedent, perinde ut mons & hæc nova materia sunt vel polo vel æquatori propiores.

PROPOSITIO LXVII. THEOREMA XXVII.

Positis iisdem attractionum legibus, dico quod corpus exterius S , circa interiorum P, T commune gravitatis centrum C , radiis ad centrum illud ductis, describit areas temporibus magis proportionales & Orbem ad formam Ellipseos umbilicum in centro eodem habentis magis accedentem, quam circa corpus intimum & maximum T , radiis ad ipsum ductis, describere potest.

Nam corporis S attractiones versus T & P component ipsius attractionem absolutam, quæ magis dirigitur in corporum T & P commune gravitatis centrum C , quam in corpus maximum T , quæque quadrato distantiae SC magis est proportionalis reciproce, quam quadrato distantiae ST : ut rem pendenti facile constabit.

Y

PRO-

Corol. Et hinc, si corpora plura minora revolvantur circa maximum, colligere licet quod Orbitæ descriptæ propius accedent ad Ellipticas, & arearum descriptiones fient magis æquabiles, si corpora omnia viribus acceleratricibus, quæ sunt ut eorum vires absolutæ directæ & quadrata distantiarum inverse, se mutuo trahant agentque, & Orbitæ cujusque umbilicus collocetur in communi centro gravitatis corporum omnium interiorum (nimirum umbilicus Orbitæ primæ & intimæ in centro gravitatis corporis maximi & intimi; ille Orbitæ secundæ, in communi centro gravitatis corporum duorum intimorum; iste tertiæ, in communi centro gravitatis trium interiorum; & sic deinceps) quam si corpus intimum quiescat & statuatur communis umbilicus Orbitalium omnium.

PROPOSITIO LXIX. THEOREMA XXIX.

In Systemate corporum plurium A, B, C, D, &c. si corpus aliquod A trahit cætera omnia B, C, D, &c. viribus acceleratricibus quæ sunt reciproce ut quadrata distantiarum a trahente; & corpus aliud B trahit etiam cætera A, C, D, &c. viribus quæ sunt reciproce ut quadrata distantiarum a trahente: erunt Absolutæ corporum trahentium A, B vires ad invicem, ut sunt ipsa corpora A, B, quorum sunt vires.

Nam attractiones acceleratrices corporum omnium *B, C, D* versus *A*, paribus distantis, sibi invicem æquantur ex Hypothesi; & similiter attractiones acceleratrices corporum omnium versus *B*, paribus distantis, sibi invicem æquantur. Est autem absoluta vis attractiva corporis *A* ad vim absolutam attractivam corporis *B*, ut attractio acceleratrix corporum omnium versus *A* ad attractionem acceleratricem corporum omnium versus *B*, paribus distantis; & ita est attractio acceleratrix corporis *B* versus *A*, ad attractionem acceleratricem corporis *A* versus *B*. Sed attractio acceleratrix corporis *B* versus *A* est ad attractionem acceleratricem corporis *A* versus *B*, ut massa corporis *A* ad massam corporis *B*; propterea quod vires motrices, quæ (per Definitionem secundam, septimam & octavam) ex viribus acceleratricibus in corpora attracta ductis oriuntur, sunt (per motus Legem tertiam) sibi invicem æqua-

DE MOTU
CORPORUM,

les. Ergo absoluta vis attractiva corporis *A* est ad absolutam vim attractivam corporis *B*, ut massa corporis *A* ad massam corporis *B*. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si singula Systematis corpora *A, B, C, D, &c.* seorsim spectata trahant cætera omnia viribus acceleratricibus quæ sunt reciproce ut quadrata distantiarum a trahente; erunt corporum illorum omnium vires absolutæ ad invicem ut sunt ipsa corpora.

Corol. 2. Eodem argumento, si singula Systematis corpora *A, B, C, D, &c.* seorsim spectata trahant cætera omnia viribus acceleratricibus quæ sunt vel reciproce vel directe in ratione dignitatis cujuscunque distantiarum a trahente, quæve secundum Legem quamcunque communem ex distantibus ab unoquoque trahente definiuntur; constat quod corporum illorum vires absolutæ sunt ut corpora.

Corol. 3. In Systemate corporum, quorum vires decrescunt in ratione duplicata distantiarum, si minora circa maximum in Ellipsis umbilicum communem in maximi illius centro habentibus quam fieri potest accuratissimis revolvantur, & radiis ad maximum illud ductis describant areas temporibus quam maxime proportionales: erunt corporum illorum vires absolutæ ad invicem, aut accurate aut quamproxime in ratione corporum; & contra. Patet per Corol. Prop. LXVIII. collatum cum hujus Corol. 1.

Scholium.

His Propositionibus manuducimur ad analogiam inter vires centripetas & corpora centralia, ad quæ vires illæ dirigi solent. Rationi enim consentaneum est, ut vires quæ ad corpora diriguntur pendeant ab eorundem natura & quantitate, ut fit in Magneticis. Et quoties hujusmodi casus incidunt, æstimandæ erunt corporum attractiones, assignando singulis eorum particulis vires proprias, & colligendo summas virium. Vocem Attractionis hic generaliter usurpo pro corporum conatu quocunque accedendi ad invicem, sive conatus iste fiat ab actione corporum, vel se mutuo petentium, vel per Spiritus emissos se invicem agitantium, sive is ab actione Ætheris, aut Aeris, Mediæ cujuscunque seu corporei seu incorporei oriatur corpora innatantia in se invicem utcunque impellentis. Eodem sensu generali usurpo vocem Impulsus, non species virium &

& qualitates Physicas, sed quantitates & proportiones Mathematicas in hoc Tractatu expendens, ut in Definitionibus explicui. LITER. PRIMUS,
 In Mathesi investigandæ sunt virium quantitates & rationes illæ, quæ ex conditionibus quibuscunque positæ consequentur: deinde, ubi in Physicam descenditur, conferendæ sunt hæ rationes cum Phænomenis, ut innotescat quænam virium conditiones singulis corporum attractivorum generibus competant. Et tum demum de virium speciebus, causis & rationibus Physicis tutius disputare licebit. Videamus igitur quibus viribus corpora Sphærica, ex particulis modo jam exposito attractivis constantia, debeant in se mutuo agere, & quales motus inde consequantur.


S E C T I O XII.

De Corporum Sphæricorum Viribus attractivis.

PROPOSITIO LXX. THEOREMA XXX.

Si ad Sphæricæ superficiei puncta singula tendant vires æquales centripetæ decrescentes in duplicata ratione distantiarum a punctis: dico quod corpusculum intra superficiem constitutum his viribus nullam in partem attrahitur.

Sit $HIKL$ superficies illa Sphærica, & P corpusculum intus constitutum. Per P agantur ad hanc superficiem lineæ duæ HK, IL , arcus quam minimos HI, KL intercipientes; &, ob triângula HPI, LPK (per Corol. 3. Lem. vii.) similia, arcus illi erunt distantis HP, LP proportionales; & superficiei Sphæricæ particulæ quævis ad HI & KL , rectis per punctum P transeuntibus undique terminatæ, erunt in duplicata illa ratione. Ergo vires harum particularum in corpus P exercitæ sunt inter se æquales. Sunt enim ut particulæ directæ & quadrata distantiarum inverse. Et hæ duæ rationes componunt rationem




DE MOTU æqualitatis. Attractiones igitur, in contrarias partes æqualiter fac-
CORPORUM, tæ, se mutuo destruunt. Et simili argumento, attractiones omnes
per totam Sphæricam superficiem a contrariis attractionibus destru-
untur. Proinde corpus P nullam in partem his attractionibus im-
pellitur. Q. E. D.

PROPOSITIO LXXI. THEOREMA XXXI.

*Isdem positis, dico quod corpusculum extra Sphæricam su-
perficiem constitutum, attrahitur ad centrum Sphære vi
reciproce proportionali quadrato distantie suæ ab eodem
centro.*

Sint $AHKB$, $abkb$ æquales duæ superficies Sphæricæ, centris
 S, s , diametris AB , ab descriptæ, & P, p corpuscula sita extrin-
secus in diametris illis productis. Agantur a corpusculis lineæ



PHK , PIL , pbk , pil , auferentes a circulis maximis AHB ,
 abk , æquales arcus HK , bk & IL , il : Et ad eas demittantur
perpendicularia SD , sd ; SE , se ; IR , ir ; quorum SD , sd se-
cent PL , pl in F & f : Demittantur etiam ad diametros perpen-
dicularia IQ , iq . Evanescant anguli DPE , dpe : & (ob æqua-
les DS , & ds , ES & es ,) lineæ PE , PF & pe , pf & li-
neolæ DF , df pro æqualibus habeantur; quippe quarum ratio
ultima, angulis illis DPE , dpe simul evanescentibus, est æqua-
litas. His itaque constitutis, erit PI , ad PF , ut RI ad DF , &
 pf , ad pi , ut df , vel DF ad ri , & ex æquo $PI \times pf$ ad $PF \times pi$
ut RI , ad ri , hoc est (per Corol. 4. Lem. VII,) ut arcus IH ad ar-
cum ib . Rursus PI , ad PS ut IQ ad SE , & ps ad pi ut se vel
 SE ad iq ; & ex æquo $PI \times ps$ ad $PS \times pi$ ut IQ ad iq . Et
conjunctis rationibus $PI \text{ quad.} \times pf \times ps$ ad $pi \text{ quad.} \times PF \times PS$,
ut $IH \times IQ$ ad $ib \times iq$; hoc est, ut superficies circularis, quam
arcus

arcus *IH* convolutione semicirculi *AKB* circa diametrum *AB* de-
scribet, ad superficiem circularem, quam arcus *ib* convolutione
semicirculi *akb* circa diametrum *ab* describet. Et vires, quibus
hæ superficies secundum lineas ad se tendentes attrahunt corpus-
cula *P* & *p*, sunt (per Hypothesin) ut ipsæ superficies applicatæ
ad quadrata distantiarum suarum a corporibus, hoc est, ut $pf \times ps$
ad $PF \times PS$. Suntque hæ vires ad ipsarum partes obliquas quæ
(facta per Legum Corol. 2. resolutione virium) secundum li-
neas *PS*, *ps* ad centra tendunt, ut *PI* ad *PQ*, & *pi* ad *pq*; id
est (ob similia triangula *PIQ* & *PSF*, *piq* & *psf*) ut *PS* ad
PF & *ps* ad *pf*. Unde, ex æquo, fit attractio corpusculi hujus *P*
versus *S* ad attractionem corpusculi *p* versus *s*, ut $\frac{PF \times pf \times ps}{PS}$ ad

$\frac{pf \times PF \times PS}{ps}$, hoc est, ut *ps quad.* ad *PS quad.* Et simili argu-
mento vires, quibus superficies convolutione arcuum *KL*, *kl* de-
scriptæ trahunt corpuscula, erunt ut *ps quad.* ad *PS quad.*; inque
eadem ratione erunt vires superficierum omnium circularium in
quas utraque superficies Sphærica, capiendo semper *s* d æqualem
SD & *se* æqualem *SE*, distingui potest. Et, per compositionem,
vires totarum superficierum Sphæricarum in corpuscula exercitæ e-
runt in eadem ratione. *Q. E. D.*

PROPOSITIO LXXII. THEOREMA XXXII.

*Si ad Sphæræ cujusvis puncta singula tendant vires æquales
centripetæ decrescentes in duplicata ratione distantiarum a
punctis, ac detur tum Sphæræ densitas, tum ratio diame-
tri Sphæræ ad distantiam corpusculi a centro ejus; dico
quod vis qua corpusculum attrahitur proportionalis erit
semidiametro Sphæræ.*

Nam concipe corpuscula duo seorsim a Sphæris duabus attrahi,
unum ab una & alterum ab altera, & distantias eorum a Sphæra-
rum centris proportionales esse diametris Sphærarum respective,
Sphæras autem resolvi in particulas similes & similiter positas ad
corpuscula. Et attractiones corpusculi unius, factæ versus singulas
particulas Sphæræ unius, erunt ad attractiones alterius versus ana-
logas totidem particulas Sphæræ alterius, in ratione composita ex
ratione particularum directe & ratione duplicata distantiarum in-
verse.

DE MOTU
CORPORUM, verse. Sed particulæ sunt ut Sphæræ, hoc est, in ratione triplicata diametrorum, & distantia sunt ut diametri, & ratio prior directe una cum ratione posteriore bis inverse est ratio diametri ad diametrum. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si corpuscula in Circulis, circa Sphæræ ex materia æqualiter attractiva constantes, revolvantur; sintque distantia a centris Sphærarum proportionales earundem diametris: Tempora periodica erunt æqualia.


Corol. 2. Et vice versa, si Tempora periodica sunt æqualia; distantia erunt proportionales diametris. Constant hæc duo per *Corol. 3. Prop. iv.*

Corol. 3. Si ad Solidorum duorum quorumvis similium & æqualiter densorum puncta singula tendant vires æquales centripetæ decrescentes in duplicata ratione distantiarum a punctis: vires quibus corpuscula, ad Solida illa duo similiter sita, attrahentur ab iisdem, erunt ad invicem ut diametri Solidorum.

PROPOSITIO LXXIII. THEOREMA XXXIII.

Si ad Sphæræ alicujus datæ puncta singula tendant æquales vires centripetæ decrescentes in duplicata ratione distantiarum a punctis: dico quod corpusculum intra Sphæram constitutum attrahitur vi proportionali distantia suæ ab ipsius centro.

In Sphæra *ABCD*, centro *S* descripta, locetur corpusculum *P*; & centro eodem *S*, intervallo *SP*, concipe Sphæram interiorem *PEQF* describi. Manifestum est, per *Prop. lxx.* quod Sphæricæ superficies concentricæ ex quibus Sphærarum differentia *AEBF* componitur, attractionibus per attractiones contrarias destructis, nil agunt in corpus *P*. Restat sola attractio Sphære interioris *PEQF*. Et per *Prop. lxxii.* hæc est ut distantia *PS*. *Q. E. D.*



Scholium.

Superficies ex quibus solida componuntur, hic non sunt pure Mathematicæ, sed Orbes adeo tenues ut eorum crassitudo instar nihili

nihili sit; nimirum Orbes evanescentes ex quibus Sphæra ultimo constat, ubi Orbium illorum numerus augetur & crassitudo minuitur in infinitum. Similiter per puncta ex quibus lineæ, superficies & solida componi dicuntur, intelligendæ sunt particulæ æquales magnitudinis contemnendæ.

PROPOSITIO LXXIV. THEOREMA XXXIV.

Isdem positis, dico quod corpusculum extra Sphæram constitutum attrahitur vi reciproce proportionali quadrato distantiae suæ ab ipsius centro.

Nam distinguatur Sphæra in superficies Sphæricas innumeras concentricas, & attractiones corpusculi a singulis superficiebus oriundæ erunt reciproce proportionales quadrato distantiae corpusculi a centro, per Prop. LXXI. Et componendo, fiet summa attractionum, hoc est attractio corpusculi in Sphæram totam, in eadem ratione.

Q. E. D.

Corol. 1. Hinc in æqualibus distantis a centris homogenearum Sphærarum, attractiones sunt ut Sphæræ. Nam per Prop. LXXII, si distantiae sunt proportionales diametris Sphærarum, vires erunt ut diametri. Minuatur distantia major in illa ratione; &, distantis jam factis æqualibus, augebitur attractio in duplicata illa ratione, adeoque erit ad attractionem alteram in triplicata illa ratione, hoc est, in ratione Sphærarum.

Corol. 2. In distantis quibusvis attractiones sunt ut Sphæræ applicatæ ad quadrata distantiarum.

Corol. 3. Si corpusculum, extra Sphæram homogeneam positum, trahitur vi reciproce proportionali quadrato distantiae suæ ab ipsius centro, constet autem Sphæra ex particulis attractivis; decrescet vis particulæ cujusque in duplicata ratione distantiae a particula.

PROPOSITIO LXXV. THEOREMA XXXV.

Si ad Sphæra datæ puncta singula tendant vires æquales centripetæ, decrescetes in duplicata ratione distantiarum a punctis; dico quod Sphæra quævis alia similis ab eadem attrahitur vi reciproce proportionali quadrato distantiae centrorum.

Nam particulæ cujusvis attractio est reciproce ut quadratum distantiae suæ a centro Sphæræ trahentis, (per Prop. LXXIV.) & prop-

DE MOTU CORPORUM, terea eadem est ac si vis tota attrahens manaret de corpusculo unico sito in centro hujus Sphæræ. Hæc autem attractio tanta est quanta foret vicissim attractio corpusculi ejusdem, si modo illud a singulis Sphæræ attractæ particulis eadem vi traheretur quas ipsas attrahit. Foret autem illa corpusculi attractio (per Prop. LXXIV.) reciproce proportionalis quadrato distantiae suæ a centro Sphæræ; adeoque huic æqualis attractio Sphæræ est in eadem ratione. *Q. E. D.*

Corol. 1. Attractiones Sphærarum, versus alias Sphæras homogeneas, sunt ut Sphæræ trahentes applicatæ ad quadrata distantiarum centrorum suorum a centris earum quas attrahunt.

Corol. 2. Idem valet ubi Sphæra attracta etiam attrahit. Namque hujus puncta singula trahent singula alterius, eadem vi qua ab ipsis vicissim trahuntur, adeoque cum in omni attractione urgeatur (per Legem III.) tam punctum attrahens, quam punctum attractum, geminabitur vis attractionis mutuae, conservatis proportionibus.

Corol. 3. Eadem omnia, quæ superius de motu corporum circa umbilicum Conicarum Sectionum demonstrata sunt, obtinent ubi Sphæra attrahens locatur in umbilico & corpora moventur extra Sphæram.


Corol. 4. Ea vero quæ de motu corporum circa centrum Conicarum Sectionum demonstrantur, obtinent ubi motus peraguntur intra Sphæram.

PROPOSITIO LXXVI. THEOREMA XXXVII.

Si Sphæra in progressu a centro ad circumferentiam (quoad materiæ densitatem & vim attractivam) utcumque dissimilares, in progressu vero per circuitum ad datam omnem a centro distantiam sunt undique similes, & vis attractiva puncti cujusque decrescit in duplicata ratione distantie corporis attracti: dico quod vis tota qua hujusmodi Sphæra una attrahit aliam sit reciproce proportionalis quadrato distantie centrorum.

Sunto Sphæræ quocunque concentricæ similes *AB, CD, EF,* &c. quarum interiores additæ exterioribus component materiam densiorem

denfioſiorem verſus centrum, vel ſubductæ relinquant tenuiorem; & LIBER
hæ (per Prop. LXXV.) trahent Sphæras alias quotcunque concentri- PRIMUS.
cas ſimilares *GH, IK, LM*, &c. ſingulæ ſingulas, viribus reci-
proce proportionalibus quadrato diſtantiæ *SP*. Et componendo vel
dividendo, ſumma virium illarum omnium, vel exceſſus aliquarum
ſupra alias, hoc eſt, vis qua Sphæra tota ex concentricis quibuſ-
cunque vel concentricarum differentiis compoſita *AB*, trahit to-
tam ex concentricis quibuſcunque vel concentricarum differentiis
compoſitam *GH*, erit in eadem ratione. Augeatur numerus Sphæ-
rarum concentricarum in infinitum ſic, ut materiæ denſitas una
cum vi attractiva, in progreſſu a circumferentia ad centrum, ſecun-
dum Legem quacunque creſcat vel decreſcat: &, addita materia



non attractiva, compleatur ubiſ denſitas deficiens, eo ut Sphæ-
ræ acquirant formam quamvis optatam; & vis qua harum una at-
trahet alteram erit etiamnum (per argumentum ſuperius) in eadem
illa diſtantiæ quadratæ ratione inverſa. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc ſi ejuſmodi Sphære complures, ſibi invicem per
omnia ſimiles, ſe mutuo trahant; attractiones acceleratrices ſingu-
larum in ſingulas erunt, in æqualibus quibuſvis centrorum di-
ſtantiis, ut Sphære attrahentes.

Corol. 2. Inque diſtantiis quibuſvis inæqualibus, ut Sphære attra-
hentes applicatæ ad quadrata diſtantiarum intra centra.

Corol. 3. Attractiones vero motrices, ſeu pondera Sphærarum in
Sphæras erunt, in æqualibus centrorum diſtantiis, ut Sphære at-
trahentes & attractæ conjunctim, id eſt, ut contenta ſub Sphæris
per multiplicationem producta.

Corol. 4. Inque diſtantiis inæqualibus, ut contenta illa applicata
ad quadrata diſtantiarum inter centra.

DE MOTU
CORPORUM,

Corol. 5. Eadem valent ubi attractio oritur a Sphæræ utriusque virtute attractiva, mutuo exercita in Sphæram alteram. Nam viribus ambabus geminatur attractio, proportionē servata.

Corol. 6. Si hujusmodi Sphæræ aliquæ circa alias quiescentes revolvantur, singulæ circa singulas, sintque distantiae inter centra revolvantium & quiescentium proportionales quiescentium diametris; æqualia erunt Tempora periodica.

Corol. 7. Et vicissim, si Tempora periodica sunt æqualia; distantiae erunt proportionales diametris.

Corol. 8. Eadem omnia, quæ superius de motu corporum circa umbilicos Conicarum Sectionum demonstrata sunt, obtinent ubi Sphæra attrahens, formæ & conditionis cujusvis jam descriptæ, locatur in umbilico.


Corol. 9. Ut & ubi gyrantia sunt etiam Sphæræ attrahentes, conditionis cujusvis jam descriptæ.

PROPOSITIO LXXVII. THEOREMA XXXVII.

Si ad singula Sphærarum puncta tendant vires centripetæ, proportionales distantis punctorum a corporibus attractis: dico quod vis composita, qua Sphæra duæ se mutuo trahent, est ut distantia inter centra Sphærarum.

Cas. 1. Sit $AEBF$ Sphæra, S centrum ejus, P corpusculum attractum, $PASB$ axis Sphæræ per centrum corpusculi transiens, EF , ef plana duo quibus Sphæra secatur, huic axi perpendicularia & hinc inde æqualiter distantia a centro Sphæræ; G, g intersectiones planorum & axis, & H punctum quodvis in plano EF . Puncti

H vis centripeta in corpusculum P , secundum lineam PH exercita, est ut distantia PH ; & (per Legum Corol. 2.) secundum lineam PG , seu versus centrum S , ut longitudo PG . Igitur punctorum omnium in plano EF , hoc est plani totius vis, qua corpusculum P trahitur versus centrum S , est ut numerus punctorum ductus in distantiam PG : id est, ut contentum sub plano ipso EF & distantia illa PG . Et similiter vis plani ef , qua corpusculum P trahitur



trahitur versus centrum S , est ut planum illud ductum in distantiam suam Pg , sive ut huic æquale planum EF ductum in distantiam illam Pg ; & summa virium plani utriusque ut planum EF ductum in summam distantiarum $PG + Pg$, id est, ut planum illud ductum in duplam centri & corpusculi distantiam PS , hoc est, ut duplum planum EF ductum in distantiam PS , vel ut summa æqualium planorum $EF + ef$ ducta in distantiam eandem. Et simili argumento, vires omnium planorum in Sphæra tota, hinc inde æqualiter a centro Sphære distantium, sunt ut summa planorum ducta in distantiam PS , hoc est, ut Sphæra tota ducta in distantiam centri sui S a corpusculo P . *Q. E. D.*

Cas. 2. Trahat jam corpusculum P Sphæram $AEBF$. Et eodem argumento probabitur quod vis, qua Sphæra illa trahitur, erit ut distantia PS . *Q. E. D.*

Cas. 3. Componatur jam Sphæra altera ex corpusculis innumeris P ; & quoniam vis, qua corpusculum unumquodque trahitur, est ut distantia corpusculi a centro Sphære primæ ducta in Sphæram eandem, atque adeo eadem est ac si prodiret tota de corpusculo unico in centro Sphære; vis tota qua corpuscula omnia in Sphæra secunda trahuntur, hoc est, qua Sphæra illa tota trahitur, eadem erit ac si Sphæra illa traheretur vi prodeunte de corpusculo unico in centro Sphære primæ, & propterea proportionalis est distantie inter centra Sphærarum. *Q. E. D.*

Cas. 4. Trahant Sphære se mutuo, & vis geminata proportionem priorem servabit. *Q. E. D.*

Cas. 5. Locetur jam corpusculum p intra Sphæram $AEBF$; & quoniam vis plani ef in corpusculum est ut contentum sub plano illo & distantia pg ; & vis contraria plani EF ut contentum sub plano illo & distantia pG ; erit vis ex utraque composita ut differentia contentorum, hoc est, ut summa æqualium planorum ducta in semissem differentie distantiarum, id est, ut summa illa ducta in pS distantiam corpusculi a centro Sphære. Et simili argumento, attractio planorum omnium EF, ef in Sphæra tota, hoc est, attractio Sphære totius, est ut summa planorum omnium, seu Sphæra tota, ducta in pS distantiam corpusculi a centro Sphære. *Q. E. D.*

Cas. 6. Et si ex corpusculis innumeris p componatur Sphæra nova, intra Sphæram priorem $AEBF$ sita, probabitur ut prius quod attractio, sive simplex Sphære unius in alteram, sive mutua utriusque in se invicem, erit ut distantia centrorum pS . *Q. E. D.*

PROPOSITIO LXXVIII. THEOREMA XXXVIII.

*Si Sphæræ in progressu a centro ad circumferentiam sint ut-
cunque dissimilares & inæquabiles, in progressu vero per
circuitum ad datam omnem a centro distantiam sint undi-
que similes; & vis attractiva puncti cujusque sit ut di-
stantia corporis attracti: dico quod vis tota qua hujusmo-
di Sphæræ duæ se mutuo trahunt sit proportionalis distan-
tiæ inter centra Sphærarum.*

Demonstratur ex Propositione præcedente, eodem modo quo
Propositio LXXVI ex Propositione LXXV demonstrata fuit:

Corol. Quæ superius in Propositionibus x & LXIV de motu cor-
porum circa centra Conicarum Sectionum demonstrata sunt, valent
ubi attractiones omnes fiunt vi Corporum Sphæræ conditionis ejus-
dem.

Scholium.


Attractionum Casus duos insigniores jam dedi expositos; nimi-
rum ubi Vires centripetæ decrescunt in duplicata distantiarum ra-
tione, vel crescunt in distantiarum ratione simplici; efficientes in
utroque Casu ut corpora gyrentur in Conicis Sectionibus, & com-
ponentes corporum Sphæricorum Vires centripetas eadem Lege,
in recessu a centro, decrescentes vel crescentes cum seipsis: Quod
est notatu dignum. Casus cæteros, qui conclusiones minus elegan-
tes exhibent, sigillatim percurrere longum esset. Malim cunctos
methodo generali simul comprehendere ac determinare, ut sequitur.

L E M M A XXIX.

*Si describantur centro S circulus quilibet AEB, & centro P
circuli duo EF, ef, secantes priorem in E, e, lineam-
que PS in F, f; & ad PS demittantur perpendiculara ED,
ed: dico quod, si distantia arcuum EF, ef in infinitum
minui intelligatur, ratio ultima lineæ evanescentis Dd ad
lineam evanescentem Ff ea sit, quæ lineæ PE ad lineam
PS.*

Nam

Nam si linea Pe fecet arcum EF in q ; & recta Ee , quæ cum arcu evanescente Ee coincidit, producta occurrat rectæ PS in T ; & ab S demittatur in PE normalis SG : ob similia triangula DTE , dTe , DES ; erit Dd ad Ee , ut DT ad TE , seu DE ad ES ;



& ob triangula Eeq , ESG (per Lem. VIII, & Corol. 3. Lem VII.)
 similia, erit Ee ad eq seu Ff , ut ES ad SG ; & ex æquo, Dd
 ad Ff ut DE ad SG ; hoc est (ob similia trianguia PDE , PGS)
 ut PE ad PS . *Q. E. D.*


PROPOSITIO LXXIX. THEOREMA XXXIX.

Si superficies ob latitudinem infinite diminutam jamjam evanescens E F f e, convolutione sui circa axem P S, describat solidum sphaericum concavo-convexum, ad cujus particulas singulas aequales tendant aequales vires centripetae: dico quod Vis, qua solidum illud trahit corpusculum situm in P, est in ratione composita ex ratione solidi $DEq \times Ff$ & ratione vis qua particula data in loco Ff traheret idem corpusculum.

Nam si primo consideremus vim superficiei Sphæricæ FE , quæ convolutione arcus FE generatur, & a linea de ubivis secatur in r ; erit superficiei pars annularis, convolutione arcus rE genita, ut lineola Da , manente Sphære radio PE , (uti demonstravit *Archimedes* in Lib. de *Sphæra* & *Cylindro*.) Et hujus vis secundum lineas PE vel Pr undique in superficie conica litas exercita, ut hæc ipsa superficiei pars annularis; hoc est, ut lineola Da vel, quod perinde est, ut rectangulum sub dato Sphære radio PE & lineola

DE MOTU
CORPORUM

lineola illa Dd : at secundum lineam PS ad centrum S tendentem minor, in ratione PD ad PE , adeoque ut $PD \times Dd$. Dividi jam intelligatur linea DF in particulas innumeras æquales, quæ singulæ nominentur Dd ; & superficies FE dividetur in totidem æquales annulos, quorum vires erunt ut summa omnium $PD \times Dd$, hoc est, ut $\frac{1}{2} PFq - \frac{1}{2} PDq$, adeoque ut DE quad. Ducatur



jam superficies FE in altitudinem Ff & fiet solidi $EFfe$ vis exercita in corpusculum P ut $DEq \times Ff$: puta si detur vis quam particula aliqua data Ff in distantia PF exercet in corpusculum P . At si vis illa non detur, fiet vis solidi $EFfe$ ut solidum $DEq \times Ff$ & vis illa non data conjunctim. *Q. E. D.*

PROPOSITIO LXXX. THEOREMA XL.

Si ad Sphæræ alicujus ABE , centro S descriptæ, particulas singulas æquales tendant æquales vires centripetæ, & ad Sphæræ axem AB , in quo corpusculum aliquod P locatur, erigantur de punctis singulis D perpendiculara DE , Sphæræ occurrentia in E , & in ipsis capiantur longitudines DN , quæ sint ut quantitas $\frac{DEq \times PS}{PE}$ & vis quam

Sphæræ particula sita in axe ad distantiam PE exercet in corpusculum P conjunctim: dico quod Vis tota, qua corpusculum P trahitur versus Sphæram, est ut area comprehensa sub axe Sphæræ AB & linea curva ANB , quam punctum N perpetuo tangit.

Etenim

Etenim stantibus quæ in Lemmate & Theoremate novissimo constructa sunt, concipe axem Sphæræ AB dividi in particulas innumeras æquales Dd , & Sphæram totam dividi in totidem laminas Sphæricas concavo-convexas $EFfe$, & erigatur perpendiculum dn . Per Theorema superius, vis qua lamina $EFfe$ trahit corpusculum P est ut $DEq \times Ff$ & vis particulæ unius ad distantiam PE vel PF exercita conjunctim. Est autem per Lemma novissimum, Dd ad Ff ut PE ad PS , & inde Ff æqualis $\frac{PS \times Dd}{PE}$; & $DEq \times Ff$ æquale Dd in $\frac{DEq \times PS}{PE}$, & prop-

terea vis laminæ $EFfe$ est ut Dd in $\frac{DEq \times PS}{PE}$ & vis particulæ ad distantiam PF exercita conjunctim, hoc est (ex Hypothesi) ut $DN \times Dd$, seu area evanescens DNd . Sunt igitur laminarum omnium vires, in corpus P exercitæ, ut areæ omnes DNd , hoc est, Sphæræ vis tota ut area tota $ABNA$. $Q.E.D.$

Corol. 1. Hinc si vis centripeta, ad particulas singulas tendens, eadem semper maneat in omnibus distantiiis, & fiat DN ut $\frac{DEq \times PS}{PE}$: erit vis tota qua corpusculum a Sphæra attrahitur, ut area $ABNA$.

Corol. 2. Si particularum vis centripeta sit reciproce ut distantia corpusculi a se attracti, & fiat DN ut $\frac{DEq \times PS}{PEq}$: erit vis qua corpusculum P a Sphæra tota attrahitur ut area $ABNA$.


Corol. 3. Si particularum vis centripeta sit reciproce ut cubus distantiae corpusculi a se attracti, & fiat DN ut $\frac{DEq \times PS}{PEqq}$: erit vis qua corpusculum a tota Sphæra attrahitur ut area $ABNA$.

Corol. 4. Et universaliter si vis centripeta ad singulas Sphæræ particulas tendens ponatur esse reciproce ut quantitas V , fiat autem DN ut $\frac{DEq \times PS}{PE \times V}$; erit vis qua corpusculum a Sphæra tota attrahitur ut area $ABNA$.

PROPOSITIO LXXXI. PROBLEMA XLI.

Stantibus jam positis, mensuranda est Area ABNA.

A puncto P ducatur recta PH Sphæram tangens in H , & ad axem PAB demissa normali HI , bisecetur PI in L ; & erit (per Prop. 12. Lib. 2. Elem.) PEq æquale $PSq + SEq + 2PSD$. Est autem SEq seu SHq (ob similitudinem triangulorum SPH , SHI) æquale rectangulo PSI . Ergo PEq æquale est contento sub PS & $PS + SI + 2SD$, hoc est, sub PS & $2LS + 2SD$, id est, sub PS & $2LD$. Porro $DEquad.$ æquale est $SEq - SDq$, seu $SEq - LSq + 2SLD - LDq$, id est, $2SLD - LDq - ALB$. Nam $LSq - SEq$ seu $LSq - SAq$



(per Prop. 6. Lib. 2. Elem.) æquatur rectangulo ALB . Scribatur itaque $2SLD - LDq - ALB$ pro DEq ; & quantitas $\frac{DEq \times PS}{PE \times V}$, quæ secundum Corollarium quartum Propositionis præcedentis est ut longitudo ordinatim applicatæ DN , resolvet sese in tres partes $\frac{2SLD \times PS}{PE \times V} - \frac{LDq \times PS}{PE \times V} - \frac{ALB \times PS}{PE \times V}$: ubi si pro V scribatur ratio inversa vis centripetæ, & pro PE medium proportionale inter PS & $2LD$; tres illæ partes evadent ordinatim applicatæ linearum totidem curvarum, quarum areae per Methodos vulgatas innotescunt. *Q.E.F.*

Ex.

Exempl. 1. Si vis centripeta ad singulas Sphæræ particulas tendens sit reciproce ut distantia; pro V scribe distantiam PE ; dein $2 PS \times LD$ pro PEq , & fiet DN ut $SL - \frac{1}{2} LD - \frac{ALB}{2 LD}$.


Pone DN æqualem duplo eius $2 SL - LD - \frac{ALB}{LD}$; & ordi-

nata pars data $2 SL$ ducta in longitudinem AB describet aream rectangulam $2 SL \times AB$; & pars indefinita LD ducta normaliter in eandem longitudinem per motum continuum, ea lege ut inter movendum crescendo vel decrecendo æquetur semper longitudini LD , describet aream $\frac{LBq - LAq}{2}$, id est, aream $SL \times AB$; quæ

subducta de area priore $2 SL \times AB$ relinquit aream $SL \times AB$.

Pars autem tertia $\frac{ALB}{LD}$ ducta itidem per motum localem norma-

liter in eandem longitudinem, describet aream Hyperbolicam; quæ subducta de area $SL \times AB$ relinquet aream quæsitam $ABNA$. Unde talis emergit Problematis constructio. Ad puncta L, A, B erige perpendiculara Ll, Aa, Bb , quorum Aa ipsi LB , & Bb ipsi LA æquetur. Asymptotis Ll, LB , per puncta a, b describatur Hyperbola ab . Et acta chorda ba claudet aream aba areæ quæsitæ $ABNA$ æqualem.



Exempl. 2. Si vis centripeta ad singulas Sphæræ particulas tendens sit reciproce ut cubus distantiae, vel (quod perinde est) ut cubus ille applicatus ad planum quodvis datum; scribe $\frac{PE cub.}{2 ASq}$ pro V ,

dein $2 PS \times LD$ pro PEq ; & fiet DN ut $\frac{SL \times ASq}{PS \times LD} - \frac{ASq}{2 PS}$

$-\frac{ALB \times ASq}{2 PS \times LDq}$, id est (ob continue proportionales PS, AS, SI)

ut $\frac{LSI}{LD} - \frac{1}{2} SI - \frac{ALB \times SI}{2 LDq}$. Si ducantur hujus partes tres in

longitudinem AB , prima $\frac{LSI}{LD}$ generabit aream Hyperboli-

cam;


cam;

DE MOTU
CORPORUM

cam; secunda $\frac{1}{2} SI$ aream $\frac{1}{2} AB \times SI$; tertia $\frac{ALB \times SI}{2LDq}$ are-

am $\frac{ALB \times SI}{2LA} - \frac{ALB \times SI}{2LB}$, id est $\frac{1}{2} AB \times SI$. De prima sub-

ducatur summa secundæ & tertiæ, & manebit area quæsita $ABNA$. Unde talis emergit Problematis constructio. Ad puncta L, A, S, B erige perpendiculara Ll, Aa, Ss, Bb , quorum Ss ipsi SI æquetur, perque punctum s Asymptotis Ll, LB describatur Hyperbola asb occurrens perpendicularis Aa, Bb in a & b ; & rectangulum ASl subductum de area Hyperbolica $Aasb$ relinquet aream quæsitam $ABNA$.



Exempl. 3. Si Vis centripeta, ad singulas Sphæræ particulas tendens, decrescit in quadruplicata ratione distantiae a particulis; scribe $\frac{PEqq}{2AScub}$ pro V , dein $\sqrt{2PS \times LD}$ pro PE , & fiet DN ut

$$\frac{SIq \times SL}{\sqrt{2SI} \times \sqrt{LDc}} - \frac{SIq}{2\sqrt{2SI} \times \sqrt{LD}} - \frac{SIq \times ALB}{2\sqrt{2SI} \times \sqrt{LDqc}}$$

Cujus tres partes ductæ in longitudinem AB , producant areas totidem, viz. $\frac{2SIq \times SL}{\sqrt{2SI} \text{ in } \sqrt{LA} - \sqrt{LB}}$; $\frac{SIq}{\sqrt{2SI} \text{ in } \sqrt{LB} - \sqrt{LA}}$;

& $\frac{SIq \times ALB}{3\sqrt{2SI} \text{ in } \sqrt{LA}^{cub} - \sqrt{LB}^{cub}}$. Et hæ post debitam reductionem fiunt $\frac{2SIq \times SL}{LI}$, SIq , & $SIq + \frac{2SIcub}{3LI}$. Hæ vero sub-

ductis posterioribus de priore, evadunt $\frac{4SIcub}{3LI}$. Igitur vis tota,

qua corpusculum P in Sphæræ centrum trahitur, est ut $\frac{SIcub}{PI}$ id est, reciproce ut $PS^{cub} \times PI$. Q.E.I.

Eadem Methodo determinari potest Attractio corpusculi siti intra Sphæram, sed expeditius per Theorema sequens.


PRO.

PROPOSITIO LXXXII. THEOREMA XLI.

LIBER
PRIMUS

In Sphæra centro S intervallo SA descripta, si capiantur SI, SA, SP continue proportionales: dico quod corpusculi intra Sphæram in loco quovis I attractio est ad attractionem ipsius extra Sphæram in loco P, in ratione composita ex subduplicata ratione distantiarum a centro IS, PS & subduplicata ratione virium centripetarum, in locis illis P & I, ad centrum tendentium.

Ut si vires centripetæ particularum Sphære sint reciproce ut distantie corpusculi a se attracti; vis, qua corpusculum situm in I trahitur a Sphæra tota, erit ad vim qua trahitur in P, in ratione



composita ex subduplicata ratione distantie SI ad distantiam SP & ratione subduplicata vis centripetæ in loco I, a particula aliqua in centro oriundæ, ad vim centripetam in loco P ab eadem in centro particula oriundam, id est, ratione subduplicata distantiarum SI, SP ad invicem reciproce. Hæ duæ rationes subduplicatæ componunt rationem æqualitatis, & propterea attractiones in I & P a Sphæra tota factæ æquantur. Simili computo, si vires particularum Sphære sunt reciproce in duplicata ratione distantiarum, colligetur quod attractio in I sit ad attractionem in P, ut distantia SP ad Sphære semidiametrum SA: Si vires illæ sunt reciproce in triplicata ratione distantiarum, attractiones in I & P erunt ad invicem

DE MOTU CORPORUM, cem ut SP quad. ad SA quad. Si in quadruplicata, ut SP cub. ad SA cub. Unde cum attractio in P , in hoc ultimo casu, inventa fuit reciproce ut PS cub. $\times PI$, attractio in I erit reciproce ut SA cub. $\times PI$, id est (ob datum SA cub.) reciproce ut PI . Et similis est progressus in infinitum. Theorema vero sic demonstratur.

Stantibus jam ante constructis, & existente corpore in loco quovis P , ordinatim applicata DN inventa fuit ut $\frac{DEq \times PS}{PE \times V}$

Ergo si agatur IE , ordinata illa ad alium quemvis locum I , mutatis mutandis, evadet ut $\frac{DEq \times IS}{IE \times V}$. Pone vires centripetas, e

Sphæræ puncto quovis E manantes, esse ad invicem in distantis IE , PE , ut PE^n ad IE^n , (ubi numerus n designet indicem potestatum PE & IE) & ordinatæ illæ fient ut $\frac{DEq \times PS}{PE \times PE^n}$ & $\frac{DEq \times IS}{IE \times IE^n}$, quarum ratio ad invicem est ut $PS \times IE \times IE^n$ ad $IS \times PE \times PE^n$. Quoniam ob similia triangula SPE , SEI , fit IE ad PE ut IS ad SE vel SA ; pro ratione IE ad PE scribe rationem IS ad SA ; & ordinarum ratio evadet $PS \times IE^n$ ad $SA \times PE^n$. Sed PS ad SA subduplicata est ratio distantiarum PS , SI ; & IE^n ad PE^n subduplicata est ratio virium in distantis PS , IS . Ergo ordinatæ, & propterea areæ quas ordinatæ describunt, hisque proportionales attractiones, sunt in ratione composita ex subduplicatis illis rationibus. $Q. E. D.$

PROPOSITIO LXXXIII. PROBLEMA XLII.

Invenire vim qua corpusculum in centro Sphæræ locatum ad ejus Segmentum quodcunque attrahitur.

Sit P corpus in centro Sphæræ, & $RBSD$ Segmentum ejus plano RDS & superficie Sphærica RBS contentum. Superficie Sphærica EFG centro P descripta secetur DB in F , ac distinguatur Segmentum in partes $BREFGS$, $FEDG$. Sit autem superficies illa non pure Mathematica, sed Physica, profunditatem habens quam minimam. Nominetur ista profunditas O ,

S E C T I O XIII.

De Corporum non Sphæricorum viribus attractivis.

PROPOSITIO LXXXV. THEOREMA XLII.

Si corporis attracti, ubi attrahenti contiguum est, attractio longe fortior sit, quam cum vel minimo intervallo separantur ab invicem: vires particularum trahentis, in recessu corporis attracti, decrescunt in ratione plusquam duplicata distantiarum a particulis.

Nam si vires decrescunt in ratione duplicata distantiarum a particulis; attractio versus corpus Sphæricum, propterea quod (per Prop. LXXIV.) sit reciproce ut quadratum distantiae attracti corporis a centro Sphærae, haud sensibilibiter augebitur ex contactu; atque adhuc minus augebitur ex contactu, si attractio in recessu corporis attracti decrescat in ratione minore. Patet igitur Propositio de Sphæris attractivis. Et par est ratio Orbium Sphæricorum concavorum corpora externa trahentium. Et multo magis res constat in Orbibus corpora interius constituta trahentibus, cum attractiones passim per Orbium cavitates ab attractionibus contrariis (per Prop. LXX.) tollantur, ideoque vel in ipso contactu nullæ sunt. Quod si Sphæris hisce Orbibusque Sphæricis partes quælibet a loco contactus remotæ auferantur, & partes novæ ubivis addantur: mutari possunt figuræ horum corporum attractivorum pro lubitu, nec tamen partes additæ vel subductæ, cum sint a loco contactus remotæ; augebunt notabiliter attractionis excessum qui ex contactu oritur. Constat igitur propositio de corporibus Figurarum omnium. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO LXXXVI. THEOREMA XLIII.

LIBER
PRIMUS.

Si particularum, ex quibus corpus attractivum componitur, vires in recessu corporis attracti decrescunt in triplicata vel plusquam triplicata ratione distantiarum a particulis: attractio longe fortior erit in contactu, quam cum attrahens & attractum intervallo vel minimo separantur ab invicem.

Nam attractionem in accessu attracti corpusculi ad hujusmodi Sphæram trahentem augeri in infinitum, constat per solutionem Problematis XLI, in Exemplo secundo ac tertio exhibitam. Idem, per Exempla illa & Theorema XLI. inter se collata, facile colligitur de attractionibus corporum versus Orbes concavo-convexos, sive corpora attracta collocentur extra Orbes, sive intra in eorum cavitatibus. Sed & addendo vel auferendo his Sphæris & Orbibus ubivis extra locum contactus materiam quamlibet attractivam, eo ut corpora attractiva induant figuram quamvis assignatam, constabit Propositio de corporibus universis. Q. E. D.

PROPOSITIO LXXXVII. THEOREMA XLIV.

Si corpora duo sibi invicem similia, & ex materia æqualiter attractiva constantia, seorsim attrahant corpuscula sibi ipsis proportionalia, & ad se similiter posita: attractiones acceleratrices corpusculorum in corpora tota erunt ut attractiones acceleratrices corpusculorum in eorum particulas totis proportionales & in totis similiter positas.

Nam si corpora distinguantur in particulas, quæ sint totis proportionales & in totis similiter sitæ; erit, ut attractio in particulam quamlibet unius corporis ad attractionem in particulam correspondentem in corpore altero, ita attractiones in particulas singulas primi corporis ad attractiones in alterius particulas singulas correspondentes; & componendo, ita attractio in totum primum corpus ad attractionem in totum secundum. Q. E. D.

Corol. I. Ergo si vires attractivæ particularum, augendo distantias corpusculorum attractorum, decrescant in ratione dignitatis

Bb

cujusvis


DE MOTU CULUSVIS distantiarum; attractiones acceleratrices in corpora tota e-
CORPORUM, runt ut corpora directe & distantiarum dignitates illæ inverse. Ut
si vires particularum decrescant in ratione duplicata distantiarum
a corpusculis attractis, corpora autem sint ut $A \text{ cub.}$ & $B \text{ cub.}$ ad-
eoque tum corporum latera cubica tum corpusculorum attractorum
distantiæ a corporibus, ut $A \& B$: attractiones acceleratrices in cor-
pora erunt ut $\frac{A \text{ cub.}}{A \text{ quad.}}$ & $\frac{B \text{ cub.}}{B \text{ quad.}}$ id est, ut corporum latera illa
cubica $A \& B$. Si vires particularum decrescant in ratione tripli-
cata distantiarum a corpusculis attractis; attractiones acceleratrices
in corpora tota erunt ut $\frac{A \text{ cub.}}{A \text{ cub.}}$ & $\frac{B \text{ cub.}}{B \text{ cub.}}$ id est, æquales. Si vi-
res decrescant in ratione quadruplicata; attractiones in corpora
erunt ut $\frac{A \text{ cub.}}{A \text{ qq.}}$ & $\frac{B \text{ cub.}}{B \text{ qq.}}$ id est, reciproce ut latera cubica $A \& B$.
Et sic in cæteris.

Corol. 2. Unde vicissim, ex viribus quibus corpora similia trahunt
corpuscula ad se similiter posita, colligi potest ratio decrementi vi-
rium particularum attractivarum in recessu corpusculi attracti: si
modo decrementum illud sit directe vel inverse in ratione aliqua
distantiarum.

PROPOSITIO LXXXVIII. THEOREMA XLV.

*Si particularum æqualium Corporis cujuscunque vires attrac-
tivæ sint ut distantie locorum a particulis: vis corporis
totius tendet ad ipsius centrum gravitatis; & eadem erit
cum vi Globi ex materia consimili & æquali constantis &
centrum habentis in ejus centro gravitatis.*

Corporis $RSTV$ particulæ A ,
 B trahant corpusculum aliquod
 Z viribus quæ, si particulæ æ-
quantur inter se, sint ut distan-
tiæ AZ , BZ ; si particulæ sta-
tuantur inæquales, sint ut hæ par-
ticulæ in distantias suas AZ , BZ
respective ductæ. Et exponantur
hæ vires per contenta illa $A \times AZ$
& $B \times BZ$. Jungatur AB , &
secetur ea in G ut sit AG ad BG ut particula B ad particulam A ;



&
fecetur ea in G ut sit AG ad BG ut particula B ad particulam A ;

& erit G commune centrum gravitatis particularum A & B . VIS LIBER PRIMUS.
 $A \times AZ$ (per Legum Corol. 2.) resolvitur in vires $A \times GZ$ & $A \times AG$, & vis $B \times BZ$ in vires $B \times GZ$ & $B \times BG$. Vires autem $A \times AG$ & $B \times BG$, ob proportionales A ad B & BG ad AG , æquantur; adeoque cum dirigantur in partes contrarias, se mutuo destruunt. Restant vires $A \times GZ$ & $B \times GZ$. Tendunt hæ ab Z versus centrum G , & vim $A+B \times GZ$ componunt; hoc est, vim eandem ac si particulæ attractivæ A & B consisterent in eorum communi gravitatis centro G , Globum ibi componententes.

Eodem argumento, si adjungatur particula tertia C , & componatur hujus vis cum vi $A+B \times GZ$ tendente ad centrum G ; vis inde oriunda tendet ad commune centrum gravitatis trium particularum A , B , C ; & eadem erit ac si Globus & particula C consisterent in centro illo communi, Globum majorem ibi componententes. Et sic pergitur in infinitum. Eadem est igitur vis tota particularum omnium corporis cujuscunque $RSTV$ ac si corpus illud, servato gravitatis centro, figuram Globi indueret. *Q. E. D.*

Corol. Hinc motus corporis attracti Z idem erit ac si corpus attrahens $RSTV$ esset Sphæricum; & propterea si corpus illud attrahens vel quiescat, vel progrediatur uniformiter in directum; corpus attractum movebitur in Ellipsi centrum habente in attrahentis centro gravitatis.

PROPOSITIO LXXXIX. THEOREMA XLVI.

Si Corpora sint plura ex particulis equalibus constantia, quarum vires sunt ut distantie locorum a singulis: vis ex omnium viribus composita, qua corpusculum quodcunque trahitur, tendet ad trahentium commune centrum gravitatis, & eadem erit ac si trahentia illa, servato gravitatis centro communi, coirent & in Globum formarentur.


Demonstratur eodem modo, atque Propositio superior.

Corol. Ergo motus corporis attracti idem erit ac si corpora trahentia, servato communi gravitatis centro, coirent & in Globum formarentur. Ideoque si corporum trahentium commune gravitatis centrum vel quiescit, vel progreditur uniformiter in linea recta: corpus attractum movebitur in Ellipsi, centrum habente in communi illo trahentium centro gravitatis.

PROPOSITIO XC. PROBLEMA XLIV.

Si ad singula Circuli cujuscunque puncta tendant vires æquales centripetæ, decreſcentes in quacunq; diſtantiarum ratione: invenire vim qua corpusculum attrahitur ubivoiſ poſitum in recta quæ plano Circuli ad centrum ejus perpendiculariter inſiſtit.

Centro *A* intervallo quovis *AD*, in plano cui recta *AP* perpendicularis eſt, deſcribi intelligatur Circulus; & ſinveniendâ ſit viſ qua corpusculum quodvis *P* in eundem attrahitur. A Circuli puncto quovis *E* ad corpusculum attractum *P* agatur recta *PE*: In recta *PA* capiatur *PF* ipſi *PE* æqualis, & erigatur normalis *FK*, quæ ſit ut viſ qua punctum *E* trahit corpusculum *P*. Sitque *IKL* curva linea quam punctum *K* perpetuo tangit. Occurrat eadem Circuli plano in *L*. In *PA* capiatur *PH* æqualis *PD*, & erigatur perpendicularum *HI* curvæ prædictæ occurrens in *I*; & erit corpusculi *P* attractio in Circulum ut area *AHIL* ducta in altitudinem *AP*. *Q.E.I.*



Etenim in *AE* capiatur linea quam minima *Ee*. Jungatur *Pe*; & in *PE*, *PA* capiantur *PC*, *Pf* ipſi *Pe* æquales. Et quoniam viſ, qua annuli centro *A* intervallo *AE* in plano prædicto deſcripti punctum quodvis *E* trahit ad ſe corpus *P*, ponitur eſſe ut *FK*, & inde viſ qua punctum illud trahit corpus *P* verſus *A* eſt ut $\frac{AP \times FK}{PE}$, & viſ qua annulus totus trahit corpus *P* verſus *A*,

ut annulus & $\frac{AP \times FK}{PE}$ conjunctim; annulus autem iſte eſt ut rectangulum ſub radio *AE* & latitudine *Ee*, & hoc rectangulum (ob proportionales *PE* & *AE*, *Ee* & *CE*) æquatur rectangulo *PE* \times *CE* ſeu *PE* \times *Ff*; erit viſ qua annulus iſte trahit corpus *P* verſus *A*; ut *PE* \times *Ff* & $\frac{AP \times FK}{PE}$ conjunctim, id eſt, ut contentum *Ff* \times *FK* \times *AP*, ſive ut area *FKkf* ducta in *AP*. Et propterea ſumma virium, quibus annuli omnes in Circulo, qui centro *A* & intervallo

tervallo AD describitur, trahunt corpus P versus A , est ut area tota $AHIKL$ ducta in AP . $\mathcal{Q}.E.D.$ LIBER PRIMUS.

Corol. 1. Hinc si vires punctorum decreseunt in duplicata distantiarum ratione, hoc est, si sit FK ut $\frac{1}{PF^2}$, atque adeo area $AHIKL$ ut $\frac{1}{PA} - \frac{1}{PH}$; erit attractio corpusculi P in Circulum ut $1 - \frac{PA}{PH}$, id est, ut $\frac{AH}{PH}$.


Corol. 2. Et universaliter, si vires punctorum ad distantias D sine reciproce ut distantiarum dignitas quælibet D^n , hoc est, si sit FK ut $\frac{1}{D^n}$, adeoque area $AHIKL$ ut $\frac{1}{PA^{n-1}} - \frac{1}{PH^{n-1}}$; erit attractio corpusculi P in Circulum ut $\frac{1}{PA^{n-2}} - \frac{PA}{PH^{n-1}}$.

Corol. 3. Et si diameter Circuli augeatur in infinitum, & numerus n sit unitate major; attractio corpusculi P in planum totum infinitum erit reciproce ut PA^{n-2} , propterea quod terminus alter $\frac{PA}{PH^{n-1}}$ evanescet.


PROPOSITIO XCI. PROBLEMA XLV.

Invenire attractionem corpusculi siti in axe Solidi rotundi, ad cujus puncta singula tendunt vires æquales centripetæ in quacunque distantiarum ratione decrescetes.

In Solidum $ADEFG$ trahatur corpusculum P , situm in ejus axe AB . Circuloquoque libet RFS ad hunc axem perpendiculari secetur hoc Solidum, & in ejus diametro FS , in plano aliquo $PALKB$ per axem transeunte, capiat (per Prop. xc.) longitudo FK vi qua corpusculum P in circulum illum attrahitur proportionalis. Tangat autem punctum K curvam lineam LKI , planis extimorum circulorum AL & BI occurrentem in L & I ; & erit attractio corpusculi P in Solidum ut area $LABI$. $\mathcal{Q}.E.D.$




DE MOTU *Corol. 1.* Unde si Solidum Cy-
 LINDRUS sit, parallelogrammo
ADEB circa axem *AB* revo-
 luto descriptus, & vires centri-
 petæ in singula ejus puncta ten-
 dentes sint reciproce ut quadra-
 ta distantiarum a punctis: erit
 attractio corpusculi *P* in hunc
 Cylindrum ut $AB - PE + PD$.
 Nam ordinatim applicata *EK*



(per *Corol. 1. Prop. xc.*) erit ut $1 - \frac{PF}{PR}$. Hujus pars 1 ducta in

longitudinem *AB*, describit aream $1 \times AB$; & pars altera $\frac{PF}{PR}$
 ducta in longitudinem *PB*, describit aream 1 in $PE - AD$ (id quod
 ex curvæ *LIK* quadratura facile ostendi potest:) & similiter pars
 eadem ducta in longitudinem *PA* describit aream 1 in $PD - AD$,
 ductaque in ipsarum *PB*, *PA* differentiam *AB*, describit arearum
 differentiam 1 in $PE - PD$. De contento primo $1 \times AB$ aufe-
 ratur contentum postremum 1 in $PE - PD$, & restabit area *LABI*
 æqualis 1 in $AB - PE + PD$. Ergo vis, huic areæ proportio-
 nalis, est ut $AB - PE + PD$.

Corol. 2. Hinc etiam
 vis innotescit qua Sphæ-
 rois *AGBCD* attrahit
 corpus quodvis *P*, exte-
 rius in axe suo *AB* si-
 tum. Sit *NKRM* Sec-
 tio Conica cujus ordi-
 natim applicata *ER*, ipsi
PE perpendicularis, æ-
 quetur semper longitu-
 dini *PD*, quæ ducitur
 ad punctum illud *D*, in




quo applicata ista Sphæroidem secat. A Sphæroidis verticibus *A, B*
 ad ejus axem *AB* erigantur perpendiculara *AK, BM* ipsis *AP, BP*
 æqualia respective, & propterea Sectioni Conicæ occurrentia in *K*
 & *M*; & jungatur *KM* auferens ab eadem segmentum *KMRK*.
 Sit autem Sphæroidis centrum *S* & semidiameter maxima *SC*: & vis
 qua

qua Sphærois trahit corpus P erit ad vim qua Sphæra, diametro AB descripta, trahit idem corpus, ut $\frac{AS \times CSq - PS \times KMRK}{PSq + CSq - ASq}$ LIBER
PRIMUS.

ad $\frac{AS \text{ cub.}}{3PS \text{ quad.}}$. Et eodem computandi fundamento invenire licet vires segmentorum Sphæroidis.

Corol. 3. Quod si corpusculum intra Sphæroidem, in data quavis ejusdem diametro, collocetur; attractio erit ut ipsius distantia a centro. Id quod facilius colligetur hoc argumento. Sit $AGOF$ Sphærois attrahens, S centrum ejus & P corpus attractum. Per corpus illud P agantur tum semidiameter SPA , tum rectæ duæ quævis DE , FG Sphæroidi hinc inde occurrentes in D & E , F & G : Sintque PCM , HLN superficies Sphæroidum duarum interiorum, exteriori similium & concentricarum, quarum prior transeat per corpus P & secet rectas DE & FG in B & C , posterior secet easdem rectas in H , I & K , L . Habeant autem Sphæroides omnes axem communem, & erunt rectarum partes hinc inde interceptæ DP & BE , FP & CG , DH & IE , FK & LG sibi mutuo æquales; propterea quod rectæ DE , PB & HI bifecantur in eodem puncto, ut & rectæ FG , PC & KL . Concipe jam DPF , EPG designare Conos oppositos, angulis verticalibus DPF , EPG infinite parvis descriptos, & lineas etiam DH , EI infinite parvas esse; & Conorum particulæ Sphæroidum superficiebus abscissæ $DHKE$, $GLIE$, ob æqualitatem linearum DH , EI , erunt ad invicem ut quadrata distantiarum suarum a corpusculo P , & propterea corpusculum illud æqualiter trahent. Et pari ratione, si superficiebus Sphæroidum innumerarum similium concentricarum & axem communem habentium dividantur spatia DPF , $EGCB$ in particulas, hæ omnes utrinque æqualiter trahent corpus P in partes contrarias. Æquales igitur sunt vires Coni DPF & segmenti Conici $EGCB$, & per contrarietatem se mutuo destruunt. Et par est ratio virium materiæ omnis extra Sphæroidem intimam $PCBM$. Trahitur igitur corpus P a sola Sphæroide intima $PCBM$, & propterea (per Corol. 3. Prop. LXXII.) attractio ejus est ad vim, qua corpus A trahitur a Sphæroide tota $AGOD$, ut distantia PS ad distantiam AS . *Q. E. D.*



PRO-

PROPOSITIO XCII. PROBLEMA XLVI.


Dato Corpore attractivo, invenire rationem decrementi virium centripetarum in ejus puncta singula tendentium.

E Corpore dato formanda est Sphæra vel Cylindrus aliave figura regularis, cujus lex attractionis, cuius decrementi rationi congruens (per Prop. LXXX, LXXXI, & XCI.) inveniri potest. Dein factis experimentis invenienda est vis attractionis in diversis distantis, & lex attractionis in totum inde patefacta dabit rationem decrementi virium partium singularum, quam invenire oportuit.

PROPOSITIO XCIII. THEOREMA XLVII.

Si Solidum ex una parte planum, ex reliquis autem partibus infinitum, constet ex particulis æqualibus æqualiter attractivis, quarum vires in recessu a Solido decrescunt in ratione potestatis cujusvis distantiarum plusquam quadraticæ, & vi Solidi totius corpusculum ad utramvis plani partem constitutum trahatur: dico quod Solidi vis illa attractiva, in recessu ab ejus superficie plana, decrescet in ratione potestatis, cujus latus est distantia corpusculi a plano, & Index ternario minor quam Index potestatis distantiarum.

Cas. I. Sit GLI planum quo Solidum terminatur. Jaceat Solidum autem ex parte plani hujus versus I , inque plana innumera mHM, nIN , &c. ipsi GL parallela resolvatur. Et primo collocetur corpus attractum C extra Solidum. Agatur autem $CGHI$ planis illis innumeris perpendicularis, & decrescant vires attractivæ punctorum Solidi in ratione potestatis distantiarum, cujus index sit numerus n ternario non minor. Ergo (per Corol. 3. Prop. xc.)



vis qua planum quodvis mHM trahit punctum C est reciproce ut CH^{n-2} . In plano mHM capiatur longitudo HM ipsi CH^{n-2} reciproce proportionalis, & erit vis illa ut HM . Similiter in planis singulis IGL , nIN , oKO , &c. capiantur longitudines GL , IN , KO , &c. ipsis CG^{n-2} , CI^{n-2} , CK^{n-2} , &c. reciproce proportionales; & vires planorum eorundem erunt ut longitudines captæ, adeoque summa virium ut summa longitudinum, hoc est, vis Solidi totius ut area $GLOK$ in infinitum versus OK producta. Sed area illa (per notas quadraturarum methodos) est reciproce ut CG^{n-3} , & propterea vis Solidi totius est reciproce ut CG^{n-3} . *Q. E. D.*

Cas. 2. Collocetur jam corpusculum C ex parte plani IGL intra Solidum, & capiatur distantia CK æqualis distantiæ CG . Et Solidi pars $LGLKO$, planis parallelis IGL , oKO terminata, corpusculum C in medio situm nullam in partem trahet, contrariis oppositorum punctorum actionibus se mutuo per æqualitatem tollentibus, Proinde corpusculum C sola vi Solidi ultra planum OK siti trahitur. Hæc autem vis (per Casum primum) est reciproce ut CK^{n-3} , hoc est (ob æquales CG , CK) reciproce ut CG^{n-3} . *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc si Solidum $LGIN$ planis duobus infinitis parallelis LG , IN utrinque terminetur, innotescit ejus vis attractiva, subducendo de vi attractiva Solidi totius infiniti $LCKO$ vim attractivam partis ulterioris $NIKO$, in infinitum versus KO productæ.

Corol. 2. Si Solidi hujus infiniti pars ulterior, quando attractio ejus collata cum attractione partis citerioris nullius pene est momenti, rejiciatur: attractio partis illius citerioris augendo distantiam decrescet quam proxime in ratione potestatis CG^{n-3} .

Corol. 3. Et hinc si corpus quodvis finitum & ex una parte planum trahat corpusculum e regione medii illius plani, & distantia inter corpusculum & planum collata cum dimensionibus corporis attrahentis perexigua sit, constet autem corpus attrahens ex particulis homogeneis, quarum vires attractivæ decrescunt in ratione potestatis cujusvis plusquam quadruplicatæ distantiarum; vis attractiva corporis totius decrescet quamproxime in ratione potestatis, cujus latus sit distantia illa perexigua, & Index ternario minor quam Index potestatis prioris. De corpore ex particulis constante, quarum vires attractivæ decrescunt in ratione potestatis triplicatæ distantiarum, assertio non valet; propterea quod, in hoc casu, attractio partis illius ulterioris corporis infiniti in Corollario secundo, semper est infinite major quam attractio partis citerioris.

Cc

Scholium.

Si corpus aliquod perpendiculariter versus planum datum trahatur, & ex data lege attractionis quærat motus corporis: Solvetur Problema quærendo (per Prop. xxxix.) motum corporis recta descendentis ad hoc planum, & (per Legum Corol. 2.) componendo motum istum cum uniformi motu, secundum lineas eidem plano parallelas factæ. Et contra, si quærat Lex attractionis in planum secundum lineas perpendiculares factæ, ea conditione ut corpus attractum in data quacunque curva linea moveatur, solvetur Problema operando ad exemplum Problematis tertii.

Operationes autem contrahi solent resolvendo ordinatim applicatas in Series convergentes. Ut si ad basem A in angulo quovis dato ordinatim applicetur longitudo B, quæ sit ut basis dignitas quælibet $A^{\frac{m}{n}}$; & quærat vis qua corpus, secundum positionem ordinatim applicatæ, vel in basem attractum vel a basi fugatum, moveri possit in curva linea quam ordinatim applicata termino suo superiore semper attingit: Suppono basem augeri parte quam minima O, & ordinatim applicatam $A + O$ $\frac{m}{n}$ resolvo in Seriem infinitam $A^{\frac{m}{n}} + \frac{m}{n} O A^{\frac{m-n}{n}} + \frac{m(m-n)}{2nn} OOA^{\frac{m-2n}{n}}$ &c. atque hujus termino in quo O duarum est dimensionum, id est, termino $\frac{m(m-n)}{2nn} OOA^{\frac{m-2n}{n}}$ vim proportionalem esse suppono. Est

igitur vis quæsitæ ut $\frac{m(m-n)}{nn} A^{\frac{m-2n}{n}}$, vel quod perinde est, ut $\frac{m(m-n)}{nn} B^{\frac{m-2n}{m}}$. Ut si ordinatim applicata Parabolam attingat,

existente $m = 2$, & $n = 1$: fiet vis ut data $2 B^0$, adeoque dabitur. Data igitur vi corpus movebitur in Parabola, quemadmodum *Galileus* demonstravit. Quod si ordinatim applicata Hyperbolam attingat, existente $m = 0 - 1$, & $n = 1$; fiet vis ut $2 A^{-3}$ seu $2 B^3$: adeoque vi, quæ sit ut cubus ordinatim applicatæ, corpus movebitur in Hyperbola. Sed missis hujusmodi Propositionibus, pergo ad alias quasdam de Motu, quas nondum attigi.

S E C T I O XIV.


LIBER
PRIMUS.

De Motu corporum minimorum, quæ Viribus centripetis ad singulas magni alicujus corporis partes tendentibus agitantur.

PROPOSITIO XCIV. THEOREMA XLVIII.

Si Media duo similaria, spatio planis parallelis utrinque terminato, distinguantur ab invicem, & corpus in transitu per hoc spatium attrahatur vel impellatur perpendiculariter versus Medium alterutrum, neque ulla alia vi agitetur vel impediatur: Sit autem attractio, in æqualibus ab utroque plano distantibus ad eandem ipsius partem capitis, ubique eadem: dico quod sinus incidentiæ in planum alterutrum erit ad sinum emergentiæ ex plano altero in ratione data.

Cas. 1. Sunto Aa , Bb plana duo parallela. Incidat corpus in planum prius Aa secundum lineam GH , actoto suo per spatium intermedium transitu attrahatur vel impellatur versus Medium incidentiæ eaque actione describat lineam curvam HI , & emergat secundum lineam IK . Ad planum emergentiæ Bb erigatur perpendicularum IM , occurrens tum lineæ incidentiæ GH productæ in M , tum plano incidentiæ Aa in R ; & linea emergentiæ KI producta occurrat HM in L . Centro L intervallo LI describatur Circulus, secans



singulis separatim uniformis, ac in diversis diversa, & Per jam demonstrata, sinus incidentiæ in planum primum Aa erit ad LIBR PRIMUS.
 sinum emergentiæ ex plano secundo Bb , in data ratione; & hic sinus, qui est sinus incidentiæ in planum secundum Bb , erit ad sinum emergentiæ ex plano tertio Cc , in data ratione; & hic sinus ad sinum emergentiæ ex plano quarto Dd , in data ratione, & sic in infinitum: & ex æquo, sinus incidentiæ in planum primum ad sinum emergentiæ ex plano ultimo in data ratione. Minuantur jam planorum intervalla & augeatur numerus in infinitum, eo. ut attractionis vel impulsus actio, secundum legem quamcunque assignatam, continua reddatur; & ratio sinus incidentiæ in planum primum ad sinum emergentiæ ex plano ultimo, semper data existens, etiamnum dabitur. Q. E. D.

PROPOSITIO XCV. THEOREMA XLIX.


Iisdem positis; dico quod velocitas corporis ante incidentiam est ad ejus velocitatem post emergentiam, ut sinus emergentiæ ad sinum incidentiæ.

Capiantur AH , Id æquales, & erigantur perpendiculara AG , dK occurrentia lineis incidentiæ & emergentiæ GH , IK , in G & K . In GH capiatur TH æqualis IK , & ad planum Aa demittatur normaliter Tv . Et (per Legum Corol. 2.) distinguatur motus corporis in duos, unum planis Aa , Bb , Cc , &c. perpendiculararem, alterum iisdem parallelum. Vis attractionis vel impulsus, agendo secundum lineas perpendiculares, nil mutat motum secundum parallelas, & propterea corpus hoc motu conficiet æqualibus temporibus æqualia illa secundum parallelas intervalla, quæ sunt inter lineam AG & punctum H , interque punctum I & lineam dK ; hoc est, æqualibus temporibus describet lineas GH , IK . Proinde velocitas ante incidentiam est ad velocitatem post emergentiam, ut GH ad IK vel TH , id est, ut AH vel Id ad vH , hoc est (respectu radii TH vel IK) ut sinus emergentiæ ad sinum incidentiæ. Q. E. D.

PROPOSITIO XCVI. THEOREMA L.

Iisdem positis & quod motus ante incidentiam velocior sit quam postea : dico quod corpus, inclinando lineam incidentiæ, reflectetur tandem, & angulus reflexionis fiet æqualis angulo incidentiæ.


Nam concipe corpus inter parallela plana Aa , Bb , Cc , &c. describere arcus Parabolicos, ut supra; sintque arcus illi HP , PQ , QR , &c. Et sit ea lineæ incidentiæ GH obliquitas ad planum primum Aa , ut sinus incidentiæ sit ad radium circuli, cujus est sinus, in ea ratione quam habet idem sinus incidentiæ ad sinum emergentiæ ex plano Dd , in spatium $DdeE$: & ob sinum emergentiæ jam factum æqualem radio, angulus emergentiæ erit rectus, adeoque linea emergentiæ coincidit cum plano Dd . Perveniat corpus ad hoc planum in puncto R ; & quoniam linea emergentiæ coincidit cum eodem plano, perspicuum est quod corpus non potest ultra pergere versus planum Ee . Sed nec potest idem pergere in lineam emergentiæ Rd , propterea quod perpetuo attrahitur vel impellitur versus Medium incidentiæ. Revertetur itaque inter plana Cc , Dd , describendo arcum Parabolæ QRq , cujus vertex principalis (juxta demonstrata *Galilæi*) est in R ; secabit planum Cc in eodem angulo in q , ac prius in Q ; dein pergendo in arcubus parabolicis qp , pb , &c. arcubus prioribus QP , PH similibus & æqualibus secabit reliqua plana in iisdem angulis in p , b , &c. ac prius in P , H , &c. emergetque tandem eadem obliquitate in b , qua incidit in H . Concipe jam planorum Aa , Bb , Cc , Dd , Ee , &c. intervalla in infinitum minui & numerum augeri, eo ut actio attractionis vel impulsus secundum legem quamcunque assignatam continua reddatur; & angulus emergentiæ semper angulo incidentiæ æqualis existens, eidem etiamnum manebit æqualis. *Q. E. D.*



Scholium.

Scholium.

Harum attractionum haud multum dissimiles sunt Lucis reflexiones & refractiones, factæ secundum datam Secantium rationem, ut invenit *Snellius*, & per consequens secundum datam Sinuum rationem, ut exposuit *Cartesius*. Namque Lucem successive propagari & spatio quasi septem vel octo minorum primorum a Sole ad Terram venire, jam constat per Phænomena Satellitum *Jovis*, Observationibus diversorum Astronomorum confirmata. Radii autem in aere existentes (uti dudum *Grimaldus*, luce per foramen in tenebrosū cubiculum admissa, invenit, & ipse quoque expertus sum) in transitu suo prope corporum vel opacorum vel perspicuorum angulos (quales sunt nummorum ex auro, argento & ære cuforum termini rectanguli circulares, & cultrorum, lapidum aut fractorum vitrorum acies) incurvantur circum corpora, quasi attracti in eadem: & ex his radiis, qui in transitu illo propius accedunt ad corpora incurvantur magis, quasi magis attracti, ut ipse etiam diligenter observavi. In figura designat s aciem cultri vel cunei cujusvis *AsB*; & *gowog*, *fnunf*, *emtme*, *dlsld*, sunt radii, arcubus *owo*, *nun*, *mtm*, *lsl* versus cultrum incurvati; idque magis vel minus pro distantia eorum a cultro. Cum autem talis incurvatio radiorum fiat in aere extra cultrum, debent etiam radii, qui incidunt in cultrum, prius incurvari in aere quam cultrum attingunt. Et par est ratio incidentium in vitrum. Fit igitur refraction, non in puncto incidentiæ, sed paulatim per continuam incurvationem radiorum, factam partim in aere antequam attingunt vitrum, partim (ni fallor) in vitro, postquam illud ingressi sunt: uti in radiis *ckzkc*, *bivib*, *abxha* incidentibus ad *r*, *q*, *p*, & inter *k* & *z*, *i* & *y*, *b* & *x* incurvatis, delineatum est. Igitur ob analogiam quæ est inter propagationem radiorum lucis & progressum corporum, visum est Propositiones sequentes in usus Opticos subungere; interea de natura radiorum (utrum sint corpora necne) nihil omnino disputans, sed Trajectorias corporum Trajectoriis radiorum persimiles solummodo determinans.




PROPO.

PROPOSITIO XCVII. PROBLEMA XLVII.

Posito quod sinus incidentiæ in superficiem aliquam sit ad sinum emergentiæ in data ratione, quodque incurvatio viæ corporum juxta superficiem illam fiat in spatio brevissimo, quod ut punctum considerari possit; determinare superficiem quæ corpuscula omnia de loco dato successive manantia convergere faciat ad alium locum datum.

Sit A locus a quo corpuscula divergunt; B locus in quem convergere debent; CDE curva linea quæ circa axem AB revoluta describat superficiem quæsitam; D, E curvæ illius puncta duo quævis; & EF, EG perpendicularia in corporis vias AD, DB demissa. Accedat punctum D ad punctum E ; & lineæ DF qua AD augeatur, ad lineam DG qua DB diminuitur, ratio ultima erit eadem quæ sinus incidentiæ ad sinum emergentiæ. Datur ergo ratio in-




crementi lineæ AD ad decrementum lineæ DB ; & propterea si in axe AB sumatur ubivis punctum C , per quod curva CDE transire debet, & capiatur ipsius AC incrementum CM , ad ipsius BC decrementum CN in data illa ratione; centrisque A, B , & intervallis AM, BN describantur circuli duo se mutuo secantes in D : punctum illud D tanget curvam quæsitam CDE , eandemque ubivis tangendo determinabit. *Q. E. I.*

Corol. i. Faciendo autem ut punctum A vel B nunc abeat in infinitum, nunc migret ad alteras partes puncti C , habebuntur Figuræ illæ omnes quas *Cartesius* in Optica & Geometria ad Refractiones exposuit. Quarum inventionem cum *Cartesius* maximi fecerit & studiose celaverit, visum fuit hac propositione exponere.

Corol.

Corol. 2. Si corpus in superficie quamvis CD , secundum lineam rectam AD lege quavis ductam incidens, emergat secundum aliam quamvis rectam DK , & a puncto C duci intelligantur Lineæ curvæ CP , CQ ipsi AD DK semper perpendiculares: erunt incrementa linearum PD , QD , atque adeo lineæ ipsæ PD , QD , incrementis istis genitæ, ut sinus incidentiæ & emergentiæ ad invicem: & contra.



PROPOSITIO XCVIII. PROBLEMA XLVIII.

*Isdem positis, & circa axem AB descripta superficie quacun-
que attractiva CD, regulari vel irregulari, per
quam corpora de loco dato A exeuntia transire debent;
invenire superficiem secundam attractivam EF, quæ cor-
pora illa ad locum datum B convergere faciat.*


Juncta AB secet superficiem primam in C & secundam in E , puncto D utcumque assumpto. Et posito sinu incidentiæ in superficiem primam ad sinum emergentiæ ex eadem, & sinu emergentiæ e superficiem secunda ad sinum incidentiæ in eandem, ut quantitas aliqua data M ad aliam datam N ; produc tum AB ad G ut sit BG ad CE ut $M-N$ ad N , tum AD ad H ut sit AH æqualis AG , tum etiam DF ad K ut sit DK ad DH ut N ad M . Junge KB , & centro D intervallo DH describe circulum occurrentem KB , productæ in L , ipsique DL parallelam age BF : & punctum F tanget lineam EF , quæ circa axem AB revoluta describet superficiem quæsitam. *Q. E. F.*

Nam concipe Lineas CP , CQ ipfis AD , DF respective, & Lineas ER , ES ipfis FB , FD ubique perpendiculares esse, adeoque QS ipfi CE semper æqualem; & erit (per Corol. 2. Prop. xcvii.) PD ad QD ut Mad N , adeoque ut dL ad dK vel FB ad FK ;

Dd &

DE MOTU
CORPORUM

& dividim ut $DL-FB$ seu $PH-PD-FB$ ad FD seu $FQ-QD$;
& composite ut $PH-FB$ ad FQ , id est (ob æquales PH &
 CG , QS & CE) CE
 $+ BG-FR$ ad $CE-FS$. Verum (ob propor-
tionales BG ad CE &
 $M-N$ ad N) est etiam
 $CE+BG$ ad CE ut M
ad N : adeoque dividim
 FR ad FS ut M ad N ,
& propterea (per Corol.
2. Prop. xcvii) superfi-
cies EF cogit corpus,
in ipsam secundum lineam DF incidens, pergere in linea FR ad
locum B . Q . E . D .



Scholium.

Eadem methodo pergere liceret ad superficies tres vel plures. Ad
usus autem Opticos maxime accommodatæ sunt figuræ Sphæricæ.
Si Perspicillorum vitra Objectiva ex vitris duobus sphærice figura-
tis & Aquam inter se cludentibus conflentur; fieri potest ut a
refractionibus Aquæ errores refractionum, quæ sunt in vitrorum
superficiebus extremis, satis accurate corrigantur. Talia autem
vitra Objectiva vitris Ellipticis & Hyperbolicis præferenda sunt,
non solum quod facilius & accuratius formari possint, sed etiam
quod Penicillos radiorum extra axem vitri sitos accuratius refrin-
gant. Verum tamen diversa diverforum radiorum Refrangibilitas
impedimento est, quo minus Optica per Figuras vel Sphæricas vel
alias quascunque perfici possit. Nisi corrigi possint errores illinc
oriundi, labor omnis in cæteris corrigendis imperite collocabitur.

D E

MOTU CORPORUM

LIBER SECUNDUS.

S E C T I O I.

*De Motu Corporum quibus resistitur in ratione
Velocitatis.*

PROPOSITIO I. THEOREMA I.

Corporis, cui resistitur in ratione velocitatis, motus ex resis-
sistentia amissus est ut spatium movendo confectum.

NAm cum motus singulis temporis particulis æqualibus amissus sit ut velocitas, hoc est, ut itineris confecti particula: erit, componendo, motus toto tempore amissus ut iter totum. *Q. E. D.*

Corol. Igitur si corpus, gravitate omni destitutum, in spatiis liberis sola vi insita moveatur; ac detur tum motus totus sub initio, tum etiam motus reliquus post spatium aliquod confectum: dabitur spatium totum quod corpus infinito tempore describere potest. Erit enim spatium illud ad spatium jam descriptum, ut motus totus sub initio ad motus illius partem amissam.

L E M M A I.

Quantitatis differentiis suis proportionales, sunt continue proportionales.

Sit A ad A—B ut B ad B—C & C ad C—D, &c. & dividendo fiet A ad B ut B ad C & C ad D, &c. *Q. E. D.*

Dd 2

PRO-


PROPOSITIO II. THEOREMA II.

Si Corpori resistitur in ratione velocitatis, & idem sola vi insita per Medium simile moveatur, sumantur autem tempora æqualia: velocitates in principiis singulorum temporum sunt in progressionem Geometricam, & spatia singulis temporibus descripta sunt ut velocitates.

Cas. 1. Dividatur tempus in particulas æquales; & si ipsis particularum initiis agat vis resistentiæ impulso unico, quæ sit ut velocitas: erit decrementum velocitatis singulis temporis particulis ut eadem velocitas. Sunt ergo velocitates differentiis suis proportionales, & propterea (per Lem. 1. Lib. II.) continue proportionales. Proinde si ex æquali particularum numero componantur tempora quælibet æqualia, erunt velocitates ipsis temporum initiis, ut termini in progressionem continua, qui per saltum capiuntur, omisso passim æquali terminorum intermediarum numero. Componuntur autem horum terminorum rationes ex æqualibus rationibus terminorum intermediarum æqualiter repetitis, & propterea sunt æquales. Igitur velocitates, his terminis proportionales, sunt in progressionem Geometricam. Minuantur jam æquales illæ temporum particularæ, & augeatur earum numerus in infinitum, eo ut resistentiæ impulsus reddatur continuus; & velocitates in principiis æqualium temporum, semper continue proportionales, erunt in hoc etiam casu continue proportionales. *Q. E. D.*

Cas. 2. Et divisim velocitatum differentiæ, hoc est, earum partes singulis temporibus amissæ, sunt ut totæ: Spatia autem singulis temporibus descripta sunt ut velocitatum partes amissæ, (per Prop. 1. Lib. II.) & propterea etiam ut totæ. *Q. E. D.*

Corol. Hinc si Asymptotis rectangulis *ADC*, *CH* deferibatur Hyperbola *BG*, sintque *AB*, *DG* ad Asymptoton *AC* perpendiculares, & exponatur tum corporis velocitas tum resistentia Medii, ipso motus initio, per lineam quamvis datam *AC*, elapso autem tempore aliquo per lineam indefinitam *DC*: exponi potest tempus per aream *ABGD*, & spatium eo tempore descriptum per lineam *AD*. Nam si area illa per motum puncti *D* augeatur uniformiter ad modum tempo-




ris,

ris, decreſcet recta DC in ratione Geometrica ad modum veloci-
tatis, & partes rectæ AC æqualibus temporibus deſcriptæ decreſ-
cent in eadem ratione. LIBER
SECUNDUS


PROPOSITIO III. PROBLEMA I.

*Corporis, cui dum in Medio ſimilaris recta aſcendit vel deſcen-
dit, reſiſtitur in ratione velocitatis, quodque ab uniformi
gravitate urgetur, deſignare motum.*

Corpore aſcendente, expo-
natur gravitas per datum quod-
vis rectangulum BC , & reſi-
ſtentia Medii initio aſcenſus per
rectangulum $B'D$ ſumptum ad
contrarias partes. Aſymptotis
rectangulis AC, CH , per punctum
 B deſcribatur Hyperbola
fecans perpendiculara DE, de in
 G, g ; & corpus aſcendendo,
tempore $DGgd$, deſcribet ſpatium $EGge$, tempore $DGBA$
ſpatium aſcenſus totius EGB ; tempore AB_2G_2D ſpatium de-
ſcenſus BF_2G , atque tempore $2D_2G_2g_2d$ ſpatium deſcenſus
 $2GF_2eg$; & velocitates corporis (reſiſtentia Medii proportiona-
les) in horum temporum periodis erunt $ABED, ABed$, nulla,
 ABF_2D, AB_2e_2d reſpective; atque maxima velocitas, quam
corpus deſcendendo poteſt acquirere, erit BC .



Reſolvatur enim rectan-
gulum AH in rectangula
innumera Ak, Kl, Lm, Mn ,
&c. quæ ſint ut incrementa
velocitatum æqualibus toti-
dem temporibus facta; &
erunt nihil, Ak, Al, Am, An ,
&c. ut velocitates totæ, at-
que adeo (per Hypotheſin)
ut reſiſtentia Medii princi-
pio ſingulorum temporum
æqualium. Fiat AC ad AK vel $ABHC$ ad $ABkK$, ut vis gra-
vitatís ad reſiſtentiam in principio temporis ſecundi, deque vi gravi-
tatis



De Motu tatis subducantur resistantiæ, & manebunt *ABHC*, *KkHC*, *LlHC*,
CORPORUM, *Nn HC*, &c. ut vires absolutæ quibus corpus in principio singulo-
 rum temporum urgetur, atque adeo (per motus Legem 11) ut in-
 crementa velocitatum, id est, ut rectangula *Ak*, *Kl*, *Lm*, *Mn*, &c;
 & propterea (per Lem. 1. Lib. 11.) in progressione Geometrica. Qua-
 re si rectæ *Kk*, *Ll*, *Mm*, *Nn*, &c. productæ occurrant Hyperbolæ
 in *q*, *r*, *s*, *t*, &c. erunt areæ *ABqK*, *KqrL*, *LrsM*, *MstN*, &c.
 æquales, adeoque tum temporibus tum viribus gravitatis semper
 æqualibus analogæ. Est autem area *ABqK* (per Corol. 3. Lem. VII
 & Lem. VIII. Lib. 1.) ad aream *Bkq* ut *Kq* ad $\frac{1}{2}kq$ seu *AC* ad $\frac{1}{2}AK$,
 hoc est, ut vis gravitatis ad resistantiam in medio temporis primi.

Et simili argumento areæ
qKLr, *rLMs*, *sMNt*, &c.

sunt ad areas *qklr*, *rlms*,

smnt, &c. ut vires gravi-

tatis ad resistantias in me-

dio temporis secundi, ter-

tii, quarti, &c. Proinde

cum areæ æquales *BAKq*,

qKLr, *rLMs*, *sMNt*,

&c. sint viribus gravitatis

analogæ, erunt areæ *Bkq*,

qklr, *rlms*, *smnt*, &c.


resistentiis in mediis singulorum tem-
 porum, hoc est (per Hypothesin) velocitatibus, atque adeo descriptis
 spatiis analogæ. Sumantur analogarum summæ, & erunt areæ *Bkq*,
Blr, *Bms*, *Bnt*, &c. spatiis totis descriptis analogæ; necnon areæ
ABqK, *ABrL*, *ABsM*, *ABtN*, &c. temporibus. Corpus
 igitur inter descendendum, tempore quovis *ABrL*, describit spa-
 tium *Blr*, & tempore *Lrtu* spatium *rlnt*. Q. E. D. Et simili-
 lis est demonstratio motus expositi in ascensu. Q. E. D.

Corol. 1. Igitur velocitas maxima, quam corpus cadendo potest
 acquirere, est ad velocitatem dato quovis tempore acquisitam, ut
 vis data gravitatis qua perpetuo urgetur, ad vim resistantiæ qua in
 fine temporis illius impeditur.

Corol. 2. Tempore autem aucto in progressione Arithmetica, sum-
 ma velocitatis illius maximæ ac velocitatis in ascensu (atque etiam
 earundem differentia in descensu) decrescit in progressione Geo-
 metrica.

Corol. 3. Sed & differentiæ spatiorum, quæ in æqualibus tem-
 porum differentiis describuntur, decrescunt in eadem progressione
 Geometrica.

Corol.




Corol. 4. Spatium vero a corpore descriptum differentia est duorum spatiorum, quorum alterum est ut tempus sumptum ab initio descensus, & alterum ut velocitas, quæ etiam ipso descensus initio æquantur inter se. LIBER
SECUNDUS.

PROPOSITIO IV. PROBLEMA II.

Posito quod vis gravitatis in Medio aliquo simili uniformis sit, ac tendat perpendiculariter ad planum Horizontis; definire motum Projectilis in eodem, resistantiam velocitatis proportionalem patientis.

E loco quovis D egrediatur Projectile secundum lineam quamvis rectam DP , & per longitudinem DP exponatur ejusdem velocitas sub initio motus. A puncto P ad lineam Horizontalem DC demittatur perpendicularum PC , & secetur DC in A ut sit DA ad AC ut resistantia Medii, ex motu in altitudinem sub initio orta, ad vim gravitatis; vel (quod perinde est) ut sit rectangulum sub DA & DP ad rectangulum sub AC & CP ut resistantia tota sub initio motus ad vim gravitatis. Asymptotis DC , CP , describatur Hyperbola quævis $GTBS$ secans perpendiculara DG , AB in G & B ; & compleatur parallelogrammum $DGKC$, cujus latus GK fecet AB in Q . Capiatur linea N in ratione ad QB qua DC fit ad CP ; & ad rectæ DC punctum quodvis R erecto perpendicularo RT , quod Hyperbolæ in T , & rectis EH , GK , DP



in I , t & V occurrat; in eo cape Vr æqualem $\frac{tGT}{N}$, vel quod perinde

Corol. 1. Est igitur Rr æqualis $\frac{DR \times AB}{N} - \frac{RDGT}{N}$, ideo LIBER
SECUNDUS.

que si producat RT ad X ut sit RX æqualis $\frac{DR \times AB}{N}$, (id est, si compleatur parallelogrammum $ACPT$, jungatur DT secans CP in Z , & producat RT donec occurrat DT in X ;) erit Xr æqualis $\frac{RDGT}{N}$, & propterea tempori proportionalis.

Corol. 2. Unde si capiantur innumeræ CR vel, quod perinde est, innumeræ ZX , in progressionem Geometricam; erunt totidem Xr in progressionem Arithmeticam. Et hinc Curva $DraF$ per tabulam Logarithmorum facile delineatur.

Corol. 3. Si vertice D , diametro DE deorsum producta, & Latere recto quod sit ad $2DP$ ut resistentia tota, ipso motus initio, ad vim gravitatis, Parabola construat: velocitas quacum corpus exire debet de loco D secundum rectam DP , ut in Medio uniformi resistente describat Curvam $DraF$, ea ipsa erit quacum exire debet de eodem loco D , secundum eandem rectam DP , ut in spatio non resistente describat Parabolam. Nam Latus rectum Parabolæ hujus, ipso motus initio, est $\frac{DV \text{ quad.}}{Vr}$ & Vr est

$\frac{tGT}{N}$ seu $\frac{DR \times Tt}{2N}$. Recta autem quæ, si duceretur, Hyperbolam GTB tangeret in G , parallela est ipsi DK , ideoque Tt est $\frac{CK \times DR}{DC}$ & N erat $\frac{QB \times DC}{CP}$. Et propterea Vr est

$\frac{DRq \times CK \times CP}{2DCq \times QB}$, id est, (ob proportionales DR & DC , DV

& DP) $\frac{DVq \times CK \times CP}{2DPq \times QB}$, & Latus rectum $\frac{DV \text{ quad.}}{Vr}$ prodit

$\frac{2DPq \times QB}{CK \times CP}$, id est (ob proportionales QB & CK , DA & AC)

$\frac{2DPq \times DA}{AC \times CP}$ adeoque ad $2DP$, ut $DP \times DA$ ad $CP \times AC$;

hoc est, ut resistentia ad gravitatem. $Q. E. D.$

Corol. 4. Unde si corpus de loco quovis D , data cum velocitate, secundum rectam quamvis positione datam DP projiciatur; & resistentia Medii ipso motus initio detur: inveniri potest Curva $DraF$, quam corpus idem describet. Nam ex data velocitate

Ee

datur

tione qualibet, & exponatur ratio illa per longitudinem quamvis *SM*. Deinde per computationem, ex longitudine illa assumpta LIBER
SECUNDUS

DP, inveniantur longitudines *DF*, *Df*, ac de ratione $\frac{Ff}{DF}$ per

calculum inventa, auferatur ratio eadem per experimentum inventa, & exponatur differentia per perpendicularum *MN*. Idem fac iterum ac tertio, assumendo semper novam resistantiæ ad gravitatem rationem *SM*, & colligendo novam differentiam

MN. Ducantur autem differentiæ affirmativæ ad unam partem rectæ *SM*, & negativæ ad alteram; & per puncta *N*, *N*, *N* agatur curva regularis *NNN* secans rectam *SM* in *X*, & erit *SX* vera ratio resistantiæ ad gravitatem, quam invenire oportuit. Ex hac ratione colligenda est longitudo *DF* per calculum; & longitudo quæ sit ad assumptam longitudinem *DP*, ut longitudo *DF* per experimentum cognita ad longitudinem *DF* modo inventam, erit vera longitudo *DP*. Qua inventa, habetur tum Curva linea *DraF* quam corpus describit, tum corporis velocitas & resistantia in locis singulis.



Scholium.

Cæterum resistantiam corporum esse in ratione velocitatis, Hypothesis est magis Mathematica quam Naturalis. Obtinet hæc ratio quamproxime ubi corpora in Mediis rigore aliquo præditis tardissime moventur. In Mediis autem quæ rigore omni vacant resistantiæ corporum sunt in duplicata ratione velocitatum. Etenim actione corporis velocioris communicatur eidem Medii quantitati, tempore minore, motus major in ratione majoris velocitatis; adeoque tempore æquali (ob majorem Medii quantitatem perturbatam) communicatur motus in duplicata ratione major; estque resistantia (per motus Legem II & III.) ut motus communicatus. Videamus igitur quales oriuntur motus ex hac lege Resistentiæ.


S E C T I O II.

*De motu Corporum quibus resistitur in duplicata ratione
Velocitatum.*

PROPOSITIO V. THEOREMA III.

*Si Corpori resistitur in velocitatis ratione duplicata, & idem
sola vi insita per Medium simile movetur; tempora ve-
ro sumantur in progressionē Geometrica a minoribus ter-
minis ad majores pergente: dico quod velocitates initio sin-
gulorum temporum sunt in eadem progressionē Geometrica
inverse, & quod spatia sunt æqualia quæ singulis tempo-
ribus describuntur.*

Nam quoniam quadrato velocita-
tis proportionalis est resistentia Me-
dii, & resistentiæ proportionale est
decrementum velocitatis; si tempus
in particulas innumeras æquales di-
vidatur, quadrata velocitatum sin-
gulis temporum initiis erunt velo-
citatum earundem differentiis pro-
portionalia. Sinto temporis particu-
læ illæ AK, KL, LM &c. in recta
 CD sumptæ, & erigantur perpen-
dicula AB, Kk, Ll, Mm , &c. Hy-
perbolæ $BklmG$, centro C Asymptotis rectangulis CD, CH descrip-
tæ, occurrentia in B, k, l, m , &c. & erit AB ad Kk ut CK ad CA , &
divisim $AB - Kk$ ad Kk ut AK ad CA , & vicissim $AB - Kk$ ad
 AK ut Kk ad CA , adeoque ut $AB \times Kk$ ad $AB \times CA$. Unde,
cum AK & $AB \times CA$ dentur erit $AB - Kk$ ut $AB \times Kk$; & ultimo,
ubi coeunt AB & Kk ut ABg . Et simili argumento erunt $Kk - Ll$,
 $Ll - Mm$, &c. ut Kkq, Llq , &c. Linearum igitur AB, Kk, Ll, Mm
qua-



quadrata sunt ut earundem differentia; & idcirco cum quadrata
 velocitatum fuerint etiam ut ipsarum differentia, similis erit am-
 barum progressio. Quo demonstrato, consequens est etiam ut
 areae his lineis descriptae sint in progressione consimili cum spatiis
 quae velocitatibus describuntur. Ergo si velocitas initio primi
 temporis AK exponatur per lineam AB , & velocitas initio se-
 cundi KL per lineam Kk , & longitudo primo tempore descripta
 per aream $AKkB$; velocitates omnes subsequentes exponantur
 per lineas subsequentes Ll, Mm , &c. & longitudines descriptae per
 areas Kl, Lm , &c. Et compositae, si tempus totum exponatur per
 summam partium suarum AM , longitudo tota descripta expone-
 tur per summam partium suarum $AMmB$. Concipe jam tempus
 AM ita dividi in partes AK, KL, LM , &c. ut sint $CA, CK,$
 CL, CM , &c. in progressione Geometrica; & erunt partes illae
 in eadem progressione, & velocitates AB, Kk, Ll, Mm , &c.
 in progressione eadem inversa, atque spatia descripta $Ak, Kl,$
 Lm , &c. aequalia. Q. E. D.

Corol. 1. Patet ergo quod, si tempus exponatur per Asymptoti-
 partem quamvis AD , & velocitas in principio temporis per ordi-
 natam applicatam AB , velocitas in fine temporis exponatur per ordi-
 natam DG , & spatium totum descriptum per aream Hyperboli-
 cam adjacentem $ABGD$; necnon spatium quod corpus aliquod
 eodem tempore AD , velocitate prima AB , in Medio non resi-
 stente describere posset, per rectangulum $AB \times AD$.

Corol. 2. Unde datur spatium in Medio resistente descriptum,
 capiendū illud ad spatium quod velocitate uniformi AB in medio
 non resistente simul describi posset, ut est area Hyperbolica
 $ABGD$ ad rectangulum $AB \times AD$.

Corol. 3. Datur etiam resistentia Medii, statuendo eam ipso mo-
 tus initio aequalem esse vi uniformi centripetae, quae in cadente
 corpore, tempore AC , in Medio non resistente, generare posset
 velocitatem AB . Nam si ducatur BT quae tangat Hyperbolam
 in B , & occurrat Asymptoto in T ; recta AT aequalis erit ipsi AC ,
 & tempus exponet quo resistentia prima uniformiter continuata tol-
 lere posset velocitatem totam AB .

Corol. 4. Et inde datur etiam proportio hujus resistentiae ad
 vim gravitatis aliamve quamvis datam vim centripetam.


Corol. 5. Et viceversa, si datur proportio resistentiae ad datam
 quamvis vim centripetam, datur tempus AC , quo vis centripeta
 resistentiae aequalis generare possit velocitatem quamvis AB ; & in-

DE MOTU de datur punctum B per quod Hyperbolæ, Asymptotis CH , CD ,
CORPORUM, describi debet; ut & spatium $ABGD$, quod corpus incipiendo
motum suum cum velocitate illa AB , tempore quovis AD , in
Medio similari resistente describere potest.

PROPOSITIO VI. THEOREMA IV.

Corpora Sphærica homogenea & equalia, resistentiis in duplicata ratione velocitatum impedita, & solis viribus initis incitata, temporibus quæ sunt reciproce ut velocitates sub initio, describunt semper equalia spatia, & amittunt partes velocitatum proportionales totis.

Asymptotis rectangulis CD , CH descripta Hyperbola quavis $BbEe$ secante perpendicularia AB , ab , DE , de , in B , b , E , e , exponantur velocitates initiales per perpendicularia AB , DE , & tempora per lineas Aa , Dd . Est ergo ut Aa ad Dd ita (per Hypothesin) DE ad AB , & ita (ex natura Hyperbolæ) Ca ad Cd ; & componendo, ita Ca ad Cd . Ergo areæ $ABba$, $DEed$, hoc est, spatia descripta æquantur inter se, & velocitates primæ AB , DE sunt ultimis ab , de , & propterea (dividendo) partibus etiam suis amissis $AB-ab$, $DE-de$ proportionales. Q. E. D.



PROPOSITIO VII. THEOREMA V.

Corpora Sphærica quibus resistitur in duplicata ratione velocitatum, temporibus quæ sunt ut motus primi directe & resistentiæ primæ inverse, amittent partes motuum proportionales totis, & spatia descripta temporibus istis in velocitates primas ductis proportionalia.

Namque motuum partes amissæ sunt ut resistentiæ & tempora
con-

conjunctim. Igitur ut partes illæ sint totis proportionales, debet resistētia & tempus conjunctim esse ut motus. Proinde tempus erit ut motus directē & resistētia inversē. Quare temporum particulis in ea ratione sumptis, corpora amittent semper particulas motuum proportionales totis, adeoque retinebunt velocitates in ratione prima. Et ob datam velocitatum rationem, describent semper spatia quæ sunt ut velocitates primæ & tempora conjunctim.

Q. E. D.

Corol. 1. Igitur si æquivelocibus corporibus resistitur in duplicata ratione diametrorum: Globi homogenei quibuscunque cum velocitatibus moti, describendo spatia diametris suis proportionalia, amittent partes motuum proportionales totis. Motus enim Globi cujusque erit ut ejus velocitas & Massa conjunctim, id est, ut velocitas & cubus diametri; resistētia (per Hypothesin) erit ut quadratum diametri & quadratum velocitatis conjunctim; & tempus (per hanc Propositionem) est in ratione priore directē & ratione posteriore inversē, id est, ut diameter directē & velocitas inversē; adeoque spatium (tempori & velocitati proportionale) est ut diameter.

Corol. 2. Si æquivelocibus corporibus resistitur in ratione sesquialtera diametrorum: Globi homogenei quibuscunque cum velocitatibus moti, describendo spatia in sesquialtera ratione diametrorum, amittent partes motuum proportionales totis.

Corol. 3. Et universaliter, si æquivelocibus corporibus resistitur in ratione dignitatis cujuscunque diametrorum: spatia quibus Globi homogenei, quibuscunque cum velocitatibus moti, amittent partes motuum proportionales totis, erunt ut cubi diametrorum ad dignitatem illam applicati. Sunt diametri D & E : & si resistentiæ, ubi velocitates æquales ponuntur, sint ut D^n & E^n : spatia quibus Globi, quibuscunque cum velocitatibus moti, amittent partes motuum proportionales totis; erunt ut D^{3-n} & E^{3-n} . Igitur describendo spatia ipsis D^{3-n} & E^{3-n} proportionalia, retinebunt velocitates in eadem ratione ad invicem ac sub initio.

Corol. 4. Quod si Globi non sint homogenei, spatium a Globo densiore descriptum augeri debet in ratione densitatis. Motus enim, sub pari velocitate, major est in ratione densitatis, & tempus (per hanc propositionem) augetur in ratione motus directē, ac spatium descriptum in ratione temporis.

Corol.

DE MOTU
CORPORUM,

Corol. 5. Et si Globi moveantur in Mediis diversis; spatium in Medio, quod cæteris paribus magis resistit, diminuendum erit in ratione majoris resistentiæ. Tempus enim (per hanc Propositionem) diminuetur in ratione resistentiæ auctæ, & spatium in ratione temporis.

L E M M A II.

Momentum Genitæ æquatur Momentis laterum singulorum generantium in eorundem laterum indices dignitatum & coefficientia continue ductis.

Genitam voco quantitatem omnem quæ ex lateribus vel terminis quibuscunque, in Arithmetica per multiplicationem, divisionem, & extractionem radicum; in Geometria per inventionem vel contentorum & laterum, vel extremarum & mediarum proportionalem, absque additione & subductione generatur. Ejusmodi quantitates sunt Facti, Quoti, Radices, Rectangula, Quadrata, Cubi, Latera quadrata, Latera cubica, & similes. Has quantitates ut indeterminatas & instabiles, & quasi motu fluxuve perpetuo crescentes vel decrecentes, hic considero; & earum incrementa vel decrementa momentanea sub nomine Momentorum intelligo: ita ut incrementa pro momentis additiis seu affirmativis, ac decrementa pro subductiis seu negativis habeantur. Cave tamen intellexeris particulas finitas. Particulæ finitæ non sunt momenta, sed quantitates ipsæ ex momentis genitæ. Intelligenda sunt principia jamjam nascentia finitarum magnitudinum. Neque enim spectatur in hoc Lemmate magnitudo momentorum, sed prima nascentium proportio. Eodem recidit si loco momentorum usurpentur vel velocitates incrementorum ac decrementorum, (quas etiam motus, mutationes & fluxiones quantitatum nominare licet) vel finitæ quævis quantitates velocitatibus hisce proportionales. Lateris autem cujusque generantis Coefficientis est quantitas, quæ oritur applicando Genitam ad hoc latus.

Igitur sensus Lemmatis est, ut, si quantitatum quarumcunque perpetuo motu crescentium vel decrescientium A, B, C , &c. momenta, vel mutationum velocitates dicantur a, b, c , &c. momentum vel mutatio geniti rectanguli AB fuerit $aB + bA$, & geniti contenti ABC momentum fuerit $aBC + bAC + cAB$: & genitarum digni-

dignitatum $A^1, A^2, A^3, A^{\frac{1}{2}}, A^{\frac{3}{2}}, A^{\frac{1}{3}}, A^{\frac{2}{3}}, A^{-1}, A^{-2},$ & $A^{-\frac{1}{2}}$ momenta

$2aA, 3aA^2, 4aA^3, \frac{1}{2}aA^{-\frac{1}{2}}, \frac{3}{2}aA^{\frac{1}{2}}, \frac{1}{3}aA^{-\frac{2}{3}}, \frac{2}{3}aA^{-\frac{1}{3}}, -aA^{-2},$

$-2aA^{-3},$ & $-\frac{1}{2}aA^{-\frac{3}{2}},$ respective. Et generaliter, ut dignitatis

cujuscunque $A^{\frac{n}{m}}$ momentum fuerit $\frac{n}{m}aA^{\frac{n-m}{m}}$. Item ut Genitæ

A^2B momentum fuerit $2aAB + bA^2$; & Genitæ $A^2B^2C^2$ momen-

tum $3aA^2B^2C^2 + 4bA^2B^2C^2 + 2cA^2B^2C^2$; & Genitæ $\frac{A^2}{B^2}$ five

A^2B^{-2} momentum $3aA^2B^{-2} - 2bA^2B^{-3}$; & sic in cæteris. De-

monstratur vero Lemma in hunc modum.

Caf. 1. Rectangulum quodvis motu perpetuo auctum AB , ubi de lateribus A & B deerant momentorum dimidia $\frac{1}{2}a$ & $\frac{1}{2}b$, fuit $A - \frac{1}{2}a$ in $B - \frac{1}{2}b$, seu $AB - \frac{1}{2}bA - \frac{1}{2}aB$; & quam primum latera A & B alteris momentorum dimidiis aucta sunt, evadit $A + \frac{1}{2}a$ in $B + \frac{1}{2}b$ seu $AB + \frac{1}{2}aB + \frac{1}{2}bA + \frac{1}{4}ab$. De hoc rectangulo subducatur rectangulum prius, & manebit excessus $aB + bA$. Igitur laterum incrementis totis a & b generatur rectanguli incrementum $aB + bA$. *Q. E. D.*

Caf. 2. Ponatur AB semper æquale G , & contenti ABC seu GC momentum (per *Caf. 1.*) erit $gC + cG$, id est (si pro G & g scribantur AB & $aB + bA$) $aBC + bAC + cAB$. Et par est ratio contenti sub lateribus quocunque. *Q. E. D.*

Caf. 3. Ponantur latera A, B, C sibi mutuo semper æqualia; & ipsius A^2 , id est rectanguli AB , momentum $aB + bA$ erit $2aA$, ipsius autem A^3 , id est contenti ABC , momentum $aBC + bAC + cAB$ erit $3aA^2$. Et eodem argumento momentum dignitatis cujuscunque A^n est naA^{n-1} . *Q. E. D.*

Caf. 4. Unde cum $\frac{1}{A}$ in A sit 1 , momentum ipsius $\frac{1}{A}$ ductum in A , una cum $\frac{1}{A}$ ducto in a erit momentum ipsius 1 , id est, nihil. Proinde momentum ipsius $\frac{1}{A}$ seu ipsius A^{-1} est $-\frac{a}{A^2}$. Et ge-

neraliter cum $\frac{1}{A^n}$ in A^n sit 1 , momentum ipsius $\frac{1}{A^n}$ ductum in A^n

DE MOTU
CORPORUM. una cum $\frac{1}{A^n}$ in $n a A^{n-1}$ erit nihil. Et propterea momentum ip-
sius $\frac{1}{A^n}$ seu A^{-n} erit $-\frac{n a}{A^{n+1}}$. *Q. E. D.*

Caf. 5. Et cum $A^{\frac{1}{2}}$ in $A^{\frac{3}{2}}$ fit A , momentum ipsius $A^{\frac{1}{2}}$ ductum in
 $2 A^{\frac{1}{2}}$ erit a , per *Caf. 3*: ideoque momentum ipsius $A^{\frac{1}{2}}$ erit $\frac{a}{2 A^{\frac{1}{2}}}$
five $\frac{1}{2} a A^{-\frac{1}{2}}$. Et generaliter si ponatur $A^{\frac{m}{n}}$ æquale B , erit A^m æ-
quale B^n , ideoque $m a A^{m-1}$ æquale $n b B^{n-1}$, & $m a A^{-1}$ æquale
 $n b B^{-1}$ seu $n b A^{-\frac{m}{n}}$, adeoque $\frac{m}{n} a A^{\frac{m-n}{n}}$ æquale b , id est, æquale
momento ipsius $A^{\frac{m}{n}}$. *Q. E. D.*

Caf. 6. Igitur Genitæ cujuscunque $A^m B^n$ momentum est mo-
mentum ipsius A^m ductum in B^n , una cum momento ipsius B^n duc-
to in A^m , id est $m a A^{m-1} B^n$, + $n b B^{n-1} A^m$; idque five dignita-
tum indices m & n sint integri numeri vel fracti, five affirmativi
vel negativi. Et par est ratio contenti sub pluribus dignitatibus.
Q. E. D.

Corol. 1. Hinc in continue proportionalibus, si terminus unus
datur, momenta terminorum reliquorum erunt ut iidem termini
multiplicati per numerum intervallorum inter ipsos & terminum
datum. Sunt A, B, C, D, E, F , continue proportionales; & si
detur terminus C , momenta reliquorum terminorum erunt inter
se ut $-2 A, -B, D, 2 E, 3 F$.

Corol. 2. Et si in quatuor proportionalibus duæ mediæ dentur,
momenta extremarum erunt ut eadem extremæ. Idem intelligen-
dum est de lateribus rectanguli cujuscunque dati.

Corol. 3. Et si summa vel differentia duorum quadratorum de-
tur, momenta laterum erunt reciproce ut latera.

Scholium.

In Literis quæ mihi cum Geometra peritissimo *G. G. Leibnitio* an-
nis abhinc decem intercedebant, cum significarem me compotem
esse methodi determinandi Maximas & Minimas, ducendi Tangen-
tes, & similia peragendi, quæ in terminis surdis æque ac in ratio-
nalibus procederet, & literis transpositis hanc sententiam involven-
tibus


tibus [*Data Equatione quotcunque Fluentes quantitates involvente, Fluxiones invenire, & vice versa*] eandem celarem : rescripsit Vir Clarissimus se quoque in ejusmodi methodum incidisse, & methodum suam communicavit a mea vix abludentem præterquam in verborum & notarum formulis, & Idea generationis quantitatum. Utriusque fundamentum continetur in hoc Lemmate.

PROPOSITIO VIII. THEOREMA VI.

Si corpus in Medio uniformi, Gravitate uniformiter agente, recta ascendat vel descendat, & spatium totum descriptum distinguatur in partes æquales, inque principiis singularum partium (addendo resistantiam Medii ad vim gravitatis, quando corpus ascendit, vel subducendo ipsam quando corpus descendit) colligantur vires absolutæ; dico quod vires illæ absolutæ sunt in progressione Geometrica.

Exponatur enim vis gravitatis per datam lineam AC ; resistantia per lineam indefinitam AK ; vis absoluta in descensu corporis per differentiam KC ; velocitas corporis per lineam AP (quæ sit media proportionalis inter AK & AC , ideoque in subduplicata ratione resistantiæ;) incrementum resistantiæ data temporis particula factum per lineolam KL , & contemporaneum velocitatis incrementum per lineolam PQ ; & centro C Asymptotis rectangulis CA , CH describatur Hyperbola quævis BNS , erectis perpendicularis AB , KN , LO , PR , QS occurrens in B , N , O , R , S . Quoniam AK est ut AP^2 , erit hujus momentum KL ut illius momentum $2 APQ$, id est, ut AP in KC . Nam velocitatis incrementum PQ , (per motus Leg. II.) proportionale est vi generanti KC . Componatur ratio ipsius KL , cum ratione ipsius KN , & fiet rectangulum $KL \times KN$ ut $AP \times KC \times KN$, hoc est, ob datum rectangulum $KC \times KN$, ut AP . Atqui area Hyperbolica $KNOL$ ad rectangulum $KL \times KN$ ratio ultima, ubi coeunt puncta K & L , est æqualitatis. Ergo area illa Hyperbolica evanescens est ut AP . Componitur igitur area tota Hyperbolica $ABOL$ ex particulis $KNOL$ velocitati AP semper proportionalibus, & propterea spatium velocitate ista descripto proportionalis est. Dividatur jam area illa in partes æquales $ABMI$, $IMNK$, $KNOL$, &c. & vi-

DE MOTU res absolutæ AC , IC , KC , LC , &c. erunt in progressionē Geo-
 CORPORUM, metrica. Q. E. D. Et simili argumento, in ascensu corporis, su-
 mendo, ad contrariam partem puncti A , æquales areas $ABmi$,
 $imnk$, $knol$, &c. constabit quod vires absolutæ AC , iC , kC , lC ,
 &c. sunt continue proportionales. Ideoque si spatia omnia in ascen-
 su & descensu capiantur æqualia; omnes vires absolutæ IC , kC , iC ,
 AC , IC , KC , LC , &c. erunt continue proportionales. Q. E. D.



Corol. 1. Hinc si spatium descriptum exponatur per aream Hyperbolicam $ABNK$; exponi possunt vis gravitatis, velocitas corporis & resistentia Medii per lineas AC , AP & AK respective; & vice versa.

Corol. 2. Et velocitatis maximæ, quam corpus in infinitum descendendo potest unquam acquirere, exponens est linea AC .

Corol. 3. Igitur si in data aliqua velocitate cognoscatur resistentia Medii, inveniatur velocitas maxima, sumendo ipsam ad velocitatem

tatem illam datam in subduplicata ratione, quam habet vis Gravitatis ad Medii resistentiam illam cognitam. L I B E R
S E C U N D U S

PROPOSITIO IX. THEOREMA VII.

Positis jam demonstratis, dico quod si Tangentes angulorum sectoris Circularis & sectoris Hyperbolici sumantur velocitatibus proportionales, existente radio justæ magnitudinis: erit tempus omne ascensus futuri ut sector Circuli, & tempus omne descensus præteriti ut sector Hyperbolæ.

Rectæ AC , qua vis gravitatis exponitur, perpendicularis & æqualis ducatur AD . Centro D semidiametro AD describatur tum Circuli quadrans AtE , tum Hyperbola rectangulæ AVZ axem habens AX , verticem principalem A & Asymptoton DC . Jungantur Dp , DP , & erit sector Circularis AtD ut tempus ascensus omnis futuri; & sector Hyperbolicus ATD ut tempus descensus omnis præteriti. Si modo sectorum Tangentes Ap , AP sint ut velocitates.

Cas. I. Agatur enim Dvq abscindens sectoris ADt & trianguli ADp momenta, seu particulas quam minimas simul descriptas tDv & pDq . Cum particulae illæ, ob angulum communem D , sunt in duplicata ratione laterum, erit particula tDv ut qDp Sed pD quad. est AD quad. + Ap quad. id est, pD quad.

AD quad. + $AD \times Ak$ seu $AD \times Ck$; & qDp est $\frac{1}{2} AD \times pq$. Ergo sectoris particula tDv est ut $\frac{pq}{Ck}$, id est, ut velocitatis de-

crementum quam minimum pq directe & vis illa Ck quæ velocitatem diminuit inverse, atque adeo ut particula temporis decremento respondens. Et componendo fit summa particularum omnium tDv in sectore ADt , ut summa particularum temporis singulis velocitatis decrefcentis Ap particulis amissis pq respondentium, usque dum velocitas illa in nihilum diminuta evanuerit; hoc est, sector totus ADt est ut ascensus totius futuri tempus. *Q. E. D.*

PQ generantur, ut summa particularum sectoris ATD , id est, LIBER
SECUNDUS.
tempus totum ut sector totus. $Q. E. D.$

Corol. 1. Hinc si AB æquetur quartæ parti ipsius AC , spatium quod corpus tempore quovis cadendo describit, erit ad spatium quod corpus velocitate maxima AC , eodem tempore uniformiter progrediendo describere potest, ut area $ABNK$, qua spatium cadendo descriptum exponitur, ad aream ATD qua tempus exponitur. Nam cum sit AC ad AP ut AP ad AK , erit (per *Corol. 1. Lem. 11.* hujus) LK ad PQ ut AK ad AP , hoc est, ut $2 AP$ ad AC , & inde LK ad $\frac{1}{2} PQ$ ut AP ad ($\frac{1}{2} AC$ vel) AB ; est & KN ad (AC vel) AD ut AB ad CK ; itaque ex æquo LKN ad DPQ ut AP ad CK . Sed erat DPQ ad DTV ut CK ad AC . Ergo rursus ex æquo LKN est ad DTV ut AP ad AC ; hoc est, ut velocitas corporis cadentis ad velocitatem maximam quam corpus cadendo potest acquirere. Cum igitur arearum $ABNK$ & ATD momenta LKN & DTV sunt ut velocitates, erunt arearum illarum partes omnes simul genitæ ut spatia simul descripta, ideoque areæ totæ ab initio genitæ $ABNK$ & ATD ut spatia tota ab initio descensus descripta. $Q. E. D.$

Corol. 2. Idem consequitur etiam de spatio quod in ascensu describitur. Nimirum quod spatium illud omne sit ad spatium, uniformi cum velocitate AC eodem tempore descriptum, ut est area $ABnk$ ad sectorem ADt .

Corol. 3. Velocitas corporis tempore ATD cadentis est ad velocitatem, quam eodem tempore in spatio non resistente acquireret, ut triangulum APD ad sectorem Hyperbolicum ATD . Nam velocitas in Medio non resistente foret ut tempus ATD , & in Medio resistente est ut AP , id est, ut triangulum APD . Et velocitates illæ initio descensus æquantur inter se, perinde ut areæ illæ ATD , APD .

Corol. 4. Eodem argumento velocitas in ascensu est ad velocitatem, qua corpus eodem tempore in spatio non resistente omnem suum ascendendi motum amittere posset, ut triangulum ApD ad sectorem Circularem AtD ; sive ut recta Ap ad arcum At .

Corol. 5. Est igitur tempus quo corpus in Medio resistente cadendo velocitatem AP acquirit, ad tempus quo velocitatem maximam AC in spatio non resistente cadendo acquirere posset, ut sector ADT ad triangulum ADC ; & tempus, quo velocitatem Ap in Medio

DE MOTU
CORPORUM.

Medio resistente ascendendo possit amittere, ad tempus quo velocitatem eandem in spatio non resistente ascendendo posset amittere, ut arcus At ad ejus tangentem Ap .


Corol. 6. Hinc ex dato tempore datur spatium ascensu vel descensu descriptum. Nam corporis in infinitum descendentis datur velocitas maxima, per *Corol. 2, & 3, Theor. VI, Lib II*; indeque datur tempus quo corpus velocitatem illam in spatio non resistente cadendo posset acquirere. Et sumendo Sectorem ADT vel ADt ad triangulum ADC in ratione temporis dati ad tempus modo inventum; dabitur tum velocitas AP vel Ap , tum area $ABNK$ vel $ABnk$, quæ est ad sectorem ADT vel ADt ut spatium quæsitum ad spatium quod tempore dato, cum velocitate illa maxima jam ante inventa, uniformiter describi potest.

Corol. 7. Et regrediendo, ex dato ascensus vel descensus spatio $ABnk$ vel $ABNK$, dabitur tempus ADt vel ADT .

PROPOSITIO X. PROBLEMA III.

Tendat uniformis vis gravitatis directe ad planum Horizontis, sitque resistentia ut Medii densitas & quadratum velocitatis conjunctim: requiritur tum Medii densitas in locis singulis, quæ faciat ut corpus in data quavis linea curva moveatur, tum corporis velocitas & Medii resistentia in locis singulis.

Sit PQ planum illud plano Schematis perpendiculari; $PFHQ$ linea curva plano huic occurrens in punctis P & Q ; G, H, I, K loca quatuor corporis in hac curva ab F ad Q pergentis; & GB, HC, ID, KE ordinatæ quatuor parallelæ ab his punctis ad horizontem



demissæ & lineæ horizontali PQ ad puncta B, C, D, E insistentes; & sint BC, CD, DE distantie Ordinarum inter se æquales. A punctis G & H ducantur rectæ GL, HN curvam tangentes in G & H , & Ordinatis CH, DI sursum productis occurrentes in L & N , & compleatur parallelogrammum $HCDM$. Et

Et tempora quibus corpus describit arcus GH , HI , erunt in subduplicata ratione altitudinum LH , NI quas corpus temporibus illis describere possit, a tangentibus cadendo: & velocitates erunt ut longitudines descriptæ GH , HI directe & tempora inverse. Exponentur tempora per T & t , & velocitates per $\frac{GH}{T}$ & $\frac{HI}{t}$: & decrementum velocitatis tempore t factum ex-

ponetur per $\frac{GH}{T} - \frac{HI}{t}$. Hoc decrementum oritur a resistentia

corpus retardante & gravitate corpus accelerante. Gravitatis in corpore cadente & spatium NI cadendo describente, generat velocitatem qua duplum illud spatium eodem tempore describi potuisset (ut *Galileus* demonstravit) id est, velocitatem $\frac{2NI}{t}$: at

in corpore arcum HI describente, auget arcum illum sola longitudine $HI - HN$ seu $\frac{MI \times NI}{HI}$, ideoque generat tantum veloci-

tatem $\frac{2MI \times NI}{t \times HI}$. Addatur hæc velocitas ad decrementum præ-

dictum, & habebitur decrementum velocitatis ex resistentia sola oriundum, nempe $\frac{GH}{T} - \frac{HI}{t} + \frac{2MI \times NI}{t \times HI}$. Proindeque cum

gravitas eodem tempore in corpore cadente generet velocitatem $\frac{2NI}{t}$; Resistentia erit ad Gravitatem ut $\frac{GH}{T} - \frac{HI}{t} + \frac{2MI \times NI}{t \times HI}$

ad $\frac{2NI}{t}$, five ut $\frac{t \times GH}{T} - HI + \frac{2MI \times NI}{HI}$ ad $2NI$.

Jam pro abscissis CB , CD , CE scribantur $-a, 0, 2a$. Pro Ordinata CH scribatur P , & pro MI scribatur series quælibet $Q_0 + R_{00} + S_0^3 + \&c$. Et seriei termini omnes post primum, nempe $R_{00} + S_0^3 + \&c$. erunt NI , & Ordinatæ DI , EK , & BG erunt $P - Q_0 - R_{00} - S_0^3 - \&c$, $P - 2Q_0 - 4R_{00} - 8S_0^3 - \&c$, & $P + Q_0 - R_{00} + S_0^3 - \&c$. respective. Et quadrando differentias Ordinarum $BG - CH$ & $CH - DI$, & ad quadrata prodeuntia addendo quadrata ipsarum BC , CD , habebuntur arcuum GH , HI quadrata $00 + QQ_{00} - 2QR_0^3 + \&c$; & $00 + QQ_{00} + 2QR_0^3 + \&c$. Quorum radices $0\sqrt{1+QQ} - \frac{QR_{00}}{\sqrt{1+QQ}}$, &

Gg

$0\sqrt{1+}$

DE MOTU
CORPORUM

0 $\sqrt{I+QQ} + \frac{QR_{00}}{\sqrt{I+QQ}}$ sunt arcus GH & HI . Præterea si ab

Ordinata CH subducatur semisumma Ordinarum BG ac DI , & ab Ordinata DI subducatur semisumma Ordinarum CH & EK , manebunt arcuum GI & HK sagittæ R_{00} & $R_{00} + 3S_0^2$. Et hæ sunt lineolis LH & NI proportionales, adeoque in duplicata ratione temporum infinite parvorum T & t , & inde ratio $\frac{t}{T}$ est $\sqrt{\frac{R+3S_0}{R}}$ seu $\frac{R+\frac{3}{2}S_0}{R}$: & $\frac{t \times GH}{T} = HI + \frac{2MI \times NI}{HI}$,

substituendo ipsorum $\frac{t}{T}$ GH , HI , MI & NI valores jam inventos, evadit $\frac{3S_{00}}{2R} \sqrt{I+QQ}$. Et cum $2NI$ sit $2R_{00}$, Resistencia jam erit ad Gravitatem ut $\frac{3S_{00}}{2R} \sqrt{I+QQ}$ ad $2R_{00}$, id est, ut $3S \sqrt{I+QQ}$ ad $4RR$.

Velocitas autem ea est quacum corpus de loco quovis H , secundum tangentem HN egrediens, in Parabola diametrum HC & latus rectum $\frac{HNq}{NI}$ seu $\frac{I+QQ}{R}$ habente, deinceps in vacuo moveri potest.

Et resistencia est ut Medii densitas & quadratum velocitatis conjunctum, & propterea Medii densitas est ut resistencia directe & quadratum velocitatis inverse, id est, ut $\frac{3S \sqrt{I+QQ}}{4RR}$ directe & $\frac{I+QQ}{R}$ inverse, hoc est, ut $\frac{S}{R \sqrt{I+QQ}}$. Q. E. I.

Corol. 1. Si tangens HN producat utrinque donec occurrat Ordinatæ cuilibet AF in T : erit $\frac{HT}{AC}$ æqualis $\sqrt{I+QQ}$, adeoque in superioribus pro $\sqrt{I+QQ}$ scribi potest. Qua ratione Resistencia erit ad Gravitatem ut $3S \times HT$ ad $4RR \times AC$; Velocitas erit ut $\frac{HT}{AC \sqrt{R}}$, & Medii densitas erit ut $\frac{S \times AC}{R \times HT}$.

Corol. 2. Et hinc, si curva linea $PFHQ$ definiatur per relationem inter basem seu abscissam AC & ordinatim applicatam CH ,

CH, (ut moris est) & valor ordinatim applicatæ resolvatur in feriem convergentem: Problema per primos seriei terminos expedite solvetur, ut in exemplis sequentibus.


Exempl. 1. Sit Linea *PFHQ* Semicirculus super diametro *PQ* descriptus, & requiratur Medii densitas quæ faciat ut Projectile in hac linea moveatur.

Bifecetur diameter *PQ* in *A*, dic *AQ* *n*, *AC* *a*, *CH* *e*, & *CD* *o*: & erit *DI* *q* seu *AQ* *q* — *AD* *q* = *nn* — *aa* — *2ao* — *oo*, seu *ee* — *2ao* — *oo*, & radice per methodum nostram extracta, fiet

$$DI = e - \frac{ao}{e} - \frac{oo}{2e} - \frac{aao}{2e^3} - \frac{ao^3}{2e^3} - \frac{a^3o^3}{2e^3} \&c. \text{ Hic scribatur } nn \text{ pro}$$

$$ee + aa, \& \text{ evadet } DI = e - \frac{ao}{e} - \frac{nnoo}{2e^3} - \frac{annoo^3}{2e^3} - \&c.$$

Hujusmodi series distinguo in terminos successivos in hunc modum. Terminum primum appello in quo quantitas infinite parva *o* non extat; secundum in quo quantitas illa est unius dimensionis, tertium in quo extat duarum, quartum in quo trium est, & sic in infinitum. Et primus terminus qui hic est *e*, denotabit semper longitudinem Ordinatæ *CH* insistentis ad initium indefinitæ quantitatis *o*; secundus terminus qui hic est $\frac{ao}{e}$, denotabit differentiam



inter *CH* & *DN*, id est, lineolam *MN* quæ abscinditur complendo parallelogrammum *HCDM*, atque adeo positionem tangentis *HN* semper determinat; ut in hoc casu capiendo *MN* ad *HM* ut est $\frac{ao}{e}$ ad *o*, seu *a* ad *e*. Terminus tertius qui hic est

$\frac{nnoo}{2e^3}$ designabit lineolam *IN* quæ jacet inter tangentem & curvam,

adeoque determinat angulum contactus *IHN* seu curvaturam quam curva linea habet in *H*. Si lineola illa *IN* finitæ est magnitudinis, designabitur per terminum tertium una cum sequentibus in infinitum. At si lineola illa minuatur in infinitum,

DE MOTU
CORPORUM,

termini subsequeutes evadent infinite minores tertio, ideoque negligi possunt. Terminus quartus determinat variationem curvaturæ, quintus variationem variationis, & sic deinceps. Unde obiter patet usus non contemnendus harum Serierum in Solutione Problematum quæ pendent a tangentibus & curvatura curvarum.

Conferatur jam series $e - \frac{ao}{e} - \frac{nnoo}{2e^3} - \frac{annoo^3}{2e^5} - \&c$, cum serie $P - Qo - Roo - So - \&c$. & perinde pro P, Q, R & S scribatur $e, \frac{a}{e}, \frac{nn}{2e^3} \& \frac{ann}{2e^5}$, & pro $\sqrt{1+QQ}$ scribatur $\sqrt{1 + \frac{aa}{ee}}$ seu $\frac{n}{e}$, & prodibit Medii densitas ut $\frac{a}{ne}$ hoc est, (ob datam n), ut $\frac{a}{e}$, seu

$\frac{AC}{CH}$, id est, ut tangentis longitudo illa HT quæ ad semidiametrum

AF ipsi PQ normaliter insistentem terminatur: & resistentia erit ad gravitatem ut $3a$ ad $2n$, id est, ut $3AC$ ad Circuli diametrum PQ : velocitas autem erit ut \sqrt{CH} . Quare si corpus iusta cum velocitate secundum lineam ipsi PQ parallelam exeat de loco F , & Medii densitas in singulis locis H sit ut longitudo tangentis HT , & resistentia etiam in loco aliquo H sit ad vim gravitatis ut $3AC$ ad PQ , corpus illud describet Circuli quadrantem FHQ . *E. I.*

At si corpus idem de loco P , secundum lineam ipsi PQ perpendicularem egrederetur, & in arcu semicirculi PFQ moveri inciperet, sumenda esset AC seu a ad contrarias partes centri A , & propterea signum ejus mutandum esset & scribendum $-a$ pro $+a$. Quo pacto prodiret Medii densitas ut $-\frac{a}{e}$. Negativam autem densitatem, hoc est, quæ motus corporum accelerat, Natura non admittit: & propterea naturaliter fieri non potest, ut corpus ascendendo a P describat Circuli quadrantem PF . Ad hunc effectum deberet corpus a Medio impellente accelerari, non a resistente impediri.

Exempl. 2. Sit linea $PFHQ$ Parabola, axem habens AF horizonti PQ perpendiculari, & requiratur Medii densitas quæ faciat ut Projectile in ipsa moveatur.

Ex natura Parabolæ, rectangulum PDQ æquale est rectangulo sub ordinata DI & recta aliqua data; hoc est, si dicantur

recta

recta illa b , PCa , PQc , CHc & CDo ; rectangulum $a+o$ in $LIBER$
 $c-a-o$ seu $ac-aa-2ao+co-oo$ æquale est rectangulo b in $SECUNDUS$.

DI , adeoque DI æquale $\frac{ac-aa}{b} + \frac{c-2a}{b} o - \frac{oo}{b}$. Jam scriben-

dus esset hujus seriei secundus terminus $\frac{c-2a}{b} o$ pro Qo , tertius

item terminus $\frac{oo}{b}$ pro Ro . Cum vero plures non sint termini, de-

bebit quarti coefficientis S evanescere, & propterea quantitas

$\frac{S}{RV+QQ}$ cui Medii densitas proportionalis est, nihil erit. Nulla

igitur Medii densitate movebitur Projectile in Parabola, uti olim de-

monstravit *Galileus. Q. E. I.*

Exempl. 3. Sit linea AGK Hyperbola, Asymptoton habens NX plano horizontali AK perpendicularem; & quærat Medii densitas quæ faciat ut Projectile moveatur in hac linea.

Sit MX Asymptotos altera, ordinatim applicatæ DG productæ occurrens in V , & ex natura Hyperbolæ, rectangulum XV in VG dabitur. Datur autem ratio DN ad VX , & propterea datur etiam rectangulum DN in VG . Sit illud bb ; & completo parallelogrammo $DNXZ$, dicatur BNa , BDo , NXc , & ratio data VZ ad

ZX vel DN ponatur esse $\frac{m}{n}$. Et erit DN æqualis $a-o$, VG

æqualis $\frac{bb}{a-o}$, VZ æqualis $\frac{m}{n} a-o$, & GD seu $NX-VZ-VG$

æqualis $c - \frac{m}{n} a + \frac{m}{n} o - \frac{bb}{a-o}$. Resolvatur terminus $\frac{bb}{a-o}$ in seriem

convergentem $\frac{bb}{a} + \frac{bb}{aa} o + \frac{bb}{a^3} oo + \frac{bb}{a^3} o^3$ &c. & fiet GD æqua-

lis $c - \frac{m}{n} a - \frac{bb}{a} + \frac{m}{n} o - \frac{bb}{aa} o - \frac{bb}{a^3} o^2 + \frac{bb}{a^3} o^3$ &c. Hujus seriei

terminus secundus $\frac{m}{n} o - \frac{bb}{aa} o$ usurpandus est pro Qo , tertius cum

signo mutato $\frac{bb}{a^3} o^3$ pro Ro , & quartus cum signo etiam mutato $\frac{bb}{a^4} o^3$

pro So , eorumque coefficientes $\frac{m}{n} - \frac{bb}{aa}$, $\frac{bb}{a^3}$ & $\frac{bb}{a^4}$ scribendæ sunt

in Regula superiore pro Q , R & S . Quo facto prodit medii densitas

Asymptoton ejus in V , fuerit VG reciproce ut ipsius ZX vel \mathcal{DN} L I B E R
dignitas aliqua \mathcal{DN}^n , cujus index est numerus n : & quærat^r Me- SECUNDUS.
dii densitas, qua Projectile progrediatur in hac curva.

Pro BN , BD , NX scribantur A , O , C respective, sitque VZ
ad XZ vel \mathcal{DN} ut d ad e , & VG æqualis $\frac{bb}{\mathcal{DN}}$, & erit \mathcal{DN} æqua-

lis $A - O$, $VG = \frac{bb}{A - O}^n$, $VZ = \frac{d}{e} \overline{A - O}$, & GD seu $NX - VZ$
 $- VG$ æqualis $C - \frac{d}{e} A + \frac{d}{e} O - \frac{bb}{A - O}^n$. Resolvatur terminus ille

$\frac{bb}{A - O}^n$ in seriem infinitam $\frac{bb}{A^n} + \frac{nbb}{A^{n+1}} O + \frac{nn+n}{2A^{n+2}} bbO^2 +$
 $\frac{n^3+3nn+2n}{6A^{n+3}} bbO^3$ &c. ac fiet GD æqualis $C - \frac{d}{e} A - \frac{bb}{A^n} +$
 $\frac{d}{e} O - \frac{nbb}{A^{n+1}} O - \frac{+nn+n}{2A^{n+2}} bbO^2 - \frac{+n^3+3nn+2n}{6A^{n+3}} bbO^3$ &c. Hu-

jus seriei terminus secundus $\frac{d}{e} O - \frac{nbb}{A^{n+1}} O$ usurpandus est pro Qo ,

tertius $\frac{nn+n}{2A^{n+2}} bbO^2$ pro Ro^2 , quartus $\frac{n^3+3nn+2n}{6A^{n+3}} bbO^3$ pro

So^3 . Et inde Medii densitas $\frac{S}{R\sqrt{1+QQ}}$, in loco quovis G , fit

$\frac{n+2}{3\sqrt{A^2 + \frac{dd}{ee} A^2 - \frac{2dnbb}{eA^n} A + \frac{nnb^2}{A^{2n}}}}$, adeoque si in VZ capiatur VT

æqualis $n \times VG$, densitas illa est reciproce ut XT . Sunt enim A^2
& $\frac{dd}{ee} A^2 - \frac{2dnbb}{eA^n} A + \frac{nnb^2}{A^{2n}}$ ipfarum XZ & ZT quadrata. Resisten-

tia autem in eodem loco G fit ad gravitatem ut $3S$ in $\frac{XT}{A}$ ad $4RR$,

id est, XT ad $\frac{2nn+2n}{n+2} VG$. Et velocitas ibidem ea ipsa est qua-

cum corpus projectum in Parabola pergeret, verticem G , diametrum
 GD & latus rectum $\frac{1+QQ}{R}$ seu $\frac{2XT\text{quad.}}{nn+n}$ in VG habente. \mathcal{Q} . *E. I.*

Scholium.

Eadem ratione qua prodiit densitas Medii ut $\frac{S \times AC}{R \times HT}$ in Corollario primo, si resistentia ponatur ut velocitatis V dignitas quælibet V^n prodibit densitas Medii ut $\frac{S}{R^{\frac{4-n}{2}}} \times \frac{AC}{HT} |^{n-1}$.

Et propterea si Curva inveniri potest ea lege ut data fuerit ratio $\frac{S}{R^{\frac{4-n}{2}}}$ ad $\frac{HT}{AC} |^{n-1}$, vel $\frac{S^2}{R^{4-n}}$ ad $1+QQ |^{n-1}$: corpus movebitur in

hac Curva in uniformi Medio cum resistentia quæ sit ut velocitatis dignitas V^n . Sed redeamus ad Curvas simpliciores.

Quoniam motus non fit in Parabola nisi in Medio non resistente, in Hyperbolis vero hic descriptis fit per resistentiam perpetuam; perspicuum est quod Linea, quam projectile in Medio uniformiter resistente describit, propius accedit ad Hyperbolas hæcæ quam ad Parabolam. Est utique linea illa Hyperbolici generis, sed quæ circa verticem magis distat ab Asymptotis; in partibus a vertice remotioribus propius ad ipsas accedit quam pro ratione Hyperbolarum quas hic descripsi. Tanta vero non est inter has & illam differentia, quin illius loco possint hæ in rebus practicis non incommode adhiberi. Et utiliores forsan futuræ sunt hæ, quam Hyperbola magis accurata & simul magis composita. Ipsæ vero in usum sic deducuntur.

Compleatur parallelogrammum $XTGT$, & recta GT tanget Hyperbolam in G , ideoque densitas Medii in G est reciproce ut tangens GT , & velocitas ibidem ut $\sqrt{\frac{GTq}{GV}}$, resistentia autem ad vim gravitatis ut GT ad $\frac{2nn+2n}{n+2}GV$.

Proinde si corpus de loco A secundum rectam AH projectum describat Hyperbolam AGK , & AH producta occurrat Asymptoto NX in H , actaque AI eidem parallela occurrat alteri Asymptoto MX in I ; erit Medii densitas in A reciproce ut AH , & corporis velocitas ut $\sqrt{\frac{AHq}{AI}}$, ac resistentia ibidem ad gravitatem ut

AH ad $\frac{2nn+2n}{n+2}$ in AI . Unde prodeunt sequentes Regulæ.

Reg. 1.

DE MOTU
CORPORUM;


Reg. 4. Quoniam densitas Medii prope verticem Hyperbolæ major est quam in loco *A*, ut habeatur densitas mediocris, debet ratio minimæ tangentium *GT* ad tangentem *AH* inveniri, & densitas in *A* augeri in ratione paulo majore quam semisummæ harum tangentium ad minimam tangentium *GT*.

Reg. 5. Si dantur longitudines *AH*, *AI*, & describenda sit Figura *AGK*: produc *HN* ad *X*, ut sit *HX* æqualis facto sub $n + 1$ & *AI*; centroque *X* & Asymptotis *MX*, *NX* per punctum *A* describatur Hyperbola, ea lege, ut sit *AI* ad quamvis *VG* ut *XV* ad *XI*.

Reg. 6. Quo major est numerus *n*, eo magis accuratæ sunt hæ Hyperbolæ in ascensu corporis ab *A*, & minus accuratæ in ejus descensu ad *K*; & contra. Hyperbola Conica mediocrem rationem tenet, estque cæteris simplicior. Igitur si Hyperbola sit hujus generis, & punctum *K*, ubi corpus projectum incidet in rectam quamvis *AN* per punctum *A* transeuntem, quærat: occurrat producta *AN* Asymptotis *MX*, *NX* in *M* & *N*, & sumatur *NK* ipsi *AM* æqualis.

Reg. 7. Et hinc liquet methodus expedita determinandi hanc Hyperbolam ex Phænomenis. Projiciantur corpora duo similia & æqualia, eadem velocitate, in angulis diversis *HAK*, *bAk*, incidantque in planum Horizontis in *K* & *k*; & notetur proportio *AK* ad *Ak*. Sit ea *d* ad *e*. Tum erecto cujusvis longitudinis perpendiculo *AI*, assume utcumque longitudinem *AH* vel *Ab*, & inde collige graphice longitudines *AK*, *Ak*, per *Reg. 6.* Si ratio *AK* ad *Ak* sit eadem cum ratione *d* ad *e*, longitudo *AH* recte assumpta fuit. Sin minus cape in recta infinita *SM* longitudinem *SM* æqualem assumptæ *AH*, & erige perpendiculum *MN* æquale ratio-

num differentiæ $\frac{AK}{Ak} - \frac{d}{e}$ ductæ in rectam quamvis datam. Simili methodo ex assumptis pluribus longitudinibus *AH* invenienda sunt plura puncta *N*, & per omnia agenda Curva lineæ regularis *NNXN*, secans rectam *SM* in *X*. Assumatur demum *AH* æqualis abscissæ *SX* & inde de novo inveniatur longitudo *AK*; & longitudines, quæ sint ad assumptam longitudinem *AI* & hanc ultimam *AH* ut longitudo *AK* per experimentum cognita ad ultimo inventam longitudinem *AK*, erunt veræ illæ longitudines *AI* & *AH*, quas invenire oportuit. Hisce vero datis dabitur & resistentia Medii in loco *A*, quippe quæ sit ad vim gravitatis ut *AH* ad 2 *AI*. Augenda est autem densitas Medii per *Reg. 4.* & resistentia modo inventa, si in eadem ratione augeatur, fiet accuratior.



Reg.

S E C T I O III.


 LIBER
SECUNDUS

De Motu Corporum quibus resistitur partim in ratione velocitatis, partim in ejusdem ratione duplicata.

PROPOSITIO XI. THEOREMA VIII.

Si Corpori resistitur partim in ratione velocitatis, partim in velocitatis ratione duplicata, & idem sola vi insita in Medio similari movetur, sumantur autem tempora in progressione Arithmetica: quantitates velocitatibus reciproce proportionales, datâ quadam quantitate auctâ, erunt in progressione Geometrica.

Centro C , Asymptotis rectangulis $CADd$ & CH , describatur Hyperbola $BEeS$, & Asymptoto CH parallelæ sint AB , DE , de . In Asymptoto CD dentur puncta A , G : Et si tempus exponatur per aream Hyperbolicam $ABED$ uniformiter crescentem; dico quod velocitas exponi potest per longitudinem DF , cujus reciproca GD una cum data CG componat longitudinem CD in progressione Geometrica crescentem.



Sit enim areola $DEed$ datum temporis incrementum quam minimum, & erit Dd reciproce ut DE , adeoque directe ut

CD . Ipsius autem $\frac{I}{GD}$ decrementum, quod (per huj. Lem. II.)

est $\frac{Dd}{GDq}$ erit ut $\frac{CD}{GDq}$ seu $\frac{CG + GD}{GDq}$, id est, ut $\frac{I}{GD} + \frac{CG}{GDq}$.

Igitur tempore $ABED$ per additionem datarum particularum $EDde$ uniformiter crescente; decrescit $\frac{I}{GD}$ in eadem ratione cum veloci-

tate. Nam decrementum velocitatis est ut resistentia, hoc est (per Hypothesin) ut summa duarum quantitatum, quarum una est ut

Hh 3

velo-

DE MOTU
CORPORUM,

velocitas, altera ut quadratum velocitatis: & ipsius $\frac{I}{GD}$ decremen-

tum est ut summa quantitatum $\frac{I}{GD}$ & $\frac{CG}{GDq}$, quarum prior est ipsa $\frac{I}{GD}$, & posterior $\frac{CG}{GDq}$ est ut $\frac{I}{GDq}$. Proinde $\frac{I}{GD}$, ob analogum decrementum, est ut velocitas. Et si quantitas GD , ipsi $\frac{I}{GD}$ reciproce proportionalis, quantitate data CG augeatur, summa CD , tempore $ABED$ uniformiter crescente, crescet in progressionem Geometricam. Q. E. D.


Corol. 1. Igitur si, datis punctis A , G , exponatur tempus per aream Hyperbolicam $ABED$; exponi potest velocitas per ipsius GD reciprocam $\frac{I}{GD}$.

Corol. 2. Sumendo autem GA ad GD ut velocitatis reciproca sub initio, ad velocitatis reciprocam in fine temporis cuiusvis $ABED$, invenietur punctum G . Eo autem invento, velocitas ex dato quovis alio tempore inveniri potest.

PROPOSITIO XII. THEOREMA IX.

Hisdem positis, dico quod si spatia descripta sumantur in progressionem Arithmetica, velocitates data quadam quantitate auctæ erunt in progressionem Geometricam.

In Asymptoto CD detur punctum R , & erecto perpendicularo RS , quod occurrat Hyperbolæ in S , exponatur descriptum spatium per aream Hyperbolicam $RSED$; & velocitas erit ut longitudo GD , quæ cum data CG componit longitudinem CD , in progressionem Geometricam decrescentem, interea dum spatium $RSED$ augetur in Arithmetica.



Etenim ob datum spatii incrementum $EDde$, lineola Dd , quæ decre-

decrementum est ipsius GD , erit reciproce ut ED , adeoque directe ut CD , hoc est, ut summa ejusdem GD & longitudinis datæ CG . Sed velocitatis decrementum, tempore sibi reciproce proportionali, quo data spatii particula $DdeE$ describitur, est ut resistentia & tempus conjunctim, id est, directe ut summa duarum quantitatum, quarum una est ut velocitas, altera ut velocitatis quadratum, & inverse ut velocitas; adeoque directe ut summa duarum quantitatum, quarum una datur, altera est ut velocitas. Igitur decrementum tam velocitatis quam lineæ GD , est ut quantitas data & quantitas decrescens conjunctim, & propter analoga decremента, analogæ semper erunt quantitates decrescentes: nimirum velocitas & linea GD . Q. E. D.

Corol. 1. Igitur si velocitas exponatur per longitudinem GD , spatium descriptum erit ut area Hyperbolica $DES R$.

Corol. 2. Et si utcumque assumatur punctum R , invenietur punctum G , capiendo GR ad GD , ut est velocitas sub initio ad velocitatem post spatium quodvis $RSED$ descriptum. Invento autem puncto G , datur spatium ex data velocitate, & contra.

Corol. 3. Unde cum, per Prop. XI, detur velocitas ex dato tempore, & per hanc Propositionem detur spatium ex data velocitate; dabitur spatium ex dato tempore, & contra.

PROPOSITIO XIII. THEOREMA X.

Posito quod Corpus ab uniformi gravitate deorsum attractum recta ascendit vel descendit, & quodeidem resistitur partim in ratione velocitatis, partim in ejusdem ratione duplicata: dico quod si Circuli & Hyperbolæ diametris parallele rectæ per conjugatarum diametrorum terminos ducantur, & velocitates sint ut segmenta quedam parallelarum a dato puncto ducta, Tempora erunt ut arearum Sectores, rectis a centro ad segmentorum terminos ductis abscissi: & contra.

Cas. 1. Ponamus primo quod corpus ascendit, centroque D & femidiametro quovis DB describatur Circuli quadrans $BETF$, & per femidiametri DB terminum B agatur infinita BAP , femidiametro DF parallela. In ea detur punctum A , & capiatur segmentum AP velocitati proportionale. Et cum resistentiæ pars aliqua sit
ut

DE MOTU
CORPORUM, pori atque adeo sectori huic proportionalis est; in Medio resistentē est ut triangulum; & in Medio utroque, ubi quam minima est, accedit ad rationem æqualitatis, pro more sectoris & trianguli.

PROPOSITIO XIV. THEOREMA XI.

Isdem positis, dico quod spatium ascensu vel descensu descriptum, est ut differentia areæ per quam tempus exponitur, & areæ cujusdam alterius quæ augetur vel diminuitur in progressionē Arithmetica; si vires ex resistentia & gravitate compositæ sumantur in progressionē Geometrica.

Capiatur AC (in Fig. tribus ultimis,) gravitati, & AK resistentiæ proportionalis. Capiantur autem ad easdem partes puncti A si corpus descendit, aliter ad contrarias. Erigatur Ab quæ sit ad DB ut DBq ad $4BAC$: & area $AbNK$ augebitur vel diminuetur in progressionē Arithmetica, dum vires CK in progressionē Geometrica sumuntur. Dico igitur quod distantia corporis ab ejus altitudine maxima sit ut excessus areæ $AbNK$ supra aream DET .

Nam cum AK sit ut resistentia, id est, ut $APq + 2BAP$; assumatur data quævis quantitas Z , & ponatur AK æqualis $\frac{APq + 2BAP}{Z}$; & (per hujus Lemma II.) erit ipsius AK mo-

mentum KL æquale $\frac{2APQ + 2BA \times P Q}{Z}$ seu $\frac{2BPQ}{Z}$, &

areæ $AbNK$ momentum $KLON$ æquale $\frac{2BPQ \times LO}{Z}$ seu $BPQ \times BD$ cub.

$\frac{2Z \times CK \times AB}{}$

Cas. I. Jam si corpus ascendit, sitque gravitas ut $ABq + BDq$ existente BET Circulo, (in Fig. *Cas. I.* Prop. XIII.) linea AC , quæ gravitati proportionalis est, erit $\frac{ABq + BDq}{Z}$, & DPq seu $APq + 2BAP + ABq + BDq$ erit $AK \times Z + AC \times Z$ seu $CK \times Z$; ideoque area DTV erit ad aream DPQ ut DTq vel DBq ad $CK \times Z$.

Cas.

Caf. 2. Sin corpus ascendit, & gravitas fit ut $ABq - BDq$, linea AC (Fig. *Caf. 2.* Prop. XIII) erit $\frac{ABq - BDq}{Z}$, & DTq erit

ad DPq ut DFq seu DBq ad $BPq - BDq$ seu $APq + 2BAP + ABq - BDq$, id est, ad $AK \times Z + AC \times Z$ seu $CK \times Z$. Ideoque area DTV erit ad aream DPQ ut DBq ad $CK \times Z$.

Caf. 3. Et eodem argumento, si corpus descendit, & propterea gravitas fit ut $BDq - ABq$, & linea AC (Fig. *Caf. 3.* Prop. præced.) æquetur $\frac{BDq - ABq}{Z}$, erit area DTV ad aream DPQ ut DBq ad $CK \times Z$: ut supra.

Cum igitur areae illæ semper sint in hac ratione, si pro area DTV , qua momentum temporis sibi met ipsi semper æquale exponitur, scribatur determinatum quodvis rectangulum, puta $BD \times m$, erit area DPQ , id est, $\frac{1}{2} BD \times PQ$ ad $BD \times m$, ut $CK \times Z$ ad BDq . Atque inde fit $PQ \times BD$ cub. æquale $2BD \times m \times CK \times Z$, & areae $AbNK$ momentum $KLON$ superius inventum, fit $\frac{BP \times BD \times m}{AB}$. Auferatur areae DET mo-

mentum DTV seu $BD \times m$, & restabit $\frac{AP \times BD \times m}{AB}$. Est igitur differentia momentorum, id est, momentum differentiae arearum, æqualis $\frac{AP \times BD \times m}{AB}$; & propterea (ob datum $\frac{BD \times m}{AB}$)

ut velocitas AP , id est, ut momentum spatii quod corpus ascendendo vel descendendo describit. Ideoque differentia arearum & spatium illud, proportionalibus momentis crescentia vel decrescencia & simul incipientia vel simul evanescentia, sunt proportionalia, $Q. E. D.$

Corol. Igitur si longitudo aliqua V sumatur in eà ratione ad duplum longitudinis M , quæ oritur applicando aream DET ad BD , quam habet linea DA ad lineam DE ; spatium quod corpus ascensu vel descensu toto in Medio resistente describit, erit ad spatium quod in Medio non resistente eodem tempore describere posset, ut arearum illarum differentia ad $\frac{BD \times V^2}{4AB}$, ideoque ex dato tem-

pore datur. Nam spatium in Medio non resistente est in duplicata ratione temporis, sive ut V^2 , & ob datas BD & AB , ut

DE MOTU
CORPORUM, $\frac{BD \times V^2}{4AB}$. Momentum hujus areae five huic æqualis $\frac{DAq \times BD \times M^2}{DEq \times AB}$
 est ad momentum differentiae arearum DET & $AbNK$, ut
 $\frac{DAq \times BD \times M \times m}{DEq \times AB}$ ad $\frac{AP \times BD \times m}{AB}$, hoc est, ut $\frac{DAq \times BD \times M}{DEq}$
 ad $\frac{1}{2} BD \times AP$, five ut $\frac{DAq}{DEq}$ in DET ad DAP ; adeoque ubi
 areae DET & DAP quam minimae sunt, in ratione æqualitatis:
 Æqualis igitur est area quam minima $\frac{BD \times V^2}{4AB}$ differentiae quam
 minimae arearum DET & $AbNK$. Unde cum spatia in Me-
 dio utroque, in principio descensus vel fine ascensus simul descrip-
 ta accedunt ad æqualitatem, adeoque tunc sunt ad invicem ut area
 $\frac{BD \times V^2}{4AB}$ & arearum DET & $AbNK$ differentia; ob eorum ana-
 loga incrementa necesse est ut in æqualibus quibuscunque tempo-
 ribus sint ad invicem ut area illa $\frac{BD \times V^2}{4AB}$ & arearum DET &
 $AbNK$ differentia. Q. E. D.


S E C T I O IV.

De Corporum Circulari Motu in Mediis resistentibus.

L E M M A III.

Sit PQR *spiralis quæ secet radios omnes* $SP, SQ, SR,$
Ec. *in æqualibus angulis. Agatur recta* PT *quæ tangat*
candem in puncto quovis P , *secetque radium* SQ *in* T ;
Et ad Spiralem erectis perpendicularis PO, QO *concur-*
rentibus in O , *jungatur* SO . *Dico quod si puncta* P *et*
 Q *accedant ad invicem et coeant, angulus* PSO *evadet*
rectus, et ultima ratio rectanguli $TQ \times 2PS$ *ad* PQ
quadr. erit ratio æqualitatis.

Etenim de angulis rectis OPQ, OQR subducantur anguli æ-
 quales SPQ, SQR , & manebunt anguli æquales OPS, OQS .
 Ergo Circulus qui transit
 per puncta O, S, P transi-
 bit etiam per punctum Q .
 Coeant puncta P & Q ,
 & hic Circulus in loco
 coitus PQ tanget Spira-
 lem, adeoque perpendicu-
 lariter secabit rectam OP .
 Fiet igitur OP diameter
 Circuli hujus, & angulus
 OSP in semicirculo rectus.
 $Q. E. D.$



Ad OP demittantur perpendiculara QD, SE , & linearum ratio-
 nes ultimæ erunt hujusmodi: TQ ad PD ut TS vel PS ad PE ,
 seu $2PO$ ad $2PS$. Item PD ad PQ ut PQ ad $2PO$. Et ex
 æquo perturbate TQ ad PQ ut PQ ad $2PS$. Unde fit $PQ \times 2PS$
 quadr. $Q. E. D.$

duplicata ratione ipsius SQ reciproce. Sunt autem arcus illi PQ & QR ut velocitates descriptrices ad invicem, id est, in subduplicata ratione SQ ad SP , five ut SQ ad $\sqrt{SP \times SQ}$; & ob æquales angulos SPQ , SQR & æquales areas PSQ , QSR , est arcus PQ ad arcum QR ut SQ ad SP . Sumantur proportionalium consequentium differentiæ, & fiet arcus PQ ad arcum Rr ut SQ ad $SP - \sqrt{SP \times SQ}$, seu $\frac{1}{2}VQ$; nam punctis P & Q coeuntibus, ratio ultima $SP - \sqrt{SP \times SQ}$ ad $\frac{1}{2}VQ$ fit æqualitatis. Quoniam decrementum arcus PQ , ex resistentia oriundum, five hujus duplum Rr , est ut resistentia & quadratum temporis conjunctim; erit resistentia ut

$\frac{Rr}{PQ \times SP}$. Erat autem PQ ad Rr ,

ut SQ ad $\frac{1}{2}VQ$, & inde $\frac{Rr}{PQ \times SP}$ fit ut $\frac{\frac{1}{2}VQ}{PQ \times SP \times SQ}$ five

ut $\frac{\frac{1}{2}OS}{OP \times SP}$. Namque punctis P & Q coeuntibus, SP & SQ

coincidunt, & angulus PVQ fit rectus; & ob similia trian-
 gula PVQ , PSO , fit PQ ad $\frac{1}{2}VQ$ ut OP ad $\frac{1}{2}OS$. Est

igitur $\frac{OS}{OP \times SP}$ ut resistentia, id est, in ratione densitatis Medii

in P & ratione duplicata velocitatis conjunctim. Auferatur dupli-
 cata ratio velocitatis, nempe ratio $\frac{1}{SP}$, & manebit Medii densi-

tas in P ut $\frac{OS}{OP \times SP}$. Detur Spiralis, & ob datam rationem OS

ad OP , densitas Medii in P erit ut $\frac{1}{SP}$. In Medio igitur, cu-

jus densitas est reciproce ut distantia a centro SP , corpus gyari
 potest in hac Spirali. $Q. E. D.$

Corol. 1. Velocitas in loco quovis P ea semper est quacum cor-
 pus in Medio non resistente gyari potest in Circulo, ad eandem
 a centro distantiam SP .

Corol. 2. Medii densitas, si datur distantia SP , est ut $\frac{OS}{OP}$ sin-
 distantia illa non datur, ut $\frac{OS}{OP \times SP}$. Et inde Spiralis ad quam-
 libet Medii densitatem aptari potest.

Corol. 3. Vis resistentiæ in loco quovis P , est ad vim centripe-
 tam

DE MOTU
CORPORUM,

tam in eodem loco ut $\frac{1}{2} OS$ ad OP . Nam vires illæ sunt ad invicem ut $\frac{1}{2} Rr$ & TQ five ut $\frac{\frac{1}{2} VQ \times PQ}{SQ} \& \frac{\frac{1}{2} PQq}{SP}$, hoc est, ut $\frac{1}{2} VQ$ & PQ , seu $\frac{1}{2} OS$ & OP . Data igitur Spirali datur proportio resistentiæ ad vim centripetam, & viceversa ex data illa proportionem datur Spiralis.

Corol. 4. Corpus itaque gyrari nequit in hac Spirali, nisi ubi vis resistentiæ minor est quam dimidium vis centripetæ. Fiat resistentia æqualis dimidio vis centripetæ & Spiralis conveniet cum linea recta PS , inque hac recta corpus descendet ad centrum, ea cum velocitate quæ sit ad velocitatem, qua probavimus in superioribus in casu Parabolæ (Theor. x. Lib. 1,) descensum in Medio non resistente fieri, in subduplicata ratione unitatis ad numerum binarium. Et tempora descensus hic erunt reciproce ut velocitates, atque adeo dantur.

Corol. 5. Et quoniam in æqualibus a centro distantis velocitas eadem est in Spirali PQR atque in recta SP , & longitudo Spiralis ad longitudinem rectæ PS est in data ratione, nempe in ratione OP ad OS ; tempus descensus in Spirali erit ad tempus descensus in recta SP in eadem illa data ratione, proindeque datur.

Corol. 6. Si centro S intervallis duobus quibuscunque datis describantur duo Circuli; & manentibus hisce Circulis, mutetur utcunque angulus quem Spiralis continet cum radio PS : numerus revolutionum quas corpus intra Circulorum circumferentias, pergendo in Spirali a circumferentia ad circumferentiam, complere potest, est ut $\frac{PS}{OS}$, five ut Tangens anguli illius quem Spiralis continet cum radio PS ; tempus vero revolutionum earundem ut $\frac{OP}{OS}$, id est, ut Secans anguli ejusdem, vel etiam reciproce ut Medii densitas.

Corol. 7. Si corpus, in Medio cujus densitas est reciproce ut distantia locorum a centro, revolutionem in curva quacunque AEB circa centrum illud fecerit, & Radium primum AS in eodem angulo secuerit in B quo prius in A , idque cum velocitate quæ fuerit ad velocitatem suam primam in A reciproce in subduplicata ratione distantiarum a centro (id est, ut AS ad mediam proportionalem inter AS & BS) corpus illud perget innumeras consimiles revolutiones BFC , CGD &c. facere, & intersectionibus

DE MOTU
CORPORUM, quo Spiralis nova fecat radium eundem in Medio proposito: Atque etiam ut sunt eorundem angulorum Tangentes ita esse numeros revolutionum omnium inter Circulos eosdem duos quam proxime. Si hæc fiant passim inter Circulos binos, continuabitur motus per Circulos omnes. Atque hoc pacto haud difficulter imaginari possumus quibus modis ac temporibus corpora in Medio quocunque regulari gyrari debebunt.

Corol. 9. Et quamvis motus excentrici in Spiralibus ad formam Ovalium accedentibus peragantur; tamen concipiendo Spiralium illarum singulas revolutiones iisdem ab invicem intervallis distare, iisdemque gradibus ad centrum accedere cum Spirali superius descripta, intelligemus etiam quomodo motus corporum in huiusmodi Spiralibus peragantur.

PROPOSITIO XVI. THEOREMA XIII.

Si Medii densitas in locis singulis sit reciproce ut distantia locorum a centro immobili, sitque vis centripeta reciproce ut dignitas quælibet ejusdem distantiae: dico quod corpus gyrari potest in Spirali quæ radios omnes a centro illo ductos intersecat in angulo dato.

Demonstratur eadem methodo cum Propositione superiore. Nam si vis centripeta in P sit reciproce ut distantiae SP dignitas quælibet $S P^{n+1}$ cujus index est $n+1$; colligetur ut supra, quod tempus quo corpus describit arcum quemvis PQ erit ut

$PQ \times SP^{\frac{1}{2}}$, & resistentia in P ut $\frac{Rr}{PQ \times SP^n}$ sive ut $\frac{1-\frac{1}{2}n \times VQ}{PQ \times SP^n \times SQ}$

adeoque ut $\frac{1-\frac{1}{2}n \times OS}{OP \times SP^{n+1}}$, hoc est, ob datum $\frac{1-\frac{1}{2}n \times OS}{OP}$, reciproce ut SP^{n+1} . Et propterea, cum velocitas sit reciproce ut $SP^{\frac{1}{2}}$, densitas in P erit reciproce ut SP .

Corol. 1. Resistentia est ad vim centripetam, ut $1-\frac{1}{2}n \times OS$ ad OP .

Corol. 2. Si vis centripeta sit reciproce ut SP^3 , erit $1-\frac{1}{2}n=0$; adeoque resistentia & densitas Medii nulla erit, ut in Propositione nona Libri primi.

Corol. 3. Si vis centripeta sit reciproce ut dignitas aliqua radii SP cujus index est major numero 3, resistentia affirmativa in negativam mutabitur.

Scholium.

Cæterum hæc Propositio & superiores, quæ ad Media inæqualiter densa spectant, intelligendæ sunt de motu corporum adeo parvorum, ut Medii ex uno corporis latere major densitas quam ex altero non consideranda veniat. Resistentiam quoque cæteris paribus densitati proportionalem esse suppono. Unde in Mediis quorum vis resistendi non est ut densitas, debet densitas eo usque augeri vel diminui, ut resistentiæ vel tollatur excessus vel defectus suppleatur.

PROPOSITIO XVII. PROBLEMA IV.

Invenire & vim centripetam & Medii resistentiam qua corpus in data Spirali, data velocitatis Lege, revolvî potest.

Sit Spiralis illa PQR . Ex velocitate qua corpus percurrit arcum quam minimum PQ dabitur tempus, & ex altitudine TQ , quæ est ut vis centripeta & quadratum temporis, dabitur vis. Deinde ex arearum, æqualibus temporum particulis confectarum PSQ & QSR , differentia RSr , dabitur corporis retardatio, & ex retardatione invenietur resistentia ac densitas Medii.

PROPOSITIO XVIII. PROBLEMA V.

Data Lege vis centripetæ, invenire Medii densitatem in locis singulis, qua corpus datam Spiralem describet.

Ex vi centripeta inveniendæ est velocitas in locis singulis, deinde ex velocitatis retardatione quærenda Medii densitas: ut in Propositione superiore.

Methodum vero tractandi hæc Problemata aperui in hujus Propositione decima, & Lemmate secundo; & Lectorem in hujusmodi perplexis disquisitionibus diutius detinere nolo. Addenda jam sunt aliqua de viribus corporum ad progrediendum, deque densitate & resistentia Mediorum, in quibus motus hæctenus expositi & his affines peraguntur.

S E C T I O V.

*De Densitate & Compressione Fluidorum, deque
Hydrostatica.*


Definitio Fluidi.

*Fluidum est corpus omne cujus partes cedunt vi cuicunque
illata, & cedendo facile moventur inter se.*

PROPOSITIO XIX. THEOREMA XIV.

*Fluidi homogenei & immoti, quod in vase quocunque im-
moto clauditur & undique comprimitur, partes omnes
(seposita condensationis, gravitatis & virium omnium
centripetarum consideratione) equaliter premuntur undi-
que, & absque omni motu a pressione illa orto perma-
nent in locis suis.*

*Cas. 1. In vase Sphærico ABC claudatur & uniformiter com-
primatur fluidum undique: dico quod ejusdem pars nulla ex illa
pressione movebitur. Nam si pars aliqua D
moveatur, necesse est ut omnes hujusmodi
partes, ad eandem a centro distantiam un-
dique consistentes, simili motu simul move-
antur; atque hoc adeo quia similis & æ-
qualis est omnium pressio, & motus omnis
exclusus supponitur, nisi qui a pressione il-
la oriatur. Atqui non possunt omnes ad
centrum propius accedere, nisi fluidum ad
centrum condensetur; contra Hypothesin.
Non possunt longius ab eo recedere, nisi
fluidum ad circumferentiam condensetur;
etiam contra Hypothesin. Non possunt servata sua a centro distan-
tia moveri in plagam quamcunque, quia pari ratione movebuntur
in plagam contrariam; in plagas autem contrarias non potest
pars*



pars eadem, eodem tempore, moveri. Ergo fluidi pars nulla de loco suo movebitur. *Q. E. D.*

Caf. 2. Dico jam quod fluidi hujus partes omnes sphæricæ æqualiter premuntur undique: sit enim EF pars sphærica fluidi, & si hæc undique non premitur æqualiter, augeatur pressio minor, usque dum ipsa undique prematur æqualiter; & partes ejus, per Casum primum, permanebunt in locis suis. Sed ante auctam pressionem permanebunt in locis suis, per Casum eundem primum, & additione pressionis novæ movebuntur de locis suis, per definitionem Fluidi. Quæ duo repugnant. Ergo falso dicebatur quod Sphæra EF non undique premebatur æqualiter. *Q. E. D.*

Caf. 3. Dico præterea quod. diversarum partium sphæricarum æqualis sit pressio. Nam partes sphæricæ contiguæ se mutuo premunt æqualiter in puncto contactus, per motus Legem III. Sed &, per Casum secundum, undique premuntur eadem vi. Partes igitur duæ quævis sphæricæ non contiguæ, quia pars sphærica intermedia tangere potest utramque, prementur eadem vi. *Q. E. D.*

Caf. 4. Dico jam quod fluidi partes omnes ubique premuntur æqualiter. Nam partes duæ quævis tangi possunt a partibus Sphæricis in punctis quibuscunque; & ibi partes illas Sphæricas æqualiter premunt, per Casum 3. & vicissim ab illis æqualiter premuntur, per Motus Legem tertiam. *Q. E. D.*

Caf. 5. Cum igitur fluidi pars quælibet GHI in fluido reliquo tanquam in vase claudatur, & undique prematur æqualiter, partes autem ejus se mutuo æqualiter premant & quiescant inter se; manifestum est quod Fluidi cujuscunque GHI , quod undique premitur æqualiter, partes omnes se mutuo premunt æqualiter, & quiescunt inter se. *Q. E. D.*

Caf. 6. Igitur si Fluidum illud in vase non rigido claudatur, & undique non prematur æqualiter, cedit idem pressioni fortiori, per Definitionem Fluiditatis.


Caf. 7. Ideoque in vase rigido Fluidum non sustinebit pressionem fortioiorem ex uno latere quam ex alio, sed eidem cedit, idque in momento temporis, quia latus vasis rigidum non persequitur liquorem cedentem. Cedendo autem urgetur latus oppositum, & sic pressio undique ad æqualitatem verget. Et quoniam Fluidum, quam primum a parte magis pressa recedere conatur, inhibetur per resistentiam vasis ad latus oppositum; reducetur pressio undique ad æqualitatem, in momento temporis, absque motu locali: & subinde partes fluidi, per Casum quintum, se mutuo prement æqualiter, & quiescent inter se. *Q. E. D.*

De Motu Corporum. *Corol.* Unde nec motus partium fluidi inter se, per pressionem fluido ubivis in externa superficie illatam, mutari possunt, nisi quatenus aut figura superficiei alicubi mutatur, aut omnes fluidi partes intensius vel remissius sese premendo difficilius vel facilius labuntur inter se.

PROPOSITIO XX. THEOREMA XV.

Si Fluidi Sphærici, & in æqualibus a centro distantis homogenei, fundo Sphærico concentrico incumbentis partes singulæ versus centrum totius gravitent; sustinet fundum pondus Cylindri, cujus basis æqualis est superficiei fundi, & altitudo eadem quæ Fluidi incumbentis.

Sit DHM superficies fundi, & AEI superficies superior fluidi. Superficiebus sphæricis innumeris BFK , CGL distinguatur fluidum in Orbes concentricos æqualiter crassos; & concipe vim gravitatis agere solummodo in superficiem superiorem Orbis cujusque, & æquales esse actiones in æquales partes superficierum omnium. Premitur ergo superficies suprema AEI vi simplici gravitatis propriæ, qua & omnes Orbis supremi partes & superficies secunda BFK (per Prop. xix.) pro mensura sua æqualiter premuntur. Premitur præterea superficies secunda BFK vi propriæ gravitatis, quæ addita vi priori facit pressionem duplam. Hac pressione, pro mensura sua, & insuper vi propriæ gravitatis, id est pressione tripla, urgetur superficies tertia CGL . Et similiter pressione quadrupla urgetur superficies quarta, quintupla quinta, & sic deinceps. Pressio igitur qua superficies unaquæque urgetur, non est ut quantitas solida fluidi incumbentis, sed ut numerus Orbium ad usque summitem fluidi; & æquatur gravitati Orbis infimi multiplicatæ per numerum Orbium: hoc est, gravitati solidi cujus ultima ratio ad Cylindrum præfinitum (si modo Orbium augeatur numerus & minuat crassitudo in infinitum, sic ut actio gravitatis a superficie infima ad supremam continua reddatur) fiet ratio æqualitatis. Sustinet ergo superficies infima pondus Cylindri præfi-



præfiniti. *Q. E. D.* Et simili argumentatione patet Propositio, LIBER
 ubi gravitas decrescit in ratione quavis assignata distantiae a centro, SECUNDUS.
 ut & ubi Fluidum sursum rarius est, deorsum densius. *Q. E. D.*

Corol. 1. Igitur fundum non urgetur a toto fluidi incumbentis pondere, sed eam solummodo ponderis partem sustinet quæ in propositione describitur; pondere reliquo a fluidi figura fornicata sustentato.

Corol. 2. In æqualibus autem a centro distantis eadem semper est pressio quantitas, sive superficies pressa sit Horizonti parallela vel perpendicularis vel obliqua; sive fluidum, a superficie pressa sursum continuatum, surgat perpendiculariter secundum lineam rectam, vel serpat oblique per tortas cavitates & canales, easque regulares vel maxime irregulares, amplas vel angustissimas. Hisce circumstantiis pressionem nil mutari colligitur, applicando demonstrationem Theorematis hujus ad Casus singulos Fluidorum.

Corol. 3. Eadem Demonstratione colligitur etiam (per Prop. XIX.) quod fluidi gravis partes nullum, ex pressione ponderis incumbentis, acquirunt motum inter se, si modo excludatur motus qui ex condensatione oritur.

Corol. 4. Et propterea si aliud ejusdem gravitatis specificæ corpus, quod sit condensationis expers, submergatur in hoc fluido, id ex pressione ponderis incumbentis nullum acquirat motum: non descendet, non ascendet, non cogetur figuram suam mutare. Si sphaericum est manebit sphaericum, non obstante pressione; si quadratum est manebit quadratum: idque sive molle sit, sive fluidissimum; sive fluido libere innatet, sive fundo incumbat. Habet enim fluidi pars quælibet internam rationem corporis submersi, & par est ratio omnium ejusdem magnitudinis, figuræ & gravitatis specificæ submersorum corporum. Si corpus submersum servato pondere liquefceret & indueret formam fluidi; hoc, si prius ascenderet vel descenderet vel ex pressione figuram novam indueret, etiam nunc ascenderet vel descenderet vel figuram novam induere cogeretur: id adeo quia gravitas ejus cæteræque motuum causæ permanent. Atqui, per Cas. 5. Prop. XIX. jam quiesceret & figuram retineret. Ergo & prius.

Corol. 5. Proinde corpus quod specificè gravius est quam Fluidum sibi contiguum subsidebit, & quod specificè levius est ascendet, motumque & figuræ mutationem consequetur, quantum excessus ille vel defectus gravitatis efficere possit. Namque excessus ille vel defectus rationem habet impulsus, quo corpus alias in æquili-

DE MOTU
CORPORUM.

æquilibrio cum fluidi partibus constitutum, urgetur; & comparari potest cum excessu vel defectu ponderis in lance alterutra libræ.

Corol. 6. Corporum igitur in fluidis constitutorum duplex est Gravitatio: altera vera & absoluta, altera apparens, vulgaris & comparativa. Gravitatio absoluta est vis tota qua corpus deorsum tendit: relativa & vulgaris est excessus gravitatis quo corpus magis tendit deorsum quam fluidum ambiens. Prioris generis Gravitatio partes fluidorum & corporum omnium gravitant in locis suis: ideoque conjunctis ponderibus componunt pondus totius. Nam totum omne grave est, ut in vasis liquorum plenis experiri licet; & pondus totius æquale est ponderibus omnium partium, ideoque ex iisdem componitur. Alterius generis Gravitatio corpora non gravitant in locis suis, id est, inter se collata non prægravant, sed mutuos ad descendendum conatus impeditentia permanent in locis suis, perinde ac si gravia non essent. Quæ in Aere sunt & non prægravant, vulgus gravia non judicat. Quæ prægravant vulgus gravia judicat, quatenus ab Aeris pondere non sustinentur. Pondera vulgi nihil aliud sunt quam excessus verorum ponderum supra pondus Aeris. Unde & vulgo dicuntur levia, quæ sunt minus gravia, Aerique prægravanti cedendo superiora petunt. Comparative levia sunt, non vere, quia descendunt in vacuo. Sic & in Aqua corpora, quæ ob majorem vel minorem gravitatem descendunt vel ascendunt, sunt comparative & apparenter gravia vel levia, & eorum gravitas vel levitas comparativa & apparens est excessus vel defectus quo vera eorum gravitas vel superat gravitatem aquæ vel ab ea superatur. Quæ vero nec prægravando descendunt, nec prægravanti cedendo ascendunt, etiam si veris suis ponderibus adaugeant pondus totius, comparative tamen & in sensu vulgi non gravitant in aqua. Nam similis est horum Casuum Demonstratio.

Corol. 7. Quæ de gravitate demonstrantur, obtinent in aliis quibuscunque viribus centripetis.

Corol. 8. Proinde si Medium, in quo corpus aliquod movetur, urgeatur vel a gravitate propria, vel ab alia quacunque vi centripeta, & corpus ab eadem vi urgeatur fortius: differentia virium est vis illa motrix, quam in præcedentibus Propositionibus ut vim centripetam consideravimus. Sin corpus a vi illa urgeatur levius, differentia virium pro vi centrifuga haberi debet.

Corol. 9. Cum autem fluida premendo corpora inclusa non mutant eorum Figuras externas, patet insuper, per Corollarium Prop.

Prop. XIX., quod non mutabunt situm partium internarum inter se: proindeque, si Animalia immergantur, & sensatio omnis a motu partium oriatur; nec lædent corpora immersa, nec sensationem ullam excitabunt, nisi quatenus hæc corpora a compressione condensari possunt. Et par est ratio cujuscunque corporum Systematis fluido comprimente circumdati. Systematis partes omnes iisdem agitantur motibus, ac si in vacuo constituerentur, ac solam retinerent gravitatem suam comparativam, nisi quatenus fluidum vel motibus earum nonnihil resistat, vel ad eandem compressione conglutinandas requiratur.

PROPOSITIO XXI. THEOREMA XVI.

Sit Fluidi cujusdam densitas compressioni proportionalis, & partes ejus a vi centripeta distantis suis a centro reciproce proportionali deorsum trahantur: dico quod, si distantie illæ sumantur continue proportionales, densitates Fluidi in iisdem distantis erunt etiam continue proportionales.


Designet ATV fundum Sphæricum cui fluidum incumbit, S centrum, SA, SB, SC, SD, SE , &c. distantias continue proportionales. Erigantur perpendiculara AH, BI, CK, DL, EM , &c. quæ sint ut densitates Medii in locis A, B, C, D, E ; & specificæ gravitates in iisdem locis erunt ut $\frac{AH}{AS}, \frac{BI}{BS}, \frac{CK}{CS}$, &c. vel, quod

perinde est, ut $\frac{AH}{AB}, \frac{BI}{BC}, \frac{CK}{CD}$, &c. Finge

primum has gravitates uniformiter continuari ab A ad B , a B ad C , a C ad D , &c. factis per gradus decrementis in punctis B, C, D , &c. Et hæc gravitates ductæ in altitudines AB, BC, CD , &c. conficiant pressiones AH, BI, CK , quibus fundum ATV (juxta Theorema xv.) urgetur. Sustinet ergo particula A pressiones omnes AH, BI, CK, DL , pergendo in infinitum; & particula B pressiones omnes præter primam AH ; & particula C omnes præter duas primas AH, BI ; & sic deinceps: adeoque particula primæ A densitas AH est ad particula secundæ B densi-

L 1


tatem



DE MOTU
CORPORUM,

tatem BI ut summa omnium $AH+BI+CK+DL$, in infinitum, ad summam omnium $BI+CK+DL$, &c. Et BI densitas secundæ B , est ad CK densitatem tertiæ C , ut summa omnium $BI+CK+DL$, &c. ad summam omnium $CK+DL$, &c. Sunt igitur summæ illæ differentiis suis AH , BI , CK , &c. proportionales, atque adeo continue proportionales, per hujus Lem. 1. proindeque differentiæ AH , BI , CK , &c. summis proportionales, sunt etiam continue proportionales. Quare cum densitates in locis A , B , C , &c. sint ut AH , BI , CK , &c. erunt etiam hæ continue proportionales. Pergatur per saltum, & (ex æquo) in distantiiis SA , SC , SE continue proportionalibus, erunt densitates AH , CK , EM continue proportionales. Et eodem argumento, in distantiiis quibuscvis continue proportionalibus SA , SD , SG , densitates AH , DL , GO erunt continue proportionales. Coeant jam puncta A , B , C , D , E , &c. eo ut progressio gravitatum specificarum a fundo A ad summitatem Fluidi continua reddatur, & in distantiiis quibuscvis continue proportionalibus SA , SD , SG , densitates AH , DL , GO , semper existentes continue proportionales, manebunt etiamnum continue proportionales. *Q. E. D.*

Corol. Hinc si detur densitas Fluidi in duobus locis, puta A & E , colligi potest ejus densitas in alio quovis loco *Q*. Centro S , Asymptotis rectangulis SQ , SX , describatur Hyperbola secans perpendiculara AH , EM , QT in a , e , q , ut & perpendiculara HX , MT , TZ , ad Asymptoton SX demissa, in b , m & t . Fiat area $ZYmtZ$ ad aream datam $YmbX$ ut area data $EeqQ$ ad aream datam $EeaA$; & linea Zt producta abscindet lineam Qt densitati proportionalem. Namque si lineæ SA , SE , SQ sunt continue proportionales, erunt areæ $EeqQ$, $EeaA$ æquales, & inde areæ his proportionales $YmtZ$, $XbmT$ etiam æquales, & lineæ SX , ST , SZ , id est AH , EM , QT continue proportionales, ut oportet. Et si lineæ SA , SE , SQ obtinent alium quemvis ordinem in serie continue proportionalium, lineæ AH , EM , QT , ob proportionales areas Hyperbolicas, obtinebunt eundem ordinem in alia serie quantitatum continue proportionalium.




PROPO.

PROPOSITIO XXII. THEOREMA XVII.

Sit Fluidi cujusdam densitas compressioni proportionalis, & partes ejus a gravitate quadratis distantiarum suarum a centro reciproce proportionali deorsum trahantur: dico quod, si distantiae sumantur in progressione Musica, densitates Fluidi in his distantiis erunt in progressione Geometrica.

Designet S centrum, & SA, SB, SC, SD, SE distantias in progressione Geometrica. Erigantur perpendiculara AH, BI, CK , &c. quæ sint ut, Fluidi densitates in locis A, B, C, D, E , &c. & ipsius



gravitates specificæ in iisdem locis erunt $\frac{AH}{SAq}, \frac{BI}{SBq}, \frac{CK}{SCq}$, &c.

Finge has gravitates uniformiter continuari, primam ab A ad B , secundam a B ad C , tertiam a C ad D , &c. Et hæ ductæ in altitudines AB, BC, CD, DE , &c. vel, quod perinde est, in distantias SA, SB, SC , &c. altitudinibus illis proportionales facient ex-

ponentes pressionum $\frac{AH}{SA}, \frac{BI}{SB}, \frac{CK}{SC}$, &c. Quare cum densitates

sint ut harum pressionum summæ, differentiæ densitatum $AH - BI$,

$BI - CK$, &c. erunt ut summarum differentiæ $\frac{AH}{SA}, \frac{BI}{SB}, \frac{CK}{SC}$, &c.

Ll 2

Centro

tur jam differentię quęlibet, puta SA, SD, SF in progressionē Musica, & differentię $Aa—Dd, Dd—Ff$ erunt æquales; & propterea differentiis hęc proportionales arę $thlx, xlnz$ æquales erunt inter se, & densitates St, Sx, Sz , id est, AH, DL, FN , continue proportionales. *Q. E. D.*

Corol. Hinc si dentur Fluidi densitates duę quęvis, puta AH & CK , dabitur area $thkw$ harum differentię tw respondens; & inde invenietur densitas FN in altitudine quacunq; SF , fumendo aream $tbnz$ ad aream illam datam $thkw$ ut est differentia $Aa—Ff$ ad differentiam $Aa—Cc$.

Scholium.

Simili argumentatione probari potest, quod si gravitas particularum Fluidi diminuatur in triplicata ratione distantiarum a centro; & quadratorum distantiarum SA, SB, SC , &c. reciproca (nempe

$\frac{SA cub.}{SAq}, \frac{SA cub.}{SBq}, \frac{SA cub.}{SCq}$) fumantur in progressionē Arithmetica; densitates AH, BI, CK , &c. erunt in progressionē Geometrica. Et si gravitas diminuatur in quadruplicata ratione distantiarum, & cuborum distantiarum reciproca (puta $\frac{SAqqq}{SA cub.}, \frac{SAqqq}{SB cub.}$

$\frac{SAqqq}{SC cub.}$, &c.) fumantur in progressionē Arithmetica; densitates AH, BI, CK , &c. erunt in progressionē Geometrica. Et sic in infinitum. Rursus si gravitas particularum Fluidi in omnibus distantis eadem sit, & distantię sint in progressionē Arithmetica, densitates erunt in progressionē Geometrica, uti Vir Cl. *Edmundus Halleius* invenit. Si gravitas sit ut distantia, & quadrata distantiarum sint in progressionē Arithmetica, densitates erunt in progressionē Geometrica. Et sic in infinitum. Hęc ita se habent ubi Fluidi compressione condensati densitas est ut vis compressionis, vel, quod perinde est, spatium a Fluido occupatum reciproce ut hęc vis. Fingi possunt alię condensationis Leges, ut quod cubus vis comprimētis sit ut quadrato-quadratum densitatis, sed triplicata ratio Vis æqualis quadruplicatę rationi densitatis. Quo in casu, si gravitas est reciproce ut quadratum distantię a centro, densitas erit reciproce ut cubus distantię. Fingatur quod cubus vis comprimētis sit ut quadrato-cubus densitatis, & si gravitas est reciproce ut quadratum distantię, densitas erit reciproce in sesquuplicata ratione


DE MOTU
CORPORUM,

tione distantiae. Fingatur quod vis comprimens sit in duplicata ratione densitatis, & gravitas reciproce in ratione duplicata distantiae, & densitas erit reciproce ut distantia. Casus omnes percurrere longum esset.

PROPOSITIO XXIII. THEOREMA XVIII.

Si Fluidi ex particulis se mutuo fugientibus compositi densitas sit ut compressio, vires centrifugæ particularum sunt reciproce proportionales distantiiis centrorum suorum. Et vice versa, particulae viribus quæ sunt reciproce proportionales distantiiis centrorum suorum se mutuo fugientes componunt Fluidum Elasticum, cujus densitas est compressioni proportionalis.

Includi intelligatur Fluidum in spatio cubico ACE , dein compressione redigi in spatium cubicum minus ace ; & particularum, similem situm inter se in utroque spatio obtinentium, distantiae erunt ut cuborum latera AB , ab ; & Medii densitates reciproce ut spatia continentia $AB\ cub.$ & $ab\ cub.$ In latere cubi majoris $ABCD$ capiatur quadratum DP æquale lateri cubi minoris db ; & ex Hypothesi, pressio qua quadratum DP urget Fluidum inclusum, erit ad pressionem qua latus illud quadratum db urget Fluidum inclusum ut Medii densitates ad invicem, hoc est, ut $ab\ cub.$ ad $AB\ cub.$ Sed pressio qua quadratum DB urget Fluidum inclusum, est ad pressionem qua quadratum DP urget idem Fluidum, ut quadratum DB , ad quadratum DP , hoc est, ut AB , quad. ad ab quad. Ergo, ex æquo, pressio qua latus DB urget Fluidum, est ad pressionem qua latus db urget Fluidum, ut ab ad AB . Planis FGH , fgb , per media cuborum ductis, distinguatur Fluidum in duas partes, & hæc se mutuo prement iisdem viribus, quibus premuntur a planis AC , ac , hoc est, in proportionem ab ad AB : adeoque vires centrifugæ, quibus hæc pressiones sustinentur, sunt in eadem ratione. Ob eundem particularum numerum similemque situm in utroque cubo, vires quas particulae omnes secundum plana FGH , fgb exercent in omnes,



nes, sunt ut vires quas singulæ exercent in singulas. Ergo vires, LIBER
SECUNDUS.
 quas singulæ exercent in singulas secundum planum FGH in cubo majore, sunt ad vires quas singulæ exercent in singulas secundum planum fgb in cubo minore ut ab ad AB , hoc est, reciproce ut distantia particularum ad invicem. \mathcal{Q} . *E. D.*

Et vice versa, si vires particularum singularum sunt reciproce ut distantia, id est, reciproce ut cuborum latera AB , ab ; summæ virium erunt in eadem ratione, & pressiones laterum DB , db ut summæ virium; & pressio quadrati DP ad pressionem lateris DB ut ab quad. ad AB quad. Et, ex æquo, pressio quadrati DP ad pressionem lateris db ut ab cub. ad AB cub. id est, vis compressionis ad vim compressionis ut densitas ad densitatem. \mathcal{Q} . *E. D.*

Scholium.

Simili argumento, si particularum vires centrifugæ sint reciproce in duplicata ratione distantiarum inter centra, cubi virium comprimentium erunt ut quadrato-quadrata densitatum. Si vires centrifugæ sint reciproce in triplicata vel quadruplicata ratione distantiarum, cubi virium comprimentium erunt ut quadrato-cubi vel cubo-cubi densitatum. Et universaliter, si D ponatur pro distantia, & E pro densitate Fluidi compressi, & vires centrifugæ sint reciproce ut distantia dignitas quælibet D^n , cujus index est numerus n ; vires comprimentes erunt ut latera cubica dignitatis E^{n+2} , cujus index est numerus $n+2$: & contra. Intelligenda vero sunt hæc omnia de particularum Viribus centrifugis quæ terminantur in particulis proximis, aut non longe ultra diffunduntur. Exemplum habemus in corporibus Magneticis. Horum Virtus attractiva terminatur fere in sui generis corporibus sibi proximis. Magnetis virtus per interpositam laminam ferri contrahitur, & in lamina fere terminatur. Nam corpora ulteriora non tam a Magnete quam a lamina trahuntur. Ad eundem modum si particulæ fugiant alias sui generis particulas sibi proximas, in particulas autem remotiores virtutem nullam exercent, ex hujusmodi particulis componentur Fluida de quibus actum est in hac Propositione. Quod si particulæ cujusque virtus in infinitum propagetur, opus erit vi majori ad æqualem condensationem majoris quantitatis Fluidi. An vero Fluida Elastica ex particulis se mutuo fugantibus consent, Quæstio Physica est. Nos proprietatem Fluidorum ex ejusmodi particulis constantium Mathematicè demonstravimus, ut Philosophis ansam præbeamus Quæstionem illam tractandi.

SECTIO

S E C T I O VI.

De Motu & Resistentia Corporum Funependulorum.

PROPOSITIO XXIV. THEOREMA XIX.

Quantitates materiæ in corporibus funependulis, quorum centra oscillationum a centro suspensionis æqualiter distant, sunt in ratione composita ex ratione ponderum & ratione duplicata temporum oscillationum in vacuo.

Nam velocitas, quam data vis in data materia dato tempore generare potest, est ut vis & tempus directe, & materia inverse. Quo major est vis vel majus tempus vel minor materia, eo major generabitur velocitas. Id quod per motus Legem secundam manifestum est. Jam vero si Pendula ejusdem sint longitudinis, vires motrices in locis a perpendiculari æqualiter distantibus sunt ut pondera: ideoque si corpora duo oscillando describant arcus æquales, & arcus illi dividantur in partes æquales; cum tempora quibus corpora describunt singulas arcuum partes correspondentes, sint ut tempora oscillationum totarum, erunt velocitates ad invicem in correspondentibus oscillationum partibus, ut vires motrices & tota oscillationum tempora directe & quantitates materiæ reciproce: adeoque quantitates materiæ ut vires & oscillationum tempora directe & velocitates reciproce. Sed velocitates reciproce sunt ut tempora, atque adeo tempora directe & velocitates reciproce sunt ut quadrata temporum, & propterea quantitates materiæ sunt ut vires motrices & quadrata temporum, id est, ut pondera & quadrata temporum. *Q. E. D.*

Corol. 1. Ideoque si tempora sunt æqualia, quantitates materiæ in singulis corporibus erunt ut pondera.

Corol. 2. Si pondera sunt æqualia, quantitates materiæ erunt ut quadrata temporum.

Corol. 3. Si quantitates materiæ æquantur, pondera erunt reciproce ut quadrata temporum.

Corol.

Corol. 4. Unde cum quadrata temporum, cæteris paribus, sint ut longitudines pendulorum; si & tempora & quantitates materiæ æqualia sunt, pondera erunt ut longitudines pendulorum.

Corol. 5. Et universaliter, quantitas materiæ pendulæ est ut pondus & quadratum temporis directe, & longitudo penduli inverse.


Corol. 6. Sed & in Medio non resistente quantitas materiæ pendulæ est ut pondus comparativum & quadratum temporis directe & longitudo penduli inverse. Nam pondus comparativum est vis motrix corporis in Medio quovis gravi, ut supra explicui; adeoque idem præstat in tali Medio non resistente atque pondus absolutum in vacuo.

Corol. 7. Et hinc liquet ratio tum comparandi corpora inter se, quoad quantitatem materiæ in singulis; tum comparandi pondera ejusdem corporis in diversis locis, ad cognoscendam variationem gravitatis. Factis autem experimentis quam accuratissimis inveni semper quantitatem materiæ in corporibus singulis eorum ponderi proportionalem esse.

PROPOSITIO XXV. THEOREMA XX.

Corpora Funependula quibus, in Medio quovis, resistitur in ratione momentorum temporis, & corpora Funependula quæ in ejusdem gravitatis specificæ Medio non resistente moventur, oscillationes in Cycloide eodem tempore peragunt, & arcuum partes proportionales simul describunt.

Sit AB Cycloidis arcus, quem corpus D tempore quovis in Medio non resistente oscillando describit. Bifecetur idem in C , ita ut C sit infimum ejus punctum; & erit vis acceleratrix qua corpus urgetur in loco quovis D vel d vel E ut longitudo arcus CD vel Cd vel CE .



Exponatur vis illa per eundem arcum; & cum resistentia sit ut momentum temporis, adeoque detur, exponatur


$M m$

tur

DE MOTU
CORPORUM,

tur eadem per datam arcus Cycloidis partem CO , & sumatur arcus Od in ratione ad arcum CD quam habet arcus OB ad arcum CB : & vis qua corpus in d urgetur in Medio resistente, cum sit excessus vis Cd supra resistantiam CO , exponetur per arcum Od , adeoque erit ad vim qua corpus D urgetur in Medio non resistente, in loco D , ut arcus Od ad arcum CD ; & propterea etiam in loco B ut arcus OB ad arcum CB . Proinde si corpora duo, D , d exeant de loco B , & his viribus urgeantur: cum vires sub initio sint ut arcus CB & OB , erunt velocitates primæ & arcus primo descripti in eadem ratione. Sunto arcus illi BD & Bd , & arcus reliqui CD , Od erunt in eadem ratione. Proinde vires, ipsis CD , Od proportionales, manebunt in eadem ratione ac sub initio, & propterea corpora pergent arcus in eadem ratione simul describere. Igitur vires &

velocitates & arcus reliqui CD , Od semper erunt ut arcus toti CB , OB , & propterea arcus illi reliqui simul describentur. Quare corpora duo D , d simul pervenient ad loca C & O , alterum quidem in Medio non resistente ad locum C ,



& alterum in Medio resistente ad locum O . Cum autem velocitates in C & O sint ut arcus CB , OB ; erunt arcus quos corpora ulterius pergendo simul describunt, in eadem ratione. Sunto illi CE & Oe . Vis qua corpus D in Medio non resistente retardatur in E est ut CE , & vis qua corpus d in Medio resistente retardatur in e est ut summa vis Ce & resistantiæ CO , id est ut Oe ; ideoque vires, quibus corpora retardantur, sunt ut arcubus CE , Oe proportionales arcus CB , OB ; proindeque velocitates, in data illa ratione retardatæ, manent in eadem illa data ratione. Velocitates igitur & arcus iisdem descripti semper sunt ad invicem in data illa ratione arcuum CB & OB ; & propterea si sumantur arcus toti AB , aB in eadem ratione, corpora D , d simul describent hos arcus, & in locis A & a motum omnem simul amittent. Isochronæ sunt igitur oscillationes totæ, & arcubus totis BA , Ba proportionales sunt arcuum partes quælibet BD , Bd vel BE , Be quæ simul describuntur. *Q. E. D.*

Corol.

Corol. Igitur motus velocissimus in Medio resistente non incidit in punctum infimum C , sed reperitur in puncto illo O , quo arcus totus descriptus aB bisecatur. Et corpus subinde pergendo ad a , iisdem gradibus retardatur quibus antea accelerabatur in descensu suo a B ad O .

PROPOSITIO XXVI. THEOREMA XXI.

Corporum Funependulorum quibus resistitur in ratione velocitatum, oscillationes in Cycloide sunt Isochronæ.

Nam si corpora duo, a centris suspensionum æqualiter distantia, oscillando describant arcus inæquales, & velocitates in arcuum partibus correspondentibus sint ad invicem ut arcus toti: resistantiæ velocitatibus proportionales, erunt etiam ad invicem ut iidem arcus. Proinde si viribus motricibus a gravitate oriundis, quæ sint ut iidem arcus, auferantur vel addantur hæ resistantiæ, erunt differentiæ vel summæ ad invicem in eadem arcuum ratione, cumque velocitatum incrementa vel decrementa sint ut hæ differentiæ vel summæ, velocitates semper erunt ut arcus toti: Igitur velocitates, si sint in aliquo casu ut arcus toti, manebunt semper in eadem ratione. Sed in principio motus, ubi corpora incipiunt descendere & arcus illos describere, vires, cum sint arcubus proportionales, generabunt velocitates arcubus proportionales. Ergo velocitates semper erunt ut arcus toti describendi, & propterea arcus illi simul describentur. *Q. E. D.*

PROPOSITIO XXVII. THEOREMA XXII.

Si Corporibus Funependulis resistitur in duplicata ratione velocitatum, differentiæ inter tempora oscillationum in Medio resistente ac tempora oscillationum in ejusdem gravitatis specificæ Medio non resistente, erunt arcubus oscillando descriptis proportionales, quam proxime.

Nam pendulis æqualibus in Medio resistente describantur arcus inæquales, A , B ; & resistantia corporis in arcu A , erit ad resistantiam corporis in parte correspondente arcus B , in duplicata ratione velocitatum, id est, ut AA ad BB , quam proxime. Si resistentia

Mm 2

stentia

DE MOTU
CORPORUM, stentia in arcu B esset ad resistantiam in arcu A ut AB ad AA; tempora in arcubus A & B forent æqualia, per Propositionem superiorem. Ideoque resistantia AA in arcu A, vel AB in arcu B, efficit excessum temporis in arcu A supra tempus in Medio non resistente: & resistantia BB efficit excessum temporis in arcu B supra tempus in Medio non resistente. Sunt autem excessus illi ut vires efficientes AB & BB quam proxime, id est, ut arcus A & B. *Q. E. D.*

Corol. 1. Hinc ex oscillationum temporibus, in Medio resistente, in arcubus inæqualibus factarum, cognosci possunt tempora oscillationum in ejusdem gravitatis specificæ Medio non resistente. Nam differentia temporum erit ad excessum temporis in arcu minore supra tempus in Medio non resistente, ut differentia arcuum ad arcum minorem.

Corol. 2. Oscillationes breviores sunt magis Isochronæ, & brevissimæ iisdem temporibus peraguntur ac in Medio non resistente, quam proxime. Earum vero quæ in majoribus arcubus fiunt, tempora sunt paulo majora, propterea quod resistantia in descensu corporis qua tempus producit, major sit pro ratione longitudinis in descensu descriptæ, quam resistantia in ascensu subsequente qua tempus contrahitur. Sed & tempus oscillationum tam brevium quam longarum nonnihil produci videtur per motum Medii. Nam corporibus tardescentibus paulo minus resistitur, pro ratione velocitatis, & corporibus acceleratis paulo magis quam iis quæ uniformiter progrediuntur: id adeo quia Medium, eo quem a corporibus accepit motu, in eandem plagam pergendo, in priore casu magis agitur; in posteriore minus; ac proinde magis vel minus cum corporibus motis conspirat. Pendulis igitur in descensu magis resistit, in ascensu minus quam pro ratione velocitatis, & ex utraque causa tempus producit.

PROPOSITIO XXVIII. THEOREMA XXIII.

Si Corpori Funependulo in Cycloide oscillanti resistitur in ratione momentorum temporis, erit ejus resistantia ad vim gravitatis ut excessus arcus descensu toto descripti supra arcum ascensu subsequente descriptum, ad penduli longitudinem duplicatam.


Designet *BC* arcum descensu descriptum, *Ca* arcum ascensu descriptum, & *Aa* differentiam arcuum: & stantibus quæ in Propositione

fitione xxv. constructa & demonstrata sunt, erit vis qua corpus oscillans urgetur in loco quovis \mathcal{D} , ad vim resistentiæ ut arcus CD ad arcum CO , qui semissis est differentiæ illius Aa . Ideoque vis qua corpus oscillans urgetur in Cycloidis principio seu puncto altissimo, id est, vis gravitatis, erit ad resistentiam ut arcus Cycloidis inter punctum illud supremum & punctum infimum C ad arcum CO ; id est (si arcus duplicentur) ut Cycloidis totius arcus, seu dupla penduli longitudo, ad arcum Aa . *Q. E. D.*

PROPOSITIO XXIX. PROBLEMA VI.

Posito quod Corpori in Cycloide oscillanti resistitur in duplicata ratione velocitatis: invenire resistantiam in locis singulis.

Sit *Ba* (Fig. Prop. xxv.) arcus oscillatione integra descriptus, sitque *C* infimum Cycloidis punctum, & *CZ* semissis arcus Cycloidis totius, longitudini Penduli æqualis; & quærat^r resistentia cor-




poris in loco quovis *D*. Secetur recta infinita *OQ* in punctis *O*, *C*, *P*, *Q*, ea lege ut (si erigantur perpendiculara *OK*, *CT*, *PI*, *QE*, centroque *O* & Asymptotis *OK*, *OQ* describatur Hyperbola *TIGE* secans perpendiculara *CT*, *PI*, *QE* in *T*; *I* & *E*, & per punctum *I* agatur *KF* parallela Asymptoto *OQ* occurrens Asymptoto *OK* in *K*, & perpendicularis *CT* & *QE* in *L* & *F*) fuerit area Hyperbolica *PTEQ* ad aream Hyperbolicam *PITC* ut arcus *BC* descensu corporis descriptus ad arcum *Ca* ascensu descriptum, & area *IEF* ad

Mm 3.
aream

DE MOTU
CORPORUM, aream ILT ut OQ ad OC . Dein perpendicularo MN abscindatur
area Hyperbolica $PINM$ quæ sit ad aream Hyperbolicam $PIEQ$
ut arcus CZ ad arcum BC descensu descriptum. Et si perpendi-
culo RG abscindatur area Hyperbolica $PIGR$, quæ sit ad aream
 $PIEQ$ ut arcus quilibet CD ad arcum BC descensu toto de-
scriptum: erit resistentia in loco D ad vim gravitatis, ut area
 $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$ ad aream $PIENM$.

Nam cum vires a gravitate oriundæ quibus corpus in locis Z, B, D ,
a urgetur, sint ut arcus CZ, CB, CD, Ca , & arcus illi sint ut areæ
 $PINM, PIEQ, PIGR, PITC$; exponantur tum arcus tum
vires per has areas respective. Sit insuper Dd spatium quam mini-
mum a corpore descendente descriptum, & exponatur idem per aream
quam minimam $RGgr$ parallelis RG, rg comprehensam; & pro-



ducatur rg ad h , ut sint $GHbg$, & $RGgr$ contemporanea arearum
 $IGH, PIGR$ decrementa. Et areæ $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$ incremen-
tum $GHbg - \frac{Rr}{OQ}IEF$, seu $Rr \times HG - \frac{Rr}{OQ}IEF$, erit ad areæ
 $PIGR$ decrementum $RGgr$ seu $Rr \times RG$, ut $HG - \frac{IEF}{OQ}$
ad RG ; adeoque ut $OR \times HG - \frac{OR}{OQ}IEF$ ad $OR \times GR$ seu
 $OP \times PI$, hoc est (ob æqualia $OR \times HG, OR \times HR - OR \times GR$,
 $ORHK - OPIK, PIHR$ & $PIGR + IGH$) ut $PIGR +$
 $IGH - \frac{OR}{OQ}IEF$ ad $OPIK$. Igitur si area $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$
dicatur

dicatur Y , atque areæ $PIGR$ decrementum $RGgr$ detur, erit $LIBER$
 incrementum areæ Y ut $PIGR - Y$. SECUNDUS.

Quod si V designet vim a gravitate oriundam, arcui describendo CD proportionalem, qua corpus urgetur in D : & R pro resistantia ponatur: erit $V - R$ vis tota qua corpus urgetur in D . Est itaque incrementum velocitatis ut $V - R$ & particula illa temporis in qua factum est conjunctim: Sed & velocitas ipsa est ut incrementum contemporaneum spatii descripti directe & particula eadem temporis inverse. Unde, cum resistantia (per Hypothesin) sit ut quadratum velocitatis, incrementum resistantiæ (per Lem. 11.) erit ut velocitas & incrementum velocitatis conjunctim, id est, ut momentum spatii & $V - R$ conjunctim; atque adeo, si momentum spatii detur, ut $V - R$; id est, si pro vi V scribatur ejus exponens $PIGR$, & resistantia R exponatur per aliam aliquam aream Z , ut $PIGR - Z$.

Igitur area $PIGR$ per datorum momentorum subductionem uniformiter decrescente, crescunt area Y in ratione $PIGR - Y$, & area Z in ratione $PIGR - Z$. Et propterea si areæ Y & Z simul incipiant & sub initio æquales sint, hæ per additionem æqualium momentorum pergent esse æquales, & æqualibus itidem momentis subinde decrescuentes simul evanescent. Et vicissim, si simul incipiunt & simul evanescent, æqualia habebunt momenta & semper erunt æquales: id adeo quia si resistantia Z augeatur, velocitas una cum arcu illo Ca , qui in ascensu corporis describitur, diminuetur; & puncto in quo motus omnis una cum resistantia cessat propius accedente ad punctum C , resistantia citius evanescet, quam area Y . Et contrarium eveniet ubi resistantia diminuitur.

Jam vero area Z incipit definitque ubi resistantia nulla est, hoc est, in principio & fine motus, ubi arcus CD , CD arcubus CB & Ca æquantur, adeoque ubi recta RG incidit in rectas QE & CT .

Et area Y seu $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$ incipit definitque ubi nulla est,

adeoque ubi $\frac{OR}{OQ}IEF$ & IGH æqualia sunt: hoc est (per constructionem) ubi recta RG incidit in rectas QE & CT . Proindeque areæ illæ simul incipiunt & simul evanescent, & propterea semper sunt æquales.

Igitur area $\frac{OR}{OQ}IEF - IGH$ æqualis est areæ Z , per quam resistantia exponitur, & propterea est ad aream $PINM$ per quam gravitas exponitur, ut resistantia ad gravitatem. $Q. E. D.$

Corol.

DE MOTU
CORPORUM,

Corol. 1. Est igitur resistentia in loco infimo C ad vim gravitatis, ut area $\frac{OP}{OQ} IEF$ ad aream $PINM$.

Corol. 2. Fit autem maxima, ubi area $PIHR$ est ad aream IEF ut OR ad OQ . Eo enim in casu momentum ejus (nimirum $PIGR - Y$) evadit nullum.

Corol. 3. Hinc etiam innotescit velocitas in locis singulis: quippe quæ est in subduplicata ratione resistentiæ, & ipso motus initio æquatur velocitati corporis in eadem Cycloide absque omni resistentia oscillantis.

Cæterum ob difficilem calculum quo resistentia & velocitas per hanc Propositionem inveniendæ sunt, visum est Propositionem sequentem subungere, quæ & generalior sit & ad usus Philosophicos abunde latis accurata.

PROPOSITIO XXX. THEOREMA XXIV.

Si recta a B æqualis sit Cycloidis arcui quem corpus oscillando describit, & ad singula ejus puncta D erigantur perpendiculara DK, quæ sint ad longitudinem Penduli ut resistentia corporis in arcus punctis correspondentibus ad vim gravitatis: dico quod differentia inter arcum descensu toto descriptum, & arcum ascensu toto subsequente descriptum, ducta in arcuum eorundem semisummam, æqualis erit area BK a B a perpendicularis omnibus DK occupata.


Exponatur enim tum Cycloidis arcus, oscillatione integra descriptus, per rectam illam sibi æqualem aB , tum arcus qui describeretur in vacuo per longitudinem AB . Bifecetur AB in C , & punctum C repræsentabit infimum Cycloidis punctum, & erit CD ut vis a gravitate oriunda, qua corpus in D secundum tangentem Cycloidis urgetur, eamque habebit rationem ad longitudinem Penduli quam habet vis in D ad vim gravitatis. Exponatur igitur vis illa per longitudinem CD , & vis gravitatis per longitudinem penduli, & si in DE capiatur DK in ea ratione ad longitudinem penduli

penduli quam habet resistentia ad gravitatem, erit $\mathcal{D}K$ exponens resistentiæ. Centro C & intervallo CA vel CB construatur Semicirculus $BEeA$. Describat autem corpus tempore quam minimo spatium $\mathcal{D}d$, & erectis perpendicularis DE , de circumferentiæ occurrentibus in E & e , erunt hæc ut velocitates quas corpus in vacuo, descendendo a puncto B , acquireret in locis \mathcal{D} & d . Patet hoc per Prop. LII. Lib. 1. Exponentur itaque hæ velocitates per perpendiculara illa DE , de ; sitque DF velocitas quam acquirit in \mathcal{D} cadendo de B in Medio resistente. Et si centro C & intervallo CF describatur Circulus FfM occurrens rectis de & AB in f & M , erit M locus ad quem deinceps absque ulteriore resistentia ascenderet, & df velocitas quam acquireret in d . Unde etiam si Fg designet velocitatis momentum quod corpus \mathcal{D} , describendo spatium quam minimum $\mathcal{D}d$, ex resistentia Medii amittit; & sumatur CN æqualis Cg : erit N locus ad quem corpus deinceps absque ulteriore resistentia ascenderet, & MN erit decrementum ascensus ex velocitatis illius amissione oriundum. Ad df demittatur perpendicularum Fm , & velocitatis DF decrementum Fg a resistentia $\mathcal{D}K$ genitum, erit ad velocitatis ejusdem incrementum fm a vi CD genitum, ut vis generans $\mathcal{D}K$ ad vim generantem CD .

Sed & ob familia trian-
gula *Fmf*, *Fhg*, *FDC*,
est *fm* ad *Fm* seu *Dd*,
ut *CD* ad *DF*;
& ex æquo *Fg* ad *Dd*
ut *DK* ad *DF*. Item
Fb ad *Fg* ut *DF* ad *CF*;
& ex æquo perturbate,
Fh seu *MN* ad *Dd* ut
DK ad *CF* seu *CM*;

ideoque summa omnium $MN \times CM$ æqualis erit summae omnium $Dd \times DK$. Ad punctum mobile M erigi semper intelligatur ordinata rectangula æqualis indeterminatæ CM , quæ motu continuo ducatur in totam longitudinem Aa ; & trapezium ex illo motu descriptum sive huic æquale rectangulum $Aa \times \frac{1}{2} aB$ æquabitur summa omnium $MN \times CM$, adeoque summae omnium $Dd \times DK$, id est, areæ $BKkVTa$. \square , *E. D.*

Corol. Hinc ex lege resistentiæ & arcuum Ca , CB differentia Aa , colligi potest proportio resistentiæ ad gravitatem quam proximè.



De Motu
CORPORUM

Nam si uniformis sit resistentia DK ; Figura $aBKkT$ rectangulum erit sub Ba & DK ; & inde rectangulum sub $\frac{1}{2} Ba$ & Aa erit æquale rectangulo sub Ba & DK , & DK æqualis erit $\frac{1}{2} Aa$. Quare cum DK sit exponens resistentiæ, & longitudo penduli exponens gravitatis, erit resistentia ad gravitatem ut $\frac{1}{2} Aa$ ad longitudinem Penduli; omnino ut in Prop. xxviii. demonstratum est.

Si resistentia sit ut velocitas, Figura $aBKkT$ Ellipsis erit quam proxime. Nam si corpus, in Medio non resistente, oscillatione integra describeret longitudinem BA , velocitas in loco quovis D foret ut Circuli diametro AB descripti ordinatim applicata DE . Proinde cum Ba in Medio resistente, & BA in Medio non resistente, æqualibus circiter temporibus describantur; adeoque velocitates in singulis ipsius Ba punctis, sint quam proxime ad velocitates in punctis correspondentibus longitudinis BA , ut est Ba ad BA ; erit velocitas DK in Medio resistente ut Circuli vel Ellipseos super diametro Ba descripti



ordinatim applicatâ; adeoque Figura $BKVTa$ Ellipsis, quam proxime. Cum resistentia velocitati proportionalis supponatur, sit OV exponens resistentiæ in puncto Medio O ; & Ellipsis $aBRVS$, centro O , semiaxibus OB , OV descripta, Figuram $aBKVT$, eique æquale rectangulum $Aa \times BO$, æquabit quamproxime. Est igitur $Aa \times BO$ ad $OV \times BO$ ut area Ellipseos hujus ad $OV \times BO$: id est, Aa ad OV ut area semicirculi ad quadratum radii, sive ut 11 ad 7 circiter: Et propterea $\frac{7}{11} Aa$ ad longitudinem penduli ut corporis oscillantis resistentia in O ad ejusdem gravitatem.

Quod si resistentia DK sit in duplicata ratione velocitatis, Figura $BKVTa$ Parabola erit verticem habens V & axem OV , ideoque æqualis erit rectangulo sub $\frac{1}{2} Ba$ & OV quam proxime. Est igitur rectangulum sub $\frac{1}{2} Ba$ & Aa æquale rectangulo sub $\frac{1}{2} Ba$ & OV , adeoque OV æqualis $\frac{1}{2} Aa$: & propterea corporis oscillantis resistentia in O ad ipsius gravitatem ut $\frac{1}{2} Aa$ ad longitudinem Penduli.

Atque has conclusiones in rebus practicis abunde satis accuratas esse cenfeo. Nam cum Ellipsis vel Parabola $BRVSa$ congruat cum

cum Figura *BKVTa* in puncto medio *V*, hæc si ad partem alteram *BRV* vel *VSa* excedit Figuram illam, deficiet ab eadem ad partem alteram, & sic eidem æquabitur proxime.

PROPOSITIO XXXI. THEOREMA XXV.

Si Corporis oscillantis resistentia in singulis arcuum descriptorum partibus proportionalibus augeatur vel minuatur in data ratione; differentia inter arcum descensu descriptum & arcum subsequente ascensu descriptum, augebitur vel diminuetur in eadem ratione.

Oritur enim differentia illa ex retardatione Penduli per resistentiam Medii, adeoque est ut retardatio tota eique proportionalis resistentia retardans. In superiore Propositione rectangulum sub recta $\frac{1}{2} aB$ & arcuum illorum *CB*, *Ca* differentia *Aa*, æqualis erat areae *BKT*. Et area illa, si maneat longitudo *aB*, augeatur vel diminuitur in ratione ordinatim applicatarum *DK*; hoc est, in ratione resistentiæ, adeoque est ut longitudo *aB* & resistentia conjunctim. Proindeque rectangulum sub *Aa* & $\frac{1}{2} aB$ est ut *aB* & resistentia conjunctim, & propterea *Aa* ut resistentia. *Q. E. D.*

Corol. 1. Unde si resistentia sit ut velocitas, differentia arcuum in eodem Medio erit ut arcus totus descriptus: & contra.

Corol. 2. Si resistentia sit in duplicata ratione velocitatis, differentia illa erit in duplicata ratione arcus totius: & contra.

Corol. 3. Et universaliter, si resistentia sit in triplicata vel alia quavis ratione velocitatis, differentia erit in eadem ratione arcus totius: & contra.

Corol. 4. Et si resistentia sit partim in ratione simplici velocitatis, partim in ejusdem ratione duplicata, differentia erit partim in ratione arcus totius & partim in ejus ratione duplicata: & contra. Eadem erit lex & ratio resistentiæ pro velocitate, quæ est differentiæ illius pro longitudine arcus.

Corol. 5. Ideoque si, pendulo inæquales arcus successive describente, inveniri potest ratio incrementi ac decrementi differentiæ hujus pro longitudine arcus descripti; habebitur etiam ratio incrementi ac decrementi resistentiæ pro velocitate majore vel minore.

Ex his Propositionibus, per oscillationes Pendulorum in Mediis quibuscunque, invenire licet resistantiam Mediorum. Aeris vero resistantiam investigavi per Experimenta sequentia. Globum ligneum pondere unciarum *Romanarum* $57\frac{1}{2}$, diametro digitorum *Londinensium* $6\frac{7}{8}$ fabricatum, filo tenui ab unco satis firmo suspendi, ita ut inter unum & centrum oscillationis Globi distantia esset pedum $10\frac{1}{2}$. In filo punctum notavi pedibus decem & uncia una a centro suspensionis distans; & e regione puncti illius collocavi Regulam in digitos distinctam, quorum ope notarem longitudines arcuum a Pendulo descriptas. Deinde numeravi oscillationes quibus Globus octavam motus sui partem amitteret. Si pendulum deducebatur a perpendiculari ad distantiam duorum digitorum, & inde demittebatur; ita ut toto suo descensu describeret arcum duorum digitorum, totaque oscillatione prima, ex descensu & ascensu subsequente composita, arcum digitorum fere quatuor: idem oscillationibus 164 amisit octavam motus sui partem, sic ut ultimo suo ascensu describeret arcum digiti unius cum tribus partibus quartis digiti. Si primo descensu descripsit arcum digitorum quatuor; amisit octavam motus partem oscillationibus 121, ita ut ascensu ultimo describeret arcum digitorum $3\frac{1}{2}$. Si primo descensu descripsit arcum digitorum octo, sexdecim, triginta duorum vel sexaginta quatuor; amisit octavam motus partem oscillationibus 69, $35\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$, respective. Igitur differentia inter arcus descensu primo & ascensu ultimo descriptos, erat in casu primo, secundo, tertio, quarto, quinto, sexto, digitorum $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 1, 2, 4, 8 respective. Dividantur eæ differentiæ per numerum oscillationum in casu unoquoque, & in oscillatione una mediocri, qua arcus digitorum $3\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$, 15, 30, 60, 120 descriptus fuit, differentia arcuum descensu & subsequente ascensu descriptorum, erit $\frac{1}{656}$, $\frac{1}{242}$, $\frac{1}{69}$, $\frac{4}{71}$, $\frac{8}{37}$, $\frac{24}{29}$ partes digiti respective. Hæ autem in majoribus oscillationibus sunt in duplicata ratione arcuum descriptorum quam proxime, in minoribus vero paulo majores quam in ea ratione: & propterea (per Corol. 2. Prop. xxxi Libri hujus) resistantia Globi, ubi celerius movetur, est in duplicata ratione velocitatis quam proxime; ubi tardius, paulo major quam in ea ratione.

Designet

Designet jam V velocitatem maximam in oscillatione quavis, sintque A, B, C quantitates datæ, & fingamus quod differentia arcuum sit $AV + BV^{\frac{1}{2}} + CV^2$. Cum velocitates maximæ sint in Cycloide ut semisses arcuum oscillando descriptorum, in Circulo vero ut semissium arcuum illorum chordæ, adeoque paribus arcubus majores sint in Cycloide quam in Circulo, in ratione semissium arcuum ad eorundem chordas; tempora autem in Circulo sint majora quam in Cycloide in velocitatis ratione reciproca; patet arcuum differentias (quæ sunt ut resistentia & quadratum temporis conjunctim) easdem fore, quamproxime, in utraque Curva: deberent enim differentiæ illæ in Cycloide augeri, una cum resistentia, in duplicata circiter ratione arcus ad chordam, ob velocitatem in ratione illa simplici auctam; & diminui, una cum quadrato temporis, in eadem duplicata ratione. Itaque ut reductio fiat ad Cycloidem, eadem sumendæ sunt arcuum differentiæ quæ fuerunt in Circulo observatæ, velocitates vero maximæ ponendæ sunt arcubus dimidiatis vel integris, hoc est, numeris 1, 1, 2, 4, 8, 16 analogæ. Scribamus ergo in casu secundo, quarto & sexto numeros 1, 4 & 16 pro V , & prodibit arcuum differentia

$$\frac{1}{121} = A + B + C \text{ in casu secundo; } \frac{2}{35^{\frac{1}{2}}} = 4A + 8B + 16C \text{ in ca-}$$

su quarto; & $\frac{8}{9^{\frac{2}{3}}} = 16A + 64B + 256C$ in casu sexto. Et ex his æquationibus, per debitam collationem & reductionem Analyticam, fit $A = 0,0000916$, $B = 0,0010847$, & $C = 0,0029558$. Est igitur differentia arcuum ut $0,0000916 V + 0,0010847 V^{\frac{1}{2}} + 0,0029558 V^2$: & propterea cum (per Corollarium Propositionis xxx) resistentia Globi in medio arcus oscillando descripti, ubi velocitas est V , fit ad ipsius pondus ut $\frac{1}{11} AV + \frac{1}{11} BV^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{11} CV^2$ ad longitudinem Penduli; si pro A, B & C scribantur numeri inventi, fiet resistentia Globi ad ejus pondus, ut $0,0000583 V + 0,0007546 V^{\frac{1}{2}} + 0,0022169 V^2$ ad longitudinem Penduli inter centrum suspensionis & Regulam, id est, ad 121 digitos. Unde cum V in casu secundo designet 1, in quarto 4, in sexto 16: erit resistentia ad pondus Globi in casu secundo ut 0,0030298 ad 121, in quarto ut 0,0417402 ad 121, in sexto ut 0,61675 ad 121.

Arcus quem punctum in filo notatum in casu sexto descripsit, erat $120 - \frac{8}{9^{\frac{2}{3}}}$ seu 119 $\frac{2}{3}$ digitorum. Et propterea cum radius esset 121 digitorum, & longitudo Penduli inter punctum suspensionis

DE MOTU & centrum Globi esset 126 digitorum, arcus quem centrum Globi
CORPORUM, descripsit erat $124\frac{1}{4}$ digitorum. Quoniam corporis oscillantis veloci-
tas maxima, ob resistantiam Aeris, non incidit in punctum infimum
arcus descripti, sed in medio fere loco arcus totius versatur: hæc
eadem erit circiter ac si Globus descensu suo toto in Medio non
resistente describeret arcus illius partem dimidiam digitorum $62\frac{1}{2}$,
idque in Cycloide, ad quam motum Penduli supra reduximus: &
propterea velocitas illa æqualis erit velocitati quam Globus, per-
pendiculariter cadendo & casu suo describendo altitudinem arcus
illius sinui verso æqualem, acquirere posset. Est autem sinus ille
versus in Cycloide ad arcum istum $62\frac{1}{2}$ ut arcus idem ad penduli
longitudinem duplam 252, & propterea æqualis digitis 15, 278.
Quare velocitas ea ipsa est quam corpus cadendo & casu suo spatium
15, 278 digitorum describendo acquirere posset. Tali igitur cum
velocitate Globus resistantiam patitur, quæ sit ad ejus pondus ut
0, 61675 ad 121, vel (si resistantiæ pars illa sola spectetur quæ est
in velocitatis ratione duplicata) ut 0, 56752 ad 121.

Experimento autem Hydrostatico inveni quod pondus Globi hu-
jus lignei esset ad pondus Globi aquei magnitudinis ejusdem, ut 55
ad 97: & propterea cum 121 sit ad 213, 4 in eadem ratione, erit
resistentia Globi aquei præfata cum velocitate progredientis ad ip-
sius pondus, ut 0, 56752 ad 213, 4 id est, ut 1 ad $376\frac{1}{3}$. Unde cum
pondus Globi aquei, quo tempore Globus cum velocitate unifor-
miter continuata describat longitudinem digitorum 30, 556 veloci-
tatem illam omnem in Globo cadente generare posset, manifestum
est quod vis resistantiæ eodem tempore uniformiter continuata
tollere posset velocitatem minorem in ratione 1 ad $376\frac{1}{3}$, hoc est,

velocitatis totius partem $\frac{1}{376\frac{1}{3}}$. Et propterea quo tempore Glo-
bus, ea cum velocitate uniformiter continuata, longitudinem se-
midiametri suæ, seu digitorum $3\frac{7}{16}$, describere posset, eodem amit-
teret motus sui partem $\frac{1}{3342}$.

Numerabam etiam oscillationes quibus Pendulum quartam mo-
tus sui partem amisit. In sequente Tabula numeri supremi deno-
tant longitudinem arcus descensu primo descripti, in digitis & par-
tibus digiti expressam: numeri medii significant longitudinem ar-
cus ascensu ultimo descripti; & loco infimo stant numeri oscilla-
tionum. Experimentum descripsi tanquam magis accuratum quam
cum motus pars tantum octava amitteretur. Calculum tentet qui
volet.

Descen-

<i>Descensus primus</i>	2	4	8	16	32	64
<i>Ascensus ultimus</i>	$1\frac{1}{2}$	3	6	12	24	48
<i>Numerus Oscillat.</i>	374	272	$162\frac{1}{2}$	$83\frac{1}{2}$	$41\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$

 LIBER
SECUNDUS.

Postea Globum plumbeum, diametro digitorum 2, & pondere unciarum *Romanarum* $26\frac{1}{2}$, fuspendi filo eodem, sic ut inter centrum Globi & punctum suspensionis intervallum esset pedum $10\frac{1}{2}$, & numerabam oscillationes quibus data motus pars amitteretur. Tabularum subsequentium prior exhibet numerum oscillationum quibus pars octava motus totius cessavit; secunda numerum oscillationum quibus ejusdem pars quarta amissa fuit.

<i>Descensus primus</i>	1	2	4	8	16	32	64
<i>Ascensus ultimus</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	7	14	28	56
<i>Numerus Oscillat.</i>	226	228	193	140	$90\frac{1}{2}$	53	30
<i>Descensus primus</i>	1	2	4	8	16	32	64
<i>Ascensus ultimus</i>	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	3	6	12	24	48
<i>Numerus Oscillat.</i>	510	518	420	318	204	121	70

In Tabula priore feligendo ex observationibus tertiam, quintam & septimam, & exponendo velocitates maximas in his observationibus particulatim per numeros 1, 4, 16 respective, & generaliter per quantitatem V ut supra: emergit in observatione tertia

$$\frac{\frac{1}{2}}{193} = A + B + C, \text{ in quinta } \frac{2}{90\frac{1}{2}} = 4A + 8B + 16C, \text{ in septima}$$

$$\frac{8}{30} = 16A + 64B + 256C. \text{ Hæ vero æquationes reductæ dant}$$

$A = 0,001414$, $B = 0,000297$, $C = 0,000879$. Et inde prodit resistentia Globi cum velocitate V moti, in ea ratione ad pondus suum unciarum $26\frac{1}{2}$, quam habet $0,0009V + 0,000207V^{\frac{3}{2}} + 0,000659V^2$ ad penduli longitudinem 121 digitorum. Et si spectemus eam solummodo resistentiæ partem quæ est in duplicata ratione velocitatis, hæc erit ad pondus Globi ut $0,000659V^2$ ad 121 digitos. Erat autem hæc pars resistentiæ in experimento primo ad pondus Globi lignei unciarum $57\frac{1}{2}$, ut $0,002217V^2$ ad 121: & inde fit resistentia Globi lignei ad resistentiam Globi plumbei (paribus eorum velocitatibus) ut $57\frac{1}{2}$ in $0,002217$ ad $26\frac{1}{2}$ in $0,000659$, id est, ut 7; ad 1. Diametri Globorum duorum erant $6\frac{1}{2}$ & 2 digitorum, & harum quadrata sunt ad invicem ut $47\frac{1}{2}$ & 4, seu $11\frac{1}{2}$ & 1 quamproxime. Ergo resistentiæ Globorum æquivelocium erant in minore ratione quam duplicata diametrorum. At nondum consideravimus resistentiam

DE MOTU
CORPORUM,

stantiam fili, quæ certe permagna erat, ac de pendulorum inventa resistentia subduci debet. Hanc accurate definire non potui, sed majorem tamen inveni quam partem tertiam resistentiæ totius minoris penduli; & inde didici quod resistentiæ Globorum, dempta fili resistentia, sunt quam proxime in duplicata ratione diametrorum. Nam ratio $7\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ ad $1 - \frac{1}{2}$, seu $10\frac{1}{2}$ ad 1, non longe abest a diametrorum ratione duplicata $11\frac{1}{2}$ ad 1.

Cum resistentia fili in Globis majoribus minoris sit momenti, tentavi etiam experimentum in Globo cujus diameter erat $18\frac{1}{2}$ digitorum. Longitudo penduli inter punctum suspensionis & centrum oscillationis erat digitorum $122\frac{1}{2}$ inter punctum suspensionis & nodum in filo $109\frac{1}{2}$ dig. Arcus primo penduli descensu a nodo descriptus, 32 dig. Arcus ascensu ultimo post oscillationes quinque ab eodem nodo descriptus, 28. dig. Summa arcuum seu arcus totus oscillatione mediocri descriptus, 60 dig. Differentia arcuum 4 dig. Ejus pars decima seu differentia inter descensum & ascensum in oscillatione mediocri $\frac{2}{7}$ dig. Ut radius $109\frac{1}{2}$ ad radium $122\frac{1}{2}$, ita arcus totus 60 dig. oscillatione mediocri a nodo descriptus, ad arcum totum $67\frac{1}{2}$ dig. oscillatione mediocri a centro Globi descriptum: & ita differentia $\frac{1}{3}$ ad differentiam novam 0, 4475. Si longitudo penduli, manente longitudine arcus descripti, augeretur in ratione 126 ad $122\frac{1}{2}$; tempus oscillationis augeretur & velocitas penduli diminueretur in ratione illa subduplicata, maneret vero arcuum descensu & subsequente ascensu descriptorum differentia 0, 4475. Deinde si arcus descriptus augeretur in ratione $124\frac{1}{3}$ ad $67\frac{1}{2}$, differentia ista 0, 4475 augeretur in duplicata illa ratione, adeoque evaderet 1, 5295. Hæc ita se haberent, ex hypothesis quod resistentia Penduli esset in duplicata illa ratione velocitatis. Ergo si pendulum describeret arcum totum $124\frac{1}{3}$ digitorum, & longitudo ejus inter punctum suspensionis & centrum oscillationis esset 126 digitorum; differentia arcuum descensu & subsequente ascensu descriptorum foret 1, 5295 digitorum. Et hæc differentia ducta in pondus Globi penduli, quod erat unciarum 208, producit 318, 136. Rursus ubi pendulum superius ex Globo ligneo constructum, centro oscillationis, quod a puncto suspensionis digitos 126 distabat, describebat arcum totum $124\frac{1}{3}$ digitorum, differentia arcuum descensu & ascensu descriptum fuit $\frac{126}{121} \text{ in } \frac{8}{9}$, quæ ducta in pondus Globi, quod erat unciarum $57\frac{7}{8}$, producit 49, 396. Duxi autem differentias hæc in pondera Globorum ut invenirem eorum resistentias. Nam differentiæ ori-

untur

DE MOTU
CORPORUM

In experimento columnæ quartæ, motus æquales oscillationibus 535 in aere, & $1\frac{1}{7}$ in aqua amissi sunt. Erant quidem oscillationes in aere paulo celeriores quam in aqua. At si oscillationes in aqua in ea ratione accelerarentur ut motus pendulorum in Medio utroque fierent æquiveloces, maneret numerus idem oscillationum $1\frac{1}{7}$ in aqua, quibus motus idem ac prius amitteretur; ob resistantiam auctam & simul quadratum temporis diminutum in eadem ratione illa duplicata. Paribus igitur pendulorum velocitatibus motus æquales in aere oscillationibus 535 & in aqua oscillationibus $1\frac{1}{7}$ amissi sunt; ideoque resistantia penduli in aqua est ad ejus resistantiam in aere ut 535 ad $1\frac{1}{7}$. Hæc est proportio resistantiarum totarum in casu columnæ quartæ.

Designet jam $AV + CV^2$ differentiam arcuum in descensu & subsequente ascensu descriptorum a Globo, in Aere cum velocitate maxima V moto; & cum velocitas maxima, in casu columnæ quartæ, sit ad velocitatem maximam in casu columnæ primæ, ut 1 ad 8; & differentia illa arcuum, in casu columnæ quartæ, ad differentiam in casu columnæ primæ ut $\frac{2}{535}$ ad $\frac{16}{85\frac{1}{2}}$, seu ut $85\frac{1}{2}$ ad 4280: scribamus in his casibus 1 & 8 pro velocitatibus, atque $85\frac{1}{2}$ & 4280 pro differentiis arcuum, & fiet $A + C = 85\frac{1}{2}$ & $8A + 64C = 4280$ seu $A + 8C = 535$; indeque per reductionem æquationum proveniet $7C = 449\frac{1}{2}$ & $C = 64\frac{3}{14}$ & $A = 21\frac{1}{7}$; atque adeo resistantia, cum sit ut $\frac{2}{11}AV + \frac{3}{4}CV^2$, erit ut $13\frac{6}{11}V + 48\frac{2}{11}V^2$. Quare in casu columnæ quartæ, ubi velocitas erat 1, resistantia tota est ad partem suam quadrato velocitatis proportionalem, ut $13\frac{6}{11} + 48\frac{2}{11}$ seu $61\frac{14}{11}$ ad $48\frac{2}{11}$; & idcirco resistantia penduli in aqua est ad resistantiæ partem illam in aere quæ quadrato velocitatis proportionalis est, quæque sola in motibus velocioribus considerata venit, ut $61\frac{14}{11}$ ad $48\frac{2}{11}$ & 535 ad $1\frac{1}{7}$ conjunctim, id est, ut 571 ad 1. Si penduli in aqua oscillantis filum totum fuisset immersum, resistantia ejus fuisset adhuc major; adeo ut penduli in aere oscillantis resistantia illa quæ velocitatis quadrato proportionalis est, quæque sola in corporibus velocioribus considerata venit, sit ad resistantiam ejusdem penduli totius, eadem cum velocitate, in aqua oscillantis, ut 800 vel 900 ad 1 circiter, hoc est, ut densitas aquæ ad densitatem aeris quamproxime.

In hoc calculo sumi quoque deberet pars illa resistantiæ penduli in aqua, quæ esset ut quadratum velocitatis, sed (quod mirum forte videatur) resistantia in aqua augebatur in ratione velocitatis plus-

plusquam duplicata. Ejus rei causam investigando, in hanc incidi, quod Arca nimis angusta esset pro magnitudine Globi penduli, & motum aquæ cedentis præ angustia sua nimis impediabat. Nam si Globus pendulus, cujus diameter erat digiti unius, immergeretur; resistentia augebatur in duplicata ratione velocitatis quamproxime. Id tentabam construendo pendulum ex Globis duobus, quorum inferior & minor oscillaretur in aqua, superior & major proxime supra aquam filo affixus esset, & in Aere oscillando, adjuvaret motum penduli eumque diuturniorem redderet. Experimenta autem hoc modo instituta se habebant ut in Tabula sequente describitur.

<i>Arcus descensu primo descriptus</i>	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
<i>Arcus ascensu ultimo descriptus</i>	12	6	3	$1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{16}$
<i>Arcuum diff. motui amisso proport.</i>	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
<i>Numerus Oscillationum</i>		$3\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	$21\frac{1}{2}$	34	$53\frac{1}{2}$

Conferendo resistentias Mediorum inter se, effeci etiam ut pendula ferrea oscillarentur in argento vivo. Longitudo fili ferrei erat pedum quasi trium, & diameter Globi penduli quasi tertia pars digiti. Ad filum autem proxime supra Mercurium affixus erat Globus alius plumbeus fatis magnus ad motum penduli diutius continuandum. Tum vasculum, quod capiebat quasi libras tres argenti vivi, implebam vicibus alternis argento vivo & aqua communi, ut pendulo in Fluido utroque successive oscillante, invenirem proportionem resistentiarum: & prodiit resistentia argenti vivi ad resistentiam aquæ, ut 13 vel 14 ad 1 circiter: id est, ut densitas argenti vivi ad densitatem aquæ. Ubi Globum pendulum paulo majorem adhibebam, puta cujus diameter esset quasi $\frac{1}{2}$ vel $\frac{2}{3}$ partes digiti, prodibat resistentia argenti vivi in ea ratione ad resistentiam aquæ quam habet numerus 12 vel 10 ad 1 circiter. Sed experimento priori magis fidendum est, propterea quod in his ultimis Vas nimis angustum fuit pro magnitudine Globi immerfi. Ampliato Globo, deberet etiam Vas ampliari. Constitueram quidem hujusmodi experimenta in vasis majoribus & in liquoribus tum Metallorum fusorum, tum aliis quibusdam tam calidis quam frigidis repetere: sed omnia experiri non vacat, & ex jam descriptis fatis liquet resistentiam corporum celeriter motorum densitati Fluidorum in quibus moventur proportionalem esse quam proxime.

Non dico accurate. Nam Fluida tenaciora, pari densitate, proculdubio

DE MOTU
CORPORUM,

dubio magis resistunt quam liquidiora, ut Oleum frigidum quam calidum, calidum quam aqua pluvialis, aqua quam Spiritus Vini. Verum in liquoribus qui ad sensum satis fluidi sunt, ut in Aere, in Aqua seu dulci seu falsa, in Spiritibus Vini, Terebinthi & Salium, in Oleo a facibus per destillationem liberato & calefacto, Oleoque Vitrioli & Mercurio, ac Metallis liquefactis, & siqui sint alii, qui tam fluidi sunt ut in vasis agitati motum impressum diutius conservent, effusque liberrime in guttas decurrendo resolvantur, nullus dubito quin regula allata satis accurate obtineat: præsertim si experimenta in corporibus pendulis & majoribus & velocius motis instituantur.

Denique cum receptissima Philosophorum ætatis hujus opinio sit, Medium quoddam æthereum & longe subtilissimum extare, quod omnes omnium corporum poros & meatus liberrime permeet; a tali autem Medio per corporum poros fluente resistentia oriri debeat: ut tentarem an resistentia, quam in motis corporibus experimur, tota sit in eorum externa superficie, an vero partes etiam internæ in superficiebus propriis resistentiam notabilem sentiant, excogitavi experimentum tale. Filo pedum undecim longitudinis, ab unco chalybeo satis firmo, mediante annulo chalybeo, suspendebam pyxidem abiernam rotundam, ad constituendum pendulum longitudinis prædictæ. Uncus sursum præacutus erat acie concava, ut annulus arcu suo superiore aciei innixus liberrime moveretur. Arcui autem inferiori annectebatur filum. Pendulum ita constitutum deducebam a perpendiculari ad distantiam quasi pedum sex, idque secundum planum aciei unci perpendicularare, ne annulus, oscillante pendulo, supra aciem unci ultro citroque laberetur. Nam punctum suspensionis, in quo annulus uncum tangit, immotum manere debet. Locum igitur accurate notabam, ad quem deduxeram pendulum, dein pendulo demisso notabam alia tria loca ad quæ redibat in fine oscillationis primæ, secundæ ac tertiæ. Hoc repetebam sæpius, ut loca illa quam potui accuratissime invenirem. Tum pyxidem plumbo & gravioribus, quæ ad manus erant, metallis implebam. Sed prius ponderabam pyxidem vacuum, unam cum parte fili quæ circum pyxidem volvebatur ac dimidio partis reliquæ quæ inter uncum & pyxidem pendulam tendebatur. (Nam filum tensum dimidio ponderis sui pendulum a perpendiculari digressum semper urget.) Huic ponderi addebam pondus Aeris quem pyxis capiebat. Et pondus totum erat quæ pars septuagesima octava pyxididis metallorum plenæ. Tum quoniam pyxis metallorum

tallorum plena, pondere suo tendendo filum, augebat longitudinem penduli, contrahebam filum ut penduli jam oscillantis eadem esset longitudo ac prius. Dein pendulo ad locum primo notatum retracito ac dimisso, numerabam oscillationes quasi septuaginta & septem, donec pyxis ad locum secundo notatum rediret, totidemque subinde donec pyxis ad locum tertio notatum rediret, atque rursus totidem donec pyxis reditu suo attingeret locum quartum. Unde concludo quod resistentia tota pyxidis plenæ non majorem habebat proportionem ad resistentiam pyxididis vacuæ quam 78 ad 77. Nam si æquales essent ambarum resistentiæ, pyxis plena ob vim suam infinitam septuagies & octies majorem vi infinita pyxididis vacuæ, motum suum oscillatorium tanto diutius conservare deberet, atque adeo completis semper oscillationibus 78 ad loca illa notata redire. Rediit autem ad eadem completis oscillationibus 77.

Designet igitur A resistentiam pyxididis in ipsius superficie externa, & B resistentiam pyxididis vacuæ in partibus internis; & si resistentiæ corporum æquivelocium in partibus internis sint ut materia, seu numerus particularum quibus resistitur: erit 78 B resistentia pyxididis plenæ in ipsius partibus internis: adeoque pyxididis vacuæ resistentia tota $A + B$ erit ad pyxididis plenæ resistentiam totam $A + 78 B$ ut 77 ad 78, & divisim $A + B$ ad 77 B, ut 77 ad 1, indeque $A + B$ ad B ut 77×77 ad 1, & divisim A ad B ut 5928 ad 1. Est igitur resistentia pyxididis vacuæ in partibus internis quinquies millies minor quam ejusdem resistentia in externa superficie, & amplius. Sic vero disputamus ex Hypothesi quod major illa resistentia pyxididis plenæ, non ab alia aliqua causa latente oriatur, sed ab actione sola Fluidi alicujus subtilis in metallum inclusum.

Hoc experimentum recitavi memoriter. Nam charta, in qua illud aliquando descripseram, intercidit. Unde fractas quasdam numerorum partes, quæ memoria exciderunt, omittere compulsus sum. Nam omnia denuo tentare non vacat. Prima vice, cum unco infirmo usus essem, pyxis plena citius retardabatur. Causam quærendo, reperi quod uncus infirmus cedebat ponderi pyxididis, & ejus oscillationibus obsequendo in partes omnes flectebatur. Parabam igitur uncum firmum, ut punctum suspensionis immotum maneret, & tunc omnia ita evenerunt uti supra descripsimus.

S E C T I O VII.

De Motu Fluidorum & Resistentia Projectilium.

PROPOSITIO XXXII. THEOREMA XXVI.

Si corporum Systemata duo similia ex æquali particularum numero constent, & particulæ correspondentes similes sint & proportionales, singulæ in uno Systemate singulis in altero, & similiter sitæ inter se, ac datam habeant rationem densitatis ad invicem, & inter se temporibus proportionalibus similiter moveri incipiant, (eæ inter se quæ in uno sunt Systemate & eæ inter se quæ sunt in altero) & si non tangant se mutuo quæ in eodem sunt Systemate, nisi in momentis reflexionum, neque attrahant vel fugant se mutuo, nisi viribus acceleratricibus quæ sint ut particularum correspondentium diametri inverse & quadrata velocitatum directe: dico quod Systematum particulæ illæ pergent inter se temporibus proportionalibus similiter moveri.

Corpora similia & similiter sita temporibus proportionalibus inter se similiter moveri dico, quorum situs ad invicem in fine temporum illorum semper sunt similes: puta si particulæ unius Systematis cum alterius particulis correspondentibus conferantur. Unde tempora erunt proportionalia, in quibus similes & proportionales Figurarum similium partes a particulis correspondentibus describuntur. Igitur si duo sint ejusmodi Systemata, particulæ correspondentes, ob similitudinem inceptorum motuum, pergent similiter moveri usque donec sibi mutuo occurrant. Nam si nullis agitantur viribus, progredientur uniformiter in lineis rectis per motus Leg. I. Si viribus aliquibus se mutuo agitant, & vires illæ sint ut particularum correspondentium diametri inverse & quadrata velocitatum directe; quoniam particularum situs sunt similes & vires proportionales, vires totæ quibus particulæ correspondentes agitantur, ex viribus singulis agitantibus (per Legum Corollarium

secun-

secundum) compositæ, similes habebunt determinationes, perinde ac si centra inter particulas similiter sita respicerent; & erunt vires illæ totæ ad invicem ut vires singulæ componentes, hoc est, ut correspondentium particularum diametri inverse, & quadrata velocitatum directe: & propterea efficient ut correspondentes particulæ figuras similes describere pergant. Hæc ita se habebunt per Corol. 1. & 8. Prop. IV. Lib. I. si modo centra illa quiescant. Sin moveantur, quoniam ob translationum similitudinem, similes manent eorum situs inter Systematum particulas; similes inducuntur mutationes in figuris quas particulæ describunt. Similes igitur erunt correspondentium & similium particularum motus usque ad occurfus suos primos, & propterea similes occurfus, & similes reflexiones, & subinde (per jam ostensa) similes motus inter se, donec iterum in se mutuo inciderint, & sic deinceps in infinitum. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc si corpora duo quævis, quæ similia sint & ad Systematum particulas correspondentes similiter sita, inter ipsas temporibus proportionalibus similiter moveri incipiant, sintque eorum magnitudines ac densitates ad invicem ut magnitudines ac densitates correspondentium particularum: hæc pergent temporibus proportionalibus similiter moveri. Est enim eadem ratio partium majorum Systematis utriusque atque particularum.

Corol. 2. Et si similes & similiter positæ Systematum partes omnes quiescant inter se: & earum duæ, quæ cæteris majores sint, & sibi mutuo in utroque Systemate correspondeant, secundum lineas similiter sitas simili cum motu utcumque moveri incipiant: hæc similes in reliquis Systematum partibus excitabunt motus, & pergent inter ipsas temporibus proportionalibus similiter moveri; atque adeo spatia diametris suis proportionalia describere.

PROPOSITIO XXXIII. THEOREMA XXVII.

Eisdem positis, dico quod Systematum partes majores, resistent in ratione composita ex duplicata ratione velocitatum suarum & duplicata ratione diametrorum & ratione densitatis partium Systematum.

Nam resistentia oritur partim ex viribus centripetis vel centrifugis quibus particulæ Systematum se mutuo agitant, partim ex occurribus & reflexionibus particularum & partium majorum.

Prioris

DE MOTU
CORPORUM,

Prioris autem generis resistentiæ sunt ad invicem ut vires totæ motrices a quibus oriuntur, id est, ut vires totæ acceleratrices & quantitates materiæ in partibus correspondentibus; hoc est (per Hypothesin) ut quadrata velocitatum directe & distantiae particularum correspondentium inverse & quantitates materiæ in partibus correspondentibus directe: ideoque (cum distantiae particularum Systematis unius sint ad distantias correspondentes particularum alterius, ut diameter particulæ vel partis in Systemate prioris ad diametrum particulæ vel partis correspondentis in altero, & quantitates materiæ sint ut densitates partium & cubi diametrorum) resistentiæ sunt ad invicem ut quadrata velocitatum & quadrata diametrorum & densitates partium Systematum. *Q. E. D.* Posterioris generis resistentiæ sunt ut reflexionum correspondentium numeri & vires conjunctim. Numeri autem reflexionum sunt ad invicem ut velocitates partium correspondentium directe, & spatia inter earum reflexiones inverse. Et vires reflexionum sunt ut velocitates & magnitudines & densitates partium correspondentium conjunctim; id est, ut velocitates & diametrorum cubi & densitates partium. Et conjunctis his omnibus rationibus, resistentiæ partium correspondentium sunt ad invicem ut quadrata velocitatum & quadrata diametrorum & densitates partium conjunctim. *Q. E. D.*

Corol. 1. Igitur si Systemata illa sint Fluida duo Elastica ad modum Aeris, & partes eorum quiescant inter se: corpora autem duo similia & partibus fluidorum quoad magnitudinem & densitatem proportionalia, & inter partes illas similiter posita, secundum lineas similiter positas utcumque projiciantur; vires autem acceleratrices, quibus particulæ Fluidorum se mutuo agitant, sint ut corporum projectorum diametri inverse, & quadrata velocitatum directe: corpora illa temporibus proportionalibus similes excitabunt motus in Fluidis, & spatia similia ac diametris suis proportionalia describent.

Corol. 2. Proinde in eodem Fluido projectile velox resistentiam patitur quæ est in duplicata ratione velocitatis quamproxime. Nam si vires, quibus particulæ distantes se mutuo agitant, augerentur in duplicata ratione velocitatis, resistentia foret in eadem ratione duplicata accurate: ideoque in Medio, cujus partes ab invicem distantes sese viribus nullis agitant, resistentia est in duplicata ratione velocitatis accurate. Sunt igitur Media tria *A, B, C* ex partibus similibus & æqualibus & secundum distantias æquales regulariter dispo-

dispositis constantia. Partes Mediorum A & B fugiant se mutuo viribus quæ sint ad invicem ut T & V , illæ Medii C ejusmodi viribus omnino destituantur. Et si corpora quatuor æqualia D , E , F , G in his Mediis moveantur, priora duo D & E in prioribus duobus A & B , & altera duo F & G in tertio C ; sitque velocitas corporis D ad velocitatem corporis E , & velocitas corporis F ad velocitatem corporis G , in subduplicata ratione virium T ad vires V : resistantia corporis D erit ad resistantiam corporis E , & resistantia corporis F ad resistantiam corporis G , in velocitatum ratione duplicata; & propterea resistantia corporis D erit ad resistantiam corporis F ut resistantia corporis E ad resistantiam corporis G . Sunt corpora D & F æquielocia ut & corpora E & G ; & augendo velocitates corporum D & F in ratione quacunque, ac diminuendo vires particularum Medii B in eadem ratione duplicata, accedet Medium B ad formam & conditionem Medii C pro lubitu, & idcirco resistantiæ corporum æqualium & æquielocium E & G in his Mediis, perpetuo accedent ad æqualitatem, ita ut earum differentia evadat tandem minor quam data quævis. Proinde cum resistantiæ corporum D & F sint ad invicem ut resistantiæ corporum E & G , accedent etiam hæc similiter ad rationem æqualitatis. Corporum igitur D & F , ubi velocissime moventur, resistantiæ sunt æquales quam proxime: & propterea cum resistantia corporis F sit in duplicata ratione velocitatis, erit resistantia corporis D in eadem ratione quam proxime.

Corol. 3. Igitur corporis in Fluido quovis Elastico velocissime moti eadem fere est resistantia ac si partes Fluidi viribus suis centrifugis destituerentur, seque mutuo non fugerent: si modo Fluidi vis Elastica ex particularum viribus centrifugis oriatur & velocitas adeo magna sit ut vires non habeant satis temporis ad agendum.

Corol. 4. Proinde cum resistantiæ similium & æquielocium corporum in Medio cujus partes distantes se mutuo non fugiunt, sint ut quadrata diametrorum; sunt etiam æquielocium & celerrime motorum corporum resistantiæ in Fluido Elastico ut quadrata diametrorum quam proxime.

Corol. 5. Et cum corpora similia, æqualia & æquielocia, in Mediis ejusdem densitatis, quorum particulæ se mutuo non fugiunt, sive particulæ illæ sint plures & minores, sive pauciores & majores, in æqualem materiæ quantitatem temporibus æqualibus impingant, eique æqualem motus quantitatem imprimant, & vicissim


mittantur perpendiculares BE , DL , & vis qua particula Medii, secundum rectam FB oblique incidendo, Globum ferit in B , erit ad vim qua particula eadem Cylindrum $ONGQ$, axe ACI circa Globum descriptum perpendiculariter feriret in b , ut LD ad LB vel BE ad BC . Rursus efficacia hujus vis ad movendum Globum secundum incidentiæ suæ plagam FB vel AC , est ad ejusdem efficaciam ad movendum Globum secundum plagam determinationis suæ, id est, secundum plagam rectæ BC qua Globum directe urget, ut BE ad BC . Et conjunctis rationibus, efficacia particulæ, in Globum secundum rectam FB oblique incidentis, ad movendum eundem secundum plagam incidentiæ suæ, est ad efficaciam particulæ ejusdem secundum eandem rectam in Cylindrum perpendiculariter incidentis, ad ipsum movendum in plagam eandem, ut BE quadratum ad BC quadratum. Quare si ad Cylindri basem circulearem NAO erigatur perpendiculum bHE , & sit

bE æqualis radio AC , & bH æqualis $\frac{BE \text{ quad.}}{CB}$: erit bH ad

bE ut effectus particulæ in Globum ad effectum particulæ in Cylindrum. Et propterea solidum quod a rectis omnibus bH occupatur erit ad solidum quod a rectis omnibus bE occupatur, ut effectus particularum omnium in Globum ad effectum particularum omnium in Cylindrum. Sed solidum prius est parabolis vertice C , axe CA & latere recto CA descriptum, & solidum posterius est Cylindrus Paraboloidi circumscriptus: & notum est quod Parabolis sit semissis Cylindri circumscripti. Ergo vis tota Medii in Globum est duplo minor quam ejusdem vis tota in Cylindrum. Et propterea si particulæ Medii quiescerent, & Cylindrus ac Globus æquali cum velocitate moverentur, foret resistentia Globi duplo minor quam resistentia Cylindri. $Q. E. D.$

Scholium.

Eadem methodo Figuræ aliæ inter se quoad resistentiam comparari possunt, æque inveniri quæ ad motus suos in Mediis resistentibus continuandos aptiores sunt. Ut si base circulari $CEBH$, quæ centro O , radio OC describitur, & altitudine OD , construendum sit frustum Coni $CBGF$, quod omni-




um eadem basi & altitudine constructorum & secundum plagam

DE MOTU
CORPORUM,

axis sui versus D progredientium frustorum minime resistatur: bise-
ca altitudinem OD in Q & produc OQ ad S ut sit QS aequalis
 QC , & erit S vertex Coni cujus frustum quaeritur.

Unde obiter, cum angulus CSB semper sit acutus, consequens
est, quod si solidum $ADBE$ convolutione figuræ Ellipticæ vel O-
valis $ADBE$ circa axem AB facta generetur, & tangatur figura
generans a rectis tribus FG , GH , HI in punctis F , B & I , ea
lege ut GH sit perpendicularis ad axem in puncto contactus B , &
 FG , HI cum eadem GH contineant angulos $FG B$, BHI gra-
dum 135: solidum, quod convolutione figuræ $ADFGHIE$ cir-
ca axem eundem CB generatur, minus resistitur, quam solidum
prius; si modo utrumque secundum plagam axis sui AB progredia-
tur, & utriusque terminus B præcedat. Quam quidem propositio-
nem in construendis Navibus non inutilem futuram esse censeo.

Quod si Figura $DNFG$
ejusmodi sit curva ut, si ab
ejus puncto quovis N ad
axem AB demittatur per-
pendicularum NM , & a punc-
to dato G ducatur recta
 GR quæ parallela sit rectæ
figuram tangenti in N , &
axem productum secet in R ;
fuerit MN ad GR ut GR
 3 ad $4 BR \times GB$: Soli-
dum quod figuræ hujus revolutione circa axem AB facta describi-
tur, in Medio raro prædicto ab A versus B movendo, minus resi-
stetur quam aliud quodvis eadem longitudine & latitudine descriptum
Solidum circulare.



PROPOSITIO XXXV. PROBLEMA VII.

*Si Medium raram ex particulis quam minimis quiescentibus
æqualibus & ad æquales ab invicem distantias libere dis-
positis constet: invenire resistantiam Globi in hoc Medio
uniformiter progredientis.*

Cas. 1. Cylindrus eadem diametro & altitudine descriptus pro-
gredi intelligatur eadem velocitate secundum longitudinem axis
sui in eodem Medio. Et ponamus quod particulæ Medii in quas
Glo-

Globus vel Cylindrus incidit, vi reflexionis quam maxima resiliant. Et cum resistentia Globi (per Propositionem novissimam) sit duplo minor quam resistentia Cylindri, & Globus sit ad Cylindrum ut duo ad tria, & Cylindrus incidendo perpendiculariter in particulas ipsasque quam maxime reflectendo, duplam sui ipsius velocitatem ipsis communicet: Cylindrus quo tempore dimidiam longitudinem axis sui describit communicabit motum particulis qui sit ad totum Cylindri motum ut densitas Medii ad densitatem Cylindri; & Globus quo tempore totam longitudinem diametri suæ describit, communicabit motum eundem particulis; & quo tempore duas tertias partes diametri suæ describit communicabit motum particulis qui sit ad totum Globi motum ut densitas Medii ad densitatem Globi. Et propterea Globus resistentiam patitur quæ sit ad vim qua totus ejus motus vel auferri possit vel generari quo tempore duas tertias partes diametri suæ describit, ut densitas Medii ad densitatem Globi.

Cas. 2. Ponamus quod particulæ Medii in Globum vel Cylindrum incidentes non reflectantur; & Cylindrus incidendo perpendiculariter in particulas simplicem suam velocitatem ipsis communicabit, ideoque resistentiam patitur duplo minorem quam in priore casu, & resistentia Globi erit etiam duplo minor quam prius.

Cas. 3. Ponamus quod particulæ Medii vi reflexionis neque maxima neque nulla, sed mediocri aliqua resiliant a Globo; & resistentia Globi erit in eadem ratione mediocri inter resistentiam in primo casu & resistentiam in secundo. *Q. E. I.*

Corol. 1. Hinc si Globus & particulæ sint infinite dura, & vi omni elastica & propterea etiam vi omni reflexionis destituta: resistentia Globi erit ad vim qua totus ejus motus vel auferri possit vel generari, quo tempore Globus quatuor tertias partes diametri suæ describit, ut densitas Medii ad densitatem Globi.

Corol. 2. Resistentia Globi, cæteris paribus, est in duplicata ratione velocitatis.


Corol. 3. Resistentia Globi, cæteris paribus, est in duplicata ratione diametri.

Corol. 4. Resistentia Globi, cæteris paribus, est ut densitas Medii.

Corol. 5. Resistentia Globi est in ratione quæ componitur ex duplicata ratione velocitatis & duplicata ratione diametri & ratione densitatis Medii.

DE MOTU CORP. 6. Et motus Globi cum ejus resistentia sic exponi potest.
CORPORUM, Sit AB tempus quo Globus per resistentiam suam uniformiter con-

tinuatam totum suum motum amittere potest. Ad AB erigantur perpendiculara AD , BC . Sitque BC motus ille totus, & per punctum C Asymptotis AD , AB describatur Hyperbola CF . Producat AB ad punctum quodvis E . Erigatur perpendicularum EF Hyperbolæ occurrens in F . Compleatur parallelogrammum $CBEG$, & agatur AF ipsi BC occurrens in H . Et si Globus tempore quovis



BE , motu suo primo BC uniformiter continuato, in Medio non resistente describat spatium $CBEG$ per aream parallelogrammi expositum, idem in Medio resistente describet spatium $CBEF$ per aream Hyperbolæ expositum, & motus ejus in fine temporis illius exponetur per Hyperbolæ ordinatam EF , amissa motus ejus parte FG . Et resistentia ejus in fine temporis ejusdem exponetur per longitudinem BH , amissa resistentiæ parte CH . Patent hæc omnia per Corol. 1. Prop. v. Lib. II.

Corol. 7. Hinc si Globus tempore T per resistentiam R uniformiter continuatam amittat motum suum totum M : idem Globus tempore t in Medio resistente, per resistentiam R in duplicata velocitatis ratione decrefcentem, amittet motus sui M partem $\frac{tM}{T+t}$,

manente parte $\frac{TM}{T+t}$, & describet spatium quod sit ad spatium motu uniformi M eodem tempore t descriptum, ut Logarithmus numeri $\frac{T+t}{T}$ multiplicatus per numerum 2,302585092994 est ad numerum $\frac{t}{T}$. Nam area Hyperbolica $ECFE$ est ad rectangulum $BCGE$ in hac proportionem.

Scholium.


In hac Propositione exposui resistentiam & retardationem Projectilium Sphæricorum in Mediis non continuis, & ostendi quod hæc resistentia sit ad vim qua totus Globi motus vel tolli possit vel generari

generari quo tempore Globus duas tertias diametri suæ partes, velocitate uniformiter continuata describat, ut densitas Medii ad densitatem Globi, si modo Globus & particulæ Medii sint summe elastica & vi maxima reflectendi polleant: quodque hæc vis sit duplo minor ubi Globus & particulæ Medii sunt infinite dura & vi reflectendi prorsus destituta. In Mediis autem continuis qualia sunt Aqua, Oleum calidum, & Argentum vivum, in quibus Globus non incidit immediate in omnes fluidi particulas resistentiam generantes, sed premit tantum proximas particulas & hæc premunt alias & hæc alias, resistentia est adhuc duplo minor. Globus utique in hujusmodi Mediis fluidissimis resistentiam patitur quæ est ad vim quæ totus ejus motus vel tolli possit vel generari quo tempore, motu illo uniformiter continuato, partes octo tertias diametri suæ describat, ut densitas Medii ad densitatem Globi. Id quod in sequentibus conabimur ostendere.

PROPOSITIO XXXVI. PROBLEMA VIII.

Aquæ de vase Cylindrico per foramen in fundo factum effluentis definire motum.

Sit $ACDB$ vas cylindricum, AB ejus orificium superius, CD fundum horizonti parallelum, EF foramen circulare in medio fundi, G centrum foraminis, & GH axis cylindri horizonti perpendicularis. Et concipe cylindrum glaciei $APQB$ ejusdem esse latitudinis cum cavitate vasis, & axem eundem habere, & uniformi cum motu perpetuo descendere, & partes ejus quam primum attingunt superficiem AB liquefcere, & in aquam conversas gravitate sua defluere in vas, & cataractam vel columnam aquæ $ABNFEM$ cadendo formare, & per foramen EF transire, idemque adæquate implere. Ea vero sit uniformis velocitas glaciei descendens ut & aquæ contiguæ in circulo AB , quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem IH acquirere potest; & jaceant IH & HG in directum, & per punctum I ducatur recta KL horizonti parallela lateribus glaciei.



DE MOTU
CORPORUM,

ciei occurrens in *K* & *L*. Et velocitas aquæ effluentis per foramen *EF* ea erit quam aqua cadendo ab *I* & casu suo describendo altitudinem *IG* acquirere potest. Ideoque per Theoremata *Galilæi* erit *IG* ad *IH* in duplicata ratione velocitatis aquæ per foramen effluentis ad velocitatem aquæ in circulo *AB*, hoc est, in duplicata ratione circuli *AB* ad circulum *EF*; nam hi circuli sunt reciproce ut velocitates aquarum quæ per ipsos, eodem tempore & æquali quantitate, adæquate transeunt. De velocitate aquæ horizontem versus hic agitur. Et motus horizonti parallelus quo partes aquæ cadentis ad invicem accedunt, cum non oriatur a gravitate, nec motum horizonti perpendicularem a gravitate oriundum mutet, hic non consideratur. Supponimus quidem quod partes aquæ aliquantulum cohæreant, & per cohæsionem suam inter cadendum accedant ad invicem per motus horizonti parallelos, ut unicam tantum efforment cataractam & non in plures cataractas dividantur: sed motum horizonti parallelum, a cohæsione illa oriundum, hic non consideramus.


Cas. 1. Concipe jam cavitatem totam in vase, in circuitu aquæ cadentis *ABNFEM*, glacie plenam esse, ut aqua per glaciem tantquam per infundibulum transeat. Et si aqua glaciem tantum non tangat vel, quod perinde est, si tangat & per glaciem propter summam ejus polituram quam liberrime & sine omni resistantia labatur; hæc defluet per foramen *EF* eadem velocitate ac prius, & pondus totum columnæ aquæ *ABNFEM* impendetur in defluxum ejus generandum uti prius, & fundum vasis sustinebit pondus glaciei columnam ambientis.

Liquefcat jam glacies in vase; & effluxus aquæ quoad velocitatem, idem manebit ac prius. Non minor erit, quia glacies in aquam resoluta conabitur descendere: non major, quia glacies in aquam resoluta non potest descendere nisi impediendo descensum aquæ alterius descensui suo æqualem. Eadem vis eandem aquæ effluentis velocitatem generare debet.

Sed foramen in fundo vasis, propter obliquos motus particularum aquæ effluentis, paulo majus esse debet quam prius. Nam particulae aquæ jam non transeunt omnes per foramen perpendiculriter, sed a lateribus vasis undique confluentes & in foramen convergentes, obliquis transeunt motibus; & cursum suum deorsum flectentes in venam aquæ exilientis conspirant, quæ exilior est paulo infra foramen quam in ipso foramine, existente ejus diametro ad diametrum foraminis ut 5 ad 6, vel $5\frac{1}{2}$ ad $6\frac{1}{2}$ quam proxime, si modo

modo diametros recte dimensus sum. Parabam utique laminam planam pertennem in medio perforatam, existente circularis foraminis diametro partium quinque octavarum digiti. Et ne vena aquæ exilientis cadendo acceleraretur & acceleratione redderetur angustior, hanc laminam non fundo sed lateri vasis affixi sic, ut vena illa egrederetur secundum lineam horizonti parallelam. Dein ubi vas aquæ plenum esset, aperui foramen ut aqua efflueret; & venæ diameter, ad distantiam quasi dimidii digiti a foramine quam accuratissime mensurata, prodiit partium viginti & unius quadragesimarum digiti. Erat igitur diameter foraminis hujus circularis ad diametrum venæ ut 25 ad 21 quamproxime. Per experimenta vero constat quod quantitas aquæ quæ per foramen circulare in fundo vasis factum effluit, ea est quæ, pro diametro venæ, cum velocitate prædicta effluere debet.

In sequentibus igitur, plano foraminis parallelum duci intelligatur planum aliud superius ad distantiam diametro foraminis æqualem vel paulo majorem & foramine majore pertusum, per quod utique vena cadat quæ adæquate impleat foramen inferius EF , atque adeo cujus diameter sit ad diametrum foraminis inferioris ut 25 ad 21 circiter. Sic enim vena per foramen inferius perpendiculariter transibit; & quantitas aquæ effluentis, pro magnitudine foraminis hujus, ea erit quam solutio Problematis postulat quamproxime. Spatium vero quod planis duobus & vena cadente clauditur, pro fundo vasis haberi potest. Sed ut solutio Problematis simplicior sit & magis Mathematica, præstat adhibere planum solum inferius pro fundo vasis, & fingere quod aqua quæ per glaciem ceu per infundibulum defluebat, & e vase per foramen EF egrediebatur, motum suum perpetuo servet & glacies quietem suam, etiam si in aquam fluidam resolvetur.




Cas. 2. Si foramen EF non sit in medio fundi vasis, sed fundum alibi perforetur: aqua effluet eadem cum velocitate ac prius, si modo eadem sit foraminis magnitudo. Nam grave majori quidem tempore descendit ad eandem profunditatem per lineam obliquam quam per lineam perpendicularem, sed descendendo eandem

DE MOTU
CORPORUM,

dem velocitatem acquirit in utroque casu, ut *Galileus* demonstra-
vit.

Cas. 3. Eadem est aquæ velocitas effluentis per foramen in latere vasis. Nam si foramen parvum sit, ut intervallum inter superficies *AB* & *KL* quoad sensum evanescat, & vena aquæ horizontaliter exilientis figuram Parabolicam efformet: ex latere recto hujus Parabolæ colligetur, quod velocitas aquæ effluentis ea sit quam corpus ab aquæ in vase stagnantis altitudine *HG* vel *IG* cadendo acquirere potuisset. Facto utique experimento inveni quod, si altitudo aquæ stagnantis supra foramen esset viginti digitorum & altitudo foraminis supra planum horizonti parallelum esset quoque viginti digitorum, vena aquæ profilientis incideret in planum illud ad distantiam digitorum 37 circiter a perpendicularo quod in planum illud a foramine demittebatur captam. Nam sine resistentia vena incidere debuisset in planum illud ad distantiam digitorum 40, existente venæ Parabolicæ latere recto digitorum 80.

Cas. 4. Quinetiam aqua effluens, si sursum feratur, eadem egreditur cum velocitate. Ascendit enim aquæ exilientis vena parva motu perpendiculari ad aquæ in vase stagnantis altitudinem *GH* vel *GI*, nisi quatenus ascensus ejus ab aeris resistentia aliquantulum impediatur; ac proinde ea effluit cum velocitate quam ab altitudine illa cadendo acquirere potuisset. Aquæ stagnantis particula unaquæque undique premitur æqualiter, per Prop. xix. Lib. II, & pressioni cedendo æquali impetu in omnes partes fertur, siue descendat per foramen in fundo vasis, siue horizontaliter effluat per foramen in ejus latere, siue egrediatur in canalem & inde ascendat per foramen parvum in superiore canalis parte factum. Et velocitatem qua aqua effluit, eam esse quam in hac Propositione assignavimus, non solum ratione colligitur, sed etiam per experimenta notissima jam descripta manifestum est.



Cas. 5. Eadem est aquæ effluentis velocitas siue figura foraminis sit circularis siue quadrata vel triangularis aut alia quæcunque circulari æqualis. Nam velocitas aquæ effluentis non pendet a figura foraminis sed ab ejus altitudine infra planum *KL*.

Cas. 6. Si vasis *ABDC* pars inferior in aquam stagnantem immergatur,

mergatur, & altitudo aquæ stagnantis supra fundum vasis sit GR : LIBER
 velocitas quacum aqua quæ in vase est, effluet per foramen EF SECUNDUS;
 in aquam stagnantem, ea erit quam aqua cadendo & casu suo de-
 scribendo altitudinem IR acquirere potest. Nam pondus aquæ
 omnis in vase quæ inferior est superficie aquæ stagnantis, sustinebi-
 tur in æquilibrio per pondus aquæ stagnantis, ideoque motum aquæ
 descendensis in vase minime accelerabit. Patebit etiam & hic Ca-
 sus per Experimenta, mensurando scilicet tempora quibus aqua ef-
 fluit.

Corol. 1. Hinc si aquæ altitudo CA producaturs ad K , ut sit AK
 ad CK in duplicata ratione areæ foraminis in quavis fundi parte fac-
 ti, ad aream circuli AB : velocitas aquæ effluentis æqualis erit velo-
 citati quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem KC
 acquirere potest.

Corol. 2. Et vis qua totus aquæ exilientis motus generari potest,
 æqualis est ponderi Cylindricæ columnæ aquæ cujus basis est fora-
 men EF , & altitudo $2GI$ vel $2CK$. Nam aqua exiliens quo tem-
 pore hanc columnam æquat, pondere suo ab altitudine GI cadendo,
 velocitatem suam qua exilit, acquirere potest.

Corol. 3. Pondus aquæ totius in vase $ABDC$, est ad ponderis
 partem quæ in defluxum aquæ impenditur, ut summa circulorum
 AB & EF , ad duplum circulum EF . Sit enim IO media pro-
 portionalis inter IH & IG ; & aqua per foramen EF egrediens,
 quo tempore gutta cadendo ab I describere posset altitudinem IG ,
 æqualis erit Cylindro cujus basis est circulus EF , & altitudo est
 $2IG$, id est, Cylindro cujus basis est circulus AB & altitudo est
 $2IO$, nam circulus EF est ad circulum AB in subduplicata ratio-
 ne altitudinis IH ad altitudinem IG , hoc est, in simplici ratione
 mediæ proportionalis IO ad altitudinem IG : & quo tempore gut-
 ta cadendo ab I describere potest altitudinem IH , aqua egrediens
 æqualis erit Cylindro cujus basis est circulus AB & altitudo est
 $2IH$: & quo tempore gutta cadendo ab I per H ad G describit
 altitudinum differentiam HG , aqua egrediens, id est, aqua tota in
 solido $ABNFEM$ æqualis erit differentię Cylindrorum, id est,
 Cylindro cujus basis est AB & altitudo $2HO$. Et propterea
 aqua tota in vase $ABDC$ est ad aquam totam cadentem in
 solido $ABNFEM$ ut HG ad $2HO$, id est, ut $HO + OG$
 ad $2HO$, seu $IH + IO$ ad $2IH$. Sed pondus aquæ totius in so-
 lido $ABNFEM$ in aquæ defluxum impenditur: ac proinde pon-
 dus

convexa erit versus cataractam, & propterea major Cono cujus basis est circellus ille PQ & altitudo GH , id est, major tertia parte Cylindri eadem base & altitudine descripti. Suffinet autem circellus ille pondus hujus columnæ, id est, pondus quod pondere Coni seu tertiæ partis Cylindri illius majus est.

Corol. 8. Pondus aquæ quam circellus valde parvus PQ sustinet, minor est pondere duarum tertiarum partium Cylindri aquæ cujus basis est circellus ille & altitudo est HG . Nam instantibus jam positis, describi intelligatur dimidium Sphæroidis cujus basis est circellus ille & semiaxis sive altitudo est HG . Et hæc figura æqualis erit duabus tertiis partibus Cylindri illius & comprehendet columnam aquæ congelatæ PHQ cujus pondus circellus ille sustinet. Nam ut motus aquæ sit maxime directus, columnæ illius superficies externa concurret cum basi PQ in angulo nonnihil acuto, propterea quod aqua cadendo perpetuo acceleratur & propter accelerationem sit tenuior; & cum angulus ille sit recto minor, hæc columna ad inferiores ejus partes jacebit intra dimidium Sphæroidis. Eadem vero sursum acuta erit seu cuspidata, ne horizontalis motus aquæ ad verticem Sphæroidis sit infinite velocior quam ejus motus horizontem versus. Et quo minor est circellus PQ , eo acutior erit vertex columnæ; & circello in infinitum diminuto, angulus PHQ in infinitum diminuetur, & propterea columna jacebit intra dimidium Sphæroidis. Est igitur columna illa minor dimidio Sphæroidis, seu duabus tertiis partibus Cylindri cujus basis est circellus ille & altitudo GH . Suffinet autem circellus vim aquæ ponderi hujus columnæ æqualem, cum pondus aquæ ambientis in defluxum ejus impendatur.

Corol. 9. Pondus aquæ quam circellus valde parvus PQ sustinet, æquale est ponderi Cylindri aquæ cujus basis est circellus ille & altitudo est $\frac{1}{2} GH$ quamproxime. Nam pondus hocce est medium Arithmeticum inter pondera Coni & Hemisphæroidis prædictæ. At si circellus ille non sit valde parvus, sed augeatur donec æquet foramen EF : hic sustinebit pondus aquæ totius sibi perpendiculariter imminuentis, id est, pondus Cylindri aquæ cujus basis est circellus ille & altitudo est GH .

Corol. 10. Et (quantum sentio) pondus quod circellus sustinet, est semper ad pondus Cylindri aquæ cujus basis est circellus ille & altitudo est $\frac{1}{2} GH$, ut EFq ad $EFq - \frac{1}{2}PQq$, sive ut circulus EF ad excessum circuli hujus supra semissem circelli PQ quamproxime.


Cylindri, qui secundum longitudinem suam uniformiter progreditur, resistentia ex aucta vel diminuta ejus longitudine non mutatur; ideoque eadem est cum resistentia Circuli eadem diametro descripti & eadem velocitate secundum lineam rectam plano ipsius perpendicularem progredientis.

Nam latera Cylindri motui ejus minime opponuntur: & Cylindrus, longitudine ejus in infinitum diminuta, in Circulum vertitur.

PROPOSITIO XXXVII. THEOREMA XXIX.

Cylindri, qui in fluido compresso infinito & non elastico secundum longitudinem suam uniformiter progreditur, resistentia quæ oritur a magnitudine sectionis transversæ, est ad vim qua totus ejus motus interea dum quadruplum longitudinis suæ describit, vel tolli possit vel generari, ut densitas Medii ad densitatem Cylindri quamproxime.

Nam si vas $ABDC$ fundo suo CD superficiem aquæ stagnantis tangat, & aqua ex hoc vase per canalem Cylindricum $EFTS$ horizonti perpendicularem in aquam stagnantem effluat, locetur autem Circellus PQ horizonti parallelus ubivis in medio canalis, & producat CA ad K , ut sit AK ad CK in duplicata ratione quam habet excessus orificii canalis EF supra circellum PQ ad circulum AB : manifestum est (per Cas. 5, Cas. 6, & Cor. 1. Prop. xxxvi.) quod velocitas aquæ transeuntis per spatium annulare inter circellum & latera vasis, ea erit quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem KC vel IG acquirere potest.



Et

Et (per Cor. 10. Prop. xxxvi.) si vasis latitudo sit infinita, ut lineola HI evanescat & altitudines IG , HG æquantur: vis aquæ defluentis in circellum erit ad pondus Cylindri cujus basis est circellus ille & altitudo est $\frac{1}{2} IG$, ut EFg ad $EFg - \frac{1}{2} P Qg$ quam proxime. Nam vis aquæ, uniformi motu defluentis per totum canalem, eadem erit in circellum PQ in quacunque canalis parte locatum.

Claudantur jam canalis orificia EF , ST , & ascendat circellus in fluido undique compresso & ascensu suo cogat aquam superiorem descendere per spatium annulare inter circellum & latera canalis: & velocitas circelli ascendentis erit ad velocitatem aquæ descendentis ut differentia circulorum EF & PQ ad circulum PQ , & velocitas circelli ascendentis ad summam velocitatum, hoc est, ad velocitatem relativam aquæ descendentis qua præterfluit circellum ascendentem, ut differentia circulorum EF & PQ ad circulum EF , sive ut $EFg - P Qg$ ad EFg . Sit illa velocitas relativa æqualis velocitati qua supra ostensum est aquam transire per idem spatium annulare dum circellus interea immotus manet, id est, velocitati quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem IG acquirere potest: & vis aquæ in circellum ascendentem eadem erit ac prius, per Legum Cor. 5. id est, Resistentia circelli ascendentis erit ad pondus Cylindri aquæ cujus basis est circellus ille & altitudo est $\frac{1}{2} IG$ ut EFg ad $EFg - \frac{1}{2} P Qg$ quam proxime. Velocitas autem circelli erit ad velocitatem quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem IG acquirit, ut $EFg - P Qg$ ad EFg .

Augeatur amplitudo canalis in infinitum: & rationes illæ inter $EFg - P Qg$ & EFg , interque EFg & $EFg - \frac{1}{2} P Qg$ accedent ultimo ad rationes æqualitatis. Et propterea Velocitas circelli ea nunc erit quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem IG acquirere potest, Resistentia vero ejus æqualis evadet ponderi Cylindri cujus basis est circellus ille & altitudo dimidium est altitudinis IG , a qua Cylindrus cadere debet ut velocitatem circelli ascendentis acquirat; & hac velocitate Cylindrus, tempore cadendi, quadruplum longitudinis suæ describet. Resistentia autem Cylindri, hac velocitate secundum longitudinem suam progredientis, eadem est cum resistentia circelli per Lemma IV; ideoque æqualis est Vi qua motus ejus, interea dum quadruplum longitudinis suæ describit, generari potest quamproxime.

DE MOTU
CORPORUM.

Si longitudo Cylindri augeatur vel minuat: motus ejus ut & tempus quo quadruplum longitudinis suæ describit, augebitur vel minuetur in eadem ratione; adeoque vis illa qua motus auctus vel diminutus, tempore pariter aucto vel diminuto, generari vel tolli possit, non mutabitur; ac proinde etiamnum æqualis est resistentiæ Cylindri, nam & hæc quoque immutata manet per Lemma IV.

Si densitas Cylindri augeatur vel minuat: motus ejus ut & Vis qua motus eodem tempore generari vel tolli potest, in eadem ratione augebitur vel minuetur. Resistentia itaque Cylindri cujuscunque erit ad Vim qua totus ejus motus, interea dum quadruplum longitudinis suæ describit, vel generari possit vel tolli, ut densitas Medii ad densitatem Cylindri quamproxime. *Q. E. D.*

Fluidum autem comprimi debet ut sit continuum, continuum vero esse & non elasticum ut pressio omnis quæ ab ejus compressione oritur propagetur in instanti &, in omnes moti corporis partes æqualiter agendo, resistentiam non mutet. Pressio utique quæ a motu corporis oritur, impenditur in motum partium fluidi generandum & Resistentiam creat. Pressio autem quæ oritur a compressione fluidi, utcunque fortis sit, si propagetur in instanti, nullum generat motum in partibus fluidi continui, nullam omnino inducit motus mutationem; ideoque resistentiam nec auget nec minuit. Certe Actio fluidi, quæ ab ejus compressione oritur, fortior esse non potest in partes posticas corporis moti quam in ejus partes anticas, ideoque resistentiam in hac Propositione descriptam minuere non potest: & fortior non erit in partes anticas quam in posticas, si modo propagatio ejus infinite velocior sit quam motus corporis pressi. Infinite autem velocior erit & propagabitur in instanti, si modo fluidum sit continuum & non elasticum.

Corol. 1. Cylindrorum, qui secundum longitudines suas in Mediis continuis infinitis uniformiter progrediuntur, resistentiæ sunt in ratione quæ componitur ex duplicata ratione velocitatum & duplicata ratione diametrorum & ratione densitatis Mediorum.


Corol. 2. Si amplitudo canalis non augeatur in infinitum, sed Cylindrus in Medio quiescente incluso secundum longitudinem suam progrediatur, & interea axis ejus cum axe canalis coincidat: Resistentia ejus erit ad vim qua totus ejus motus, quo tempore quadruplum longitudinis suæ describit, vel generari possit vel tolli, in ratione quæ componitur ex ratione EFq ad $EFq - \frac{1}{2}PQq$ semel

semel, & ratione EFq ad $EFq - PQq$ bis, & ratione densitatis Medii ad densitatem Cylindri.

Corol. 3. Iisdem positis, & quod longitudo L sit ad quadruplum longitudinis Cylindri in ratione quæ componitur ex ratione $EFq - \frac{1}{2}PQq$ ad EFq semel, & ratione $EFq - PQq$ ad EFq bis: resistentia Cylindri erit ad vim qua totus ejus motus, interea dum longitudinem L describit, vel tolli possit vel generari, ut densitas Medii ad densitatem Cylindri.

Scholium.

In hac Propositione resistentiam investigavimus quæ oritur a sola magnitudine transversæ sectionis Cylindri, neglecta resistentiæ parte quæ ab obliquitate motuum oriri possit. Nam quemadmodum in casu primo Propositionis xxxvi. obliquitas motuum quibus partes aquæ in vase, undique convergebant in foramen EF , impedit effluxum aquæ illius per foramen: sic in hac Propositione, obliquitas motuum quibus partes aquæ ab anteriore Cylindri termino pressæ, cedunt pressioni & undique divergunt, retardat eorum transitum per loca in circuitu termini illius antecedentis versus posteriores partes Cylindri, efficitque ut fluidum ad majorem distantiam commoveatur & resistentiam auget, idque in ea fere ratione qua effluxum aquæ e vase diminuit, id est, in ratione duplicata 25 ad 21 circiter. Et quemadmodum, in Propositionis illius casu primo, effecimus ut partes aquæ perpendiculariter & maxima copia transirent per foramen EF , ponendo quod aqua omnis in vase quæ in circuitu cataractæ congelata fuerat, & cujus motus obliquus erat & inutilis, maneret sine motu: sic in hac Propositione, ut obliquitas motuum tollatur, & partes aquæ motu maxime directo & brevissimo cedentes facillimum præbeant transitum Cylindro, & sola maneat resistentia quæ oritur a magnitudine sectionis transversæ, quæque diminui non potest nisi diminuendo diametrum Cylindri, concipiendum est quod partes fluidi quarum motus sunt obliqui & inutilis & resistentiam creant, quiescant inter se ad utrumque Cylindri terminum, & cohæreant & Cylindro jungantur. Sit $ABCD$ rectangulum, & sint AE & BE arcus duo Parabolici axe AB descripti, latere autem recto quod sit ad spa-




R r

tium

DE MOTU
CORPORUM.

tium HG , describendum à Cylindro cadente dum velocitatem suam acquirit, ut HG ad $\frac{1}{2} AB$. Sint etiam CF & DF arcus alii duo Parabolici, axe CD & latere recto quod sit prioris lateris recti quadruplum descripti; & convolutione figuræ circum axem EF generetur solidum cujus media pars $ABDC$ sit Cylindrus de quo agimus, & partes extremæ ABE & CDF contineant partes fluidi inter se quiescentes & in corpora duo rigida concretas, quæ Cylindro utrinque tanquam caput & cauda adhæreant. Et solidi $EACFDB$, secundum longitudinem axis sui FE in partes versus E progredientis, resistentia ea erit quamproxime quam in hac Propositione descripsimus, id est, quæ rationem illam habet ad vim qua totus Cylindri motus, interea dum longitudo $4 AC$ motu illo uniformiter continuato describatur, vel tolli possit vel generari, quam densitas Fluidi habet ad densitatem Cylindri quamproxime. Et hac vi Resistentia minor esse non potest quam in ratione 2 ad 3, per Corol. 7. Prop. xxxvi.



L E M M A V.

Si Cylindrus, Sphæra & Sphærois, quorum latitudines sunt æquales, in medio canalis Cylindrici ita locentur successive ut eorum axes cum axe canalis coincidant: hæc corpora fluxum aquæ per canalem æqualiter impediunt.

Nam spatia inter Canalem & Cylindrum, Sphæram, & Sphæroidem per quæ aqua transit, sunt æqualia: & aqua per æqualia spatia æqualiter transit.

L E M M A VI.

Isdem positis, corpora prædicta æqualiter urgentur ab aqua per canalem fluente.

Patet per Lemma v & Motus Legem tertiam. Aqua utique & corpora in se mutuo æqualiter agunt.

LEMMA

L E M M A VII.

Si aqua quiescat in canali, & corpora in partes contrarias æquali velocitate per canalem ferantur: æquales erunt eorum resistentiæ inter se.

Constat ex Lemmate superiore, nam motus relativi iidem inter se manent.

Scholium.

Eadem est ratio corporum omnium convexorum & rotundorum, quorum axes cum axē canalis coincidunt. Differentia aliqua ex majore vel minore frictione oriri potest; sed in his Lemmatis corpora esse politissima supponimus, & Medii tenacitatem & frictionem esse nullam, & quod partes fluidi, quæ motibus suis obliquis & superfluis fluxum aquæ per canalem perturbare, impedire, & retardare possunt, quiescant inter se tanquam gelu constrictæ, & corporibus ad ipsorum partes anticæ & posticæ adhæreant, perinde ut in Scholio Propositionis præcedentis exposui. Agitur enim in sequentibus de resistentia omnium minima quam corpora rotunda, datis maximis sectionibus transversis descripta, habere possunt.

Corpora fluidis innatantia, ubi moventur in directum, efficiunt ut fluidum ad partem anticam ascendat, ad posticam subsidat, præsertim si figura sint obtusa; & inde resistentiam paulo majorem sentiunt quam si capite & cauda sint acutis. Et corpora in fluidis elasticis mota, si ante & post obtusa sint, fluidum paulo magis condensant ad anticam partem & paulo magis relaxant ad posticam; & inde resistentiam paulo majorem sentiunt quam si capite & cauda sint acutis. Sed nos in his Lemmatis & Propositionibus non agimus de fluidis elasticis, sed de non elasticis; non de insidentibus fluido, sed de alte immersis. Et ubi resistentia corporum in fluidis non elasticis innotescit, augenda erit hæc resistentia aliquantulum tam in fluidis elasticis, qualis est Aer, quam in superficiebus fluidorum stagnantium, qualia sunt maria & paludes.

DE MOTU
CORPORUM,

PROPOSITIO XXXVIII. THEOREMA XXX.

Globi, in Fluido compresso infinito & non elastico uniformiter progredientis, resistentia est ad vim qua totus ejus motus, quo tempore octo tertias partes diametri suæ describit, vel tolli possit, vel generari, ut densitas Fluidi ad densitatem Globi quamproxime.

Nam Globus est ad Cylindrum circumscriptum ut duo ad tria; & propterea Vis illa, quæ tollere possit motum omnem Cylindri interea dum Cylindrus describat longitudinem quatuor diametrorum, Globi motum omnem tollet interea dum Globus describit duas tertias partes hujus longitudinis, id est, octo tertias partes diametri propriæ. Resistentia autem Cylindri est ad hanc Vim quamproxime ut densitas Fluidi ad densitatem Cylindri vel Globi, per Prop. xxxvii.; & Resistentia Globi æqualis est Resistentiæ Cylindri, per Lem. v, vi, vii. *Q. E. D.*

Corol. 1. Globorum, in Mediis compressis infinitis, resistentiæ sunt in ratione quæ componitur ex duplicata ratione velocitatis, & duplicata ratione diametri, & ratione densitatis Mediorum.

Corol. 2. Velocitas maxima quacum Globus, vi ponderis sui comparativi, in fluido resistente potest descendere, ea est quam acquirere potest Globus idem, eodem pondere, absque resistentia cadendo & casu suo describendo spatium quod sit ad quatuor tertias partes diametri suæ ut densitas Globi ad densitatem Fluidi. Nam Globus tempore casus sui, cum velocitate cadendo acquisita, describet spatium quod erit ad octo tertias diametri suæ, ut densitas Globi ad densitatem Fluidi; & vis ponderis motum hunc generans, erit ad vim quæ motum eundem generare possit quo tempore Globus octo tertias diametri suæ eadem velocitate describit, ut densitas Fluidi ad densitatem Globi: ideoque per hanc Propositionem, vis ponderis æqualis erit vi Resistentiæ, & propterea Globum accelerare non potest.

Corol. 3. Data & densitate Globi & velocitate ejus sub initio motus, ut & densitate fluidi compressi quiescentis in qua Globus movetur; datur ad omne tempus & velocitas Globi & ejus resistentia & spatium ab eo descriptum, per Corol. 7. Prop. xxxv.

Corol.

Corol. 4. Globus in fluido compresso quiescente ejusdem secum densitatis movendo, dimidiam motus sui partem prius amittet quam longitudinem duarum ipsius diametrorum descripserit, per idem Corol. 7.

LIBER
SECUNDUS

PROPOSITIO XXXIX. THEOREMA XXXI.

Globi, per Fluidum in canali Cylindrico clausum & compressum uniformiter progredientis, resistentia est ad vim qua totus ejus motus, interea dum octo tertias partes diametri suae describit, vel generari possit vel tolli, in ratione quae componitur ex ratione orificii canalisi ad excessum hujus orificii supra dimidium circuli maximi Globi, & ratione duplicata orificii canalisi ad excessum hujus orificii supra circulum maximum Globi, & ratione densitatis Fluidi ad densitatem Globi quamproxime.

Patet per Corol. 2. Prop. xxxvii; procedit vero demonstratio quemadmodum in Propositione praecedente.

PROPOSITIO XL. PROBLEMA IX.

Globi in Medio fluidissimo compresso progredientis, invenire resistentiam per Phaenomena.

Sit A pondus Globi in vacuo, B pondus ejus in Medio resistente; D diameter Globi, F spatium quod fit ad $\frac{1}{4}$ D ut densitas Globi ad densitatem Medii, id est, ut A ad A—B, G tempus quo Globus pondere B absque resistentia cadendo describit spatium F, & H velocitas quam Globus hocce casu suo acquirit. Et erit H velocitas maxima quacum Globus, pondere suo B, in Medio resistente potest descendere, per Corol. 2. Prop. xxxviii; & resistentia quam Globus ea cum velocitate descendens patitur, aequalis erit ejus ponderi B: resistentia vero quam patitur in alia quacunque velocitate, erit ad pondus B in duplicata ratione velocitatis hujus ad velocitatem illam maximam H, per Corol. 1. Prop. xxxviii.

Rr 3

Hæc

DE MOTU
CORPORUM.

Hæc est resistentia quæ oritur ab inertia materiæ Fluidi. Ea vero quæ oritur ab elasticitate, tenacitate, & frictione partium ejus, sic investigabitur.

Demittatur Globus ut pondere suo B in Fluido descendat; & sit P tempus cadendi, idque in minutis secundis si tempus G in minutis secundis habeatur. Inveniatur numerus absolutus N qui congruit Logarithmo 0,4342944819 $\frac{2P}{G}$, sitque L Logarithmus nu-

meri $\frac{N+1}{N}$: & velocitas cadendo acquisita erit $\frac{N-1}{N+1} H$, altitudo

autem descripta erit $\frac{2PF}{G} - 1,3862943611 F + 4,605170186 LF$.

Si Fluidum satis profundum sit, negligi potest terminus 4,605170186

LF; & erit $\frac{2PF}{G} - 1,3862943611 F$ altitudo descripta quamproxi-

me. Patent hæc per Libri secundi Propositionem nonam & ejus Corollaria, ex Hypothesi quod Globus nullam aliam patiaturs resistentiam nisi quæ oritur ab inertia materiæ. Si vero aliam insuper resistentiam patiaturs, descensus erit tardior, & ex retardatione innotescet quantitas hujus resistentiæ.

Ut corporis in Fluido cadentis velocitas & descensus facilius innotescant, composui Tabulam sequentem, cujus columna prima denotat tempora descensus, secunda exhibet velocitates cadendo acquisitas existente velocitate maxima 100000000, tertia exhibet spatia temporibus illis cadendo descripta, existente 2 F spatio quod corpus tempore G cum velocitate maxima describit, & quarta exhibet spatia iisdem temporibus cum velocitate maxima descripta.

Numeri in quarta columna sunt $\frac{2P}{G}$, & subducendo numerum

1,3862944—4,6051702 L, inveniuntur numeri in tertia columna, & multiplicandi sunt hi numeri per spatium F ut habeantur spatia cadendo descripta. Quinta his insuper adjecta est columna, quæ continet spatia descripta iisdem temporibus a corpore, vi ponderis sui comparativi B, in vacuo cadente.

Tempora

Tempora P	Velocitates cadentis in fluido.	Spatia caden- do descripta in fluido.	Spatia motu maximo de- scripta.	Spatia caden- do descripta in vacuo.
0,001G	99999 $\frac{1}{2}$	0,000001F	0,002F	0,000001F
0,01G	9999967	0,0001F	0,02F	0,0001F
0,1G	9966799	1,0099834F	0,2F	0,01F
0,2G	19737532	0,0397361F	0,4F	0,04F
0,3G	29131261	0,0886815F	0,6F	0,09F
0,4G	37994896	0,1559070F	0,8F	0,16F
0,5G	46211716	0,2402290F	1,0F	0,25F
0,6G	53704957	0,3402706F	1,2F	0,36F
0,7G	60436778	0,4545405F	1,4F	0,49F
0,8G	66403677	0,5815071F	1,6F	0,64F
0,9G	71629787	0,7196609F	1,8F	0,81F
1G	76159416	0,8675617F	2F	1F
2G	96402758	2,6500055F	4F	4F
3G	99505475	4,6186570F	6F	9F
4G	99932930	6,6143765F	8F	16F
5G	99990920	8,6137964F	10F	25F
6G	99998771	10,6137179F	12F	36F
7G	99999834	12,6137073F	14F	49F
8G	99999980	14,6137059F	16F	64F
9G	99999997	16,6137057F	18F	81F
10G	99999999 $\frac{1}{2}$	18,6137056F	20F	100F

Scholium.

Ut resistencias Fluidorum investigarem per Experimenta, paravi vas ligneum quadratum, longitudine & latitudine interna digitorum novem pedis *Londinensis*, profunditate pedum novem cum semisse, idemque implevi aqua pluviali; & globis ex cera & plumbo incluso formatis, notavi tempora descensus globorum, existente descensus altitudine 112 digitorum pedis. Pes solidus cubicus *Londinensis* continet 76 libras *Romanas* aquæ pluvialis, & pedis hujus digitus solidus continet $\frac{1}{2}$ uncias libræ hujus seu grana 253 $\frac{1}{2}$; & globus aqueus diametro digiti unius descriptus continet grana

132,645.

DE MOTU 132,645 in Medio aeris, vel grana 132,8 in vacuo; & globus quilibet alius est ut excessus ponderis ejus in vacuo supra pondus ejus in aqua.

Exper. 1. Globus, cujus pondus erat 156½ granorum in aere & 77 granorum in aqua, altitudinem totam digitorum 112 tempore minutorum quatuor secundorum descripsit. Et experimento repetito, globus iterum cecidit eodem tempore minutorum quatuor secundorum.

Pondus globi in vacuo est 156½ *gran.*, & excessus hujus ponderis supra pondus globi in aqua est 72½ *gran.* Unde prodit globi diameter 0,84224 partium digiti. Est autem ut excessus ille ad pondus globi in vacuo, ita densitas aquæ ad densitatem globi, & ita partes octo tertiæ diametri globi (*viz.* 2,24597 *dig.*) ad spatium 2 *F*, quod proinde erit 4,4256 *dig.* Globus tempore minuti unius secundi, toto suo pondere granorum 156½, cadendo in vacuo describet digitos 193½; & pondere granorum 77, eodem tempore, absque resistentia cadendo in aqua describet digitos 95,219; & tempore *G*, quod sit ad minutum unum secundum in subduplicata ratione spatii *F* seu 2,2128 *dig.* ad 95,219 *dig.* describet 2,2128 *dig.* & velocitatem maximam *H* acquireret quacum potest in aqua descendere. Est igitur tempus *G* 0,15244. Et hoc tempore *G*, cum velocitate illa maxima *H*, globus describet spatium 2 *F* digitorum 4,4256; ideoque tempore minutorum quatuor secundorum describet spatium digitorum 116,1245. Subducatur spatium 1,3862944 *F* seu 3,0676 *dig.* & manebit spatium 113,0569 digitorum quod globus cadendo in aqua, in vase amplissimo, tempore minutorum quatuor secundorum describet. Hoc spatium, ob angustiam vasis lignei prædicti, minui debet in ratione quæ componitur ex subduplicata ratione orificii vasis ad excessum orificii hujus supra semicirculum maximum globi & ex simplici ratione orificii ejusdem ad excessum ejus supra circulum maximum globi, id est, in ratione 1 ad 0,9914. Quo facto, habebitur spatium 112,08 digitorum, quod Globus cadendo in aqua in hoc vase ligneo tempore minutorum quatuor secundorum per Theoriam describere debuit quamproxime. Descripsit vero digitos 112 per Experimentum.

Exper. 2. Tres Globi æquales, quorum pondera seorsim erant 76½ granorum in aere & 5½ granorum in aqua, successive demittebantur; & unusquisque cecidit in aqua tempore minutorum secundorum quindecim, casu suo describens altitudinem digitorum 112.

Com.

Computum ineundo prodeunt pondus globi in vacuo $76\frac{1}{2}$ gran., excessus hujus ponderis supra pondus in aqua $71\frac{1}{4}$ gran., diameter globi 0, 81296 dig., octo tertiæ partes hujus diametri 2, 16789 dig., spatium 2 F 2, 3217 dig., spatium quod globus pondere $5\frac{1}{16}$ gran. tempore 1", absque resistantia cadendo describat 12, 808 dig., & tempus G 0", 301056. Globus igitur, velocitate maxima quacum potest in aqua vi ponderis $5\frac{1}{16}$ gran. descendere, tempore 0", 301056 describet spatium 2, 3217 dig. & tempore 15" spatium 115, 678 dig. Subducatur spatium 1, 3862944 F seu 1, 609 dig. & manebit spatium 114, 069 dig. quod proinde globus eodem tempore in vase latissimo cadendo describere debet. Propter angustiam vasis nostri detrahi debet spatium 0, 895 dig. circiter. Et sic manebit spatium 113, 174 dig. quod globus cadendo in hoc vase, tempore 15" describere debuit per Theoriam quamproxime. Descripsit vero digitos 112. per Experimentum. Differentia est insensibilis.

Exper. 3. Globi tres æquales, quorum pondera seorsim erant 121 gran. in aere & 1 gran. in aqua, successive demittebantur; & cadebant in aqua temporibus 46", 47", & 50", describentes altitudinem digitorum 112.

Per Theoriam hi globi cadere debuerunt tempore 40" circiter. Quod tardius ceciderunt, vel bullulis nonnullis globo adhærentibus, vel rarefactioni ceræ ad calorem vel tempestatem vel manus globum demittentis, vel erroribus insensibilibus in ponderandis globis in aqua, vel denique minori proportioni resistantiæ quæ a vi inertię in tardis motibus oritur ad resistantiam quæ oritur ab aliis causis,tribuendum esse puto. Ideoque pondus globi in aqua debet esse plurium granorum ut experimentum certum & fide dignum reddatur.

Exper. 4. Experimenta hæcenus descripta cæpi ut investigarem resistantias fluidorum antequam Theoria, in propositionibus proximè præcedentibus exposita, mihi innotesceret. Postea, ut Theoriam inventam examinarem, paravi vas ligneum latitudine interna digitorum $8\frac{1}{2}$, profunditate pedum quindecim cum triente. Deinde ex cera & plumbo incluso globos quatuor formavi, singulos pondere 139½ granorum in aere & 7½ granorum in aqua. Et hos demisi ut tempora cadendi in aqua per pendulum, ad semi-minuta secunda oscillans, mensurarem. Globi, ubi ponderabantur & postea cadebant, frigidi erant & aliquamdiu frigidi manserant; quia calor ceram rarefacit, & per rarefactionem diminuit pondus globi in aqua, & cera rarefacta non statim ad densitatem pristinam per

Sf

frigus

DE MOTU CELESTIUM frigus reducitur. Antequam caderent, immergebantur penitus in aquam; ne pondere partis alicujus ex aqua extantis descensus eorum sub initio acceleraretur. Et ubi penitus immerſi quieſcebant, demittebantur quam cauſſime, ne impulſum aliquem a manu demittente acciperent. Ceciderunt autem ſucceſſive temporibus oſcillationum $47\frac{1}{2}$, $48\frac{1}{2}$, 50 & 51 , deſcribentes altitudinem pedum quindecim & digitorum duorum. Sed tempeſtas jam paulo frigidior erat quam cum globi ponderabantur, ideoque iteravi experimentum alio die, & globi ceciderunt temporibus oſcillationum 49 , $49\frac{1}{2}$, 50 & 53 , ac tertio temporibus oſcillationum $49\frac{1}{2}$, 50 , 51 & 53 . Et experimento ſæpius capto, Globi ceciderunt maxima ex parte temporibus oſcillationum $49\frac{1}{2}$ & 50 . Ubi tardius cecidere, ſuſpikor eoſdem retardatos fuiſſe impingendo in latera vaſis.

Jam computum per Theoriam ineundo, prodeunt pondus globi in vacuo $139\frac{2}{7}$ granorum. Exceſſus hujus ponderis ſupra pondus globi in aqua $132\frac{1}{2}$ gran. Diameter globi $0,99868$ dig. Octo tertię partes diametri $2,66315$ dig. Spatium $2F$ $2,8066$ dig. Spatium quod globus pondere $7\frac{1}{2}$ granorum, tempore minuti unius ſecundi abſque reſiſtentia cadendo deſcribit $9,88164$ dig. Et tempus $G0''$, 376843 . Globus igitur, velocitate maxima quacum poteſt in aqua vi ponderis $7\frac{1}{2}$ granorum deſcendere, tempore $0''$, 376843 deſcribit ſpatium $2,8066$ digitorum, & tempore $1''$ ſpatium $7,44766$ digitorum, & tempore $25''$ ſeu oſcillationum 50 ſpatium $186,1915$ dig. Subducatur ſpatium $1,386294 F$, ſeu $1,9454$ dig. & manebit ſpatium $184,2461$ dig. quod globus eodem tempore in vaſe latiffimo deſcribet. Ob anguſtiam vaſis noſtri, minuatur hoc ſpatium in ratione quæ componitur ex ſubduplicata ratione oriſicii vaſis ad exceſſum hujus oriſicii ſupra ſemicirculum maximum globi, & ſimplici ratione ejuſdem oriſicii ad exceſſum ejus ſupra circulum maximum globi; & habebitur ſpatium 181 , 86 digitorum, quod globus in hoc vaſe tempore oſcillationum 50 deſcribere debuit per Theoriam quamproxime. Deſcripſit vero ſpatium 182 . digitorum tempore oſcillationum $49\frac{1}{2}$ vel 50 per Experimentum.

Exper. 5. Globi quatuor pondere $154\frac{1}{2}$ gran. in aere & $21\frac{1}{2}$ gran. in aqua, ſæpe demiffi, cadebant tempore oſcillationum $28\frac{1}{2}$, 29 , $29\frac{1}{2}$ & 30 , & nonnunquam 31 , 32 & 33 , deſcribentes altitudinem pedum quindecim & digitorum duorum.

Per Theoriam cadere debuerunt tempore oſcillationum 29 quamproxime.

Exper.

Exper. 6. Globi quinque pondere $212\frac{1}{2}$ gran. in aere & $79\frac{1}{2}$ in a-
qua, sæpe demissi, cadebant tempore oscillationum 15, $15\frac{1}{2}$, 16, LIBER
17 & 18, describentes altitudinem pedum quindecim & digitorum SECUNDUS.
duorum.

Per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 15 quam-
proxime.

Exper. 7. Globi quatuor pondere $293\frac{1}{2}$ gran. in aere & $35\frac{1}{2}$ gran.
in aqua sæpe demissi, cadebant tempore oscillationum $29\frac{1}{2}$, 30, $30\frac{1}{2}$,
31, 32 & 33, describentes altitudinem pedum quindecim & digiti
unius cum semisse.

Per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 28 quam-
proxime.

Causam investigando cur globorum, ejusdem ponderis & magni-
tudinis, aliqui citius alii tardius caderent, in hanc incidi; quod
globi, ubi primum demittebantur & cadere incipiebant, oscillarent
circum centra, latere illo quod forte gravius esset, primum descen-
dente, & motum oscillatorium generante. Nam per oscillationes
suas, globus majorem motum communicat aquæ, quam si sine os-
cillationibus descenderet; & communicando, amittit partem mo-
tus proprii quo descendere deberet, & pro majore vel minore os-
cillatione, magis vel minus retardatur. Quinetiam globus recedit
semper a latere suo quod per oscillationem descendit, & receden-
do appropinquat lateribus vasis & in latera nonnunquam impingitur.
Et hæc oscillatio in globis gravioribus fortior est, & in majoribus
aquam magis agit. Quapropter, ut oscillatio globorum minor red-
deretur, globos novos ex cera & plumbo construxi, infigendo plum-
bum in latus aliquod globi prope superficiem ejus; & globum ita de-
misi, ut latus gravius, quoad fieri potuit, esset infimum ab initio
descensus. Sic oscillationes factæ sunt multo minores quam prius,
& globi temporibus minus inæqualibus ceciderunt, ut in experimentis
sequentibus.

Exper. 8. Globi quatuor pondere granorum 139 in aere & $6\frac{1}{2}$ in
aqua, sæpe demissi, ceciderunt temporibus oscillationum non plu-
rium quam 52, non pauciorum quam 50, & maxima ex parte tem-
pore oscillationum 51 circiter, describentes altitudinem digitorum
182.

Per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 52 circi-
ter.

Exper. 9. Globi quatuor pondere granorum $273\frac{1}{2}$ in aere &
 $140\frac{1}{2}$ in aqua, sæpius demissi, ceciderunt temporibus oscillationum
Sf 2 non

DE MOTU
CORPORUM,

non pauciorum quam 12, non plurium quam 13, describentes altitudinem digitorum 182.

Per Theoriam vero hi globi cadere debuerunt tempore oscillationum 11½ quamproxime.

Exper. 10. Globi quatuor pondere granorum 384 in aere & 119½ in aqua, sæpe demissi, cadebant temporibus oscillationum 17½, 18, 18½ & 19, describentes altitudinem digitorum 181½. Et ubi ceciderunt tempore oscillationum 19, nonnunquam audiui impulsus eorum in latera vasis antequam ad fundum pervenerunt.

Per Theoriam vero cadere debuerunt tempore oscillationum 15½ quamproxime.

Exper. 11. Globi tres æquales, pondere granorum 48 in aere & 3½ in aqua, sæpe demissi, ceciderunt temporibus oscillationum 43½, 44, 44½, 45 & 46, & maxima ex parte 44 & 45, describentes altitudinem digitorum 182½ quamproxime.

Per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 46½ circiter.

Exper. 12. Globi tres æquales, pondere granorum 141 in aere & 4½ in aqua, aliquoties demissi, ceciderunt temporibus oscillationum 61, 62, 63, 64 & 65, describentes altitudinem digitorum 182.

Et per Theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 64½ quamproxime.

Per hæc Experimenta manifestum est quod, ubi globi tardè ceciderunt, ut in experimentis secundis, quartis, quintis, octavis, undecimis ac duodecimis, tempora cadendi recte exhibentur per Theoriam: at ubi globi velocius ceciderunt, ut in experimentis sextis, nonis ac decimis, resistentia paulo major extitit quam in duplicata ratione velocitatis. Nam globi inter cadendum oscillant aliquantulum; & hæc oscillatio in globis levioribus & tardius cadentibus, ob motus languorem cito cessat; in gravioribus autem & majoribus, ob motus fortitudinem diutius durat, & non nisi post plures oscillationes ab aqua ambiente cohiberi potest. Quinetiam globi, quo velociores sunt, eo minus premuntur a fluido ad posticas suas partes; & si velocitas perpetuo augeatur, spatium vacuum tandem a tergo relinquent, nisi compressio fluidi simul augeatur. Debet autem compressio fluidi (per Prop. xxxii & xxxiii) augeri in duplicata ratione velocitatis, ut resistentia sit in eadem duplicata ratione. Quoniam hoc non fit, globi velociores paulo minus premuntur a tergo, & defectu pressiois, resistentia eorum fit paulo major quam in duplicata ratione velocitatis.

Con-

Congruit igitur Theoria cum phænomenis corporum cadentium in Aqua, reliquum est ut examinemus phænomena cadentium in Aere.

Exper. 13. A culmine Ecclesiæ *Sti. Pauli*, in urbe *Londini*, globi duo vitrei simul demittebantur, unus argenti vivi plenus, alter aeris; & cadendo describebant altitudinem pedum *Londinensium* 220. Tabula lignea ad unum ejus terminum polis ferreis suspendebatur, ad alterum pessulo ligneo incumbebat; & globi duo huic Tabulæ impositi simul demittebantur, subtrahendo pessulum, ut Tabula polis ferreis solummodo innixa super iisdem devolveretur, & eodem temporis momento pendulum ad minuta secunda oscillans, per filum ferreum a pessulo ad imam Ecclesiæ partem tendens, demitteretur & oscillare inciperet. Diametri & pondera globorum ac tempora cadendi exhibentur in Tabula sequente.

<i>Globorum mercurio plenorum.</i>			<i>Globorum aere plenorum.</i>		
<i>Pondera</i>	<i>Diametri</i>	<i>Tempora cadendi.</i>	<i>Pondera</i>	<i>Diametri</i>	<i>Tempora cadendi.</i>
908 <i>gran.</i>	0,8 <i>digit.</i>	4"	510 <i>gran.</i>	5,1 <i>digit.</i>	8" ¹ / ₂
983	0,8	4—	642	5,2	8
866	0,8	4—	599	5,1	8
747	0,75	4+	515	5,0	8 ¹ / ₂
808	0,75	4	483	5,0	8 ¹ / ₂
784	0,75	4+	641	5,2	8

Cæterum tempora observata corrigi debent. Nam globi mercuriales (per Theoriam *Galilæi*) minutis quatuor secundis describent pedes *Londinenses* 257, & pedes 220 minutis tantum 3" 42". Tabula lignea utique, detracto pessulo, tardius devolvebatur quam par erat, & tarda sua devolutione impendebat descensum globorum sub initio. Nam globi incumbant Tabulæ prope medium ejus, & paulo quidem propiores erant axi ejus quam pessulo. Et hinc tempora cadendi prorogata fuerunt minutis tertiis octodecim circiter, & jam corrigi debent detrahendo illa minuta, præsertim in globis majoribus qui Tabulæ devolventi paulo diutius incumbant propter magnitudinem diametrorum. Quo facto, tempora quibus globi sex majores cecidere, evadent 8" 12", 7" 42", 7" 42", 7" 57", 8" 12", & 7" 42".

DE MOTU
CORPORUM.

Globorum igitur aere plenorum quintus, diametro digitorum quinque pondere granorum 483 constructus cecidit, tempore 8" 12"', describendo altitudinem pedum 220. Pondus aquæ huic globo æqualis, est 16600 granorum; & pondus aëris eidem æqualis est $\frac{16600}{860}$ gran. seu 19 $\frac{3}{4}$ gran.; ideoque pondus globi in vacuo est 502 $\frac{3}{4}$ gran. & hoc pondus est ad pondus aeris globo æqualis, ut 502 $\frac{3}{4}$ ad 19 $\frac{3}{4}$, & ita sunt 2 F ad octo tertias partes diametri globi, id est, ad 13 $\frac{1}{2}$ digitos. Unde 2 F prodeunt 28 ped. 11 dig. Globus cadendo in vacuo, toto suo pondere 502 $\frac{3}{4}$ granorum, tempore minuti unius secundi describit digitos 193 $\frac{1}{2}$ ut supra, & pondere 483 gran. describit digitos 185, 905, & eodem pondere 483 gran. etiam in vacuo describit spatium F seu 14 ped. 5 $\frac{1}{2}$ dig. tempore 57" 58"', & velocitatem maximam acquirit quacum possit in aere descendere. Hac velocitate globus, tempore 8" 12"', describit spatium pedum 245 & digitorum 5 $\frac{1}{2}$. Aufer 1, 3863 F seu 20 ped. 0 $\frac{1}{2}$ dig. & manebunt 225 ped. 5 dig. Hoc spatium igitur globus, tempore 8" 12"', cadendo describere debuit per Theoriam. Descripsit vero spatium 220 pedum per experimentum. Differentia insensibilis est.

Similibus computis ad reliquos etiam globos aere plenos applicatis, confeci Tabulam sequentem.

Globorum ponderi.	Diametri	Tempora cecidendi ab altitudine pedum 220.	Spatia describenda per Theoriam,	Excessus.
510 gran.	5,1 dig.	8" 12"	226 ped. 11 dig.	6 ped. 11 dig.
642	5,2	7 42	230 9	10 9
599	5,1	7 42	227 10	7 10
515	5	7 57	224 5	4 5
483	5	8 12	225 5	5 5
641	5,2	7 42	230 7	10 7

Globorum igitur tam in Aere quam in Aqua motorum resistentia prope omnis per Theoriam nostram recte exhibetur, ac densitati fluidorum, paribus globorum velocitatibus ac magnitudinibus proportionalis est.

In

In Scholio quod Sectioni sextæ subjunctum est, ostendimus per experimenta pendulorum quod globorum æqualium & æquivelocium in Aere, Aqua, & Argento vivo motorum resistentiæ sunt ut fluidorum densitates. Idem hic ostendimus magis accurate per experimenta corporum cadentium in Aere & Aqua. Nam pendula singulis oscillationibus motum cient in fluido motui penduli redeuntis semper contrarium, & resistentia ab hoc motu oriunda, ut & resistentia fili quo pendulum suspendebatur, totam Penduli resistentiam majorem reddiderunt quam resistentia quæ per experimenta corporum cadentium prodit. Etenim per experimenta pendulorum in Scholio illo exposita, globus ejusdem densitatis cum Aqua, describendo longitudinem semidiametri suæ in Aere, amittere deberet motus sui partem $\frac{1}{1726}$. At per Theoriam in hac septima Sectione expositam & experimentis cadentium confirmatam, globus idem describendo longitudinem eandem, amittere deberet motus sui partem tantum $\frac{1}{8786}$, posito quod densitas Aquæ sit ad densitatem Aeris ut 860 ad 1. Resistentiæ igitur per experimenta pendulorum majores prodire (ob causas jam descriptas) quam per experimenta globorum cadentium, idque in ratione 4 ad 3 circiter. Attamen cum pendulorum in Aere, Aqua, & Argento vivo oscillantium resistentiæ a causis similibus similiter augeantur, proportio resistentiarum in his Mediis, tam per experimenta pendulorum, quam per experimenta corporum cadentium, satis recte exhibebitur. Et inde concludi potest quod corporum in fluidis quibuscunque fluidissimis motorum resistentiæ, cæteris paribus, sunt ut densitates fluidorum.

His ita stabilitis, dicere jam licet quamnam motus sui partem globus quilibet, in fluido quocunque projectus, dato tempore amittet quamproxime. Sit D diameter globi, & V velocitas ejus sub initio motus, & T tempus quo globus velocitate V in vacuo describet spatium quod sit ad spatium $\frac{2}{3}D$ ut densitas globi ad densitatem fluidi: & globus in fluido illo projectus, tempore quovis alio t , amittet velocitatis suæ partem $\frac{tV}{T+t}$, manente parte $\frac{TV}{T+t}$, & describet spatium quod sit ad spatium uniformi velocitate V eodem tempore descriptum in vacuo, ut logarithmus numeri $\frac{T+t}{T}$ multiplicatus per numerum 2,302585093 est ad numerum $\frac{t}{T}$, per

Corol.

DE MOTU
CORPORUM.

Corol. 7. Prop. xxxv. In motibus tardis resistentia potest esse paulo minor, propterea quod figura Globi paulo aptior sit ad motum quam figura Cylindri eadem diametro descripti. In motibus velocibus resistentia potest esse paulo major, propterea quod elasticitas & compressio fluidi non augeantur in duplicata ratione velocitatis. Sed hujusmodi minutias hic non expendo.

Et quamvis Aer, Aqua, Argentum vivum & similia fluida, per divisionem partium in infinitum, subtiliarentur & fierent Media infinite fluida; tamen globis projectis haud minus resisterent. Nam resistentia, de qua agitur in Propositionibus præcedentibus, oritur ab inertia materiæ; & inertia materiæ corporibus essentialis est & quantitati materiæ semper proportionalis. Per divisionem partium fluidi, resistentia quæ oritur a tenacitate & frictione partium, diminui quidem potest: sed quantitas materiæ per divisionem partium ejus non diminuitur; & manente quantitate materiæ, manet ejus vis inertię cui resistentia, de qua hic agitur, semper proportionalis est. Ut hæc resistentia diminuatur, diminui debet quantitas materiæ in spatiis per quæ corpora moventur. Et propterea spatia Cœlestia, per quæ globi Planetarum & Cometarum in omnes partes liberrime & absque omni motus diminutione sensibili perpetuo moventur, fluido omni corporeo destituuntur, si forte vapores longe tenuissimos & trajectos lucis radios excipias.

Projectilia utique motum ciet in fluidis progrediendo, & hic motus oritur ab excessu pressionis fluidi ad projectilis partes anticæ supra pressionem ad ejus partes posticæ, & non minor esse potest in Mediis infinite fluidis quam in Aere, Aqua, & Argento vivo pro densitate materiæ in singulis. Hic autem pressionis excessus, pro quantitate sua, non tantum motum ciet in fluido, sed etiam agit in projectile ad motum ejus retardandum: & propterea resistentia in omni fluido, est motus in fluido a projectili excitatus, nec minor esse potest in Æthere subtilissimo pro densitate Ætheris, quam in Aere, Aqua, & Argento vivo pro densitatibus horum fluidorum.

S E C T I O VIII.


De Motu per Fluida propagato.

PROPOSITIO XLI. THEOREMA XXXII.

Pressio non propagatur per Fluidum secundum lineas rectas, nisi ubi particule Fluidi in directum jacent.

Si jaceant particule a, b, c, d, e in linea recta, potest quidem pressio directe propagari ab a ad e ; at particula e urgebit particulas oblique positas f & g oblique, & particule illæ f & g non sustinebunt pressionem illatam, nisi fulciantur a particulis ulterioribus b & k ; quatenus autem fulciuntur, premunt particulas fulcientes; & hæ non sustinebunt pressionem nisi fulciantur ab ulterioribus l & m easque premant, & sic deinceps in infinitum. Pressio igitur, quam primum propagatur ad particulas quæ non in directum jacent, divaricare incipiet & oblique propagabitur in infinitum; & postquam incipit oblique propagari, si inciderit in particulas posteriores, quæ non in directum jacent, iterum divaricabit; idque toties, quoties in particulas non accurate in directum jacentes inciderit.


Q. E. D.



Corol. Si pressionis, a dato puncto per Fluidum propagatæ, pars aliqua obstaculo intercipiatur; pars reliqua, quæ non intercipitur, divaricabit in spatia pone obstaculum. Id quod sic etiam demonstrari potest. A puncto A propagetur pressio quaquaversum, idque si fieri potest secundum lineas rectas & obstaculo $NBCK$ perforato in BC , intercipiatur ea omnis, præter partem Coniformem APQ , quæ per foramen circulare BC transit. Planis transversis de, fg, hi distinguatur conus APQ in frusta; & interea dum conus ABC , pressionem propagando, urget frustum

T t

DE MOTU **st**um conicum ulterius *defg* in superficie *de*, & hoc frustum
CORPORUM, urget frustum proximum *fgih* in superficie *fg*, & frustum illud
urget frustum tertium, & sic deinceps in infinitum; manifestum
est (per motus Legem tertiam) quod frustum primum *defg*,
reactione frusti secundi *fgih*, tantum urgebitur & premetur in
superficie *fg*, quantum urget & premit frustum illud secundum.
Frustum igitur *degf* inter conum *Ade* & frustum *fbig* com-
primitur utrinque, & propterea (per Corol. 6. Prop. XIX.) figu-
ram suam servare nequit, nisi vi eadem comprimat undique.



Eodem igitur impetu quo premitur in superficiebus *de*, *fg*, cona-
bitur cedere ad latera *af*, *eg*; ibique (cum rigidum non sit, sed
omnimodo Fluidum) excurreret ac dilatabitur, nisi Fluidum ambiens
ad sit, quo conatus iste cohibeatur. Proinde conatu excurrendi,
premet tam Fluidum ambiens ad latera *df*, *eg* quam frustum *fgih*
eodem impetu, & propterea pressio non minus propagabitur a late-
ribus *df*, *eg* in spatia *NO*, *KL* hinc inde, quam propagatur a su-
perficie *fg* versus *P*, *Q*, *E*, *D*.

P R O-

PROPOSITIO XLII. THEOREMA XXXIII.

Motus omnis per Fluidum propagatus divergit a recto tramite in spatia immota.


Cas. 1. Propagetur motus a puncto A per foramen BC pergamque (si fieri potest) in spatio conico $BCQP$ secundum lineas rectas divergentes a puncto C . Et ponamus primo quod motus iste sit undarum in superficie stagnantis aquæ. Sintque de, fg, hi, kl , &c. undarum singularum partes altissimæ, vallibus totidem intermediis ab invicem distinctæ. Igitur quoniam aqua in undarum jugis altior est quam in Fluidi partibus immotis LK, NO , defluet eadem de jugorum terminis e, g, i, l , &c. d, f, h, k , &c. hinc inde, versus KL & NO : & quoniam in undarum vallibus depressior est quam in Fluidi partibus immotis KL, NO ; defluet eadem de partibus illis immotis in undarum valles. Defluxu priore undarum juga, posteriore valles hinc inde dilatantur & propagantur versus KL & NO . Et quoniam motus undarum ab A versus PQ fit per continuum defluxum jugorum in valles proximos, adeoque celerior non est quam pro celeritate descensus; & descensus aquæ, hinc inde, versus KL & NO eadem velocitate peragi debet; propagabitur dilatatio undarum, hinc inde, versus KL & NO , eadem velocitate qua undæ ipsæ ab A versus PQ recta progrediuntur. Proindeque spatium totum hinc inde, versus KL & NO , ab undis dilatatis $rfg, shis, tklt, umnv$, occupabitur. $Q. E. D.$ Hæc ita se habere quilibet in aqua stagnante experiri potest.

Cas. 2. Ponamus jam quod de, fg, hi, kl, mn , designent pulsus a puncto A , per Medium Elasticum, successive propagatos. Pulsus propagari concipe per successivas condensationes & rarefactiones Medii, sic ut pulsus cujusque pars densissima sphericam occupet superficiem circa centrum A descriptam, & inter pulsus successivos æqualia intercedant intervalla. Designent autem lineæ de, fg, hi, kl , &c. densissimas pulsuum partes, per foramen BC propagatas. Et quoniam Medium ibi densius est quam in spatiis hinc inde versus KL & NO , dilatabit sese tam versus spatia illa KL, NO utrinque sita, quam versus pulsuum rariora intervalla;

Tt 2

eoque

DE MOTU eoque pacto rarius semper evadens e regione intervallorum ac den-
CORPORUM, sius e regione pulsuum, participabit eorundem motum. Et quo-
 niam pulsuum progressivus motus oritur a perpetua relaxatione par-
 tium densiorum versus antecedentia intervalla rariora; & pulsus ea-
 dem fere celeritate sese in Medii partes quiescentes *KL*, *NO* hinc
 inde relaxare debent; pulsus illi eadem fere celeritate sese dilatant
 undique in spatia immota *KL*, *NO*, qua propagantur directe a cen-
 tro *A*; adeoque spatium totum *KLON* occupabunt. *Q. E. D.*
 Hoc experimur in Sonis, qui vel monte interposito audiuntur, vel
 in cubiculum per fenestram admissi sese in omnes cubiculi partes di-
 latant, inque angulis omnibus audiuntur, non tam reflexi a parieti-
 bus oppositis, quam a fenestra directe propagati, quantum ex sensu
 judicare licet.



Cas. 3. Ponamus denique quod motus cujuscunque generis pro-
 pagetur ab *A* per foramen *BC*: & quoniam propagatio ista non
 fit, nisi quatenus partes Medii centro *A* propiores urgent commo-
 ventque partes posteriores; & partes quæ urgentur fluidæ sunt, ideo-
 que recedunt quaquaversum in regiones ubi minus premuntur: re-
 cedent

cedent eadem versus Medii partes omnes quiescentes, tam laterales LIBER
 KL & NO , quam anteriores PQ , eoque pacto motus omnis, SECONDO.
 quam primum per foramen BC tranlit, dilatari incipiet & abinde,
 tanquam a principio & centro, in partes omnes directe propagari.
 $Q. E. D.$

PROPOSITIO XLIII. THEOREMA XXXIV.

*Corpus omne tremulum in Medio Elastico propagabit motum
 pulsuum undique in directum, in Medio vero non
 Elastico motum circularem excitabit.*

Cas. 1. Nam partes corporis tremuli vicibus alternis eundo &
 redeundo, itu suo urgebunt & propellent partes Medii sibi proxi-
 mas, & urgendo comprimant easdem & condensabunt, dein re-
 ditu suo sinent partes compressas recedere & sese expandere. Igitur
 partes Medii corpori tremulo proximæ ibunt & redibunt per vices,
 ad instar partium corporis illius tremuli: & qua ratione partes cor-
 poris hujus agitabant hæc Medii partes, hæc similibus tremoribus
 agitæ agitabunt partes sibi proximas, eæque similiter agitæ agi-
 tabunt ultiores, & sic deinceps in infinitum. Et quemadmodum
 Medii partes primæ eundo condensantur & redeundo relaxantur;
 sic partes reliquæ quoties eunt condensabuntur, & quoties redeunt
 sese expandent. Et propterea non omnes ibunt & simul redibunt
 (sic enim determinatas ab invicem distantias servando, non rarefie-
 rent & condensarentur per vices) sed accedendo ad invicem ubi
 condensantur, & recedendo ubi rarefiunt, aliquæ earum ibunt
 dum aliæ redeunt, idque vicibus alternis in infinitum. Partes
 autem euntes & eundo condensatæ, ob motum suum progressivum
 quo feriunt obstacula, sunt pulsus; & propterea pulsus successivi
 a corpore omni tremulo in directum propagabuntur; idque æqua-
 libus circiter ab invicem distantis, ob æqualia temporis intervalla,
 quibus corpus tremoribus suis singulis singulos pulsus excitat. Et
 quamquam corporis tremuli partes eant & redeant secundum pla-
 gam aliquam certam & determinatam, tamen pulsus inde per
 Medium propagati sese dilatabunt ad latera, per Propositionem
 præcedentem; & a corpore illo tremulo tanquam centro communi,
 secundum superficies propemodum sphericas & concentricas,
 undique propagabuntur. Cujus rei exemplum aliquod habemus

DE MOTU
CORPORUM.

in Undis, quæ si digito tremulo excitentur, non solum pergent hinc inde secundum plagam motus digiti, sed, in modum circum concentricorum, digitum statim cingent & undique propagabuntur. Nam gravitas Undarum supplet locum vis Elasticæ.

Cas. 2. Quod si Medium non sit Elasticum: quoniam ejus partes a corporis tremuli partibus vibratis pressæ condensari nequeunt, propagabitur motus in instanti ad partes ubi Medium facillime cedit, hoc est, ad partes quas corpus tremulum alioqui vacuas a tergo relinqueret. Idem est casus cum casu corporis in Medio quocunque projecti. Medium cedendo projectilibus, non recedit in infinitum; sed in circulum eundo, pergit ad spatia quæ corpus relinquit a tergo. Igitur quoties corpus tremulum pergit in partem quamcunque, Medium cedendo perget per circulum ad partes quas corpus relinquit; & quoties corpus regreditur ad locum priorem, Medium inde repelletur & ad locum suum priorem redibit. Et quamvis corpus tremulum non sit firmum, sed modis omnibus flexile, si tamen magnitudine datum maneat, quoniam tremoribus suis nequit Medium ubivis urgere, quin alibi eidem simul cedat; efficiet ut Medium, recedendo a partibus ubi premitur, pergat semper in orbem ad partes quæ eidem cedunt.
Q. E. D.


Corol. Hallucinantur igitur qui credunt agitationem partium Flammæ ad pressionem, per Medium ambiens, secundum lineas rectas propagandam conducere. Debebit ejusmodi pressio non ab agitatione sola partium Flammæ, sed a totius dilatatione derivari.

PROPOSITIO XLIV. THEOREMA XXXV.

Si aqua in Canalis cruribus erectis KL, MN vicibus alternis ascendat & descendat; construatur autem Pendulum cujus longitudo inter punctum suspensionis & centrum oscillationis æquetur semissi longitudinis aquæ in Canali: dico quod aqua ascendet & descendet iisdem temporibus quibus Pendulum oscillatur.

Longitudinem aquæ mensuro secundum axes canalıs & crurum, eandem summæ horum axium æquando; & resistentiam aquæ quæ oritur

oritur ab attritu canalís, hic non confidero. Designent igitur AB , CD mediocrem altitudinem aquæ in crure utroque; & ubi aqua in crure KL ascendit ad altitudinem EF descenderit aqua in crure MN ad altitudinem GH . Sit autem P corpus pendulum, VP filum, V punctum suspensionis, $SPQR$ Cyclois quam Pendulum describat, P ejus punctum infimum, PQ arcus altitudini AE æqualis. Vis, qua motus aquæ alternis vicibus acceleratur



& retardatur, est excessus ponderis aquæ in alterutro crure supra pondus in altero, ideoque, ubi aqua in crure KL ascendit ad EF , & in crure altero descendit ad GH , vis illa est pondus duplicatum aquæ $EABF$, & propterea est ad pondus aquæ totius ut AE seu PQ ad VP seu PR . Vis etiam, qua pondus P in loco quovis Q acceleratur & retardatur in Cycloide, (per Corol. Prop. LI.) est ad ejus pondus totum, ut ejus distantia PQ a loco infimo P , ad Cycloidis longitudinem PR . Quare aquæ & penduli, æqualia spatia AE , PQ describentium, vires motrices sunt ut pondera movenda; ideoque, si aqua & pendulum in principio quiescunt, vires illæ movebunt eadem æqualiter temporibus æqualibus, efficientque ut motu reciproco simul eant & redeant. Q. E. D.

Corol. 1. Igitur aquæ ascendentis & descendentis, five motus intensior sit five remissior, vices omnes sunt Isochronæ.

Corol. 2. Si longitudo aquæ totius in canali sit pedum *Parissensum* $6\frac{1}{2}$; aqua tempore minuti unius secundi descendet, & tempore minuti alterius secundi ascendet; & sic deinceps vicibus alternis in infinitum. Nam pendulum pedum $3\frac{1}{4}$ longitudinis, tempore minuti unius secundi oscillatur.

Corol.

Corol. 3. Aucta autem vel diminuta longitudine aquæ, augetur vel diminuitur tempus reciprocationis in longitudinis ratione subduplicata.

PROPOSITIO XLV. THEOREMA XXXVI.

Undarum velocitas est in subduplicata ratione latitudinum.

Consequitur ex constructione Propositionis sequentis.

PROPOSITIO XLVI. PROBLEMA X.

Invenire velocitatem Undarum.

Constituatur Pendulum cujus longitudo, inter punctum suspensionis & centrum oscillationis, æquetur latitudini Undarum: & quo tempore pendulum illud oscillationes singulas peragit, eodem Undæ progrediendo latitudinem suam propemodum conficient.

Undarum latitudinem voco mensuram transversam, quæ vel vallis imis, vel summis culminibus interjacet. Designet *ABCDEF* superficiem aquæ stagnantis, undis successivis ascendentem ac descendentem; sintque *A, C, E*, &c. undarum culmina, & *B, D, F*, &c. valles intermediæ. Et quoniam motus undarum fit per aquæ successivum ascensum & descensum, sic ut ejus partes *A, C, E*, &c. quæ nunc altissimæ sunt, mox fiant infimæ; & vis motrix, qua partes altissimæ descendunt & infimæ ascendunt, est pondus aquæ elevatae; alternus ille ascensus & descensus analogus erit motui reciproco aquæ in canali, easdemque temporis leges observabit: & propterea (per Prop. *XLIV.*) si distantiae inter undarum loca altissima *A, C, E* & infima *B, D, F* æquantur duplæ penduli longitudini; partes altissimæ *A, C, E*, tempore oscillationis unius evadent infimæ, & tempore oscillationis alterius denuo ascendent. Igitur inter transitum Undarum singularum tempus erit oscillationum duarum; hoc est, Unda describet latitudinem suam, quo tempore pendulum illud bis oscillatur, sed eodem tempore pendulum, cujus longitudo quadrupla est, adeoque æquat undarum latitudinem, oscillabitur semel. *Q. E. I.*

Corol. 1. Igitur Undæ, quæ pedes *Parisenses* $3\frac{1}{2}$ latæ sunt, tempore minuti unius secundi progrediendo latitudinem suam conficient; adeoque tempore minuti unius primi percurrent pedes $183\frac{1}{2}$, & horæ spatio pedes 11000 quamproxime.

Corol. 2.

LIBER
SECUNDUS.

PROP. XLVII. THEOR. XXXVII.



quæ puncta illa motu reciproco singulis vibrationibus eunt & redeunt ; ϵ , ϕ , γ loca quævis intermedia eorundem punctorum ; & EF , FG lineolas Physicas seu Medii partes lineares punctis illis interjectas, & successive translatas in loca $\epsilon\phi$, $\phi\gamma$ & ϵf , fg . Rectæ Ee æqualis ducatur recta PS . Bifecetur eadem in O , centroque O & intervallo OP describatur circulus $SIPi$. Per hujus circumferentiam totam cum partibus suis exponatur tempus totum vibrationis unius cum ipsis partibus proportionalibus ; sic ut completo tempore quovis PH vel $PHSb$, si demittatur ad PS perpendicularum HL vel bl , & capiatur $E\epsilon$ æqualis PL vel Pl , punctum Physicum E , reperietur in

 \dot{V}_y

DE MOTU
CORPORUM,

in ϵ . Hac lege punctum quodvis E , eundo ab E per ϵ ad e , & inde redeundo per ϵ ad E , iisdem accelerationis ac retardationis gradibus vibrationes singulas peraget cum oscillante Pendulo. Probandum est quod singula Medii puncta Physica tali motu agitari debeant. Fingamus igitur Medium tali motu a causa quacunque cieri, & videamus quid inde sequatur.

In circumferentia $PHSb$ capiantur æquales ar-
cus HI , IK vel hi , ik , eam habentes rationem
ad circumferentiam totam quam habent æquales
rectæ EF , FG ad pulsuum intervallum totum
 BC . Et demissis perpendicularis IM , KN vel
 im , kn ; quoniam puncta E , F , G motibus simili-
bus successively agitantur, & vibrationes suas integras
ex itu & reditu compositas interea peragunt dum
pulsus transfertur a B ad C ;
si PH vel $PHSb$ fit tem-
pus ab initio motus puncti E ,
erit PI vel PHS tempus
ab initio motus puncti F , &
 PK vel $PHSk$ tempus ab
initio motus puncti G ; &
propterea $E\varepsilon$, $F\phi$, $G\gamma$ erunt
ipsi PL , PM , PN in itu
punctorum, vel ipsis Pl ,
 Pm , Pn in punctorum reditu, æquales respecti-
ve. Unde $\varepsilon\gamma$ seu $EG+G\gamma-E\varepsilon$ in itu puncto-
rum æqualis erit $EG-LN$, in reditu autem
æqualis $EG+ln$. Sed $\varepsilon\gamma$ latitudo est seu expansio
partis Medii EG in loco $\varepsilon\gamma$; & propterea expan-
sio partis illius in itu, est ad ejus expansionem
mediocrem, ut $EG-LN$ ad EG ; in reditu au-
tem ut $EG+ln$ seu $EG+LN$ ad EG . Quare
cum sit LN ad KH ut IM ad radium OP , &
 KH ad EG ut circumferentia $PHSbP$ ad
 BC , id est (si ponatur V pro radio circuli
circumferentiam habentis æqualem intervallo pul-
suum BC) ut OP ad V ; & ex æquo LN
ad EG , ut IM ad V : erit expansio partis
 EG punctive Physici F in loco $\varepsilon\gamma$, ad ex-
pansionem



panfionem mediocrem quam pars illa habet in loco suo primo EG , ut $V - IM$ ad V in itu, utque $V + im$ ad V in reditu. Unde vis elastica puncti F in loco $\epsilon\gamma$, est ad vim ejus elasticam me-

diocrem in loco EG , ut $\frac{I}{V - IM}$ ad $\frac{I}{V}$ in itu, in reditu vero ut

$\frac{I}{V + im}$ ad $\frac{I}{V}$. Et eodem argumento vires elasticæ punctorum

Physicorum E & G in itu, sunt ut $\frac{I}{V - HL}$ & $\frac{I}{V - KN}$ ad

$\frac{I}{V}$; & virium differentia ad Medii vim elasticam mediocrem, ut

$\frac{HL - KN}{VV - V \times HL - V \times KN + HL \times KN}$ ad $\frac{I}{V}$. Hoc est, ut $\frac{HL - KN}{VV}$ ad $\frac{I}{V}$, five ut $HL - KN$ ad V , si modo (ob angustos

limites vibrationum) supponamus HL & KN indefinite minores esse quantitate V . Quare cum quantitas V detur, differentia virium est ut $HL - KN$, hoc est (ob proportionales $HL - KN$ ad HK , & OM ad OI vel OP , datasque HK & OP) ut OM ; id est, si Ff bifecetur in Ω , ut $\Omega\phi$. Et eodem argumento differentia virium elasticarum punctorum Physicorum ϵ & γ , in reditu lineolæ Physicæ $\epsilon\gamma$ est ut $\Omega\phi$. Sed differentia illa (id est, excessus vis elasticæ puncti ϵ supra vim elasticam puncti γ ,) est vis qua interjecta Medii lineola Physica $\epsilon\gamma$ acceleratur; & propterea vis acceleratrix lineolæ Physicæ $\epsilon\gamma$, est ut ipsius distantia a medio vibrationis loco Ω . Proinde tempus (per Prop. xxxviii. Lib. i.) recte exponitur per arcum PI ; & Medii pars linearis $\epsilon\gamma$ lege præscripta movetur, id est, lege oscillantis Penduli: estque par ratio partium omnium linearium ex quibus Medium totum componitur. *Q. E. D.*

Corol. Hinc patet quod numerus pulsuum propagatorum idem sit cum numero vibrationum corporis tremuli, neque multiplicatur in eorum progressu. Nam lineola Physica $\epsilon\gamma$, quamprimum ad locum suum primum redierit, quiescet; neque deinceps movebitur, nisi vel ab impetu corporis tremuli, vel ab impetu pulsuum qui a corpore tremulo propagantur, motu novo cieatur. Quiescet igitur quamprimum pulsus a corpore tremulo propagari desinunt.

PROPOSITIO XLVIII. THEOREMA XXXVIII.

Pulsuum in Fluido Elastico propagatorum velocitates, sunt in ratione composita ex subduplicata ratione vis Elasticæ directe & subduplicata ratione densitatis inverse; si modo Fluidi vis Elastica ejusdem condensationi proportionalis esse supponatur.

Cas. 1. Si Media sint homogenea, & pulsuum distantiae in his Mediis æquantur inter se, sed motus in uno Medio intensior sit: contractiones & dilatationes partium analogarum erunt ut iidem motus. Accurata quidem non est hæc proportio. Verum tamen nisi contractiones & dilatationes sint valde intensæ, non errabit sensibilibiter, ideoque pro Physice accurata haberi potest. Sunt autem vires Elasticæ motrices ut contractiones & dilatationes; & velocitates partium æqualium simul genitæ sunt ut vires. Ideoque æquales & correspondentes pulsuum correspondentium partes, itus & reditus suos per spatia contractionibus & dilatationibus proportionalia, cum velocitatibus quæ sunt ut spatia, simul peragent: & propterea pulsus, qui tempore itus & reditus unius latitudinem suam progrediendo conficiunt, & in loca pulsuum proxime præcedentium semper succedunt, ob æqualitatem distantiarum, æquali cum velocitate in Medio utroque progredientur.

Cas. 2. Sin pulsuum distantiae seu longitudines sint majores in uno Medio quam in altero; ponamus quod partes correspondentes spatia latitudinibus pulsuum proportionalia singulis vicibus eundo & redeundo describant: & æquales erunt earum contractiones & dilatationes. Ideoque si Media sint homogenea, æquales erunt etiam vires illæ Elasticæ motrices quibus reciproco motu agitantur. Materia autem his viribus movenda, est ut pulsuum latitudo; & in eadem ratione est spatium per quod singulis vicibus eundo & redeundo moveri debent. Estque tempus itus & reditus unius in ratione composita ex ratione subduplicata materiæ & ratione subduplicata spatii, atque adeo ut spatium. Pulsus autem temporibus itus & reditus unius eundo latitudines suas conficiunt, hoc est, spatia temporibus proportionalia percurrunt; & propterea sunt æquiveloces.

Cas. 3. In Mediis igitur densitate & vi Elastica paribus, pulsus omnes sunt æquiveloces. Quod si Medii vel densitas vel vis Elastica intendatur, quoniam vis motrix in ratione vis Elasticæ, & materia movenda in ratione densitatis augetur; tempus quo motus

tus

tus iidem peragantur ac prius, augebitur in subduplicata ratione densitatis, ac diminuetur in subduplicata ratione vis Elasticæ. Et propterea velocitas pulsum erit in ratione composita ex ratione subduplicata densitatis Medii inverse & ratione subduplicata vis Elasticæ directe. *Q. E. D.*

Hæc Propositio ulterius patebit ex constructione sequentis.

PROPOSITIO XLIX. PROBLEMA XI.

Datis Medii densitate & vi Elasticæ, invenire velocitatem pulsum.

Fingamus Medium ab incumbente pondere, pro more Aeris nostri comprimi; sitque A altitudo Medii homogenei, cuius pondus adæquet pondus incumbens, & cuius densitas eadem sit cum densitate Medii compressi, in quo pulsus propagantur. Constitui autem intelligatur Pendulum, cuius longitudo inter punctum suspensionis & centrum oscillationis sit A: & quo tempore Pendulum illud oscillationem integram ex itu & reditu compositam peragit, eodem pulsus eundo conficiet spatium circumferentiæ circuli radio A descripti æquale.

Nam stantibus quæ in Propositione XLVII constructa sunt, si linea quævis Physica EF, singulis vibrationibus describendo spatium PS, urgeatur in extremis itus & reditus cuiusque locis P & S, a vi Elasticæ quæ ipsius ponderi æquetur; peraget hæc vibrationes singulas quo tempore eadem in Cycloide, cuius perimeter tota longitudini PS æqualis est, oscillari posset: id adeo quia vires æquales æqualia corpuscula per æqualia spatia simul impellent. Quare cum oscillationum tempora sint in subduplicata ratione longitudinis Pendulorum, & longitudo Penduli æquetur dimidio arcui Cycloidis totius; foret tempus vibrationis unius ad tempus oscillationis Penduli cuius longitudo est A, in subduplicata ratione longitudinis PS seu PO ad longitudinem A. Sed vis Elasticæ qua lineola Physica EG, in locis suis extremis P, S existens, urgetur, erat (in demonstratione Propositionis XLVII.) ad ejus vim totam Elasticam ut HL—KN ad V, hoc est (cum punctum K jam incidat in P) ut HK ad V: & vis illa tota, hoc est pondus incumbens, quo lineola EG comprimitur, est ad pondus lineolæ ut ponderis incumbentis altitudo A ad lineolæ longitudinem EG; adeoque ex æquo, vis qua lineola EG in locis suis P & S urgetur, est ad lineolæ illius pondus ut HK×A ad V×EG, sive ut PO×A ad VV, nam HK erat ad EG ut PO ad V. Quare cum tem-

DE MOTU
CORPORUM,

pora, quibus æqualia corpora per æqualia spatia impelluntur, sint reciproce in subduplicata ratione virium, erit tempus vibrationis unius urgente vi illa Elastica, ad tempus vibrationis urgente vi ponderis, in subduplicata ratione VV ad $PO \times A$, atque adeo ad tempus oscillationis Penduli cujus longitudo est A , in subduplicata ratione VV ad $PO \times A$, & subduplicata ratione PO ad A conjunctim: id est, in ratione integra V ad A . Sed tempore vibrationis unius ex itu & reditu compositæ, pulsus progrediendo conficit latitudinem suam BC . Ergo tempus quo pulsus percurrit spatium BC , est ad tempus oscillationis unius ex itu & reditu compositæ, ut V ad A , id est, ut BC ad circumferentiam circuli cujus radius est A . Tempus autem, quo pulsus percurrit spatium BC , est ad tempus quo percurrit longitudinem huic circumferentiæ æqualem, in eadem ratione; ideoque tempore talis oscillationis pulsus percurrit longitudinem huic circumferentiæ æqualem. *Q. E. D.*

Corol. 1. Velocitas pulsum ea est quam acquirunt Gravia, æqualiter accelerato motu cadendo, & casu suo describendo dimidium altitudinis A . Nam tempore casus hujus, cum velocitate cadendo acquisita, pulsus percurrit spatium quod erit æquale toti altitudini A , adeoque tempore oscillationis unius ex itu & reditu compositæ, percurrit spatium æquale circumferentiæ circuli radio A descripti: est enim tempus casus ad tempus oscillationis ut radius circuli ad ejusdem circumferentiam.

Corol. 2. Unde cum altitudo illa A sit ut Fluidi vis Elastica directe & densitas ejusdem inverse; velocitas pulsum erit in ratione composita ex subduplicata ratione densitatis inverse & subduplicata ratione vis Elastice directe.

PROPOSITIO L. PROBLEMA XII.

Invenire pulsum distantias.

Corporis, cujus tremore pulsus excitantur, inveniatur numerus Vibrationum dato tempore. Per numerum illum dividatur spatium quod pulsus eodem tempore percurrere possit, & pars inventa erit pulsus unius latitudo. *Q. E. I.*

Scholium.

Speciant propositiones novissimæ ad motum Lucis & Sonorum. Lux enim cum propagetur secundum lineas rectas, in actione sola
(per

(per Prop. XLI. & XLII.) consistere nequit. Soni vero propterea quod a corporibus tremulis oriantur, nihil aliud sunt quam aeris pulsus propagati, per Prop. XLIII. Confirmatur id ex tremoribus quos excitant in corporibus objectis, si modo vehementes sint & graves, quales sunt soni Tympanorum. Nam tremores celeriores & breviores difficilius excitantur. Sed & sonos quosvis, in chor- das corporibus sonoris unisonas impactos, excitare tremores notis- simum est. Confirmatur etiam ex velocitate sonorum. Nam cum pondera specifica Aquæ pluvialis & Argenti vivi sint ad invicem ut 1 ad $13\frac{1}{2}$ circiter, & ubi Mercurius in *Barometro* altitudinem at- tingit digitorum *Anglicorum* 30, pondus specificum Aeris & aquæ pluvialis sint ad invicem ut 1 ad 870 circiter: erunt pondera speci- fica aeris & argenti vivi ut 1 ad 11890. Proinde cum altitudo ar- genti vivi sit 30 digitorum, altitudo aeris uniformis cuius pondus aerem nostrum subiectum comprimere posset, erit 356700 digito- rum, seu pedum *Anglicorum* 29725. Estque hæc altitudo illa ipsa quam in constructione superioris Problematis nominavimus A. Cir- culi radio 29725 pedum descripti circumferentia est pedum 186768. Et cum Pendulum digitos $39\frac{1}{2}$ longum, oscillationem ex itu & re- ditu compositam, tempore minutorum duorum secundorum, uti notum est, absolvat; Pendulum pedes 29725, seu digitos 356700 longum, oscillationem consimilem tempore minutorum secundo- rum $190\frac{1}{2}$ absolvere debet. Eo igitur tempore sonus progrediendo conficiet pedes 186768, adeoque tempore minuti unius secundi pe- des 979.

Cæterum in hoc compute nulla habetur ratio crassitudinis soli- darum particularum aeris per quam sonus utique propagatur in in- stanti. Cum pondus aeris sit ad pondus aquæ ut 1 ad 870, & sa- les sint fere duplo densiores quam aqua; si particulæ aeris ponan- tur esse ejusdem circiter densitatis cum particulis vel aquæ vel sa- lium, & raritas aeris oriatur ab intervallis particularum: diameter particulæ aeris erit ad intervallum inter centra particularum, ut 1 ad 9 vel 10 circiter, & ad intervallum inter particulas ut 1 ad 8 vel 9. Proinde ad pedes 979 quos sonus tempore minuti unius secundi juxta calculum superiorem conficiet, addere licet pe- des $\frac{279}{9}$ seu 109 circiter, ob crassitudinem particularum aeris: & sic sonus tempore minuti unius secundi conficiet pedes 1088 circi- ter.

His adde quod vapores in aere latentes, cum sint alterius ela- teris & alterius toni, vix aut ne vix quidem participant motum aeris veri quo soni propagantur. His autem quiescentibus, mo-

DE MOTU
CORPORUM,

tus ille celerius propagabitur per solum aerem verum ; idque in subduplicata ratione minoris materiæ. Ut si Atmosphæra constet ex decem partibus aeris veri & una parte vaporum , motus sonorum celerior erit in subduplicata ratione 11 ad 10 , vel in integra circiter ratione 21 ad 20, quam si propagaretur per undecim partes aeris veri: ideoque motus sonorum supra inventus, augendus erit in hac ratione. Quo pacto sonus , tempore minuti unius secundi , conficiet pedes 1142.

Hæc ita se habere debent tempore verno & autumnali , ubi aer per calorem temperatum rarefcit & ejus vis elastica nonnihil intenditur. At hyberno tempore , ubi aer per frigus condensatur , & ejus vis elastica remittitur, motus sonorum tardior esse debet in subduplicata ratione densitatis ; & vicissim æstivo tempore debet esse velocior.

Constat autem per experimenta quod soni tempore minuti unius secundi eundo, conficiunt pedes *Londinenses* plus minus 1142 , *Parisenses* vero 1070.

Cognita sonorum velocitate innotescunt etiam intervalla pulsuum. Invenit utique *D. Sauveur* (factis a se experimentis) quod fistula aperta, cujus longitudo est pedum *Parisensium* plus minus quinque, sonum edit ejusdem toni cum sono chordæ quæ tempore minuti unius secundi centies recurrit. Sunt igitur pulsus plus minus centum in spatio pedum *Parisensium* 1070 , quos sonus tempore minuti unius secundi percurrit ; adeoque pulsus unus occupat spatium pedum *Parisensium* quasi $10\frac{7}{10}$, id est, duplam circiter longitudinem fistulæ. Unde verisimile est quod latitudines pulsuum, in omnium apertarum fistularum sonis , æquantur duplis longitudinibus fistularum.

Porro cur soni cessante motu corporis sonori statim cessant, neque diutius audiuntur ubi longissime distamus a corporibus sonoris, quam cum proxime absumus, patet ex Corollario Propositionis XLVII Libri hujus. Sed & cur soni in Tubis stenterophonicis valde augentur, ex allatis principiis manifestum est. Motus enim omnis reciprocus singulis recurribus a causa generante augeri solet. Motus autem in Tubis dilatationem sonorum impredientibus, tardius mittitur & fortius recurrit, & propterea a motu novo singulis recurribus impresso, magis augetur. Et hæc sunt præcipua Phænomena Sonorum.

SECTIO

S E C T I O IX.

De Motu Circulari Fluidorum.


HYPOTHESIS.

Resistentiam, quæ oritur ex defectu lubricitatis partium Fluidi, cæteris paribus, proportionalem esse velocitati, qua partes Fluidi separantur ab invicem.

PROPOSITIO LI. THEOREMA XXXIX.

Si Cylindrus solidus infinite longus in Fluido uniformi & infinito circa axem positione datum uniformi cum motu revolvatur, & ab hujus impulsu solo agatur Fluidum in orbem, perseveret autem Fluidi pars unaquæque uniformiter in motu suo; dico quod tempora periodica partium Fluidi sunt ut ipsarum distantie ab axe Cylindri.


Sit *AFL* Cylindrus uniformiter circa axem *S* in orbem actus, & circulis concentricis *BGM*, *CHN*, *DIO*, *EKP*, &c. distinguatur Fluidum in Orbes Cylindricos innumeros concentricos solidos ejusdem crassitudinis. Et quoniam homogeneum est Fluidum, impressiones contiguorum Orbium in se mutuo factæ, erunt (per Hypothesin) ut eorum translationes ab invicem & superficies contiguæ in quibus impressiones sunt. Si impressio in Orbem aliquem major est vel



minor ex parte concava quam ex parte
X x

DE MOTU
CORPORUM,

parte convexa ; prævalebit impressio fortior , & motum Orbis vel accelerabit vel retardabit , prout in eandem regionem cum ipsius motu vel in contrariam dirigitur. Proinde ut Orbis unusquisque in motu suo uniformiter perseveret , debent impressiones ex parte utraque sibi invicem æquari , & fieri in regiones contrarias. Unde cum impressiones sunt ut contiguæ superficies & harum translationes ab invicem , erunt translationes inverse ut superficies , hoc est , inverse ut superficierum distantia ab axe. Sunt autem differentia motuum angularium circa axem ut hæ translationes applicatæ ad distantias , sive ut translationes directæ & distantia inverse ; hoc est (conjunctis rationibus) ut quadrata distantiarum inverse. Quare si ad infinita recta $SABCDE$ partes singulas erigantur perpendiculara Aa , Bb , Cc , Dd , Ee , &c. ipsarum SA , SB , SC , SD , SE , &c. quadratis reciproce proportionalia , & per terminos perpendicularium duci intelligatur linea curva Hyperbolica ; erunt summæ differentiarum , hoc est , motus totius angulares , ut respondentes summæ linearum Aa , Bb , Cc , Dd , Ee : id est , si ad constituendum Medium uniformiter fluidum , Orbium numerus augeatur & latitudo minuatur in infinitum , ut area Hyperbolica his summis analogæ Aa , Bb , Cc , Dd , Ee , &c. Et tempora motibus angularibus reciproce proportionalia , erunt etiam his areis reciproce proportionalia. Est igitur tempus periodicum particulæ cujusvis D reciproce ut area Dd , hoc est , (per notas Curvarum quadraturas) directæ ut distantia SD . Q . E . D .



Corol. 1. Hinc motus angulares particularum fluidi sunt reciproce ut ipsarum distantia ab axe cylindri , & velocitates absolutæ sunt æquales.

Corol. 2. Si fluidum in vase cylindrico longitudinis infinitæ contineatur , & cylindrum alium interiorem contineat , revolvatur autem cylindrus uterque circa axem communem , sintque revolutionum

tionum tempora ut ipsorum femidiametri, & perseveret fluidi pars unaquæque in motu suo; erunt partium singularum tempora periodica ut ipsarum distantiae ab axe cylindrorum.

Corol. 3. Si cylindro & fluido ad hunc modum motis addatur vel auferatur communis quilibet motus angularis; quoniam hoc novo motu non mutatur attritus mutuus partium fluidi, non mutabuntur motus partium inter se. Nam translationes partium ab invicem pendunt ab attritu. Pars quælibet in eo perseverabit motu, qui, attritu utrinque in contrarias partes facto, non magis acceleratur quam retardatur.

Corol. 4. Unde si toti cylindrorum & fluidi Systemati auferatur motus omnis angularis cylindri exterioris, habebitur motus fluidi in cylindro quiescente.

Corol. 5. Igitur si fluido & cylindro exteriore quiescentibus, revolvatur cylindrus interior uniformiter; communicabitur motus circularis fluido, & paulatim per totum fluidum propagabitur; nec prius desinet augeri quam fluidi partes singulae motum Corollario quarto definitum acquirant.

Corol. 6. Et quoniam fluidum conatur motum suum adhuc latius propagare, hujus impetu circumagetur etiam cylindrus exterior nisi violenter detentus; & accelerabitur ejus motus quoad usque tempora periodica cylindri utriusque æquentur inter se. Quod si cylindrus exterior violenter detineatur, conabitur is motum fluidi retardare; & nisi cylindrus interior vi aliqua extrinsecus impressa motum illum conservet, efficiet ut idem paulatim cesset.

Quæ omnia in Aqua profunda stagnante experiri licet.

PROPOSITIO LII. THEOREMA XL.

Si Sphæra solida, in Fluido uniformi & infinito, circa axem positione datum uniformi cum motu revolvatur, & ab hujus impulsu solo agatur Fluidum in orbem; perseveret autem Fluidi pars unaquæque uniformiter in motu suo; dico quod tempora periodica partium Fluidi erunt ut quadrata distantiarum à centro Sphære.

Cas. 1. Sit *AFL* Sphæra uniformiter circa axem *S* in orbem acta, & circulis concentricis *BGM*, *CHN*, *DIO*, *EKP*, &c.

XX 2

distin.

DE MOTU CORPORUM, distinguatur Fluidum in Orbes innumeros concentricos ejusdem crassitudinis. Finge autem Orbes illos esse solidos; & quoniam homogeneum est Fluidum, impressiones contiguum Orbium in se mutuo factæ, erunt (per Hypothefin) ut eorum translationes ab invicem & superficies contiguæ in quibus impressiones fiunt. Si impressio in Orbem aliquem major est vel minor ex parte concava quam ex parte convexa; prævalebit impressio fortior, & velocitatem Orbis vel accelerabit vel retardabit, prout in eandem regionem cum ipsius motu vel in contrariam dirigitur. Proinde ut Orbis unusquisque in motu suo perseveret uniformiter, debent impressiones ex parte utraque sibi invicem æquari, & fieri in regiones contrarias. Unde cum impressiones sint ut contiguæ superficies & harum translationes ab invicem; erunt translationes inverse ut superficies, hoc est, inverse ut quadrata distantiarum superficierum a centro. Sunt autem differentię motuum angularium circa axem ut hæ translationes applicatæ ad distantias, sive ut translationes directæ & distantię inverse; hoc est (conjunctis rationibus) ut cubi distantiarum inverse. Quare si ad rectæ infinitæ $SAB CDEQ$, partes singulas erigantur perpendiculara Aa, Bb, Cc, Dd, Ee , &c. ipsarum SA, SB, SC, SD, SE , &c. cubis reciproce proportionalia, erunt summæ differentiarum, hoc est, motus toti angulares, ut respondentes summæ linearum Aa, Bb, Cc, Dd, Ee : id est (si ad constituendum Medium uniformiter fluidum, numerus Orbium augeatur & latitudo minuatur in infinitum) ut area Hyperbolicæ his summis analogæ AaQ, BbQ, CcQ, DdQ, EeQ , &c. Et tempora periodica motibus angularibus reciproce proportionalia, erunt etiam his areis reciproce proportionalia. Est igitur tempus periodicum Orbis cujusvis DIO reciproce ut area DdQ , hoc est, (per notas Curvarum quadraturas) directe ut quadratum distantię SD . Id quod volui primo demonstrare.

Cas. 2. A centro Sphæræ ducantur infinitæ rectæ quam plurimæ, quæ cum axe datos contineant angulos, æqualibus differentiis se mutuo superantes, & his rectis circa axem revolutis concipe Orbes in annulos innumeros secari; & annulus unusquisque habebit annulos quatuor sibi contiguos, unum interiorem, alterum exteriorem & duos laterales. Attritu interioris & exterioris non potest annulus unusquisque, nisi in motu juxta legem casus primi facti, æqualiter & in partes contrarias urgeri. Patet hoc ex demonstratione casus primi. Et propterea annulorum series quolibet a Globo

Globo in infinitum recta pergens, movebitur pro lege casus primi, nisi quatenus impeditur ab attritu annulorum ad latera. At in motu hac lege facto, attritus annulorum ad latera nullus est; neque adeo motum, quo minus hac lege fiat, impedit. Si annuli, qui a centro æqualiter distant, vel citius revolverentur vel tardius juxta polos quam juxta æquatorem; tardiores accelerarentur, & velociores retardarentur ab attritu mutuo, & sic vergerent semper tempora periodica ad æqualitatem, pro lege casus primi. Non impedit igitur hic attritus quo minus motus fiat secundum legem casus primi, & propterea lex illa obtinebit: hoc est, annulorum singulorum tempora periodica erunt ut quadrata distantiarum ipsorum a centro Globi. Quod volui secundo demonstrare.

Cas. 3. Dividatur jam annulus unusquisque sectionibus transversis in particulas innumeras constituentes substantiam absolute & uniformiter fluidam, & quoniam hæ sectiones non spectant ad legem motus circularis, sed ad constitutionem Fluidi solummodo conducent, perseverabit motus circularis ut prius. His sectionibus annuli omnes quam minimi asperitatem & vim attritus mutui aut non mutabunt aut mutabunt æqualiter. Et manente causarum proportionem manebit effectuum proportio, hoc est, proportio motuum & periodicorum temporum. *Q. E. D.* Caterum cum motus circularis, & abinde orta vis centrifuga, major sit ad Eclipticam quam ad Polos; debet causa aliqua adesse qua particulæ singulæ in circulis suis retineantur; ne materia quæ ad Eclipticam est, recedat semper a centro & per exteriora Vorticis imigret ad Polos, indeque per axem ad Eclipticam circulatione perpetua revertatur.

Corol. 1. Hinc motus angulares partium fluidi circa axem globi, sunt reciproce ut quadrata distantiarum a centro globi, & velocitates absolutæ reciproce ut eadem quadrata applicata ad distantias ab axe.

Corol. 2. Si globus in fluido quiescente similari & infinito circa axem positione datum uniformi cum motu revolvatur, communicabitur motus fluido in morem Vorticis, & motus iste paulatim propagabitur in infinitum; neque prius cessabit in singulis fluidi partibus accelerari, quam tempora periodica singularum partium sint ut quadrata distantiarum a centro globi.

Corol. 3. Quoniam Vorticis partes interiores ob majorem suam velocitatem atterunt & urgent exteriores, motumque ipsis ea actio-

DE MOTU
CORPORUM.

ne perpetuo communicant, & exteriores illi eandem motus quantitatem in alios adhuc exteriores simul transferunt, eaque actione servant quantitatem motus sui plane invariata; patet quod motus perpetuo transfertur a centro ad circumferentiam Vorticis, & per infinitatem circumferentiæ absorbetur. Materia inter sphaericas duas quasvis superficies Vortici concentricas nunquam accelerabitur, eo quod motum omnem a materia interiore acceptum transfert semper in exteriorem.

Corol. 4. Proinde ad conservationem Vorticis constanter in eodem movendi statu, requiritur principium aliquod activum, a quo globus eandem semper quantitatem motus accipiat, quam imprimit in materiam Vorticis. Absque tali principio necesse est ut globus & Vorticis partes interiores, propagantes semper motum suum in exteriores, neque novum aliquem motum recipientes, tardescant paulatim & in orbem agi desinant.

Corol. 5. Si globus alter huic Vortici ad certam ab ipsius centro distantiam innataret, & interea circa axem inclinatione datum vi aliqua constanter revolveretur; hujus motu raperetur fluidum in Vorticem; & primo revolveretur hic Vortex novus & exiguus una cum globo circa centrum alterius, & interea latius serperet ipsius motus, & paulatim propagaretur in infinitum, ad modum Vorticis primi. Et eadem ratione qua hujus globus raperetur motu Vorticis alterius, raperetur etiam globus alterius motu hujus, sic ut globi duo circa intermedium aliquod punctum revolverentur, sedque mutuo ob motum illum circularem fugerent, nisi per vim aliquam cohibiti. Postea si vires constanter impressæ, quibus globi in motibus suis perseverant, cessarent, & omnia legibus Mechanicis permitterentur, languesceret paulatim motus globorum (ob rationem in Corol. 3. & 4. assignatam) & Vortices tandem conquiescerent.

Corol. 9. Si globi plures datis in locis circum axes positione datos certis cum velocitatibus constanter revolverentur, fierent Vortices totidem in infinitum pergentes. Nam globi singuli, eadem ratione qua unus aliquis motum suum propagat in infinitum, propagabunt etiam motus suos in infinitum, adeo ut fluidi infiniti pars unaquæque eo agitetur motu qui ex omnium globorum actionibus resultat. Unde Vortices non desinientur certis limitibus, sed in se mutuo paulatim excurrent; globique per actiones Vorticum in se mutuo, perpetuo movebuntur de locis suis, uti in Corollario superiore expositum est; neque certam quamvis inter se positionem

positionem servabunt, nisi per vim aliquam retenti. Cessantibus autem viribus illis quæ in globos constanter impressæ conservant hosce motus, materia ob rationem in Corollario tertio & quarto assignatam, paulatim requiescet & in Vortices agi desinet.

Corol. 7. Si fluidum simile claudatur in vase sphaerico, ac globi in centro consistentis uniformi rotatione agatur in Vorticem, globus autem & vas in eandem partem circa axem eundem revolvantur, sintque eorum tempora periodica ut quadrata semidiametrorum: partes fluidi non prius perseverabunt in motibus suis sine acceleratione & retardatione, quam sint eorum tempora periodica ut quadrata distantiarum a centro Vorticis. Alia nulla Vorticis constitutio potest esse permanens.

Corol. 8. Si vas, fluidum inclusum & globus servant hunc motum, & motu præterea communi angulari circa axem quemvis datum revolvantur; quoniam hoc motu novo non mutatur attritus partium fluidi in se invicem, non mutabuntur motus partium inter se. Nam translationes partium inter se pendent ab attritu. Pars quælibet in eo perseverabit motu, quo fit ut attritu ex uno latere non magis tardetur quam acceleretur attritu ex altero.

Corol. 9. Unde si vas quiescat ac detur motus globi, dabitur motus fluidi. Nam concipe planum transire per axem globi & motu contrario revolvi; & pone summam temporis revolutionis hujus & revolutionis globi esse ad tempus revolutionis globi, ut quadratum semidiametri vasis ad quadratum semidiametri globi: & tempora periodica partium fluidi respectu plani hujus, erunt ut quadrata distantiarum suarum a centro globi.

Corol. 10. Proinde si vas vel circa axem eundem cum globo, vel circa diversum aliquem, data cum velocitate quacunque moveatur, dabitur motus fluidi. Nam si Systemati toti auferatur vasis motus angularis, manebunt motus omnes iidem inter se qui prius, per Corol. 8. Et motus isti per Corol. 9. dabuntur.

Corol. 11. Si vas & fluidum quiescant & globus uniformi cum motu revolvatur, propagabitur motus paulatim per fluidum totum in vas, & circumagetur vas nisi violenter detentum, neque prius desinent fluidum & vas accelerari, quam sint eorum tempora periodica æqualia temporibus periodicis globi. Quod si vas vi aliqua detineatur vel revolvatur motu quovis constanti & uniformi, deveniet Medium paulatim ad statum motus in Corollariis 8. 9. & 10. definiti, nec in alio unquam statu quocunque perseverabit. Deinde vero si, viribus illis cessantibus quibus vas & globus certis motibus

DE MOTU
CORPORUM,

motibus revolvebantur, permittatur Systema totum Legibus Mechanicis; vas & globus in se invicem agent mediante fluido, neque motus suos in se mutuo per fluidum propagare prius cessabunt, quam eorum tempora periodica æquentur inter se, & Systema totum ad instar corporis unius solidi simul revolvatur.

Scholium.

In his omnibus suppono fluidum ex materia quoad densitatem & fluiditatem uniformi constare. Tale est in quo globus idem eodem cum motu, in eodem temporis intervallo, motus similes & æquales, ad æquales semper a se distantias, ubivis in fluido constitutis, propagare possit. Conatur quidem materia per motum suum circularem recedere ab axe Vorticis, & propterea premit materiam omnem ulteriorem. Ex hac pressione fit attritus partium fortior & separatio ab invicem difficilior; & per consequens diminuitur materiæ fluiditas. Rursus si partes fluidi sunt alicubi crassiores seu majores, fluiditas ibi minor erit, ob pauciores superficies in quibus partes separantur ab invicem. In hujusmodi casibus deficientem fluiditatem vel lubricitatem partium vel lentorem aliave aliqua conditione restitui suppono. Hoc nisi fiat, materia ubi minus fluida est magis cohærebit & segnior erit, adeoque motum tardius recipiet, & longius propagabit quam pro ratione superius assignata. Si figura vasis non sit Sphærica, movebuntur particulae in lineis non circularibus sed conformibus eidem vasis figuræ, & tempora periodica erunt ut quadrata mediocrium distantiarum a centro quamproxime. In partibus inter centrum & circumferentiam, ubi latiora sunt spatia, tardiores erunt motus, ubi angustiora velociores, neque tamen particulae velociores petent circumferentiam. Arcus enim describent minus curvos, & conatus recedendi a centro non minus diminuatur per decrementum hujus curvaturæ, quam augebitur per incrementum velocitatis. Pergendo a spatiis angustioribus in latiora recedent paulo longius a centro, sed isto recessu tardescunt, & accedendo postea de latioribus ad angustiora accelerabuntur; & sic per vices tardescunt & accelerabuntur particulae singulae in perpetuum. Hæc ita se habebunt in vase rigido. Nam in fluido infinito constitutio Vorticum innotescit per Propositionis hujus Corollarium sextum.

Proprietates autem Vorticum hac Propositione investigare conatus sum, ut pertentarem siqua ratione Phænomena cœlestia per Vorti-

Vortices explicari possint. Nam Phænomenon est, quod Planetarum circa Jovem revolvendum tempora periodica sunt in ratione sesquuplicata distantiarum a centro Jovis; & eadem Regula obtinet in Planetis qui circa Solem revolvuntur. Obtenent autem hæ Regulæ in Planetis utrisque quam accuratissime, quatenus observationes Astronomicæ hæcenus prodidere. Ideoque si Planetæ illi a Vorticibus circa Jovem & Solem revolventibus deferantur, debent etiam hi Vortices eadem lege revolvî. Verum tempora periodica partium Vorticis prodierunt in ratione duplicata distantiarum a centro motus; neque potest ratio illa diminui & ad rationem sesquiplicatam reduci, nisi vel materia Vorticis eo fluidior sit quo longius distat a centro, vel resistentia, quæ oritur ex defectu lubricitatis partium fluidi, ex aucta velocitate qua partes fluidi separantur ab invicem, augeatur in majori ratione quam ea est in qua velocitas augetur. Quorum tamen neutrum rationi consentaneum videtur. Partes crassiores & minus fluidæ (nisi graves sint in centrum) circumferentiam petent; & verisimile est quod, etiamsi Demonstrationum gratia Hypothesin talem initio Sectionis hujus proposuerim ut Resistentia velocitati proportionalis esset, tamen Resistentia in minori sit ratione quam ea velocitatis est. Quo concesso, tempora periodica partium Vorticis erunt in majori quam duplicata ratione distantiarum ab ipsius centro. Quod si Vortices (uti aliquorum est opinio) celerius moveantur prope centrum, dein tardius usque ad certum limitem, tum denuo celerius juxta circumferentiam; certe nec ratio sesquuplicata neque alia quævis certa ac determinata obtinere potest. Viderint itaque Philosophi quo pacto Phænomenon illud rationis sesquiplicatæ per Vortices explicari possit.

PROPOSITIO LIII. THEOREMA XLI.

Corpora quæ in Vortice delata in orbem redeunt, ejusdem sunt densitatis cum Vortice, & eadem lege cum ipsius partibus (quoad velocitatem & cursus determinationem) moventur.

Nam si Vorticis pars aliqua exigua, cujus particulæ seu puncta physica datum servant situm inter se, congelari supponatur: hæc, quoniam neque quoad densitatem suam, neque quoad vim insitam aut figuram suam mutatur, movebitur eadem lege ac prius: &

Y y

contra,

DE MOTU
CORPORUM,

contra, si Vorticis pars congelata & solida ejusdem sit densitatis cum reliquo Vortice, & resolvatur in fluidum; movebitur hæc eadem lege ac prius, nisi quatenus ipsius particulæ jam fluidæ factæ moveantur inter se. Negligatur igitur motus particularum inter se, tanquam ad totius motum progressivum nil spectans, & motus totius idem erit ac prius. Motus autem idem erit cum motu aliarum Vorticis partium a centro æqualiter distantium, propterea quod solidum in Fluidum resolutum sit pars Vorticis cæteris partibus confimilis. Ergo solidum, si sit ejusdem densitatis cum materia Vorticis, eodem motu cum ipsius partibus movebitur, in materia proxime ambiente relative quiescens. Sin densius sit, jam magis conabitur recedere a centro Vorticis quam prius; adeoque Vorticis vim illam, qua prius in Orbita sua tanquam in æquilibrio constitutum retinebatur, jam superans, recedet a centro & revolvendo describet Spiralem, non amplius in eundem Orbem rediens. Et eodem argumento si rarius sit, accedet ad centrum. Igitur non redibit in eundem Orbem nisi sit ejusdem densitatis cum fluido. Eo autem in casu offensum est, quod revolveretur eadem lege cum partibus fluidi a centro Vorticis æqualiter distantibus. *Q. E. D.*


Corol. 1. Ergo solidum quod in Vortice revolvitur & in eundem Orbem semper redit, relative quiescit in fluido cui innatat.

Corol. 2. Et si Vortex sit quoad densitatem uniformis, corpus idem ad quamlibet a centro Vorticis distantiam revolvi potest.

Scholium.

Hinc liquet Planetas a Vorticibus corporeis non deferri. Nam Planetæ secundum Hypothesin *Copernicæam* circa Solem delati revolvuntur in Ellipsis umbilicum habentibus in Sole, & radiis ad Solem ductis areas describunt temporibus proportionales. At partes Vorticis tali motu revolvi nequeunt. Designent *AD, BE, CF*, Orbes tres circa Solem *S* descriptos, quorum extimus *CF* circulus sit Soli concentricus, & interiorum duorum Aphelia sint *A, B* & Perihelia *D, E*. Ergo corpus quod revolvitur in Orbe *CF*, radio ad Solem ducto areas temporibus proportionales describendo, movebitur uniformi cum motu. Corpus autem quod revolvitur in Orbe *BE*, tardius movebitur in Aphelio *B* & velocius in Perihelio *E*, secundum leges Astronomicas; cum tamen secundum leges Mechanicas materia Vorticis in spatio angustiore inter *A* & *C* velocius

velocius moveri debeat quam in spatio latiore inter *D* & *F*; id est, in Aphelio velocius quam in Perihelio. Quæ duo repugnant inter se. Sic in principio Signi Virginis, ubi Aphelium Martis jam versatur, distantia inter orbes Martis & Veneris est ad distantiam eorundem orbium in principio Signi Piscium ut tria ad duo circiter, & propterea materia Vorticis inter Orbes illos *F* in principio Piscium debet esse velocior quam in principio Virginis in ratione trium ad duo. Nam quo angustius est spatium per quod eadem Materiæ quan-



titas eodem revolutionis unius tempore transit, eo majori cum velocitate transire debet. Igitur si Terra in hac Materia cœlesti relative quiescens ab ea deferretur, & una circa Solem revolveretur, foret hujus velocitas in principio Piscium ad ejusdem velocitatem in principio Virginis in ratione sesquialtera. Unde Solis motus diurnus apparens in principio Virginis major esset quam minorum primorum septuaginta, & in principio Piscium minor quam minorum quadraginta & octo: cum tamen (experientia teste) apparens iste Solis motus major sit in principio Piscium quam in principio Virginis, & propterea Terra velocior in Principio Virginis quam in Principio Piscium. Itaque Hypothesis Vorticum cum Phenomenis Astronomicis omnino pugnat, & non tam ad explicandos quam ad perturbandos motus cœlestes conducit. Quomodo vero motus isti in spatiis liberis absque Vorticibus peragantur intelligi potest ex Libro primo, & in Mundi Systemate plenius docebitur.

D E M U N D I S Y S T E M A T E L I B E R T E R T I U S.

IN Libris præcedentibus principia Philosophiæ tradidi, non tamen Philosophica sed Mathematica tantum, ex quibus videlicet in rebus Philosophicis disputari possit. Hæc sunt motuum & virium leges & conditiones, quæ ad Philosophiam maxime spectant. Eadem tamen, ne sterilia videantur, illustravi Scholiis quibusdam Philosophicis, ea tractans quæ generalia sunt, & in quibus Philosophia maxime fundari videtur, uti corporum densitatem & resistentiam, spatia corporibus vacua, motumque Lucis & Sonorum. Superest ut ex iisdem principiis doceamus constitutionem Systematis Mundani. De hoc argumento composueram Librum tertium methodo populari, ut a pluribus legeretur. Sed quibus Principia posita satis intellecta non fuerint, ii vim consequentiarum minime percipiunt, neque præjudicia deponent quibus a multis retro annis insueverunt: & propterea ne res in disputationes trahatur, summam libri illius transtuli in Propositiones, more Mathematico, ut ab iis solis legantur qui Principia prius evolverint. Veruntamen quoniam Propositiones ibi quam plurimæ occurrunt, quæ Lectoribus etiam Mathematicè doctis moram nimiam injicere possint, auctor esse nolo ut quisquam eas omnes evolvat; suffecerit siquis Definitiones, Leges motuum & sectiones tres priores Libri primi sedulo legat, dein transeat ad hunc Librum de Mundi Systemate, & reliquas Librorum priorum Propositiones hic citatas pro lubitu consulat.

R E G U L Æ

R E G U L Æ PHILOSOPHANDI.

R E G U L A I

Causas rerum naturalium non plures admitti debere, quam quæ & veræ sint & earum Phænomenis explicandis sufficient.

Dicunt utique Philosophi : Natura nihil agit frustra, & frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora. Natura enim simplex est & rerum causis superfluis non luxuriat.

R E G U L A II.

Ideoque Effectuum naturalium ejusdem generis eadem sunt Causæ.

Uti respirationis in Homine & in Bestia; descensus lapidum in *Europa* & in *America*; Lucis in Igne culinari & in Sole; reflexionis Lucis in Terra & in Planetis.

R E G U L A III.

Qualitates corporum quæ intendi & remitti nequeunt, quæque corporibus omnibus competunt in quibus experimenta institui licet, pro qualitatibus corporum universorum habendæ sunt.

Nam qualitates corporum non nisi per experimenta innotescunt, ideoque generales statuendæ sunt quotquot cum experimentis generaliter quadrant; & quæ minui non possunt, non possunt auferri. Certe contra experimentorum tenorem somnia temere confingenda non sunt, nec a Naturæ analogia recedendum est, cum

DE MUNDI
SYSTEMATE,

ea simplex esse soleat & sibi semper consona. Extensio corporum non nisi per sensus innotescit, nec in omnibus sentitur: sed quia sensibilibus omnibus competit, de universis affirmatur, Corpora plura dura esse experimur. Oritur autem durities totius a duritie partium, & inde non horum tantum corporum quæ sentiuntur, sed aliorum etiam omnium particulas indivisas esse duras merito concludimus. Corpora omnia impenetrabilia esse non ratione sed sensu colligimus. Quæ tractamus, impenetrabilia inveniuntur, & inde concludimus impenetrabilitatem esse proprietatem corporum universorum. Corpora omnia mobilia esse, & viribus quibusdam (quas vires inertiae vocamus) perseverare in motu vel quiete, ex hisce corporum visorum proprietatibus colligimus. Extensio, durities, impenetrabilitas, mobilitas & vis inertiae totius, oritur ab extensione, duritie, impenetrabilitate, mobilitate & viribus inertiae partium; & inde concludimus omnes omnium corporum partes minimas extendi & duras esse & impenetrabiles & mobiles & viribus inertiae præditas. Et hoc est fundamentum Philosophiæ totius. Porro corporum partes divisas & sibi mutuo contiguas ab invicem separari posse, ex Phænomenis novimus, & partes indivisas in partes minores ratione distingui posse ex Mathematica certum est. Utrum vero partes illæ distinctæ & nondum divisæ per vires Naturæ dividi & ab invicem separari possint, incertum est. At si vel unico constaret experimento quod particula aliqua indivisa, frangendo corpus durum & solidum, divisionem pateretur: concluderemus vi hujus Regulæ, quod non solum partes divisæ separabiles essent, sed etiam quod indivisæ in infinitum dividi possent.

Denique si corpora omnia in circuitu Terræ gravia esse in Terram, idque pro quantitate materiæ in singulis, & Lunam gravem esse in Terram pro quantitate materiæ suæ, & vicissim mare nostrum grave esse in Lunam, & Planetas omnes graves esse in se mutuo, & Cometarum similem esse gravitatem, per experimenta & observationes Astronomicas universaliter constet: dicendum erit per hanc Regulam quod corpora omnia in se mutuo gravitant. Nam & fortius erit argumentum ex Phænomenis de gravitate universali, quam de corporum impenetrabilitate: de qua utique in corporibus Cœlestibus nullum experimentum, nullam prorsus observationem habemus.

P H Æ N O.

PHÆNOMENA.

PHÆNOMENON I.

Planetæ Circumjoviales, radiis ad centrum Jovis ductis, areas describere temporibus proportionales, eorumque tempora periodica esse in ratione sesquuplicata distantiarum ab ipsius centro.

Constat ex observationibus Astronomicis. Orbes horum Planetarum non differunt sensibiliter a circulis Jovi concentricis, & motus eorum in his circulis uniformes deprehenduntur. Tempora vero periodica esse in sesquuplicata ratione semidiametrorum Orbium consentiunt Astronomi; & idem ex Tabula sequente manifestum est.

Satellitum Jovialium tempora periodica.

$1^d. 18^h. 27'. 34''.$ $3^d. 13^h. 13'. 42''.$ $7^d. 3^h. 42'. 36''.$ $16^d. 16^h. 32'. 9''.$

Distantiæ Satellitum a centro Jovis.

<i>Ex observationibus</i>	1	2	3	4	
Borelli	$5\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$	14	$24\frac{1}{2}$	} Semidiam. Jovis.
Townlei per Microm.	5, 52	8, 78	13, 47	24, 72	
Cassini per Telescop.	5	8	13	23	
Cassini per Eclips. Satell.	$5\frac{1}{2}$	9	$14\frac{23}{100}$	$25\frac{3}{10}$	
<i>Ex temporibus periodicis.</i>	5,667	9,017	14,384	25,299	

PHÆNOMENON II.

Planetæ Circum saturnios, radiis ad Saturnum ductis, areas describere temporibus proportionales, & eorum tempora periodica esse in ratione sesquuplicata distantiarum ab ipsius centro.

Cassinus unque ex observationibus suis distantias eorum a centro Saturni & periodica tempora hujusmodi esse statuit.

Satelli-

Satellitum Saturniorum tempora periodica.

1^d. 21^h. 19'. 2^d. 17^h. 41'. 4^d. 13^h. 47'. 15^d. 22^h. 41'. 79^d. 22^h. 4'.

Distantiæ Satellitum a centro Saturni in semidiametris Annuli.

Ex observationibus 1 $\frac{12}{25}$. 2 $\frac{1}{2}$. 3 $\frac{1}{2}$. 8. 24.
Ex temporibus periodicis 1,95. 2,5. 3,52. 8,09. 23,71.

P H Æ N O M E N O N III.

Planetas quinque primarios Mercurium, Venerem, Martem, Jovem & Saturnum Orbibus suis Solem cingere.

Mercurium & Venerem circa Solem revolvi ex eorum phasibus lunaribus demonstratur. Plena facie lucentes ultra Solem siti sunt, dimidiata e regione Solis, falcata cis Solem; per discum ejus ad modum macularum nonnunquam transeuntes. Ex Martis quoque plena facie prope Solis conjunctionem, & gibbosa in quadraturis, certum est quod is Solem ambit. De Jove etiam & Saturno idem ex eorum phasibus semper plenis demonstratur.

P H Æ N O M E N O N IV.

Planetarum quinque primariorum, ☿ (vel Solis circa Terram vel) Terræ circa Solem tempora periodica esse in ratione sesquuplicata mediocrium distantiarum à Sole.

Hæc a *Keplero* inventa ratio in confesso est apud omnes. Eadem utique sunt tempora periodica, eademque orbium dimensiones, si-ve Sol circa Terram, si-ve Terra circa Solem revolvatur. Ac de mensura quidem temporum periodicorum convenit inter Astronomos universos. Magnitudines autem Orbium *Keplerus* & *Bullialdus* omnium diligentissime ex Observationibus determinaverunt: & distantiae mediocres, quæ temporibus periodicis respondent, non differunt sensibilibiter a distantis quas illi invenerunt, suntque inter ipsas ut plurimum intermedia; uti in Tabula sequente videre licet.

Plane-

Planetarum ac Telluris distantiae mediocres à Sole.

	♄	♅	♆	♇	♈	♉
Secundum <i>Keplerum</i>	951000.	519650.	152350.	100000.	72400.	38806.
Secundum <i>Bullialdum</i>	954198.	522520.	152350.	100000.	72398.	38585.
Secundum tempora periodica	953806.	520116.	152399.	100000.	72333.	38710.

De distantiiis Mercurii & Veneris à Sole disputandi non est locus, cum hæ per eorum Elongationes à Sole determinentur. De distantiiis etiam superiorum Planetarum à Sole tollitur omnis disputatio per Eclipses Satellitum Jovis. Etenim per Eclipses illas determinatur positio umbræ quam Jupiter projicit, & eo nomine habetur Jovis longitudo Heliocentrica. Ex longitudinibus autem Heliocentrica & Geocentrica inter se collatis determinatur distantia Jovis.

PHÆNOMENON V.

Planetæ primarios, radiis ad Terram ductis, areas describere temporibus minime proportionales; at radiis ad Solem ductis, areas temporibus proportionales percurrere.

Nam respectu Terræ nunc progrediuntur, nunc stationarii sunt, nunc etiam regrediuntur: At Solis respectu semper progrediuntur, idque propemodum uniformi cum motu, sed paulo celerius tamen in Periheliis ac tardius in Apheliis, sic ut arearum æquabilis sit descriptio. Propositio est Astronomis notissima, & in Jove apprime demonstratur per Eclipses Satellitum, quibus Eclipsibus Heliocentricas Planetæ hujus longitudes & distantias à Sole determinari diximus.

PHÆNOMENON VI.

Lunam radio ad centrum Terræ ducto, aream tempori proportionalem describere.

Patet ex Lunæ motu apparente cum ipsius diametro apparente collato. Perturbatur autem motus Lunarum aliquantulum à vi Solaris, sed errorum insensibiles minutias in hisce Phænomenis negligo.

Z z

P R O.

PROPOSITIONES.

PROPOSITIO I. THEOREMA I.

Vires, quibus Planetæ Circumjoviales perpetuo retrabuntur à motibus rectilineis & in Orbibus suis retinentur, respicere centrum Jovis, & esse reciproce ut quadrata distantiarum locorum ab eodem centro.

Patet pars prior Propositionis per Phænomenon primum, & Propositionem secundam vel tertiam Libri primi: & pars posterior per Phænomenon primum, & Corollarium sextum Propositionis quartæ ejusdem Libri.

Idem intellige de Planetis qui Saturnum comitantur, per Phænomenon secundum.

PROPOSITIO II. THEOREMA II.

Vires, quibus Planetæ primarii perpetuo retrabuntur à motibus rectilineis, & in Orbibus suis retinentur, respicere Solem, & esse reciproce ut quadrata distantiarum ab ipsius centro.

Patet pars prior Propositionis per Phænomenon quintum, & Propositionem secundam Libri primi: & pars posterior per Phænomenon quartum, & Propositionem quartam ejusdem Libri. Accuratissime autem demonstratur hæc pars Propositionis per quietem Apheliorum. Nam aberratio quam minima à ratione duplicata (per Corol. I. Prop. XLV. Lib. I.) motum Apfidum in singulis revolutionibus notabilem, in pluribus enormem efficere deberet.

P R O.

PROPOSITIO III. PROBLEMA III.

Vim qua Luna retinetur in Orbe suo respicere Terram, & esse reciproce ut quadratum distantiae locorum ab ipsius centro.

Patet assertionis pars prior per Phænomenon sextum, & Propositionem secundam vel tertiam Libri primi: & pars posterior per motum tardissimum Lunarum Apogæi. Nam motus ille, qui singulis revolutionibus est graduum tantum trium & minorum trium in consequentia, contemni potest. Patet enim (per Corol. 1. Prop. XLV. Lib. I.) quod si distantia Lunæ a centro Terræ sit ad semidiametrum Terræ ut D ad 1; vis a qua motus talis oriatur sit reciproce ut $D^2 \frac{4}{2+3}$, id est, reciproce ut ea ipsius D dignitas cujus index est $2 \frac{4}{2+3}$, hoc est, in ratione distantiae paulo majore quam duplicata inverse, sed quæ partibus $59 \frac{1}{2}$ propius ad duplicatam quam ad triplicatam accedit. Oritur vero ab actione Solis (uti posthac dicetur) & propterea hic negligendus est. Actio Solis quatenus Lunam distrahit a Terra, est ut distantia Lunæ a Terra quamproxime; ideoque (per ea quæ dicuntur in Corol. 2. Prop. XLV. Lib. I.) est ad Lunæ vim centripetam ut 2 ad 357,45 circiter, seu 1 ad $178 \frac{29}{45}$. Et neglecta Solis vi tantilla, vis reliqua quæ Luna retinetur in Orbe erit reciproce ut D^2 . Id quod etiam plenius constabit conferendo hanc vim cum vi gravitatis, ut fit in Propositione sequente.

Corol. Si vis centripeta mediocris qua Luna retinetur in Orbe, augeatur primo in ratione $177 \frac{22}{45}$ ad $178 \frac{29}{45}$, deinde etiam in ratione duplicata semidiametri Terræ ad mediocrem distantiam centri Lunæ a centro Terræ: habebitur vis centripeta Lunarum ad superficiem Terræ, posito quod vis illa descendendo ad superficiem Terræ, perpetuo augeatur in reciproca altitudinis ratione duplicata.

PROPOSITIO IV. THEOREMA IV.

Lunam gravitare in Terram, & vi gravitatis retrahi semper a motu rectilineo, & in Orbe suo retineri.

Lunæ distantia mediocris a Terra in Syzygiis est semidiametrorum terrestrium, secundum plerosque Astronomorum 59, secundum *Vendelinum* 60, secundum *Copernicum* 60½, & secundum *Tychonem*

DE MUNDI *chonem* 56 $\frac{1}{2}$. At *Tycho*, & quotquot ejus Tabulas refractionum SYSTEMATE, sequuntur, constituendo refractiones Solis & Lunæ (omnino contra naturam Lucis) majores quam Fixarum, idque scrupulis quasi quatuor vel quinque, auxerunt parallaxin Lunæ scrupulis totidem, hoc est, quasi duodecima vel decima quinta parte totius parallaxeos. Corrigatur iste error, & distantia evadet quasi 60 $\frac{1}{2}$ semidiametrorum terrestrium, fere ut ab aliis assignatum est. Assumamus distantiam mediocrem sexaginta semidiametrorum; & Lunarem periodum respectu Fixarum compleri diebus 27, horis 7, minutis primis 43, ut ab Astronomis statuitur; atque ambitum Terræ esse pedum Parisiensium 123249600, uti a *Gallis* mensurantibus definitum est: Et si Luna motu omni privari fingatur ac dimitti ut, urgente vi illa omni qua in Orbe suo retinetur, descendat in Terram; hæc spatio minuti unius primi cadendo describet pedes Parisienses 15 $\frac{1}{12}$. Colligitur hoc ex calculo vel per Propositionem xxxvi. Libri primi, vel (quod eodem recidit) per Corollarium nonum Propositionis quartæ ejusdem Libri, confectio. Nam arcus illius quem Luna tempore minuti unius primi, medio suo motu, ad distantiam sexaginta semidiametrorum terrestrium describat, sinus versus est pedum Parisiensium 15 $\frac{1}{12}$ circiter. Unde cum vis illa accedendo ad Terram augeatur in duplicata distantie ratione inversa, adeoque ad superficiem Terræ major sit partibus 60 \times 60 quam ad Lunam; corpus vi illa in regionibus nostris cadendo, describere deberet spatio minuti unius primi pedes Parisienses 60 \times 60 \times 15 $\frac{1}{12}$, & spatio minuti unius secundi pedes 15 $\frac{1}{12}$. Atqui corpora in regionibus nostris vi gravitatis cadendo, describunt tempore minuti unius secundi pedes Parisienses 15 $\frac{1}{12}$, uti *Hugenius* factis pendulorum experimentis & computo inde inito, demonstravit: & propterea (per Reg. i. & ii.) vis qua Luna in orbe suo retinetur, illa ipsa est quam nos Gravitatem dicere solemus. Nam si Gravitatis ab ea diversa est, corpora viribus utrisque conjunctis Terram petendo, duplo velocius descendent, & spatio minuti unius secundi cadendo describent pedes Parisienses 30 $\frac{1}{2}$: omnino contra Experimentiam.

Calculus hic fundatur in hypothesi quod Terra quiescit. Nam si Terra & Luna circum Solem moveantur, & interea quoque circum commune gravitatis centrum revolvantur: distantia centrorum Lunæ ac Terræ ab invicem erit 60 $\frac{1}{2}$ semidiametrorum terrestrium; uti computationem (per Prop. lx. Lib. I.) ineunti patebit.

PROPOSITIO V. THEOREMA V.

Planetas Circumjoviales gravitare in Jovem, Circumsaturnios in Saturnum, & Circumsolares in Solem, & vi gravitatis suæ retrahi semper à motibus rectilineis, & in Orbibus curvilineis retineri.

Nam revolutiones Planetarum Circumjovialium circa Jovem, Circumsaturniorum circa Saturnum, & Mercurii ac Veneris reliquorumque Circumsolarium circa Solem sunt Phænomena ejusdem generis cum revolutione Lunæ circa Terram; & propterea per Reg. 11. à causis ejusdem generis dependent: præsertim cum demonstratum sit quod vires, à quibus revolutiones illæ dependent, respiciant centra Jovis, Saturni ac Solis, & recedendo à Jove, Saturno & Sole decrescant eadem ratione ac lege, qua vis gravitatis decrescit in recessu à Terra.

Corol. 1. Gravitas igitur datur in Planetas universos. Nam Venerem, Mercurium, cæterosque esse corpora ejusdem generis cum Jove & Saturno, nemo dubitat. Et cum attractio omnis (per motus Legem tertiam) mutua sit, Jupiter in Satellitēs suos omnes, Saturnus in suos, Terraque in Lunam, & Sol in Planetas omnes primarios gravitabit.

Corol. 2. Gravitatem, quæ Planetam unumquemque respicit, esse reciproce ut quadratum distantiae locorum ab ipsius centro.

Corol. 3. Graves sunt Planetæ omnes in se mutuo per Corol. 1. & 2. Et hinc Jupiter & Saturnus prope conjunctionem se invicem attrahendo, sensibilibus perturbant motus mutuos, Sol perturbat motus Lunares, Sol & Luna perturbant Mare nostrum, ut in sequentibus explicabitur.

PROPOSITIO VI. THEOREMA VI.

Corpora omnia in Planetas singulos gravitare, & pondera eorum in eundem quemvis Planetam, paribus distantiiis à centro Planetæ, proportionalia esse quantitati materiæ in singulis.

Descensus gravium omnium in Terram (dempta saltem inæquali retardatione quæ ex Aeris perexiguæ resistantia oritur) aequalibus

DE MUNDI
SYSTEMATE, temporibus fieri, jamdudum observarunt alii; & accuratissime quidem notare licet æqualitatem temporum in Pendulis. Rem tentavi in Auro, Argento, Plumbo, Vitro, Arena, Sale communi, Ligno, Aqua, Triticò. Comparabam pyxides duas ligneas rotundas & æquales. Unam implebam Ligno, & idem Auri pondus fuspendebam (quam potui exacte) in alterius centro oscillationis. Pyxides ab æqualibus pedum undecim filis pendentes, constituiebant Pendula, quoad pondus, figuram, & aeris resistentiam omnino paria: Et paribus oscillationibus, juxta positæ, ibant una & redibant diutissime. Proinde copia materiæ in Auro (per Corol. 1. & 6. Prop. xxiv. Lib. II.) erat ad copiam materiæ in Ligno, ut vis motricis actio in totum Aurum ad ejusdem actionem in totum Lignum; hoc est, ut pondus ad pondus. Et sic in cæteris. In corporibus ejusdem ponderis differentiæ materiæ, quæ vel minor esset quam pars millesima materiæ totius, his experimentis manifesto deprehendi potuit. Jam vero naturam gravitatis in Planetas eandem esse atque in Terram, non est dubium. Elevari enim fingantur corpora hæc Terrestria ad usque Orbem Lunæ, & una cum Luna motu omni privata demitti, ut in Terram simul cadant; & per jam ante ostensa certum est quod temporibus æqualibus describerent æqualia spatia cum Luna, adeoque quod sunt ad quantitatem materiæ in Luna, ut pondera sua ad ipsius pondus. Porro quoniam Satellites Jovis temporibus revolvuntur quæ sunt in ratione sesquuplicata distantiarum à centro Jovis, erunt eorum gravitates acceleratrices in Jovem reciproce ut quadrata distantiarum à centro Jovis; & propterea in æqualibus a Jove distantis, eorum gravitates acceleratrices evaderent æquales. Proinde temporibus æqualibus ab æqualibus altitudinibus cadendo, describerent æqualia spatia; perinde ut fit in gravibus, in hac Terra nostra. Et eodem argumento Planetæ circumsolares ab æqualibus à Sole distantis demissi, descensu suo in Solem æqualibus temporibus æqualia spatia describerent. Vires autem, quibus corpora inæqualia æqualiter accelerantur, sunt ut corpora; hoc est, pondera ut quantitates materiæ in Planetis. Porro Jovis & ejus Satellitum pondera in Solem proportionalia esse quantitibus materiæ eorum, patet ex motu Satellitum quam maxime regulari; per Corol. 3. Prop. lxxv. Lib. I. Nam si horum aliqui magis traherentur in Solem, pro quantitate materiæ suæ, quam cæteri: motus Satellitum (per Corol. 2. Prop. lxxv. Lib. I.) ex inæqualitate attractionis perturbarentur. Si (paribus à Sole distantis) Satelles aliquis gravior esset in Solem pro quantitate

titate materiæ suæ, quam Jupiter pro quantitate materiæ suæ, in ratione quacunque data, puta d ad e : distantia inter centrum Solis & centrum Orbis Satellitis, major semper foret quam distantia inter centrum Solis & centrum Jovis in ratione subduplicata quam proxime; uti calculis quibusdam initis inveni. Et si Satelles minus gravis esset in Solem in ratione illa d ad e , distantia centri Orbis Satellitis à Sole minor foret quam distantia centri Jovis à Sole in ratione illa subduplicata. Igitur si in æqualibus à Sole distantis, gravitas acceleratrix Satellitis cujuscvis in Solem major esset vel minor quam gravitas acceleratrix Jovis in Solem, parte tantum millesima gravitatis totius; foret distantia centri Orbis Satellitis à Sole major vel minor quam distantia Jovis à Sole parte $\frac{1}{1000}$ distantiae totius, id est, parte quinta distantiae Satellitis extimi à centro Jovis: Quæ quidem Orbis eccentricitas foret valde sensibilis. Sed Orbes Satellitum sunt Jovi concentrici, & propterea gravitates acceleratrices Jovis & Satellitum in Solem æquantur inter se. Et eodem argumento pondere Saturni & Comitum ejus in Solem, in æqualibus à Sole distantis, sunt ut quantitates materiæ in ipsis: Et pondera Lunæ ac Terræ in Solem vel nulla sunt, vel earum massis accurate proportionalia. Aliqua autem sunt per Corol. 1. & 3. Prop. v.

Quinetiam pondera partium singularum Planetæ cujusque in alium quemcunque, sunt inter se ut materia in partibus singulis. Nam si partes aliquæ plus gravitarent, aliæ minus, quam pro quantitate materiæ: Planeta totus, pro genere partium quibus maxime abundet, gravitaret magis vel minus quam pro quantitate materiæ totius. Sed nec refert utrum partes illæ externæ sint vel internæ. Nam si verbi gratia corpora Terrestria, quæ apud nos sunt, in Orbem Lunæ elevari fingantur, & conferantur cum corpore Lunæ: Si horum pondera essent ad pondera partium externarum Lunæ ut quantitates materiæ in iisdem, ad pondera vero partium internarum in majori vel minori ratione, forent eadem ad pondus Lunæ totius in majori vel minori ratione: contra quam supra ostensum est.

Corol. 1. Hinc pondera corporum non pendent ab eorum formis & texturis. Nam si cum formis variari possent; forent majora vel minora, pro varietate formarum, in æquali materia: omnino contra Experientiam.

Corol.

DE MUNDI
SYSTEMATE.

Corol. 2. Corpora univerſa quæ circa Terram ſunt, gravia ſunt in Terram; & pondera omnium, quæ æqualiter à centro Terræ diſtant, ſunt ut quantitates materiæ in iſdem. Hæc eſt qualitas omnium in quibus experimenta inſtituere licet, & propterea per Reg. III. de univerſis affirmanda eſt. Si Æther aut corpus aliud quodcunque vel gravitate omnino deſtitueretur, vel pro quantitate materiæ ſuæ minus gravitaret: quoniam id (ex mente *Ariſtotelis*, *Carteſii* & aliorum) non differt ab aliis corporibus niſi in forma materiæ, poſſet idem per mutationem formæ gradatim tranſmutari in corpus ejuſdem conditionis cum iis quæ, pro quantitate materiæ, quam maxime gravitant, & viciffim corpora maxime gravia, formam illius gradatim induendo, poſſent gravitatem ſuam gradatim amittere. Ac proinde pondera penderent à formis corporum, poſſentque cum formis variari, contra quam probatum eſt in Corollario ſuperiore.

Corol. 3. Spatia omnia non ſunt æqualiter plena. Nam ſi ſpatia omnia æqualiter plena eſſent, gravitas ſpecifica fluidi quo regio aeris impleretur, ob ſummam denſitatem materiæ, nil cederet gravitati ſpecificæ argenti vivi, vel auri, vel corporis alterius cuiuſcunque denſiſſimi; & propterea nec aurum neque aliud quodcunque corpus in aere deſcendere poſſet. Nam corpora in fluidis, niſi ſpecificè graviora ſint, minime deſcendunt. Quod ſi quantitas materiæ in ſpatio dato per rarefactionem quamcunque diminui poſſit, quidni diminui poſſit in infinitum?

Corol. 4. Si omnes omnium corporum particulæ ſolidæ ſint ejuſdem denſitatis, neque abſque poris rareſci poſſint, Vacuum datur. Ejuſdem denſitatis eſſe dico, quarum vires inertię ſunt ut magnitudines.

Corol. 5. Vis gravitatis diverſi eſt generis à vi magnetica. Nam attractio magnetica non eſt ut materia attracta. Corpora aliqua magis trahuntur, alia minus, plurima non trahuntur. Et vis magnetica in uno & eodem corpore intendi poſeſt & remitti, eſtque nonnuncquam longe major pro quantitate materiæ quam vis gravitatis, & in receſſu à Magnete decreſcit in ratione diſtantiæ non duplicata, ſed fere triplicata, quantum ex craſſis quibuſdam obſervationibus animadvertere potui.

P R O .

PROPOSITIO VII. THEOREMA VII.

Gravitatem in corpora universa fieri, eamque proportionalem esse quantitati materiæ in singulis.

Planetas omnes in se mutuo graves esse jam ante probavimus, ut & gravitatem in unumquemque seorsim spectatum esse reciproce ut quadratum distantiae locorum à centro Planetæ. Et inde consequens est, (per Prop. LXX. Lib. I. & ejus Corollaria) gravitatem in omnes proportionalem esse materiæ in iisdem.

Porro cum Planetæ cujusvis *A* partes omnes graves sint in Planetam quemvis *B*, & gravitas partis cujusque sit ad gravitatem totius, ut materia partis ad materiam totius, & actioni omni reactio (per motus Legem tertiam) æqualis sit; Planeta *B* in partes omnes Planetæ *A* vicissim gravitabit, & erit gravitas sua in partem unamquamque ad gravitatem suam in totum, ut materia partis ad materiam totius. *Q. E. D.*

Corol. 1. Oritur igitur & componitur gravitas in Planetam totum ex gravitate in partes singulas. Cujus rei exempla habemus in attractionibus Magneticis & Electricis. Oritur enim attractio omnis in totum ex attractionibus in partes singulas. Res intelligetur in gravitate, concipiendo Planetas plures minores in unum Globum coire & Planetam majorem componere. Nam vis totius ex viribus partium componentium oriri debet. Siquis objiciat quod corpora omnia, quæ apud nos sunt, hac lege gravitare deberent in se mutuo, cum tamen ejusmodi gravitas nequiquam sentiatur: Respondeo quod gravitas in hæc corpora, cum sit ad gravitatem in Terram totam ut sunt hæc corpora ad Terram totam, longe minor est quam quæ sentire possit.

Corol. 2. Gravitatio in singulas corporis particulas æquales est reciproce ut quadratum distantiae locorum à particulis. Patet per Corol. 3. Prop. LXXIV. Lib. I.

PROPOSITIO VIII. THEOREMA VIII.

Si Globorum duorum in se mutuo gravitantium materia undique, in regionibus quæ a centrīs æqualiter distant, homogēnea sit: erit pondus Globi alterutrius in alterum reciproce ut quadratum distantie inter centra.

Postquam invenissem gravitatem in Planetam totum oriri & componi ex gravitatibus in partes; & esse in partes singulas reciproce proportionalem quadratis distantiarum à partibus: dubitabam an reciproca illa proportio duplicata obtineret accurate in vi tota ex viribus pluribus composita, an vero quam proxime. Nam fieri posset ut proportio, quæ in majoribus distantis satis accurate obtineret, prope superficiem Planetæ ob inæquales particularum distantias & situs dissimiles, notabiliter erraret. Tandem vero, per Prop. LXXV. & LXXVI. Libri primi & ipsarum Corollaria, intellexi veritatem Propositionis de qua hic agitur.

Corol. 1. Hinc inveniri & inter se comparari possunt pondera corporum in diversos Planetas. Nam pondera corporum æqualium circum Planetas in circulis revolvendum sunt (per Corol. 2. Prop. IV. Lib. I.) ut diametri circulorum directæ & quadrata temporum periodicorum inversæ; & pondera ad superficies Planetarum, aliasve quasvis à centro distantias, majora sunt vel minora (per hanc Propositionem) in duplicata ratione distantiarum inversa. Sic ex temporibus periodicis Veneris circum Solem dierum 224 & horarum 16½, Satellitis extimi circumjovialis circum Jovem dierum 16 & horarum 16½, Satellitis Hugeniæ circum Saturnum dierum 15 & horarum 22½, & Lunæ circum Terram dierum 27, hor. 7. min. 43, collatis cum distantia mediocri Veneris a Sole & cum elongationibus maximis heliocentricis Satellitis extimi circumjovialis a centro Jovis 8'. 21'', Satellitis Hugeniæ a centro Saturni 3'. 20'', & Lunæ a Terra 10', computum ineundo inveni quod corporum æqualium & a Sole, Jove, Saturno ac Terra æqualiter distantium pondera in Solem, Jovem, Saturnum ac Terram forent ad invicem ut 1, $\frac{1}{1033}$, $\frac{1}{2411}$, & $\frac{1}{22712}$ respective. Est enim parallaxis Solis ex observationibus novissimis quasi 10'', & Halleyus noster per emerfiones Jovis & Satellitum e parte obscura Lunæ,

Lunæ, determinavit quod elongatio maxima heliocentrica Satellitis extimi Jovialis a centro Jovis in mediocri Jovis a Sole distantia sit $8'. 21\frac{1}{2}''$, & diameter Jovis $41''$. Ex duratione Eclipsæ Satellitum in umbram Jovis incidentium prodit hæc diameter quasi $40''$, atque adeo semidiameter $20''$. Mensuravit autem *Hugēnius* elongationem maximam heliocentricam Satellitis a se detectis $3'. 20''$ a centro Saturni, & hujus elongationis pars quarta, nempe $50''$, est diameter annuli Saturni e Sole visi, & diameter Saturni est ad diametrum annuli ut 4 ad 9, ideoque semidiameter Saturni e Sole visi est $11''$. Subducatur lux erratica quæ haud minor esse solet quam $2''$. vel $3''$: Et manebit semidiameter Saturni quasi $9''$. Ex hisce autem & Solis semidiametro mediocri $16'. 6''$ computum ineundo prodeunt veræ Solis, Jovis, Saturni ac Terræ semidiametri ad invicem ut 10000, 1077, 889 & 104. Unde, cum pondera æqualium corporum a centris Solis, Jovis, Saturni ac Terræ æqualiter distantium, sint in Solem, Jovem, Saturnum ac Terram, ut 1, $\frac{1}{1033}$, $\frac{1}{2411}$, & $\frac{1}{227512}$ respective, & auctis vel diminutis distantis pondera diminuantur vel augeantur in duplicata ratione: pondera æqualium corporum in Solem, Jovem, Saturnum ac Terram in distantis 10000, 1077, 889, & 104 ab eorum centris, atque adeo in eorum superficiebus, erunt ut 10000, 835, 525, & 410 respective. Quanta sint pondera corporum in superficie Lunæ dicemus in sequentibus.

Corol. 2. Innotescit etiam quantitas materiæ in Planetis singulis. Nam quantitates materiæ in Planetis sunt ut eorum vires in æqualibus distantis ab eorum centris, id est, in Sole, Jove, Saturno ac Terra sunt ut 1, $\frac{1}{1033}$, $\frac{1}{2411}$, & $\frac{1}{227512}$ respective. Si parallaxis Solis statuatur major vel minor quam $10''$, debet quantitas materiæ in Terra augeri vel diminui in triplicata ratione.

Corol. 3. Innotescunt etiam densitates Planetarum. Nam pondera corporum æqualium & homogeneorum in Sphæras homogeneas sunt in superficiebus Sphærarum ut Sphærarum diametri, per Prop. LXXII. Lib. I. ideoque Sphærarum heterogenearum densitates sunt ut pondera illa applicata ad Sphærarum diametros. Erant autem veræ Solis, Jovis, Saturni ac Terræ diametri ad invicem ut 10000, 1077, 889, & 104, & pondera in eisdem ut 10000, 835, 525, & 410, & propterea densitates sunt ut 100, 78, 59, & 396. Densitas Terræ quæ prodit ex hoc computo non pendet a parallaxi Solis, sed determinatur per parallaxin Lunæ, & propterea

DE MUNDI SYSTEMATE, terea hic recte definitur. Est igitur Sol paulo densior quam Jupiter, & Jupiter quam Saturnus, & Terra quadruplo densior quam Sol. Nam per ingentem suum calorem Sol rarefcit. Luna vero densior est quam Terra, ut in fequentibus patebit.

Corol. 4. Denfiores igitur funt Planetæ qui funt minores, cæteris paribus. Sic enim vis gravitatis in eorum fuperficiebus ad æqualitatem magis accedit. Sed & denfiores funt Planetæ, cæteris paribus, qui funt Soli propiores; ut Jupiter Saturno, & Terra Jove. In diverfis utique diftantiis a Sole collocandi erant Planetæ ut quilibet pro gradu denfitatis calore Solis majore vel minore frueretur. Aqua noſtra, ſi Terra locaretur in orbe Saturni, rigefceret, ſi in orbe Mercurii in vapores ſtatim abiret. Nam lux Solis, cui calor proportionalis eſt, ſeptuplo denfior eſt in orbe Mercurii quam apud nos: & Thermometro expertus ſum quod ſeptuplo Solis æſtivi calore aqua ebullit. Dubium vero non eſt quin materia Mercurii ad calorem accommodetur, & propterea denfior ſit hac noſtra; cum materia omnis denfior ad operationes Naturales obeundas majorem calorem requirat.

PROPOSITIO IX. THEOREMA IX.

Gravitatem pergendo a fuperficiebus Planetarum deorſum decrefcere in ratione diftantiarum a centro quam proxime.

Si materia Planetæ quoad denſitatem uniformis eſſet, obtineret hæc Propoſitio accurate: per Prop. LXXIII. Lib. I. Error igitur tantus eſt, quantus ab inæquabili denſitate oriri poſſit.

PROPOSITIO X. THEOREMA X.

Motus Planetarum in Coelis diutiſſime conſervari poſſe.

In Scholio Propoſitionis XL. Lib. II. oſtenſum eſt quod globus Aquæ congelatæ in Aere noſtro, libere movendo & longitudinem ſemidiametri ſuæ deſcribendo, ex reſiſtentia Aeris amitteret motus fui partem $\frac{459}{45900}$. Obtinet autem eadem proportio quam proxime in globis utcunque magnis & velocibus. Jam vero Globum Terræ noſtræ denſiorem eſſe quam ſi totus ex Aqua conſtaret, ſic colligo. Si Globus hicce totus eſſet aqueus, quæcunque rariora eſſent quam aqua, ob minorem ſpecificam gravitatem emergerent & ſupernatarent.

rent. Eaque de Causa Globus terreus aquis undique coopertus, si rarior esset quam aqua, emergeret alicubi, & aqua omnis inde defluens congregaretur in regione opposita. Et par est ratio Terræ nostræ maribus magna ex parte circumdatæ. Hæc si densior non esset, emergeret ex maribus, & parte sui pro gradu levitatis extaret ex Aqua, maribus omnibus in regionem oppositam confluentibus. Eodem argumento maculæ Solares leviores sunt quam materia lucida Solaris cui supernant. Et in formatione qualicumque Planetarum, materia omnis gravior, quo tempore massa tota fluida erat, centrum petebat. Unde cum Terra communis suprema quasi duplo gravior sit quam aqua, & paulo inferius in fodinis quasi triplo vel quadruplo aut etiam quintuplo gravior reperiatur: verisimile est quod copia materiæ totius in Terra quasi quintuplo vel sextuplo major sit quam si tota ex aqua constaret; præsertim cum Terram quasi quintuplo densiorem esse quam Jovem jam ante ostensum sit. Igitur si Jupiter paulo densior sit quam aqua, hic spatio dierum triginta, quibus longitudinem 459 semidiametrorum suarum describit, amitteret in Medio ejusdem densitatis cum Aere nostro motus sui partem fere decimam. Verum cum resistentia Mediorum minuitur in ratione ponderis ac densitatis, sic ut aqua, quæ partibus 13 $\frac{1}{2}$ levior est quam argentum vivum, minus resistat in eadem ratione; & aer, qui partibus 850 levior est quam aqua, minus resistat in eadem ratione: si ascendatur in coelos ubi pondus Medii, in quo Planetæ moventur, diminuitur in immensum, resistentia prope cessabit.

HYPOTHESIS II.

Centrum Systematis Mundani quiescere.

Hoc ab omnibus concessum est, dum aliqui Terram alii Solem in centro Systematis quiescere contendunt. Videamus quid inde sequatur.

PROPOSITIO XI. THEOREMA XI.

Commune centrum gravitatis Terræ, Solis & Planetarum omnium quiescere.

Nam centrum illud (per Legum Corol. 4.) vel quiescet vel progredietur uniformiter in directum. Sed centro illo semper

DE MUNDI progrediente, centrum Mundi quoque movebitur contra Hy-
SYSTEMATE, pothesin.

PROPOSITIO XII. THEOREMA XII.

*Solem motu perpetuo agitari, sed nunquam longe recedere a
communi gravitatis centro Planetarum omnium.*

Nam cum (per Corol. 2. Prop. VIII.) materia in Sole sit ad materiam in Jove ut 1033 ad 1, & distantia Jovis a Sole sit ad semidiametrum Solis in ratione paulo majore; incidet commune centrum gravitatis Jovis & Solis in punctum paulo supra superficiem Solis. Eodem argumento cum materia in Sole sit ad materiam in Saturno ut 2411 ad 1, & distantia Saturni a Sole sit ad semidiametrum Solis in ratione paulo minore; incidet commune centrum gravitatis Saturni & Solis in punctum paulo infra superficiem Solis. Et ejusdem calculi vestigiis insistendo si Terra & Planetæ omnes ex una Solis parte confisterent, commune omnium centrum gravitatis vix integra Solis diametro a centro Solis distaret. Aliis in casibus distantia centrorum semper minor est. Et propterea cum centrum illud gravitatis perpetuo quiescit, Sol pro vario Planetarum situ in omnes partes movebitur, sed à centro illo nunquam longe recedet.

Corol. Hinc commune gravitatis centrum Terræ, Solis & Planetarum omnium pro centro Mundi habendum est. Nam cum Terra, Sol & Planetæ omnes gravitent in se mutuo, & propterea, pro vi gravitatis suæ, secundum leges motus perpetuo agitentur: perspicuum est quod horum centra mobilia pro Mundi centro quiescente haberi nequeunt. Si corpus illud in centro locandum esset in quod corpora omnia maxime gravitant (uti vulgi est opinio) privilegium istud concedendum esset Soli. Cum autem Sol moveatur, eligendum erit punctum quiescens, a quo centrum Solis quam minime discedit; & a quo idem adhuc minus discederet, si modo Sol densior esset & major, ut minus moveretur.

PRO-

PROPOSITIO XIII. THEOREMA XIII.

Planetae moventur in Ellipsis umbilicum habentibus in centro Solis, & radiis ad centrum illud ductis areas describunt temporibus proportionales.

Disputavimus supra de his motibus ex Phænomenis. Jam cognitis motuum principiis, ex his colligimus motus coelestes a priori. Quoniam pondera Planetarum in Solem sunt reciproce ut quadrata distantiarum a centro Solis; si Sol quiesceret & Planetæ reliqui non agerent in se mutuo, forent orbes eorum Elliptici, Solem in umbilico communi habentes, & areae describerentur temporibus proportionales (per Prop. I. & XI, & Corol. I. Prop. XIII. Lib. I.) Actiones autem Planetarum in se mutuo perexiguæ sunt (ut possint contemni) & motus Planetarum in Ellipsis circa Solem mobilem minus perturbant (per Prop. LXVI. Lib. I.) quam si motus isti circa Solem quiescentem peragerentur.

Actio quidem Jovis in Saturnum non est omnino contemnenda. Nam gravitas in Jovem est ad gravitatem in Solem (paribus distantis) ut 1 ad 1033; adeoque in conjunctione Jovis & Saturni, quoniam distantia Saturni a Jove est ad distantiam Saturni a Sole fere ut 4 ad 9, erit gravitas Saturni in Jovem ad gravitatem Saturni in Solem ut 81 ad 16 \times 1033 seu 1 ad 204 circiter. Et hinc oritur perturbatio orbis Saturni in singulis Planetæ hujus cum Jove conjunctionibus adeo sensibilis ut ad eandem Astronomi hæreant. Pro vario situ Planetæ in his conjunctionibus, Eccentricitas ejus nunc augetur nunc diminuitur, Aphelium nunc promovetur nunc forte retrahitur, & medius motus per vices acceleratur & retardatur. Error tamen omnis in motu ejus circum Solem a tanta vi oriundus (præterquam in motu medio) evitari fere potest constituendo umbilicum inferiorem Orbis ejus in communi centro gravitatis Jovis & Solis (per Prop. LXVII. Lib. I.) & propterea ubi maximus est, vix superat minuta duo prima. Et error maximus in motu medio vix superat minuta duo prima annuatim. In conjunctione autem Jovis & Saturni gravitates acceleratrices Solis in Saturnum, Jovis in Saturnum & Jovis in Solem sunt fere ut 16, 81 & $\frac{16 \times 81 \times 2411}{25}$ seu 124986, adeoque differentia gravitatum Solis in Saturnum & Jovis in Saturnum est ad gravitatem Jovis

DE MUNDI SYSTEMATE, Jovis in Solem ut 65 ad 124986 seu 1 ad 1923. Huic autem differentiæ proportionalis est maxima Saturni efficacia ad perturbandum motum Jovis, & propterea perturbatio orbis Jovialis longe minor est quam ea Saturnii. Reliquorum orbium perturbationes sunt adhuc longe minores, præterquam quod Orbis Terræ sensibilibiter perturbatur a Luna. Commune centrum gravitatis Terræ & Lunæ, Ellipsin circum Solem in umbilico positum percurrit, & radio ad Solem ducto areas in eadem temporibus proportionales describit, Terra vero circum hoc centrum commune motu menstruo revolvitur.

PROPOSITIO XIV. THEOREMA XIV.

Orbium Aphelia & Nodi quiescunt.

Aphelia quiescunt, per Prop. XI. Lib. I. ut & Orbium plana, per ejusdem Libri Prop. I. & quiescentibus planis quiescunt Nodi. Attamen a Planetarum revolvendum & Cometarum actionibus in se invicem orientur inæqualitates aliquæ, sed quæ ob parvitatem hic contemni possunt.

Corol. 1. Quiescunt etiam Stellæ fixæ, propterea quod datas ad Aphelia Nodosque positiones servant.

Corol. 2. Ideoque cum nulla sit earum parallaxis sensibilis ex Terræ motu annuo oriunda, vires earum ob immensam corporum distantiam nullos edent sensibiles effectus in regione Systematis nostri. Quinimo Fixæ in cœli partes æqualiter dispersæ contrariis attractionibus vires mutuas destruunt, per Prop. LXX. Lib. I.

Scholium.

Cum Planetæ Soli propiores (nempe Mercurius, Venus, Terra, & Mars) ob corporum parvitatem parum agant in se invicem: horum Aphelia & Nodi quiescent, nisi quatenus a viribus Jovis, Saturni, & corporum superiorum turbentur. Et inde colligi potest per theoriam gravitatis, quod horum Aphelia moventur aliquantulum in consequentia respectu fixarum, idque in proportionem sesquuplicata distantiarum horum Planetarum a Sole. Ut si Aphelium Martis in annis centum conficiat 35' in consequentia respectu fixarum; Aphelia Terræ, Veneris, & Mercurii in annis centum conficiant 18', 36", 11'. 27", & 4'. 29" respective. Et hi motus, ob parvitatem, negliguntur in hac Propositione.

P R O .

PROPOSITIO XV. PROBLEMA I.

Invenire Orbium principales diametros.

Capiendæ sunt hæ in ratione subseſquuplicata temporum periodico-
rum, per Prop. xv. Lib. I. deinde ſigillatim augendæ in ratione
ſummæ maſſarum Solis & Planetæ cujuſque revolventis ad primam
duarum medie proportionalium inter ſummam illam & Solem, per
Prop. lx. Lib. I.

PROPOSITIO XVI. PROBLEMA II.

Invenire Orbium Eccentricitates & Aphelia.

Problema conſtit per Prop. xviii. Lib. I.

PROPOSITIO XVII. THEOREMA XV.

*Planetarum motus diurnos uniformes eſſe, & librationem
Lunæ ex ipſius motu diurno oriri.*

Patet per motus Legem I. & Corol. 22. Prop. lxvi. Lib. I.
Quoniam vero Lunæ, circa axem ſuum uniformiter revolventis,
dies menſtruus eſt; hujus facies eadem ulteriorem umbilicum or-
bis ipſius ſemper reſpiciet, & propterea pro ſitu umbilici illius
deviabit hinc inde a Terra. Hæc eſt libratio in longitudinem.
Nam libratio in latitudinem orta eſt ex inclinatione axis Lunar-
is ad planum orbis. Porro hæc ita ſe habere, ex Phænomenis manifeſtum
eſt.

PROPOSITIO XVIII. THEOREMA XVI.

*Axes Planetarum diametris quæ ad eoſdem axes normaliter
ducuntur minores eſſe.*

Planetæ ſublato omni motu circulari diurno figuram Sphæricam,
ob æqualem undique partium gravitatem, affectare deberent. Per
motum illum circularem fit ut partes ab axe recedentes juxta
æquatorem aſcendere conentur. Ideoque materia ſi fluida ſit
Bbb aſcenſu

DE MUNDI
SYSTEMATE, ascensu suo ad æquatorem diametros adaugebit, axem vero descensu suo ad polos diminuet. Sic Jovis diameter (consentientibus Astronomorum observationibus) brevior deprehenditur inter polos quam ab oriente in occidentem. Eodem argumento, nisi Terra nostra paulo altior esset sub æquatore quam ad polos, Maria ad polos subsiderent, & juxta æquatorem ascendendo, ibi omnia inundarent.

PROPOSITIO XIX. PROBLEMA III.

Invenire proportionem axis Planetæ ad diametros eidem perpendiculares.

Picartus mensurando arcum gradus unius & 22'. 55" inter *Ambianum* & *Malvoisinam*, invenit arcum gradus unius esse hexapedarum Parisiensium 57060. Unde ambitus Terræ est pedum Parisiensium 123249600, ut supra. Sed cum error quadringentesimæ partis digiti, tam in fabrica instrumentorum quam in applicatione eorum ad observationes capiendas, sit insensibilis, & in Sectore decempedali quo *Galli* observarunt Latitudines locorum respondeat minutis quatuor secundis, & in singulis observationibus incidere possit tam ad centrum Sectoris quam ad ejus circumferentiam, & errores in minoribus arcibus sint majoris momenti: * ideo *Cassinus* jussu Regio mensuram Terræ per majora locorum intervalla aggressus est, & subinde per distantiam inter Observatorium Regium *Parisense* & villam *Colioure* in *Rouffillon* & Latitudinum differentiam 6^{gr.} 18', supponendo quod figura Terræ sit Sphærica, invenit gradum unum esse hexapedarum 57292, prope ut *Norwoodus* noster antea invenerat. Hic enim circa annum 1635, mensurando distantiam pedum Londinensium 905751 inter *Londinum* & *Eboracum*, & observando differentiam Latitudinum 2^{gr.} 28', collegit mensuram gradus unius esse pedum Londinensium 367196, id est, hexapedarum Parisiensium 57300. Ob magnitudinem intervalli a *Cassino* mensurati, pro mensura gradus unius in medio intervalli illius, id est, inter Latitudines 45^{gr.} & 46^{gr.} usurpabo hexapedas 57292. Unde, si Terra sit Sphærica, femidiameter ejus erit pedum Parisiensium 19695539.

* Vide Historiam Academicæ Regiæ scientiarum anno 1700.


Penduli-

Penduli in Latitudine *Lutetiae Parisiorum* ad minuta secunda oscillantis longitudo est pedum trium Parisiensium & linearum 8 $\frac{1}{2}$. Et longitudo quod grave tempore minuti unius secundi cadendo describit, est ad dimidiam longitudinem penduli hujus, in duplicata ratione circumferentiae circuli ad diametrum ejus (ut indicavit *Hugenius*) ideoque est pedum Parisiensium 15, dig. 1, lin. 2 $\frac{1}{3}$, seu linearum 2174 $\frac{1}{3}$.

Corpus in circulo, ad distantiam pedum 19695539 a centro, singulis diebus sidereis horarum 23. 56'. 4" uniformiter revolvens, tempore minuti unius secundi describit arcum pedum 1436, 223, cujus sinus versus est pedum 0,05236558, seu linearum 7,54064. Ideoque vis qua gravia descendunt in Latitudine *Lutetiae*, est ad vim centrifugam corporum in Aequatore, a Terrae motu diurno oriundam, ut 2174 $\frac{1}{3}$ ad 7,54064.

Vis centrifuga corporum in Aequatore, est ad vim centrifugam qua corpora directe tendunt a Terra in Latitudine *Lutetiae* graduum 48. 50', in duplicata ratione Radii ad sinum complementi Latitudinis illius, id est, ut 7,54064 ad 3,267. Addatur hæc vis ad vim qua gravia descendunt in Latitudine *Lutetiae*, & corpus in Latitudine *Lutetiae* vi tota gravitatis cadendo, tempore minuti unius secundi describeret lineas 2177, 32, seu pedes Parisienses 15, dig. 1, & lin. 5, 32. Et vis tota gravitatis in Latitudine illa, erit ad vim centrifugam corporum in Aequatore Terræ, ut 2177, 32 ad 7,54064, seu 289 ad 1.

Unde si *APBQ* figuram Terræ designet jam non amplius Sphæricam sed revolutione Ellipseos circum axem minorem *PQ* genitam, sitque *ACQca* canalis aquæ plena, a polo *Qg* ad centrum *Cc*, & inde ad Aequatorem *Aa* pergens: debet pondus aquæ in canalis crure *ACca*, esse ad pondus aquæ in crure altero *QCcg* ut 289 ad 288, eo quod vis centrifuga ex circulari motu orta partem unam e ponderis partibus 289 sustinebit ac detrahet, & pondus 288 in altero crure sustinebit reliquas. Porro (ex Propositionis xci. Corollario secundo, Lib. I.) computationem inuendo, invenio quod si Terra constaret ex uniformi materia, motuque omni privaretur, & esset ejus axis *PQ*




Bbb 2

ad

DE MONDI
SYSTEMATE,

ad diametrum AB ut 100 ad 101: gravitas in loco Q in Terram, foret ad gravitatem in eodem loco Q in Sphæram centro C radio PC vel QC descriptam, ut 126 ad 125. Et eodem argumento gravitas in loco A in Sphæroidem, convolutione Ellipseos $APBQ$ circa axem AB descriptam, est ad gravitatem in eodem loco A in Sphæram centro C radio AC descriptam, ut 125 ad 126. Est autem gravitas in loco A in Terram, media proportionalis inter gravitates in dictam Sphæroidem & Sphæram: propterea quod Sphæra, diminuendo diametrum PQ in ratione 101 ad 100, vertitur in figuram Terræ; & hæc figura diminuendo in eadem ratione diametrum tertiam, quæ diametris duabus AB , PQ perpendicularis est, vertitur in dictam Sphæroidem, & gravitas in A , in casu utroque, diminuitur in eadem ratione quam proxime. Est igitur gravitas in A in Sphæram centro C radio AC descriptam, ad gravitatem in A in Terram ut 126 ad 125 $\frac{1}{2}$, & gravitas in loco Q in Sphæram centro C radio QC descriptam, est ad gravitatem in loco A in Sphæram centro C radio AC descriptam, in ratione diametrorum (per Prop. LXXII. Lib. I.) id est, ut 100 ad 101. Conjungantur jam hæ tres rationes, 126 ad 125, 126 ad 125 $\frac{1}{2}$, & 100 ad 101: & fiet gravitas in loco Q in Terram, ad gravitatem in loco A in Terram, ut $126 \times 126 \times 100$ ad $125 \times 125 \times 101$, seu ut 501 ad 500.



Jam cum (per Corol. 3. Prop. xci. Lib. I.) gravitas in canalis crure utrovis $ACca$ vel $QCcq$ sit ut distantia locorum a centro Terræ; si crura illa superficiebus transversis & æquidistantibus distinguantur in partes totis proportionales, erunt pondera partium singularum in crure $ACca$ ad pondera partium totidem in crure altero, ut magnitudines & gravitates acceleratrices conjunctim; id est, ut 101 ad 100 & 500 ad 501, hoc est, ut 505 ad 501. Ac proinde si vis centrifuga partis cujusque in crure $ACca$ ex motu diurno oriunda, fuisset ad pondus partis ejusdem ut 4 ad 505, eo ut de pondere partis cujusque, in partes 505. diviso, partes quatuor detraheret; manerent pondera in utroque crure æqualia, & propterea fluidum consisteret in æquilibrio. Verum vis centrifuga partis cujusque est ad pondus ejusdem ut 1 ad 289, hoc est, vis centrifuga quæ deberet esse ponderis pars $\frac{1}{289}$. Et

Et propterea dico, secundum Regulam auream, quod si vis centrifuga $\frac{4}{109}$ faciat ut altitudo aquæ in crure *ACca* superet altitudinem aquæ in crure *QCCq* parte centesima totius altitudinis: vis centrifuga $\frac{1}{100}$ faciet ut excessus altitudinis in crure *ACca* sit altitudinis in crure altero *QCCq* pars tantum $\frac{1}{100}$. Est igitur diameter Terræ secundum æquatorem ad ipsius diametrum per polos ut 230 ad 219. Ideoque cum Terræ semidiameter mediocris, juxta mensuram *Cassini*, sit pedum Parisiensium 19695539, seu milliarium 3939 (posito quod milliare sit mensura pedum 5000) Terra altior erit ad Æquatorem quam ad Polos excessu pedum 85820, seu milliarium $17\frac{1}{2}$.

Si Planeta major sit vel minor quam Terra manente ejus densitate ac tempore periodico revolutionis diurnæ, manebit proportio vis centrifugæ ad gravitatem, & propterea manebit etiam proportio diametri inter polos ad diametrum secundum æquatorem. At si motus diurnus in ratione quacunque acceleretur vel retardetur, augebitur vel minuetur vis centrifuga in duplicata illa ratione, & propterea differentia diametrorum augebitur vel minuetur in eadem duplicata ratione quamproxime. Et si densitas Planetæ augeatur vel minuatur in ratione quavis, gravitas etiam in ipsum tendens augebitur vel minuetur in eadem ratione, & differentia diametrorum vicissim minuetur in ratione gravitatis auctæ vel augebitur in ratione gravitatis diminutæ. Unde cum Terra respectu fixarum revolvatur horis 23. 56', Jupiter autem horis 9. 56', sintque temporum quadrata ut 29 ad 5, & densitates ut 5 ad 1: differentia diametrorum Jovis erit ad ipsius diametrum minorem ut $\frac{29}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{225}$ ad 1, seu 1 ad 8 quamproxime. Est igitur diameter Jovis ab oriente in occidentem ducta, ad ejus diametrum inter polos ut 9 ad 8 quamproxime, & propterea diameter inter polos est $35\frac{1}{2}$ ". Hæc ita se habent ex hypothesi quod uniformis sit Planetarum materia. Nam si materia densior sit ad centrum quam ad circumferentiam; diameter quæ ab oriente in occidentem ducitur, erit adhuc major.

Jovis vero diametrum quæ polis ejus interjacet minorem esse diametro altera *Cassinus* dudum observavit, & Terræ diametrum inter polos minorem esse diametro altera patebit per ea quæ dicentur in Propositione sequente.

PROPOSITIO XX. PROBLEMA IV.

*Invenire & inter se comparare Pondera corporum in Terra
hujus regionibus diversis.*

Quoniam pondera inæqualium crurum canalis aqueæ *ACQca* æqualia sunt; & pondera partium, cruribus totis proportionalium & similiter in totis sitarum, sunt ad invicem ut pondera totorum, cruribus similiter sitarum partium reciproce ut crura, id est, reciproce ut 230 ad 229. Et par est ratio homogeneous & æqualium quorumvis & in canalis cruribus similiter sitorum corporum. Horum pondera sunt reciproce ut crura, id est, reciproce ut distantie corporum a centro Terræ. Proinde si corpora in supremis canalium partibus, sive in superficie Terræ consistent; erunt pondera eorum ad invicem reciproce ut distantie eorum a centro. Et eodem argumento pondera, in aliis quibuscunque per totam Terræ superficiem regionibus, sunt reciproce ut distantie locorum a centro; & propterea, ex-Hypothesi quod Terra Sphærois sit, dantur proportione.

Unde tale confit Theorema, quod incrementum ponderis per-gendo ab Æquatore ad Polos, sit quam proxime ut sinus versus Latitudinis duplicatæ, vel, quod perinde est, ut quadratum sinus recti Latitudinis. Et in eadem circiter ratione augentur arcus graduum Latitudinis in Meridiano. Ideoque cum Latitudo *Lutetie Parisiorum* sit 48^{gr.} 50', ea locorum sub Æquatore 00^{gr.} 00', & ea locorum ad Polos 90^{gr.} & duplorum sinus versi sint 11334, 00000 & 20000, existente Radio 10000, & gravitas ad Polum sit ad gravitatem sub Æquatore ut 230 ad 229, & excessus gravitatis ad Polum ad gravitatem sub Æquatore ut 1 ad 229: erit excessus gravitatis in Latitudine *Lutetie* ad gravitatem sub Æquatore, ut $1 \times \frac{11334}{20000}$ ad 229, seu 5667 ad 2290000. Et propterea gravitates totæ in his locis erunt ad invicem ut 2295667 ad 2290000. Quare cum longitudines pendulorum æqualibus temporibus oscillantium sint ut gravitates, & in Latitudine *Lutetie Parisiorum* longitudo penduli singulis minutis secundis oscillantis sit pedum trium Parisiensium & linearum 8 $\frac{1}{2}$: longitudo penduli sub Æquatore superabitur a longitudine synchroni penduli *Parisensis*, excessu lineæ unius & 87 partium millesimarum lineæ. Et simili computo confit Tabula sequens.

Latitudo

<i>Latitudo Locī</i>	<i>Longitudo Penduli</i>		<i>Mensura Gradus unius in Meridiano</i>
Gr.	Ped.	Lin.	Hexaped.
0	3 .	7,468	56909
5	3 .	7,482	56914
10	3 .	7,526	56931
15	3 .	7,596	56959
20	3 .	7,692	56996
25	3 .	7,811	57042
30	3 .	7,948	57096
35	3 .	8,099	57155
40	3 .	8,261	57218
1	3 .	8,294	57231
2	3 .	8,327	57244
3	3 .	8,361	57257
4	3 .	8,394	57270
45	3 .	8,428	57283
6	3 .	8,461	57296
7	3 .	8,494	57309
8	3 .	8,528	57322
9	3 .	8,561	57335
50	3 .	8,594	57348
55	3 .	8,756	57411
60	3 .	8,907	57470
65	3 .	9,044	57524
70	3 .	9,162	57570
75	3 .	9,258	57607
80	3 .	9,329	57635
85	3 .	9,372	57652
90	3 .	9,387	57657

Constat autem per hanc Tabulam, quod graduum inæqualitas tam parva sit, ut in rebus Geographicis figura Terræ pro Sphærica haberi possit, quodque inæqualitas diametrorum Terræ facilius & certius per experimenta pendulorum deprehendi possit vel etiam per Eclipses Lunæ, quam per arcus Geographicæ mensuratos in Meridiano.

Hæc

DE MUNDI
SYSTEMATE,

Hæc ita se habent ex hypothesi quod Terra ex uniformi materia constat. Nam si materia ad centrum paulo densior sit quam ad superficiem, differentię pendulorum & graduum Meridiani paulo majores erunt quam pro Tabula præcedente, propterea quod si materia ad centrum redundans qua densitas ibi major redditur, subducatur & seorsim spectetur, gravitas in Terram reliquam uniformiter densam, erit reciproce ut distantia ponderis a centro; in materiam vero redundantem reciproce ut quadratum distantię a materia illa quamproxime. Gravitas igitur sub æquatore minor est in materiam illam redundantem quam pro computo superiore: & propterea Terra ibi, propter defectum gravitatis, paulo altius ascendet, & excessus longitudinum Pendulorum & graduum ad polos paulo majores erunt quam in præcedentibus definitum est.

Jam vero Astronomi aliqui in longinquas regiones ad observationes Astronomicas faciendas missi, invenerunt quod horologia oscillatoria tardius moverentur prope Æquatorem quam in regionibus nostris. Et primo quidem *D. Richer* hoc observavit anno 1672 in insula *Cayennæ*. Nam dum observaret transitum Fixarum per meridianum mense *Augusto*, reperit horologium suum tardius moveri quam pro medio motu Solis, existente differentia 2'. 28" singulis diebus. Deinde faciendo ut Pendulum simplex ad minuta singula secunda per horologium optimum mensurata oscillaret, notavit longitudinem Penduli simplicis, & hoc fecit sæpius singulis septimanis per menses decem. Tum in *Galliam* redux contulit longitudinem hujus Penduli cum longitudine Penduli *Parisiensis* (quæ erat trium pedum Parisiensium, & octo linearum cum tribus quintis partibus lineæ) & reperit breviorē esse, existente differentia lineæ unius cum quadrante. At ex tarditate horologii oscillatorii in *Cayennæ*, differentia Pendulorum colligitur esse lineæ unius cum semisse.

Postea *Halleius* noster circa annum 1677 ad insulam *S^{te} Helenæ* navigans, reperit horologium suum oscillatorium ibi tardius moveri quam *Londini*, sed differentiam non notavit. Pendulum vero brevius reddidit plusquam octava parte digiti, seu lineæ una cum semisse. Et ad hoc efficiendum, cum longitudo cochleæ in ima parte penduli non sufficeret, annulum ligneum thecæ cochleæ & ponderi pendulo interposuit.

Deinde anno 1682 *D. Varin* & *D. Des Hayes* invenerunt longitudinem Penduli singulis minutis secundis oscillantis in Observatorio

vatorio Regio *Parisiensis* esse ped. 3. lin. 8 $\frac{1}{2}$. Et in insula *Gorea* eadem methodo longitudinem Penduli synchroni invenerunt esse ped. 3. lin. 6 $\frac{1}{2}$, existente longitudinum differentia lin. 2. Et eodem anno ad insulas *Guadaloupam* & *Martinicam* navigantes, invenerunt longitudinem Penduli tynchroni in his insulis esse ped. 3. lin. 6 $\frac{1}{2}$. LIBER
TERTIUS

Posthac *D. Couplet* filius anno 1697 mense *Julio*, horologium suum oscillatorium ad motum Solis medium in Observatorio Regio *Parisiensi* sic aptavit, ut tempore satis longo horologium cum motu Solis congrueret. Deinde *Ulyssipponem* navigans invenit quod mense *Novembri* proximo horologium tardius iret quam prius, existente differentia 2' 13" in horis 24. Et mense *Martio* sequente *Paraibam* navigans invenit ibi horologium suum tardius ire quam *Parisiis*, existente differentia 4' 12" in horis 24. Et affirmat Pendulum ad minuta secunda oscillans brevius fuisse *Ulyssipponi* lineis 2 $\frac{1}{2}$ & *Paraibæ* lineis 3 $\frac{1}{2}$ quam *Parisiis*. Rectius potuisset differentias esse 1 $\frac{1}{2}$ & 2 $\frac{1}{2}$. Nam hæ differentiæ differentiis temporum 2'. 13", & 4'. 12" respondent. Crassioribus hujus Observationibus minus fidendum est.

Annis proximis (1699 & 1700) *D. Des Hayes* ad *Americam* denuo navigans, determinavit quod in insulis *Cayennæ* & *Granadæ* longitudo Penduli ad minuta secunda oscillantis, esset paulo minor quam ped. 3. lin. 6 $\frac{1}{2}$, quodque in insula *S. Christophori* longitudo illa esset ped. 3. lin. 6 $\frac{1}{2}$, & quod in insula *S. Dominici* eadem esset ped. 3. lin. 7.

Annoque 1704. *P. Feuilleus* invenit in *Porto-belo* in *America* longitudinem Penduli ad minuta secunda oscillantis, esse pedum trium *Parisiensium* & linearum tantum 5 $\frac{1}{2}$, id est tribus fere lineis brevioriorem quam *Lutetiæ Parisorum*, sed errante Observatione. Nam deinde ad insulam *Martinicam* navigans, invenit longitudinem Penduli isochroni esse pedum tantum trium *Parisiensium* & linearum 5 $\frac{1}{2}$.

Latitudo autem *Paraibæ* est 6^{gr}. 38' ad austrum, & ea *Porto-beli* 9^{gr}. 33' ad boream, & Latitudines insularum *Cayennæ*, *Goreæ*, *Guadaloupæ*, *Martinicæ*, *Granadæ*, *Sⁿⁱ. Christophori*, *Sⁿⁱ. Dominici* sunt respective 4^{gr}. 55', 14^{gr}. 40', 14^{gr}. 00', 14^{gr}. 44', 12^{gr}. 6', 17^{gr}. 19', & 19^{gr}. 48' ad boream. Et excessus longitudinis Penduli *Parisiensis* supra longitudes Pendulorum isochronorum in his latitudinibus observatas, sunt paulo majores quam pro Tabula longitudinum Penduli superius computata. Et propterea Terra aliquanto altior est sub *Æquatore* quam pro superiore calculo,

DE MUNDI culo, & densior ad centrum quam in fodinis prope superficiem, nisi
SYSTEMATE, forte calores in Zona torrida longitudinem Pendulorum aliquantulum
auxerint.

Observavit utique *D. Picartus* quod virga ferrea, quæ tempore hyberno ubi gelabant frigora erat pedis unius longitudine, ad ignem calefacta evasit pedis unius cum quarta parte lineæ. Deinde *D. de la Hire* observavit quod virga ferrea quæ tempore consimili hyberno sex erat pedum longitudinis, ubi Soli æstivo exponebatur evasit sex pedum longitudinis cum duabus tertiis partibus lineæ. In priore casu calor major fuit quam in posteriore, in hoc vero major fuit quam calor externarum partium corporis humani. Nam metalla ad Solem æstivum valde incallescunt. At virga penduli in horologio oscillatorio nunquam exponi solet calori Solis æstivi, nunquam calorem concipit calori externæ superficiei corporis humani æqualem. Et propterea virga Penduli in horologio tres pedes longa, paulo quidem longior erit tempore æstivo quam hyberno, sed excessu quartam partem lineæ unius vix superante. Proinde differentia tota longitudinis pendulorum quæ in diversis regionibus isochrona sunt, diverso calori attribui non potest. Sed neque erroribus Astronomorum è *Gallia* missorum tribuenda est hæc differentia. Nam quamvis eorum observationes non perfecte congruant inter se, tamen errores sunt adeo parvi ut contemni possint. Et in hoc concordant omnes, quod isochrona pendula sunt breviora sub Æquatore quam in Observatorio Regio *Parisiensi*, existente differentia duarum circiter linearum seu sextæ partis digiti. Per observationes *D. Richer* in *Cayenna* factas, differentia fuit lineæ unius cum semisse. Error semissis lineæ facile committitur. Et *D. des Hayes* postea per observationes suas in eadem insula factas errorem correxit, inventa differentia linearum $2\frac{1}{4}$. Sed & per observationes in insulis *Gorea*, *Guadaloupa*, *Martinica*, *Granada*, *S. Christophori*, & *S. Dominici* factas & ad Æquatorem reductas, differentia illa prodiit haud minor quam $1\frac{1}{2}$ lineæ, haud major quam $2\frac{1}{2}$ linearum. Et inter hos limites quantitas mediocris est $2\frac{1}{2}$ linearum. Propter calores locorum in Zona torrida negligamus $\frac{1}{2}$ partes lineæ, & manebit differentia duarum linearum.

Quare cum differentia illa per Tabulam præcedentem, ex hypothesis quod Terra ex materia uniformiter densa constet, sit tantum $1\frac{17}{32}$ lineæ: excessus altitudinis Terræ ad æquatorem supra altitudinem ejus ad polos, qui erat milliarium $17\frac{1}{2}$, jam auctus in
ratione

ratione differentiarum, fiet milliarium 317 $\frac{1}{2}$. Nam tarditas Penduli sub Æquatore defectum gravitatis arguit; & quo levior est materia eo major esse debet altitudo ejus, ut pondere suo materiam sub Polis in æquilibrio sustineat.

Hinc figura umbræ Terræ per Eclipses Lunæ determinanda, non erit omnino circularis, sed diameter ejus ab oriente in occidentem ducta major erit quam diameter ejus ab austro in boream ducta, excessu 55" circiter. Et parallaxis maxima Lunæ in Longitudinem paulo major erit quam ejus parallaxis maxima in Latitudinem. Ac Terræ semidiameter maxima erit pedum Parisiensium 19767630, minima pedum 19609820 & mediocris pedum 19688725 quamproxime.

Cum gradus unus mensurante *Picarto* sit hexapedarum 57060, mensurante vero *Cassino* sit hexapedarum 57292: suspicantur aliqui gradum unumquemque, pergendo per *Gallias* austrum versus majorem esse gradu præcedente hexapedis plus minus 72, seu parte octingentesima gradus unius; existente Terra Sphæroide oblonga cujus partes ad polos sunt altissimæ. Quo posito, corpora omnia ad Polos Terræ leviora forent quam ad Æquatorem, & altitudo Terræ ad polos superaret altitudinem ejus ad æquatorem milliariis fere 95, & pendula isochrona longiora forent ad Æquatorem quam in Observatorio Regio *Parisiensi* excessu semissis digiti circiter; ut conferenti proportionibus hic positas cum proportionibus in Tabula præcedente positis, facile constabit. Sed & diameter umbræ Terræ quæ ab austro in boream ducitur, major foret quam diameter ejus quæ ab oriente in occidentem ducitur, excessu 2'. 46", seu parte duodecima diametri Lunæ. Quibus omnibus Experientia contrariatur. Certe *Cassinus*, definiendo gradum unum esse hexapedarum 57292, medium inter mensuras suas omnes, ex hypothesi de æqualitate graduum assumpsit. Et quamvis *Picartus* in *Galliæ* limite boreali invenit gradum paulo minorem esse, tamen *Norwoodus* noster in Regionibus magis borealibus, mensurando majus intervallum, invenit gradum paulo majorem esse quam *Cassinus* invenerat. Et *Cassinus* ipse mensuram *Picarti*, ob parvitatem intervalli mensurati, non satis certam & exactam esse judicavit ubi mensuram gradus unius per intervallum longe majus definire aggressus est. Differentiæ vero inter mensuras *Cassini*, *Picarti*, & *Norwoodi* sunt prope insensibiles, & ab insensibilibus observationum erroribus facile oriri potuere, ut Nutationem axis Terræ præteream.

PROPOSITIO XXI. THEOREMA XVII.

*Puncta Æquinoctialia regredi, & axem Terræ singulis revolutionibus annuis nutando bis inclinari in Eclipticam
& bis redire ad positionem priorem.*

Patet per Corol. 20. Prop. LXVI. Lib. I. Motus tamen iste nutandi perexiguus esse debet, & vix aut ne vix quidem sensibilis.

PROPOSITIO XXII. THEOREMA XVIII.

Motus omnes Lunares, omnesque motuum inæqualitates ex allatis Principiis consequi.

Planetas majores, interea dum circa Solem feruntur, posse alios minores circum se revolventes Planetas deferre, & minores illos in Ellipsis, umbilicos in centris majorum habentibus, revolvi debere patet per Prop. LXV. Lib. I. Actione autem Solis perturbantur eorum motus multimode, iisque adficientur inæqualitates quæ in Luna nostra notantur. Hæc utique (per Corol. 2, 3, 4, & 5. Prop. LXVI.) velocius movetur, ac radio ad Terram ducto describit aream pro tempore majorem, Orbemque habet minus curvum, atque adeo propius accedit ad Terram, in Syzygiis quam in Quadraturis, nisi quatenus impedit motus Eccentricitatis. Eccentricitas enim maxima est (per Corol. 9. Prop. LXVI.) ubi Apogæum Lunæ in Syzygiis versatur, & minima ubi idem in Quadraturis consistit; & inde Luna in Perigæo velocior est & nobis propior, in Apogæo autem tardior & remotior in Syzygiis quam in Quadraturis. Progreditur insuper Apogæum, & regrediuntur Nodi, sed motu inæquabili. Et Apogæum quidem (per Corol. 7. & 8. Prop. LXVI.) velocius progreditur in Syzygiis suis, tardius regreditur in Quadraturis, & excessu progressus supra regressum annuatim fertur in consequentia. Nodi autem (per Corol. 11. Prop. LXVI.) quiescunt in Syzygiis suis, & velocissime regrediuntur in Quadraturis. Sed & major est Lunæ latitudo maxima in ipsius Quadraturis (per Corol. 10. Prop. LXVI.) quam in Syzygiis: & motus medius tardior in Perihelio Terræ (per Corol. 6. Prop.

Prop. LXVI.) quam in ipsius Aphelio. Atque hæ sunt inæqualitates insigniores ab Astronomis notatæ. LIBER,
TERTIUS.

Sunt etiam aliæ quædam nondum observatæ inæqualitates, quibus motus Lunares adeo perturbantur, ut nulla hæcenus lege ad Regulam aliquam certam reduci potuerint. Velocitates enim seu motus horarii Apogæi & Nodorum Lunæ, & eorundem æquationes, ut & differentia inter Eccentricitatem maximam in Syzygiis & minimam in Quadraturis, & inæqualitas quæ Variatio dicitur, augentur ac diminuuntur annuatim (per Corol. 14. Prop. LXVI.) in triplicata ratione diametri apparentis Solaris. Et Variatio præterea augetur vel diminuitur in duplicata ratione temporis inter quadraturas quam proxime (per Corol. 1. & 2. Lem. X. & Corol. 16. Prop. LXVI. Lib. I.) Sed hæc inæqualitas in calculo Astronomico, ad Prosthaphæresin Lunæ referri solet, & cum ea confundi.

PROPOSITIO XXIII. PROBLEMA V.

Motus inæquales Satellitum Jovis & Saturni à motibus Lunaribus derivare.

Ex motibus Lunæ nostræ motus analogi Lunarum seu Satellitum Jovis sic derivantur. Motus medius Nodorum Satellitis extimi Jovialis, est ad motum medium Nodorum Lunæ nostræ, in ratione composita ex ratione duplicata temporis periodici Terræ circa Solem ad tempus periodicum Jovis circa Solem, & ratione simplici temporis periodici Satellitis circa Jovem ad tempus periodicum Lunæ circa Terram: (per Corol. 16. Prop. LXVI.) adeoque annis centum conficit Nodus iste $8^{\text{re}} 24'$ in antecedentia. Motus medii Nodorum Satellitum interiorum sunt ad motum hujus, ut illorum tempora periodica ad tempus periodicum hujus, per idem Corollarium, & inde dantur. Motus autem Augis Satellitis cujusque in consequentia, est ad motum Nodorum ipsius in antecedentia, ut motus Apogæi Lunæ nostræ ad hujus motum Nodorum, (per idem Corol.) & inde datur. Diminui tamen debet motus Augis sic inventus in ratione 5 ad 9 vel 1 ad 2 circiter, ob causam quam hic exponere non vacat. Æquationes maximæ Nodorum & Augis Satellitis cujusque fere sunt ad æquationes maximas Nodorum & Augis Lunæ respectivæ, ut motus Nodorum & Augis Satellitum tempore unius revolutionis æquationum priorum,

DE MUNDI
SYSTEMATE, rum, ad motus Nodorum & Apogæi Lunæ tempore unius revo-
lutionis æquationum posteriorum. Variatio Satellitis è Jove spec-
tati, est ad Variationem Lunæ, ut sunt ad invicem toti motus No-
dorum temporibus quibus Satelles & Luna ad Solem revolvuntur,
per idem Corollarium; adeoque in Satellite extimo non superat
5". 12'''.

PROPOSITIO XXIV. THEOREMA XIX.

*Fluxum & refluxum Maris ab actionibus Solis ac
Lunæ oriri.*

Mare singulis diebus tam Lunaribus quam Solaribus bis intumescere debere ac bis defluere, patet per Corol. 19. Prop. LXVI. Lib. I. ut & aquæ maximam altitudinem, in maribus profundis & liberis, appulsu Luminarium ad Meridianum loci, minori quam sex horarum spatio sequi, uti fit in Maris *Atlantici* & *Ethiopici* tractu toto orientali inter *Galliam* & Promontorium *Bonæ Spei*, ut & in Maris *Pacifici* littore *Chilensi* & *Peruviano*: in quibus omnibus littoribus æstus in horam circiter tertiam incidit, nisi ubi motus per loca vadosa propagatus aliquantulum retardatur. Horas numero ab appulsu Luminaris utriusque ad Meridianum loci, tam infra Horizontem quam supra, & per horas diei Lunaris intelligo vigesimas quartas partes temporis quo Luna motu apparente diurno ad Meridianum loci revolvitur.

Motus autem bini, quos Luminaria duo excitant, non cernentur distincte, sed motum quendam mixtum efficient. In Luminarium Conjunctione vel Oppositione conjunguntur eorum effectus, & componetur fluxus & refluxus maximus. In Quadraturis Sol attollet aquam ubi Luna deprimit, deprimetque ubi Sol attollit; & ex effectuum differentia æstus omnium minimus orietur. Et quoniam, experientia teste, major est effectus Lunæ quam Solis, incidet aquæ maxima altitudo in horam tertiam Lunarem. Extra Syzygias & Quadraturas, æstus maximus qui sola vi Lunari incidere semper deberet in horam tertiam Lunarem, & sola Solari in tertiam Solarem, compositis viribus incidet in tempus aliquod intermedium quod tertiæ Lunari propinquius est, adeoque in transitu Lunæ a Syzygiis ad Quadraturas, ubi hora tertia Solaris præcedit tertiam Lunarem, maxima aquæ altitudo præcedet etiam
tertiam

tertiam Lunarem, idque maximo intervallo paulo post Octantes Lunæ; & paribus intervallis æstus maximus sequetur horam tertiam Lunarem in transitu Lunæ a Quadraturis ad Syzygias, Hæc ita sunt in Mari aperto. Nam in ostiis Fluviorum fluxus majores cæteris paribus tardius ad *apex* venient.

Pendent autem effectus Luminarium ex eorum distantii a Terra. In minoribus enim distantii majores sunt eorum effectus, in majoribus minores, idque in triplicata ratione diametrorum apparentium. Igitur Sol tempore hyberno, in Perigæo existens, majores edit effectus, efficitque ut æstus in Syzygiis paulo majores sint, & in Quadraturis paulo minores (cæteris paribus) quam tempore æstivo; & Luna in Perigæo singulis mensibus majores ciet æstus quam ante vel post dies quindecim, ubi in Apogæo versatur. Unde fit ut æstus duo omnino maximi in Syzygiis continuis se mutuo non sequantur.

Pendet etiam effectus utriusque Luminaris ex ipsius Declinatione seu distantia ab Æquatore. Nam si Luminare in polo constitueretur, traheret illud singulas aquæ partes constanter, absque actionis intensione & remissione, adeoque nullam motus reciprocationem cieret. Igitur Luminaria recedendo ab Æquatore polum versus, effectus suos gradatim amittent, & propterea minores ciebunt æstus in Syzygiis Solstitialibus quam in Æquinoctialibus. In Quadraturis autem Solstitialibus majores ciebunt æstus quam in Quadraturis Æquinoctialibus; eo quod Lunæ jam in Æquatore constitutæ effectus maxime superat effectum Solis. Incidunt igitur æstus maximi in Syzygiis & minimi in Quadraturis Luminarium, circa tempora Æquinoctii utriusque. Et æstum maximum in Syzygiis comitatur semper minimus in Quadraturis, ut experientia compertum est. Per minorem autem distantiam Solis a Terra, tempore hyberno quam tempore æstivo, fit ut æstus maximi & minimi sæpius præcedant Æquinoctium vernum quam sequantur, & sæpius sequantur autumnale quam præcedant.

Pendent etiam effectus Luminarium ex locorum latitudine. Designet *A p E P* Tellurem aquis profundis undique coopertam; *C* Centrum ejus; *P, p* polos; *AE* Æquatorem; *F* locum quemvis extra Æquatorem; *F f* parallelum loci; *D d* parallelum ei respondentem ex altera parte Æquatoris; *L* locum quem Luna tribus ante horis occupabat; *H* locum Telluris ei perpendiculariter subiectum

DE MUNDI
SYSTEMATE,

subiectum; b locum huic oppositum; K, k loca inde gradibus 90 distantia, CH, Cb Maris altitudines maximas mensuratas a centro Telluris; & CK, Ck altitudines minimas: & si axibus Hb, Kk describatur Ellipsis, deinde Ellipseos hujus revolutionē circa axem majorem Hb describatur Sphærois $HPKbpk$; designabit hæc figuram Maris quam proxime, & erunt CF, Cf, CD, Cd altitudines Maris in locis F, f, D, d . Quinetiam si in præfata Ellipseos revolutione punctum quodvis N describat circulum NM , secantem parallelos Ff, Dd in locis quibusvis R, T , & æquatorem AE in S ; erit CN altitudo Maris



in locis omnibus R, S, T , sitis in hoc circulo. Hinc in revolutione diurna loci cujuscvis F , affluxus erit maximus in F , hora tertia post appulsus Lunæ ad Meridianum supra Horizontem; postea defluxus maximus in Q hora tertia post occasum Lunæ; dein affluxus maximus in f hora tertia post appulsus Lunæ ad Meridianum infra Horizontem; ultimo defluxus maximus in Q hora tertia post ortum Lunæ; & affluxus posterior in f erit minor quam affluxus prior in F . Distinguitur enim Mare totum in duos omnino fluctus Hemisphæricos, unum in Hemisphærio $KHkC$ ad Boream vergentem, alterum in Hemisphærio opposito $Kbkc$; quos igitur fluctum Borealem & fluctum Australem nominare licet. Hi fluctus semper sibi mutuo oppositi, veniunt per vices ad Meridianos locorum singulorum, interposito intervallo horarum Lunarium duodecim. Cumque regiones Boreales magis participant fluctum Borealem, & Australes magis Australem, inde oriuntur æstus alternis vicibus majores & minores, in locis singulis extra Æquatorem, in quibus Luminaria oriuntur & occidunt. Æstus autem major, Luna in verticem loci declinante, incidet in horam circiter tertiam post appulsus Lunæ ad Meridianum supra Horizontem, & Luna declinationem mutante revertitur in minorem. Et fluxuum differentia maxima incidet in tempora Solstitiorum; præsertim si Lunæ Nodus ascendens versatur in principio Arietis. Sic experientia compertum est, quod æstus matutini tempore hyberno superent vespertinos & vespertini tempore

pore æstivo matutinos, ad *Plymuthum* quidem altitudine quasi pedis unius, ad *Bristoliam* vero altitudine quindecim digitorum: observantibus *Colepressio* & *Sturmio*. LIBER
TERTIUS

Motus autem hæcenus descripti mutantur aliquantulum per vim illam reciprocationis aquarum, qua Maris æstus, etiam cessantibus Luminarium actionibus, posset aliquamdiu perseverare. Conservatio hæcce motus impressi minuit differentiam æstuum alternorum; & æstus proxime post Syzygias majores reddit, eosque proxime post Quadraturas minuit. Unde fit ut æstus alterni ad *Plymuthum* & *Bristoliam* non multo magis differant ab invicem quam altitudine pedis unius vel digitorum quindecim; utque æstus omnium maximi in iisdem portubus, non sint primi a Syzygiis, sed tertii. Retardantur etiam motus omnes in transitu per vada, adeo ut æstus omnium maximi, in fretis quibusdam & Fluviorum ostiis, sint quarti vel etiam quinti a Syzygiis.

Porro fieri potest ut æstus propagetur ab Oceano per freta diversa ad eundem portum, & citius transeat per aliqua freta quam per alia: quo in casu æstus idem, in duos vel plures successive advenientes divisus, componere possit motus novos diverforum generum. Fingamus æstus duos æquales a diversis locis in eundem portum venire, quorum prior præcedat alterum spatio horarum sex, incidatque in horam tertiam ab appulsu Lunæ ad Meridianum portus. Si Luna in hocce suo ad Meridianum appulsu versabatur in Æquatore, venient singulis horis senis æquales affluxus, qui in mutuos refluxus incidendo eosdem affluxibus æquabunt, & sic spatio diei illius efficient ut aqua tranquille stagnet. Si Luna tunc declinabat ab Æquatore, fient æstus in Oceano vicibus alternis majores & minores, uti dictum est; & inde propagabuntur in hunc portum affluxus bini majores & bini minores, vicibus alternis. Affluxus autem bini majores component aquam altissimam in medio inter utrumque, affluxus major & minor faciet ut aqua ascendat ad mediocrem altitudinem in Medio ipsorum, & inter affluxus binos minores aqua ascendet ad altitudinem minimam. Sic spatio viginti quatuor horarum, aqua non bis ut fieri solet, sed semel tantum perveniet ad maximam altitudinem & semel ad minimam; & altitudo maxima, si Luna declinat in polum supra Horizontem loci, incidet in horam vel sextam vel tricesimam ab appulsu Lunæ ad Meridianum, atque Luna declinationem mutante mutabitur in defluxum. Quorum omnium exemplum, in portu regni *Tunquini* ad *Batsbam* sub latitudine

D d d

Boreali

DE MUNDI
SYSTEMATE


Boreali 20^{te} 50'. *Halleius* ex Nautarum Observationibus patefecit. Ibi aqua die transitum Lunæ per Æquatorem sequente stagnat, dein Luna ad Boream declinante incipit fluere & refluere, non bis, ut in aliis portubus, sed semel singulis diebus, & æstus incidit in occasum Lunæ, defluxus maximus in ortum. Cum Lunæ declinatione augetur hic æstus, usque ad diem septimum vel octavum, dein per alios septem dies iisdem gradibus decrescit, quibus antea creverat; & Luna declinationem mutante cessat, ac mox mutatur in defluxum. Incidit enim subinde defluxus in occasum Lunæ & affluxus in ortum, donec Luna iterum mutet declinationem. Aditus ad hunc portum fretaque vicina duplex patet, alter ab Oceano *Sinenfi* inter Continentem & Insulam *Luconiam*, alter a Mari *Indico* inter Continentem & Insulam *Borneo*. An æstus spatio horarum duodecim a Mari *Indico*, & spatio horarum sex a Mari *Sinenfi* per freta illa venientes, & sic in horam tertiam & novam Lunarem incidentes, component hujusmodi motus; sitne alia Marium illorum conditio, observationibus vicinorum littorum determinandum relinquo.

Hactenus causas motuum Lunæ & Marium reddidi. De quantitate, motuum jam convenit aliqua subungere.

PROPOSITIO XXV. PROBLEMA VI.

Invenire vires Solis ad perturbandos motus Luna.

Designet *S* Solem, *T* Terram, *P* Lunam, *PADB* orbem Lunæ. In *SP* capiatur *SK* æqualis *ST*; sitque *SL* ad *SK*



in duplicata ratione *SK* ad *SP*, & ipsi *PT* agatur parallela *LM*; & si gravitas acceleratrix Terræ in Solem exponatur per distantiam *ST* vel *SK*, erit *SL* gravitas acceleratrix Lunæ in Solem.

Solem: Ea componitur ex partibus SM , LM , quarum LM & ipsius SM pars TM perturbatur motum Lunæ, ut in Libri primi Prop. LXVI. & ejus Corollariis expositum est. Quatenus Terra & Luna circum commune gravitatis centrum revolvuntur, perturbabitur etiam motus Terræ circa centrum illud a viribus consimilibus; sed summas tam virium quam motuum referre licet ad Lunam, & summas virium per lineas ipsis analogas TM & ML designare. Vis ML (in mediocri sua quantitate) est ad vim centripetam, qua Luna in Orbe suo circa Terram quiescentem ad distantiam PT revolvi posset, in duplicata ratione temporum periodicorum Lunæ circa Terram & Terræ circa Solem, (per Corol. 17. Prop. LXVI. Lib. I.) hoc est, in duplicata ratione dierum 27. hor. 7. min. 43. ad dies 365. hor. 6. min. 9. id est, ut 1000. ad 178725, seu 1 ad 178 $\frac{2}{3}$. Invenimus autem in Propositione quarta quod, si Terra & Luna circa commune gravitatis centrum revolvantur, earum distantia mediocris ab invicem erit 60 $\frac{1}{2}$ semidiametrorum mediocrium Terræ quamproxime. Et vis qua Luna in Orbe circa Terram quiescentem, ad distantiam PT semidiametrorum terrestrium 60 $\frac{1}{2}$ revolvi posset, est ad vim, qua eodem tempore ad distantiam semidiametrorum 60 revolvi posset, ut 60 $\frac{1}{2}$ ad 60; & hæc vis ad vim gravitatis apud nos ut 1 ad 60 \times 60 quamproxime. Ideoque vis mediocris ML est ad vim gravitatis in superficie Terræ, ut 1 \times 60 $\frac{1}{2}$ ad 60 \times 60 \times 178 $\frac{2}{3}$, seu 1 ad 638092.6. Unde ex proportionem linearum TM , ML , datur etiam vis TM : & hæc sunt vires Solis quibus Lunæ motus perturbantur.

Q. E. I.

PROPOSITIO XXVI. PROBLEMA VII.

Invenire incrementum horarium areæ quam Luna, radio ad Terram ducto, in Orbe circulari describit.

Diximus aream, quam Luna radio ad Terram ducto describit, esse temporis proportionalem, nisi quatenus motus Lunaris ab actione Solis turbatur. Inæqualitatem momenti (vel incrementi horarii) hic investigandam proponimus. Ut computatio facilior reddatur, fingamus orbem Lunæ circularem esse, & inæqualitates omnes negligamus, ea sola excepta, de qua hic agitur. Ob ingentem vero Solis distantiam, ponamus etiam lineas SP , ST sibi invicem parallelas esse. Hoc pacto vis LM reducetur semper ad

summa genita, id est, ut acceleratio descriptionis areæ CTP , seu incrementum momenti. Vis qua Luna circa Terram quiescentem ad distantiam TP , tempore suo periodico $CADB C$ dierum 27. hor. 7. min. 43. revolvi posset, efficeret ut corpus, tempore CT cadendo, describeret longitudinem $\frac{1}{2}CT$, & velocitatem simul acquireret æqualem velocitati, qua Luna in Orbe suo movetur. Patet hoc per Corol. 9. Prop. IV. Lib. I. Cum autem perpendicularum Kd in TP demissum sit ipsius EL pars tertia, & ipsius TP seu ML in Octantibus pars dimidia, vis EL in Octantibus, ubi maxima est, superabit vim ML in ratione 3 ad 2, adeoque erit ad vim illam, qua Luna tempore suo periodico circa Terram quiescentem revolvi posset, ut 100 ad $\frac{1}{3} \times 17872\frac{1}{2}$ seu 11915, & tempore CT velocitatem generare deberet quæ esset pars $\frac{100}{11915}$ velocitatis Lunaræ, tempore autem CPA velocitatem majorem generaret in ratione CA ad CT seu TP . Exponatur vis maxima EL in Octantibus per aream $FK \times Kk$ rectangulo $\frac{1}{2}TP \times Pp$ æqualem. Et velocitas, quam vis maxima tempore quovis CP generare posset, erit ad velocitatem quam vis omnis minor EL eodem tempore generat, ut rectangulum $\frac{1}{2}TP \times CP$ ad aream $KCGF$; tempore autem toto CPA , velocitates genitæ erunt ad invicem ut rectangulum $\frac{1}{2}TP \times CA$ & triangulum $TG C$, sive ut arcus quadrantalæ CA & radius TP . Ideoque (per Prop. IX. Lib. V. Elem.) velocitas posterior, toto tempore genita, erit pars $\frac{100}{11915}$ velocitatis Lunæ. Huic Lunæ velocitati, quæ areæ momento mediocri analoga est, addatur & auferatur dimidium velocitatis alterius; & si momentum mediocre exponatur per numerum 11915, summa 11915 + 50, seu 11965 exhibebit momentum maximum areæ in Syzygia A , ac differentia 11915 - 50 seu 11865 ejusdem momentum minimum in Quadraturis. Igitur areæ temporibus æqualibus in Syzygiis & Quadraturis descriptæ, sunt ad invicem ut 11965 ad 11865. Ad momentum minimum 11865 addatur momentum, quod fit ad momentorum differentiam 100 ut Trapezium $FKCG$ ad triangulum $TG C$ (vel quod perinde est, ut quadratum Sinus PK ad quadratum Radii TP , id est, ut Pd ad TP) & summa exhibebit momentum areæ, ubi Luna est in loco quovis intermedio P .

Hæc omnia ita se habent, ex Hypothesi quod Sol & Terra quiescunt, & Luna tempore Synodico dierum 27. hor. 7. min. 43. revolvitur. Cum autem periodus Synodica Lunaræ vere sit die-

DE MUNDI
SYSTEMATE,

rum 29. hor. 12. & min. 44. augeri debent momentorum incrementa in ratione temporis, id est, in ratione 1080853 ad 1000000. Hoc pacto incrementum totum, quod erat pars $\frac{11023}{11023}$, momenti mediocris, jam fiet ejusdem pars $\frac{100}{11023}$. Ideoque momentum areæ in Quadratura Lunæ erit ad ejus momentum in Syzygia ut 11023 — 50 ad 11023 + 50, seu 10973 ad 11073, & ad ejus momentum, ubi Luna in alio quovis loco intermedio P versatur, ut 10973 ad 10973 + P , existente videlicet TP æquali 100.

Area igitur, quam Luna radio ad Terram ducto singulis temporis particulis æqualibus describit, est quam proxime ut summa numeri 219, 46 & sinus versæ duplicatæ distantiae Lunæ a Quadratura proxima, in circulo cujus radius est unitas. Hæc ita se habent ubi Variatio in Octantibus est magnitudinis mediocris. Sin Variatio ibi major sit vel minor, augeri debet vel minui Sinus ille versus in eadem ratione.

PROPOSITIO XXVII. PROBLEMA VIII.

Ex motu horario Lunæ invenire ipsius distantiam a Terra.

Area, quam Luna radio ad Terram ducto, singulis temporis momentis, describit, est ut motus horarius Lunæ & quadratum distantiae Lunæ a Terra conjunctim; & propterea distantia Lunæ a Terra est in ratione composita ex subduplicata ratione Areæ directæ & subduplicata ratione motus horarii inverse. *Q. E. I.*

Corol. 1. Hinc datur Lunæ diameter apparens: quippe quæ sit reciproce ut ipsius distantia a Terra. Tentent Astronomi quam probe hæc Regula cum Phænomenis congruat.


Corol. 2. Hinc etiam Orbis Lunarum accuratius ex Phænomenis quam antehac definiri potest.

PROPOSITIO XXVIII. PROBLEMA IX.

Invenire diametros Orbis in quo Luna, absque eccentricitate, moveri deberet.

Curvatura Trajectoriæ, quam mobile, si secundum Trajectoriæ illius perpendiculum trahatur, describit, est ut attractio directæ & quadratum velocitatis inverse. Curvaturas linearum pono esse inter

ter se in ultima proportionē Sinuum vel Tangentium angulorum
 contactuum ad radios æquales pertinentium ubi radii illi in infi-
 nitum diminuuntur. Attractio autem Lunæ in Terram in Syzygiis est
 excessus gravitatis ipsius in Terram supra vim Solarem 2 PK (Vi-
 de *Figur. pag. 394.*) qua gravitas acceleratrix Lunæ in Solem su-
 perat gravitatem acceleratricem Terræ in Solem. In Quadratu-
 ris autem attractio illa est summa gravitatis Lunæ in Terram &
 vis Solaris KT , qua Luna in Terram trahitur. Et hæ attrac-
 tiones, si $\frac{AT+CT}{2}$ dicatur N , sunt ut $\frac{178725}{ATq} - \frac{2000}{CT \times N}$ &
 $\frac{178725}{CTq} \times \frac{1000}{AT \times N}$ quam proxime; seu ut $178725 N \times CTq$
 $- 2000 ATq \times CT$ & $178725 N \times ATq + 1000 CTq \times AT$. Nam
 si gravitas acceleratrix Lunæ in Terram exponatur per numerum
 178725 , vis mediocris ML , quæ in Quadraturis est PT vel TK ,
 & Lunam trahit in Terram, erit 1000, & vis mediocris
 TM in Syzygiis erit 3000; de qua, si vis mediocris ML
 subducatur, manebit vis 2000 qua Luna in Syzygiis distra-
 hitur a Terra, quamque jam ante nominavi 2 PK . Velo-
 citas autem Lunæ in Syzygiis $A \& B$ est ad ipsius velocita-
 tem in Quadraturis $C \& D$, ut CT ad AT & momentum
 aræ quam Luna radio ad Terram ducto describit in Sy-
 zygiis ad momentum ejusdem aræ in Quadraturis conjunc-
 tim; id est, ut 11073 CT ad 10973 AT . Sumatur hæc ra-
 tio bis inverse & ratio prior semel directe, & fiet curvatura Orbis Lunar-
 is in Syzygiis ad ejusdem curvaturam in Quadraturis ut $120406729 \times 178725 ATq \times$
 $CTq \times N - 120406729 \times 2000 ATq \times CT$ ad 122611329×178725
 $ATq \times CTq \times N + 122611329 \times 1000 CTq \times AT$, i.e. ut 2151969
 $AT \times CT \times N - 24081 AT.cub.$ ad 2191371 $AT \times CT \times N + 12261$
 $CT.cub.$



Quoniam

anguli CTp ad angulum CTP . Quæ quidem rationes ex sinubus LIBER
 angulorum contactus ac differentiarum angulorum facile colliguntur. TERTIUS.
 His autem inter se collatis, prodit curvatura Figuræ Cpa in a ad
 ipsius curvaturam in C , ut $AT \text{ cub} + \frac{1.6324}{100000} CTq \times AT$ ad CT
 $\text{cub.} + \frac{1.6324}{100000} ATq \times CT$. ubi numerus $\frac{1.6324}{100000}$ designat differentiam
 quadratorum angulorum CTP & CTp applicatam ad quadratum
 anguli minoris CTP seu (quod perinde est) differentiam quadra-
 torum temporum $27^d. 7^h. 43'$, & $29^d. 12^h. 44'$ applicatam ad quadra-
 tum temporis $27^d. 7^h. 43'$.

Igitur cum a designet Syzygiam Lunæ, & C ipsius Quadratu-
 ram, proportio jam inventa eadem esse debet cum proportione
 curvaturæ Orbis Lunæ in Syzygiis ad ejusdem curvaturam in Qua-
 draturis, quam supra invenimus. Proinde ut inveniatu'r propor-
 tio CT ad AT , duco extrema & media in se invicem. Et ter-
 mini prodeuntes ad $AT \times CT$ applicati, fiunt 2062, 79 $CTq q$
 $- 2151969 N \times CT \text{ cub.} + 368676 N \times AT \times CTq + 36342 ATq$
 $\times CTq - 362047 N \times ATq \times CT + 2191371 N \times AT \text{ cub.} \times$
 $4051, 4 ATq q = 0$. Hic pro terminorum AT & CT semisum-
 ma N scribo 1, & pro eorundem semidifferentia ponendo x , fit
 $CT = 1 + x$, & $AT = 1 - x$: quibus in æquatione scriptis, &
 æquatione prodeunte resoluta, obtinetur x æqualis 0, 00719, &
 inde semidiameter CT fit 1, 00719, & semidiameter AT 0, 99281,
 qui numeri sunt ut $70\frac{1}{24}$ & $69\frac{1}{24}$ quam proxime. Est igitur distantia
 Lunæ a Terra in Syzygiis ad ipsius distantiam in Quadraturis (se-
 posita scilicet Eccentricitatis consideratione) ut $69\frac{1}{24}$ ad $70\frac{1}{24}$, vel
 numeris rotundis ut 69 ad 70.

PROPOSITIO XXIX. PROBLEMA X.


Invenire Variationem Lunæ.

Oritur hæc inæqualitas partim ex forma Elliptica orbis Lunaris,
 partim ex inæqualitate momentorum areæ, quam Luna radio ad
 Terram ducto describit. Si Luna P in Ellipsi $DBCA$ circa
 Terram in centro Ellipseos quiescentem moveretur, & radio TP
 ad Terram ducto describeret aream CTP tempori proportiona-
 lem; esset autem Ellipseos semidiameter maxima CT ad semi-
 diametrum minimam TA ut 70 ad 69: foret tangens anguli
 CTP ad tangentem anguli motus medii a Quadratura C compu-
 tati, ut Ellipseos semidiameter TA ad ejusdem semidiametrum
Ecc TC

DE MUNDI
SYSTEMATE,

TC seu 69 ad 70. Debet autem descriptio areæ *CTP*, in progressu Lunæ a Quadratura ad Syzygiam, ea ratione accelerari, ut ejus momentum in Syzygia Lunæ sit ad ejus momentum in Quadratura ut 11073 ad 10973, utque excessus momenti in loco quovis intermedio *P* supra momentum in Quadratura sit ut quadratum sinus anguli *CTP*. Id quod satis accurate fiet, si tangens anguli *CTP* diminuatur in subduplicata ratione numeri 10973 ad numerum 11073, id est, in ratione numeri 68, 6877 ad numerum 69. Quo pacto

tangens anguli *CTP* jam erit ad tangentem motus medii ut 68, 6877 ad 70, & angulus *CTP* in Octantibus, ubi motus medius est 45^{gr} invenietur 44^{gr}. 27'. 28". qui subductus de angulo motus medii 45^{gr} relinquit Variationem maximam 32'. 32". Hæc ita se haberent si Luna, pergendo a Quadratura ad Syzygiam, describeret angulum *CTA* graduum tantum nonaginta. Verum ob motum Terræ, quo Sol in consequentia motu apparente transfertur, Luna, priusquam Solem assequitur, describit



angulum *CTa* angulo recto majorem in ratione temporis revolutionis Lunaris Synodicæ ad tempus revolutionis Periodicæ, id est, in ratione 29^d. 12^h. 44'. ad 27^d. 7^h. 43'. Et hoc pacto anguli omnes circa centrum *T* dilatantur in eadem ratione, & Variatio maxima quæ secus esset 32'. 32", jam aucta in eadem ratione fit 35'. 10".

Hæc est ejus magnitudo in mediocri distantia Solis a Terra, neglectis differentiis quæ a curvatura Orbis magni majorique Solis actione in Lunam falcata & novam quam in gibbosam & plenam, oriri possint. In aliis distantiiis Solis a Terra, Variatio maxima est in ratione quæ componitur ex duplicata ratione temporis revolutionis Synodicæ Lunaris (dato anni tempore) directe, & triplicata ratione distantie Solis a Terra inverse. Ideoque in

Apogæo


Apogæo Solis, Variatio maxima est $33'. 14''$, & in ejus Perigæo $37'. 11''$, si modo Eccentricitas Solis sit ad Orbis magni semidiametrum transversam ut $16\frac{1}{2}$ ad 1000. LIBER
TERTIUS.

Hactenus Variationem investigavimus in Orbe non eccentrico, in quo utique Luna in Octantibus suis semper est in mediocri sua distantia a Terra. Si Luna propter eccentricitatem suam, magis vel minus distat a Terra quam si locaretur in hoc Orbe, Variatio paulo major esse potest vel paulo minor quam pro Regula hic allata: sed excessum vel defectum ab Astronomis per Phænomena determinandum relinquo.

PROPOSITIO XXX. PROBLEMA XI.

Invenire motum horarium Nodorum Lunæ in Orbe circulari.

Designet S Solem, T Terram, P Lunam, NPn Orbem Lunæ, Npn vestigium Orbis in plano Eclipticæ; N, n Nodos, $nTNm$



lineam Nodorum infinite productam; PI, PK perpendiculara demissa in lineas ST, Qg ; Pp perpendicularum demissum in planum Eclipticæ.


Designet jam PM arcum, quem Luna dato tempore quam minimo describit, & ML lineolam quam Luna, impellente vi præfata 3 IT , eodem tempore describere posset. Jungantur PL , MP , & producantur eæ ad m & l , ubi secent planum Eclipticæ; inque Tm demittatur perpendicularum PH . Et quoniam recta ML parallela est plano Eclipticæ, ideoque cum recta ml quæ in plano illo jacet concurrere non potest, & tamen jacent hæ rectæ in plano communi $LMPml$; parallelæ erunt hæ rectæ, & propterea similia erunt triangula LMP , Lmp . Jam cum MPm sit in plano Orbis, in quo Luna in loco P movebatur, incidet punctum m in lineam Nn per Orbis illius Nodos N , n ductam. Et quoniam vis qua lineola LM generatur, si tota simul & semel in loco P impressa esset, efficeret ut Luna moveretur in arcu, cujus chorda esset LP , atque adeo transferret Lunam de plano $MPmT$ in planum $LPIT$; motus angularis Nodorum a vi illa genitus, æqualis erit angulo mTl . Est autem ml ad mP ut ML ad MP , adeoque cum MP ob datum tempus data sit, est ml ut rectangulum $ML \times mP$, id est, ut rectangulum $IT \times mP$. Et angulus mTl , si modo angulus Tml rectus sit, est ut $\frac{ml}{Tm}$ & propterea ut

$\frac{IT \times Pm}{Tm}$, id est, (ob proportionales Tm & mP , TP & PH) ut $\frac{IT \times PH}{TP}$, adeoque ob datam TP , ut $IT \times PH$. Quod si angulus Tml , seu STN obliquus sit, erit angulus mTl adhuc minor, in ratione sinus anguli STN ad Radium. Est igitur velocitas Nodorum ut $IT \times PH \times AZ$, sive ut contentum sub sinusbus trium angulorum TPl , PTN & STN .

Si anguli illi, Nodis in Quadraturis & Luna in Syzygia existentibus, recti sint, lineola ml abibit in infinitum, & angulus mTl evadet angulo mPl æqualis. Hoc autem in casu, angulus mPl est ad angulum PTM , quem Luna eodem tempore motu suo apparente circa Terram describit ut 1 ad 59, 575. Nam angulus mPl æqualis est angulo LPM , id est, angulo deflexionis Lunæ a recto tramite, quem sola vis præfata Solaris 3 IT si tum cessaret Lunæ gravitas dato illo tempore generare posset; & angulus PTM æqualis est angulo deflexionis Lunæ a recto tramite, quem vis illa, qua Luna in Orbe suo retinetur, si tum cessaret vis Solaris 3 IT eodem tempore generaret. Et hæ vires, ut supra diximus,

mus, sunt ad invicem ut 1 ad 59, 575. Ergo cum motus medius horarius Lunæ (respectu fixarum) sit $32'. 56''. 27'''$. $12^{iv}\frac{1}{2}$, motus horarius Nodi in hoc casu erit $33''. 10'''$. 33^{iv} . 12^v . Aliis autem in casibus motus iste horarius erit ad $33''. 10'''$. 33^{iv} . 12^v . ut contentum sub sinubus angulorum trium TPI , PTN , & STN (seu distantiarum Lunæ a Quadratura, Lunæ a Nodo, & Nodi a Sole) ad cubum Radii. Et quoties signum anguli alicujus de affirmativo in negativum, deque negativo in affirmativum mutatur, debet motus regressivus in progressivum & progressivus in regressivum mutari. Unde fit ut Nodi progrediantur quoties Luna inter Quadraturam alterutram & Nodum Quadraturæ proximum versatur. Aliis in casibus regrediuntur, & per excessum regressus supra progressum, singulis mensibus feruntur in antecedentia.

Corol. 1. Hinc si a dati arcus quam minimi PM terminis P & M ad lineam Quadraturas jungentem Qq demittantur perpendiculara PK , Mk , eademque producantur donec secent lineam Nodorum Nn in D & d ; erit motus horarius Nodorum ut area $MPDd$ & quadratum lineæ AZ conjunctim. Sunt enim



PK , PH & AZ prædicti tres sinus. Nempe PK sinus distantiae Lunæ a Quadratura, PH sinus distantiae Lunæ a Nodo, & AZ sinus distantiae Nodi a Sole: & erit velocitas Nodi ut contentum $PK \times PH \times AZ$. Est autem PT ad PK ut PM ad Kk , adeoque ob datas PT & PM est Kk ipsi PK proportionalis. Est & AT ad PD ut AZ ad PH , & propterea PH rectangulo $PD \times AZ$

$PD \times AZ$ proportionalis, & conjunctis rationibus, $PK \times PH$ LIBER
 est ut contentum $Kk \times PD \times AZ$, & $PK \times PH \times AZ$ ut TERTIUS,
 $Kk \times PD \times AZ$ qu. id est, ut area $PDdM$ & AZ qu. conjunc-
 tim. Q. E. D.


Corol. 2. In data quavis Nodorum positione, motus horarius
 mediocris est semissis motus horarii in Syzygiis Lunæ, ideoque est
 ad $16''$. $35'''$. $16''$. $36''$. ut quadratum sinus distantiae Nodorum a Sy-
 zygiis ad quadratum Radii, sive ut AZ qu. ad AT qu. Nam si
 Luna uniformi cum motu perambulet semicirculum QAq , sum-
 ma omnium arearum $PDdM$, quo tempore Luna pergit a Q ad
 M , erit area $QMdE$ quæ ad circuli tangentem QE terminatur;
 & quo tempore Luna attingit punctum n , summa illa erit area to-
 ta $EQAn$ quam linea PD describit, dein Luna pergente ab n ad
 q , linea PD cadet extra circulum, & aream nqe ad circuli tan-
 gentem qe terminatam describet; quæ, quoniam Nodi prius re-
 grediebantur, jam vero progrediuntur, subduci debet de area prio-
 re, & cum æqualis sit areæ QEN , relinquet semicirculum $NQAn$.
 Igitur summa omnium arearum $PDdM$, quo tempore Luna se-
 micirculum describit, est area semicirculi; & summa omnium quo
 tempore Luna circulum describit est area circuli totius. At area
 $PDdM$, ubi Luna versatur in Syzygiis, est rectangulum sub arcu
 PM & radio MT ; & summa omnium huic æqualium arearum,
 quo tempore Luna circulum describit, est rectangulum sub circum-
 ferentia tota & radio circuli; & hoc rectangulum, cum sit æqua-
 le duobus circulis, duplo majus est quam rectangulum prius.
 Proinde Nodi, ea cum velocitate uniformiter continuata quam
 habent in Syzygiis Lunaribus, spatium duplo majus describerent
 quam revera describunt; & propterea motus mediocris quocum,
 si uniformiter continuaretur, spatium a se inæquabili cum motu
 revera confectum describere possent, est semissis motus quem
 habent in Syzygiis Lunæ. Unde cum motus horarius maximus,
 si Nodi in Quadraturis versantur, sit $33''$. $10'''$. $33''$. $12''$, motus me-
 diocris horarius in hoc casu erit $16''$. $35'''$. $16''$. $36''$. Et cum mo-
 tus horarius Nodorum semper sit ut AZ qu. & area $PDdM$ con-
 junctim, & propterea motus horarius Nodorum in Syzygiis Lu-
 næ ut AZ qu. & area $PDdM$ conjunctim, id est (ob datam a-
 ream $PDdM$ in Syzygiis descriptam) ut AZ qu. erit etiam mo-
 tus mediocris ut AZ qu. atque adeo hic motus, ubi Nodi extra
 Quadraturas versantur, erit ad $16''$. $35'''$. $16''$. $36''$. ut AZ qu. ad
 AT qu. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO XXXI. PROBLEMA XII.

Invenire motum horarium Nodorum Lunæ in Orbe Elliptico.

Designet $Qpmaq$ Ellipsin, axe majore Qq , minore ab descriptam, QAq Circulum circumscriptum, T Terram in utriusque centro communi, S Solem, p Lunam in Ellipsi motam, & pm arcum quem data temporis particula quam minima describit, N & n Nodos linea Nn junctos, pK & mk perpendiculara in axem Qq demissa & hinc inde producta, donec occurrant Circulo in P & M ,



& lineæ Nodorum in D & d . Et si Luna, radio ad Terram ducto, aream describat tempori proportionalem, erit motus Nodi in Ellipsi ut area $pDdm$.

Nam si PF tangat Circulum in P , & producta occurrat TN in F , & pf tangat Ellipsin in p & producta occurrat eidem TN in

in f , convenient autem hæc tangentes in axe TQ ad T ; & si ML designet spatium quod Luna in Circulo revolvens, interea dum describit arcum PM , urgente & impellente vi prædicta $3IT$, motu transverso describere posset, & ml designet spatium quod Luna in Ellipsi revolvens eodem tempore, urgente etiam vi $3IT$, describere posset; & producantur LP & lp donec occurrant plano Eclipticæ in G & g ; & jungantur FG & fg , quarum FG producta secet pf , pg & TQ in c , e & R respective, & fg producta secet TQ in r : Quoniam vis $3IT$ seu $3PK$ in Circulo est ad vim $3IT$ seu $3pK$ in Ellipsi, ut PK ad pK , seu AT ad aT ; erit spatium ML vi priore genitum, ad spatium ml vi posteriore genitum, ut PK ad pK , id est, ob similes figuras $PTKp$ & $FT Rc$, ut FR ad cR . Est autem ML ad FG (ob similia triangula PLM , PGF) ut PL ad PG , hoc est (ob parallelas Lk , PK , GR) ut pl ad pe , id est, (ob similia triangula plm , cpe) ut lm ad ce ; & inverse ut LM est ad lm , seu FR ad cR , ita est FG ad ce . Et propterea si fg esset ad ce ut fT ad cT , id est, ut fr ad cR (hoc est, ut fr ad FR & FR ad cR conjunctim, id est, ut fT ad FT & FG ad ce conjunctim,) quoniam ratio FG ad ce utrinque ablata relinquit rationes fg ad FG & fT ad FT , foret fg ad FG ut fT ad FT ; atque adeo anguli, quos FG & fg subtenderent ad Terram T , æquarentur inter se. Sed anguli illi (per ea quæ in præcedente Propositione exposuimus) sunt motus Nodorum, quo tempore Luna in Circulo arcum PM , in Ellipsi arcum pm percurrit: & propterea motus Nodorum in Circulo & Ellipsi æquarentur inter se. Hæc ita se haberent, si modo fg esset ad ce ut fT ad cT , id est, si gf æqualis esset $\frac{ce \times fT}{cT}$. Verum ob similia triangula fgp , cep , est fg

ad ce ut fp ad cp ; ideoque fg æqualis est $\frac{ce \times fp}{cp}$; & propterea angulus, quem fg revera subtendit, est ad angulum priorem, quem FG subtendit, hoc est, motus Nodorum in Ellipsi ad modum Nodorum in Circulo, ut hæc fg seu $\frac{ce \times fp}{cp}$ ad priorem fg seu $\frac{ce \times fT}{cT}$, id est, ut $fp \times cT$ ad $fT \times cp$, seu fp ad fT & cT ad cp , hoc est, si ph ipsi TN parallela occurrat FP in b , ut Fb ad FT & FT ad FP ; hoc est, ut Fb ad FP seu Dp ad DP , adeoque
Fff ut

DE MONDI
SYSTEMATE

ut area $\mathcal{D}pmd$ ad aream $\mathcal{D}P Md$. Et propterea, cum area posterior proportionalis sit motui Nodorum in Circulo, erit area prior proportionalis motui Nodorum in Ellipsi. $\mathcal{Q}. E. \mathcal{D}.$

Corol. Igitur cum, in data Nodorum positione, summa omnium arearum $p\mathcal{D}dm$, quo tempore Luna pergit a Quadratura ad locum quemvis m , sit area $mp\mathcal{Q}Ed$, quæ ad Ellipseos tangentem $\mathcal{Q}E$ terminatur; & summa omnium arearum illarum, in revolutione integra, sit area Ellipseos totius: motus mediocris Nodorum in Ellipsi erit ad motum mediocrem Nodorum in Circulo, ut Ellipsis ad Circulum; id est, ut Ta ad TA , seu 69 ad 70. Et propterea, cum motus mediocris horarius Nodorum in Circulo sit ad $16''.35'''.16^{iv}.36^v$. ut $AZqu$. ad $ATqu$. si capiatur angulus $16''.21'''.3^{iv}.30^v$. ad angulum $16''.35'''.16^{iv}.36^v$. ut 69 ad 70, erit motus mediocris horarius Nodorum in Ellipsi ad $16''.21'''.3^{iv}.30^v$. ut AZq ad ATq ; hoc est, ut quadratum sinus distantiae Nodi a Sole ad quadratum Radii.

Cæterum Luna, radio ad Terram ducto, aream velocius describit in Syzygiis quam in Quadraturis, & eo nomine tempus in Syzygiis contrahitur, in Quadraturis producit; & una cum tempore motus Nodorum augetur ac diminuitur. Erat autem momentum areæ in Quadraturis Lunæ ad ejus momentum in Syzygiis ut 10973 ad 11073, & propterea momentum mediocre in Octantibus est ad excessum in Syzygiis, defectumque in Quadraturis, ut numerorum semisumma 11023 ad eorundem semidifferentiam 50. Unde cum tempus Lunæ in singulis Orbis particulis æqualibus sit reciproce ut ipsius velocitas, erit tempus mediocre in Octantibus ad excessum temporis in Quadraturis, ac defectum in Syzygiis, ab hac causa oriundum, ut 11023 ad 50 quam proxime. Pergendo autem a Quadraturis ad Syzygias, invenio quod excessus momentorum areæ in locis singulis, supra momentum minimum in Quadraturis, sit ut quadratum sinus distantiae Lunæ a Quadraturis quam proxime; & propterea differentia inter momentum in loco quocumque & momentum mediocre in Octantibus, est ut differentia inter quadratum sinus distantiae Lunæ a Quadraturis & quadratum sinus graduum 45, seu semissem quadrati Radii; & incrementum temporis in locis singulis inter Octantes & Quadraturas, & decrementum ejus inter Octantes & Syzygias, est in eadem ratione. Motus autem Nodorum, quo tempore Luna percurrit singulas Orbis particulas æquales, acceleratur vel retardatur in duplicata ratione temporis. Est enim motus iste, dum Luna per-

percurrit PM , (cæteris paribus) ut ML , & ML est in duplicata ratione temporis. Quare motus Nodorum in Syzygiis, eo tempore confectus quo Luna datas Orbis particulas percurrit, diminuitur in duplicata ratione numeri 11073 ad numerum 11023; estque decrementum ad motum reliquum ut 100 ad 10973, ad motum vero totum ut 100 ad 11073 quam proxime. Decrementum autem in locis inter Octantes & Syzygias, & incrementum in locis inter Octantes & Quadraturas, est quam proxime ad hoc decrementum, ut motus totus in locis illis ad motum totum in Syzygiis & differentia inter quadratum sinus distantiae Lunæ a Quadratura & semissem quadrati Radii ad semissem quadrati Radii, conjunctim. Unde si Nodi in Quadraturis versentur, & capiantur loca duo æqualiter ab Octante hinc inde distantia, & alia duo a Syzygia & Quadratura iisdem intervallis distantia, deque decrementis motuum in locis duobus inter Syzygiam & Octantem, subducantur incrementa motuum in locis reliquis duobus, quæ sunt inter Octantem & Quadraturam; decrementum reliquum æquale erit decremento in Syzygia: uti rationem ineunti facile constabit. Proindeque decrementum mediocre, quod de Nodorum motu mediocri subduci debet, est pars quarta decrementi in Syzygia. Motus totus horarius Nodorum in Syzygiis (ubi Luna radio ad Terram ducto aream tempori proportionalem describere supponebatur) erat $32''. 42''' . 7^{iv}$. Et decrementum motus Nodorum, quo tempore Luna jam velocior describit idem spatium, diximus esse ad hunc motum ut 100 ad 11073; adeoque decrementum illud est $17''' . 43^{iv} . 11^v$, cujus pars quarta $4''' . 25^{iv} . 48^v$, motui horario mediocri superius invento $16'' . 21''' . 3^{iv} . 30^v$ subducta, relinquit $16'' . 16''' . 37^{iv} . 42^v$. motum mediocrem horarium correctum.

Si Nodi versantur extra Quadraturas, & spectantur loca bina a Syzygiis hinc inde æqualiter distantia; summa motuum Nodorum, ubi Luna versatur in his locis, erit ad summam motuum, ubi Luna in iisdem locis & Nodi in Quadraturis versantur, ut $AZqu.$ ad $ATqu.$ Et decrementsa motuum, a causis jam expositis oriunda, erunt ad invicem ut ipsi motus, adeoque motus reliqui erunt ad invicem ut $AZqu.$ ad $ATqu.$ & motus mediocres ut motus reliqui. Est itaque motus mediocris horarius correctus, in dato quocunque Nodorum situ, ad $16'' . 16''' . 37^{iv} . 42^v$. ut $AZqu.$ ad $ATqu.$; id est, ut quadratum sinus distantiae Nodorum a Syzygiis ad quadratum Radii.

tus medius Nodorum circulo toti respondens. Et motus Nodorum, quo tempore Sol pergit ab N ad A , est ad $19^{\text{gr}} 49' 3'' 55''$. ut area NAZ ad circulum totum.

Hæc ita se habent, ex Hypothesi quod Nodus horis singulis in locum priorem retrahitur, sic ut Sol anno toto completo ad Nodum eundem redeat a quo sub initio digressus fuerat. Verum per motum Nodi fit ut Sol citius ad Nodum revertatur, & computanda jam est abbreviatio temporis. Cum Sol anno toto conficiat 360 gradus, & Nodus motu maximo eodem tempore conficeret $39^{\text{gr}} 38' 7'' 50''$, seu $39,6355$ gradus; & motus mediocris Nodi in loco quovis N sit ad ipsius motum mediocrem in Quadraturis suis, ut AZq ad ATq : erit motus Solis ad motum Nodi in N , ut $360 ATq$ ad $39,6355 AZq$; id est, ut $9,0827646 ATq$ ad AZq . Unde si circuli totius circumferentia NaN dividatur in particulas æquales Aa , tempus quo Sol percurrat particulam Aa , si circulus quiesceret, erit ad tempus quo percurrit eandem particulam, si circulus una cum Nodis circa centrum T revolvatur, reciproce ut $9,0827646 ATq$ ad $9,0827646 ATq + AZq$. Nam tempus est reciproce ut velocitas qua particula percurritur, & hæc velocitas est summa velocitatum Solis & Nodi. Igitur si tempus, quo Sol absque motu Nodi percurreret arcum NA , exponatur per Sectorem NTA , & particula temporis quo percurreret arcum quam minimum Aa , exponatur per Sectoris particulam ATa ; & (perpendiculari aT in Nn demisso) si in AZ capiatur dZ , ejus longitudinis ut sit rectangulum dZ in ZT ad Sectoris particulam ATa ut AZq ad $9,0827646 ATq + AZq$, id est, ut sit dZ ad $\frac{1}{2} AZ$ ut ATq ad $9,0827646 ATq + AZq$; rectangulum dZ in ZT designabit decrementum temporis ex motu Nodi oriundum, tempore toto quo arcus Aa percurritur. Et si punctum d tangit Curvam $NdGn$, area curvilinea NdZ erit decrementum totum, quo tempore arcus totus NA percurritur; & propterea excessus Sectoris NAT supra aream NdZ erit tempus illud totum. Et quoniam motus Nodi tempore minore minor est in ratione temporis, debet etiam area $AuTZ$ diminui in eadem ratione. Id quod fiet si capiatur in AZ longitudo eZ , quæ sit ad longitudinem AZ ut AZq ad $9,0827646 ATq + AZq$. Sic enim rectangulum eZ in ZT erit ad aream $AZTa$ ut decrementum temporis quo arcus Aa percurritur, ad tempus totum quo percurreretur si Nodus quiesceret: Et propterea rectangulum illud respondebit decremento motus Nodi. Et si punctum e tangat

Curvam $NeFn$, area tota NeZ , quæ summa est omnium decrementorum, respondebit decremento toti, quo tempore arcus AN percurritur; & area reliqua NAe respondebit motui reliquo, qui verus est Nodi motus quo tempore arcus totus NA , per Solis & Nodi conjunctos motus, percurritur. Jam vero area semicirculi est ad aream Figuræ $NeFnT$, per methodum Serierum infinitarum quæsitam, ut 793 ad 60 quamproxime. Motus autem qui respondet Circulo toti erat $19^{\text{gr}} 49'. 3''. 55'''$; & propterea motus qui Figuræ $NeFnT$ duplicatæ respondet, est $18^{\text{gr}} 29'. 58''. 2'''$. Qui de motu priore subductus relinquit $18^{\text{gr}} 19'. 5''. 53'''$. motum totum Nodi inter sui ipsius Conjunctiones cum Sole; & hic motus de Solis motu annuo graduum 360 subductus, relinquit $341^{\text{gr}} 40'. 54''. 7'''$. motum Solis inter easdem Conjunctiones. Iste autem motus est ad motum annum 360^{gr} ut Nodi motus jam inventus $18^{\text{gr}} 19'. 5''. 53'''$. ad ipsius motum annum, qui propterea erit $19^{\text{gr}} 18'. 1''. 23'''$. Hic est motus medius Nodorum in anno Sidereo. Idem per Tabulas Astronomicas est $19^{\text{gr}} 21'. 21''. 50'''$. Differentia minor est parte trecentesima motus totius, & ab Orbis Lunaris Eccentricitate & Inclinatione ad planum Eclipticæ oriri videtur. Per Eccentricitatem Orbis motus Nodorum nimis acceleratur, & per ejus Inclinationem vicissim retardatur aliquantulum, & ad justam velocitatem reducitur.


PROPOSITIO XXXIII. PROBLEMA XIV.

Invenire motum verum Nodorum Lunæ.

In tempore quod est ut area $NTA - NdZ$, (in Fig. præced.) motus iste est ut area $NAeN$, & inde datur. Verum ob nimiam calculi difficultatem, præstat sequentem Problematis constructionem adhibere. Centro C , intervallo quovis CD , describatur circulus $BEFD$. Producat DC ad A , ut sit AB ad AC ut motus medius ad semissem motus veri mediocris, ubi Nodi sunt in Quadraturis, (id est, ut $19^{\text{gr}} 18'. 1''. 23'''$. ad $19^{\text{gr}} 49'. 3''. 55'''$, atque adeo BC ad AC ut motuum differentia $0^{\text{gr}} 31'. 2''. 32'''$, ad motum posteriorem $19^{\text{gr}} 49'. 3''. 55'''$) hoc est, ut 1 ad $38\frac{1}{2}$, dein per punctum D ducatur infinita Gg , quæ tangat circulum in D ; & si capiatur angulus BCE vel BCF æqualis duplæ distantie Solis a loco Nodi, per motum medium invento;

&

& agatur *AE* vel *AF* fecans perpendicularum *DG* in *G*; & capiatur angulus qui fit ad motum totum Nodi inter ipsius Syzygias (id est, ad 9^{th} . $11'$. $3''$.) ut tangens *DG* ad circuli *BED* circumferentiam totam; atque angulus iste (pro quo angulus *DAG* usurpari potest) ad motum medium Nodorum addatur ubi Nodi.



transeunt a Quadraturis ad Syzygias, & ab eodem motu medio subducatur ubi transeunt a Syzygiis ad Quadraturas, habebitur eorum motus verus. Nam motus verus sic inventus congruet quam proxime cum motu vero qui prodit exponendo tempus per aream $NTA - NdZ$, & motum Nodi per aream $NAeN$; ut rem perpendenti & computationes instituenti constabit. Hæc est æquatio semestris motus Nodorum. Est & æquatio mensura, sed quæ ad inventionem Latitudinis Lunæ minime necessaria est. Nam cum Variatio Inclinationis Orbis Lunaris ad planum Eclipticæ duplici inæqualitati obnoxia sit, alteri semestri, alteri autem mensura; hujus mensura inæqualitas & æquatio mensura Nodorum ita se mutuo contemperant & corrigunt, ut ambæ in determinanda Latitudine Lunæ neglegi possint.

Corol. Ex hac & præcedente Propositione liquet quod Nodi in Syzygiis suis quiescunt, in Quadraturis autem regrediuntur motu horario $16''$. $19'''$. 26^{iv} . Et quod æquatio motus Nodorum in Octantibus sit 1^{st} . $30'$. Quæ omnia cum Phænomenis cœlestibus probe quadrant.

$IT \times PG \times AZ$ ad AT cub, erit angulus GPg (seu Inclinationis horaria Variatio) ad angulum $33'' 10'' 33^{iv}$, ut $IT \times AZ \times TG$ LIBER 3
TERTIUS.
 $\times \frac{Pp}{PG}$ ad AT cub. Q. E. I.

Hæc ita se habent ex Hypothefi quod Luna in Orbe Circulari uniformiter gyatur. Quod si Orbis ille Ellipticus fit, motus mediocris Nodorum minuetur in ratione axis minoris ad axem majorem; uti supra expositum est. Et in eadem ratione minuetur etiam Inclinationis Variatio.

Corol. 1. Si ad Nn erigatur perpendicularum TF , sitque pM motus horarius Lunæ in plano Eclipticæ; & perpendiculara pK, Mk in QT demissa & utrinque producta occurrant TF in H & b : erit IT ad AT ut Kk ad Mp , & TG ad Hp ut TZ ad AT , ideoque $IT \times TG$ æquale $\frac{Kk \times Hp \times TZ}{Mp}$, hoc est, æquale arææ

$Hp Mb$ ductæ in rationem $\frac{TZ}{Mp}$: & propterea Inclinationis Variatio horaria ad $33'' 10'' 33^{iv}$, ut $Hp Mb$ ducta in $AZ \times \frac{TZ}{Mp} \times \frac{Pp}{PG}$ ad AT cub.

Corol. 2. Ideoque si Terra & Nodi singulis horis completis retraherentur à locis suis novis, & in loca priora in instanti semper reducerentur, ut situs eorum, per mensem integrum periodicum, datus maneret; tota Inclinationis Variatio tempore mensis illius foret ad $33'' 10'' 33^{iv}$, ut aggregatum omnium arearum $Hp Mb$, in revolutione puncti p genitarum, & sub signis propriis + & — conjunctarum, ductum in $AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG}$ ad $Mp \times AT$ cub. id

est, ut circulus totus $QAqa$ ductus in $AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG}$ ad $Mp \times AT$ cub. hoc est, ut circulus totus $QAqa$ ductus in $AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG}$ ad $2 Mp \times AT$ quad.

Corol. 3. Proinde in dato Nodorum situ, Variatio mediocris horaria, ex qua per mensem uniformiter continuata Variatio illa menstrua generari posset, est ad $33'' 10'' 33^{iv}$, ut $AZ \times TZ \times \frac{Pp}{PG}$ ad $2 ATq$, sive ut $Pp \times \frac{AZ \times TZ}{\frac{1}{2} AT}$ ad $PG \times 4 AT$, id
Ggg est

est (cum Pp sit ad PG ut sinus Inclinationis prædictæ ad radium, & $\frac{AZ \times TZ}{\frac{1}{2}AT}$ sit ad 4 AT ut sinus duplicati anguli ATn ad radium quadruplicatum) ut Inclinationis ejusdem sinus ductus in sinum duplicatæ distantiae Nodorum a Sole, ad quadruplum quadratum radii.

Corol. 4. Quoniam Inclinationis horaria Variatio, ubi Nodi in Quadraturis versantur, est (per hanc Propositionem) ad angulum $33''$. $10'''$. 33^{iv} . ut $IT \times AZ \times TG \times \frac{Pp}{PG}$ ac AT^3 id est,

ut $\frac{IT \times TG}{\frac{1}{2}AT} \times \frac{Pp}{PG}$ ad 2 AT , hoc est, ut sinus duplicatæ distantiae

Lunæ à Quadraturis ductus in $\frac{Pp}{PG}$ ad radium duplicatum: summa omnium Variationum horariorum, quo tempore Luna in hoc situ Nodorum transiit à Quadratura ad Syzygiam, (id est, spatio horarum $177\frac{1}{2}$.) erit ad summam totidem angulorum $33''$. $10'''$. 33^{iv} , seu $5878''$, ut summa omnium sinuum duplicatæ distantiae Lunæ à Quadraturis ducta in $\frac{Pp}{PG}$, ad summam totidem

diametrorum; hoc est, ut diameter ducta in $\frac{Pp}{PG}$ ad circumferentiam: id est, si Inclination sit $58^\circ 1'$, ut $7 \times \frac{374}{10000}$ ad 22, seu 278 ad 10000. Proindeque Variatio tota, ex summa omnium horariorum Variationum tempore prædicto conflata, est $163''$, seu $2'$. $43''$.

PROPOSITIO XXXV. PROBLEMA XVI.


Dato tempore invenire Inclinationem Orbis Lunarum ad planum Eclipticæ.

Sit AD sinus Inclinationis maximæ, & AB sinus Inclinationis minimæ. Bifecetur BD in C , & centro C , intervallo BC , describatur Circulus BGD . In AC capiatur CE in ea ratione ad EB quam EB habet ad $2BA$; Et si dato tempore constituatur angulus AEG æqualis duplicatæ distantiae Nodorum à

Qua-

Quadraturis, & ad AD demittatur perpendicularum GH : erit AH sinus Inclinationis quæsitæ. LIBRUS
TERTIUS

Nam GEq æquale est $GHq + HEq = BHD + HEq = HBD + HEq - BHq = HBD + BEq - 2BH \times BE = BEq + 2EC \times BH = 2EC \times AB + 2EC \times BH = 2EC \times AH$. Ideoque cum $2EC$ detur, est GEq ut AH . Designet jam AEg duplicatam distantiam Nodorum à Quadraturis post datum aliquod momentum temporis completum, & arcus Gg , ob datum



angulum GEg , erit ut distantia GE . Est autem Hb ad Gg ut GH ad GC , & propterea Hb est ut contentum $GH \times Gg$ seu $GH \times GE$; id est, ut $\frac{GH}{GE} \times GEg$ seu $\frac{GH}{GE} \times AH$, id est, ut AH & sinus anguli AEG conjunctim. Igitur si AH in casu aliquo sit sinus Inclinationis, augebitur ea iisdem incrementis cum sinu Inclinationis, per Corol. 3. Propositionis superioris, & propterea sinui illi æqualis semper manebit. Sed AH ubi punctum G incidit in punctum alterutrum B vel D huic sinui æqualis est, & propterea eidem semper æqualis manet. $\mathcal{Q}. E. D.$


In hac demonstratione supposui angulum BEG , qui est duplicata distantia Nodorum à Quadraturis, uniformiter augeri. Nam omnes inæqualitatum minutias expendere non vacat. Concipe jam angulum BEG rectum esse, & in hoc casu Gg esse augmentum horarium duplæ distantie Nodorum & Solis ab invicem; & Inclinationis Variatio horaria in eodem casu (per Corol. 3. Prop. novissimæ) erit ad $33''. 12'''$. 33^{iv} . ut contentum sub Inclinationis sinu AH & sinu anguli recti BEG , qui est duplicata distantia Nodorum à Sole, ad quadruplum quadratum radii; id est, ut mediocris Inclinationis sinus AH ad radium quadruplicatum; hoc est (cum Inclination illa mediocris sit quasi $5^{\text{gr.}} 8\frac{1}{2}$) ut ejus sinus 896 ad radium quadruplicatum 40000, sive ut 224 ad 10000. Est autem Variatio tota, sinuum differentie BD respondens, ad Variationem illam horariam ut diameter BD ad

Ggg 2

arcum

arcum Gg ; id est, ut diameter BD ad semicircumferentiam BGD & tempus horarum $2079\frac{1}{2}$, quo Nodus pergit à Quadraturis ad Syzygias, ad horam unam conjunctim; hoc est, ut 7 ad 11 & $2079\frac{1}{2}$ ad 1. Quare si rationes omnes jungantur, fiet Variatio tota BD ad $33''. 10''$. 33^{iv} . ut $224 \times 7 \times 2079\frac{1}{2}$ ad 110000, id est, ut 29645 ad 1000, & inde Variatio illa BD prodibit $16''. 23''$.

Hæc est Inclinationis Variatio maxima quatenus locus Lunæ in Orbe suo non consideratur. Nam Inclination, si Nodi in Syzygiis versantur, nil mutatur ex vario situ Lunæ. At si Nodi in Quadraturis consistunt, Inclination minor est ubi Luna versatur in Syzygiis, quam ubi ea versatur in Quadraturis, excessu $2''. 43''$; uti in Propositionis superioris Corollario quarto indicavimus. Et hujus excessus dimidio $1''. 21''$. Variatio tota mediocris BD in Quadraturis Lunaribus diminuta fit $15''. 2''$, in ipsius autem Syzygiis aucta fit $17'. 45''$. Si Luna igitur in Syzygiis constituatur, Variatio tota, in transitu Nodorum à Quadraturis ad Syzygias, erit $17'. 45''$: adeoque si Inclination, ubi Nodi in Syzygiis versantur, sit $5'. 17'. 20''$; eadem, ubi Nodi sunt in Quadraturis, & Luna in Syzygiis, erit $4^{gr} 59' 35''$. Atque hæc ita se habere confirmatur ex Observationibus.



Si jam desideretur Orbis Inclination illa, ubi Luna in Syzygiis & Nodi ubique versantur; fiat AB ad AD ut sinus graduum $4. 59'. 35''$. ad sinum graduum $5. 17'. 20''$, & capiatur angulus $AE G$ æqualis duplicatæ distantie Nodorum à Quadraturis; & erit AH sinus Inclinationis quæsitæ. Huic Orbis Inclinationi æqualis est ejusdem Inclination, ubi Luna distat 90^{gr} à Nodis. In aliis Lunæ locis inæqualitas menstrua, quam inclinationis variatio admittit, in calculo Latitudinis Lunæ compensatur & quodammodo tollitur per inæqualitatem mensuram motus Nodorum, (ut supra diximus) adeoque in calculo Latitudinis illius negligi potest.

Scho-

Scholium.

Hicce motuum Lunarium computationibus ostendere volui, quod motus Lunares, per Theoriam Gravitatis, a causis suis computari possint. Per eandem Theoriam inveni præterea quod Æquatio Annua medii motus Lunæ oriatur a varia dilatatione Orbis Lunæ per vim Solis, juxta Corol. 6. Prop. LXVI. Lib. I. Hæc vis in Perigæo Solis major est, & Orbem Lunæ dilatat; in Apogæo ejus minor est, Orbem illum contrahi permittit. In Orbe dilatato Luna tardius revolvitur, in contracto citius; & Æquatio Annua per quam hæc inæqualitas compensatur, in Apogæo & Perigæo Solis nulla est, in mediocri Solis a Terra distantia ad 11'. 50". circiter ascendit, in alijs locis Æquationi centri Solis proportionalis est; & additur medio motui Lunæ ubi Terra pergit ab Aphelio suo ad Perihelium, & in opposita Orbis parte subducitur. Assumendo radium Orbis magni 1000 & Eccentricitatem Terræ 16 $\frac{1}{2}$, hæc Æquatio ubi maxima est, per Theoriam Gravitatis prodit 11'. 49". Sed Eccentricitas Terræ paulo major esse videtur, & aucta Eccentricitate hæc Æquatio augeri debet in eadem ratione. Sit Eccentricitas 16 $\frac{1}{2}$, & Æquatio maxima erit 11'. 52".


Inveni etiam quod in Perihelio Terræ, propter majorem vim Solis, Apogæum & Nodi Lunæ velocius moventur quam in Aphelio ejus, idque in triplicata ratione distantiae Terræ a Sole inverse. Et inde oriuntur Æquationes Annuæ horum motuum Æquationi centri Solis proportionales. Motus autem Solis est in duplicata ratione distantiae Terræ a Sole inverse, & maxima centri Æquatio quam hæc inæqualitas generat, est 1st. 56'. 26" prædictæ Solis Eccentricitati 16 $\frac{1}{2}$ congruens. Quod si motus Solis esset in triplicata ratione distantiae inverse, hæc inæqualitas generaret Æquationem maximam 2 56'. 9". Et propterea Æquationes maximæ quas inæqualitates motuum Apogæi & Nodorum Lunæ generant, sunt ad 2st. 56'. 9", ut motus medius diurnus Apogæi & motus medius diurnus Nodorum Lunæ sunt ad motum medium diurnum Solis. Unde prodit Æquatio maxima medii motus Apogæi 19'. 52": & Æquatio maxima medii motus Nodorum 9'. 27". Additur vero Æquatio prior & subducitur posterior, ubi Terra pergit a Perihelio suo ad Aphelium: & contrarium fit in opposita Orbis parte.

De Mundi Per Theoriam Gravitatis constitit etiam quod actio Solis in
SYSTEMATE, Lunam paulo major sit ubi transversa diameter Orbis Lunaris
 transit per Solem, quam ubi eadem ad rectos est angulos cum
 linea Terram & Solem jungente: & propterea Orbis Lunaris
 paulo major est in priore casu quam in posteriore. Et hinc ori-
 tur alia Æquatio motus medii Lunaris, pendens a situ Apogæi
 Lunæ ad Solem, quæ quidem maxima est cum Apogæum Lunæ
 versatur in Octante cum Sole; & nulla cum illud ad Quadraturas
 vel Syzygias pervenit: & motui medio additur in transitu Apo-
 gæi Lunæ a Solis Quadratura ad Syzygiam, & subducitur in tran-
 situ Apogæi a Syzygia ad Quadraturam. Hæc Æquatio quam
 Semestrem vocabo, in Octantibus Apogæi quando maxima est,
 ascendit ad $3'. 45''$ circiter, quantum ex Phænomenis colligere
 potui. Hæc est ejus quantitas in mediocri Solis distantia a Terra.
 Augetur vero ac diminuitur in triplicata ratione distantiae Solis
 inverse, adeoque in maxima Solis distantia est $3'. 34''$, & in mi-
 nima $3'. 56''$ quamproxime: ubi vero Apogæum Lunæ situm est
 extra Octantes, evadit minor; estque ad Æquationem maximam,
 ut sinus duplæ distantiae Apogæi Lunæ a proxima Syzygia vel
 Quadratura ad radium.

Per eandem Gravitatis Theoriam actio Solis in Lunam paulo
 major est ubi linea recta per Nodos Lunæ ducta transit per So-
 lem, quam ubi linea ad rectos est angulos cum recta Solem ac
 Terram jungente. Et inde oritur alia medii motus Lunaris Æqua-
 tio, quam Semestrem secundam vocabo, quæque maxima est ubi
 Nodi in Solis Octantibus versantur, & evanescit ubi sunt in Syzy-
 giis vel Quadraturis, & in aliis Nodorum positionibus proportio-
 nalis est sinui duplæ distantiae Nodi alterutrius a proxima Syzygia
 aut Quadratura: additur vero medio motui Lunæ dum Nodi
 transeunt a Solis Quadraturis ad proximas Syzygias, & subduci-
 tur in eorum transitu a Syzygiis ad Quadraturas; & in Octanti-
 bus ubi maxima est, ascendit ad $47''$ in mediocri Solis distantia a
 Terra, uti ex Theoria Gravitatis colligo. In aliis Solis distantiiis
 hæc Æquatio, in Octantibus Nodorum, est reciproce ut cubus di-
 stantiae Solis a Terra, ideoque in Perigæo Solis ad $45''$ in Apo-
 gæo ejus ad $49''$ circiter ascendit.

Per eandem Gravitatis Theoriam Apogæum Lunæ progreditur
 quam maxime ubi vel cum Sole conjungitur vel eidem opponitur,
 & regreditur ubi cum Sole Quadraturam facit. Et Eccentricitas
 sit maxima in priore casu & minima in posteriore, per Corol.

7, 8 & 9. Prop. LXVI. Lib. I. Et hæ inæqualitates per eadem Corollaria permagnæ sunt, & Æquationem principalem Apogæi generant, quam Semestrem vocabo. Et Æquatio maxima Semestris est $12^{\text{st}} 18'$ circiter, quantum ex Observationibus colligere potui. *Horroxius* noster Lunam in Ellipsi circum Terram, in ejus umbilico inferiore constitutam, revolvit primus statuit. *Halleius* centrum Ellipseos in Epicyclo locavit, cujus centrum uniformiter revolvitur circum Terram. Et ex motu in Epicyclo oriuntur inæqualitates jam dictæ in progressu & regressu Apogæi & quantitate Eccentricitatis. Dividi intelligatur distantia mediocris Lunæ a Terra in partes 100000, & referat T Terram & TC Eccentricitatem mediocrem Lunæ partium 5505. Producat TC ad B , ut sit CB sinus Æquationis maximæ Semestris $12^{\text{st}} 18'$ ad radium TC , & circulus BDA centro C intervallo CB descriptus, erit Epicyclus ille in quo centrum Orbis Lunaris locatur & secundum ordinem literarum BDA revolvitur. Capiatur angulus BCD æqualis duplo Argumento annuo, seu duplæ distantie veri loci Solis ab Apogæo Lunæ semel æquato, & erit CTD Æquatio



Semestris Apogæi Lunæ & TD Eccentricitas Orbis ejus in Apogæum secundo æquatum tendens. Habitis autem Lunæ motu medio & Apogæo & Eccentricitate, ut & Orbis axe majore partium 200000, ex his eruetur verus Lunæ locus in Orbe & distantia ejus a Terra, idque per Methodos notissimas.

In Perihelio Terræ, propter majorem vim Solis, centrum Orbis Lunæ velocius movetur circum centrum C quam in Aphelio, idque in triplicata ratione distantie Terræ a Sole inverse. Ob Æquationem centri Solis in Argumento annuo comprehensam, centrum Orbis Lunæ velocius movetur in Epicyclo BDA in duplicata ratione distantie Terræ a Sole inverse. Ut idem adhuc velocius moveatur in ratione simplici distantie inverse; ab Orbis centro D agatur recta DE versus Apogæum Lunæ, seu rectæ TC parallela, & capiatur angulus EDG æqualis excessui Argumenti

Solis. Et ut radius est ad sinum anguli sic inventi, ita $2'. 25''$ LIBER TERTIUS sunt ad *Æquationem* centri Secundam, addendam si summa illa sit minor semicirculo, subducendam si major. Sic habebitur ejus Longitudo in ipsis Luminarium Syzygiis.

Si computatio accuratior desideretur, corrigendus est locus Lunæ in Orbe ut supra inventus per Variationem duplicem. De Variatione Prima & principali diximus supra, hæc maxima est in Octantibus Lunæ. Variatio altera maxima est in Quadrantibus, & oritur a varia Solis actione in Orbem Lunæ pro varia positione Apogæi Lunæ ad Solem, computatur vero in hunc modum. Ut radius ad sinum versum distantiae Apogæi Lunæ a Perigæo Solis in consequentia, ita angulus quidam P ad quartum proportionalem. Et ut radius ad sinum distantiae Lunæ a Sole, ita summa hujus quarti proportionalis & anguli cujusdam alterius Q ad Variationem Secundam, subducendam si Lunæ lumen augetur, addendam si diminuitur. Sic habebitur locus verus Lunæ in Orbe, & per Reductionem loci hujus ad Eclipticam habebitur Longitudo Lunæ. Anguli vero P & Q ex Observationibus determinandi sunt. Et interea si pro angulo P usurpentur $2'$, & pro angulo Q $1'$, non multum errabitur.


Cum Atmosphæra Terræ ad usque altitudinem milliarium 35 vel 40 refringat lucem Solis, & refringendo spargat eandem in Umbram Terræ, & spargendo lucem in confinio Umbræ dilatat Umbram: ad diametrum Umbræ quæ per Parallaxim prodit, addo minutum unum primum in Eclipsibus Lunæ, vel minutum unum cum triente.

Theoria vero Lunæ primo in Syzygiis, deinde in Quadraturis, & ultimo in Octantibus per Phænomena examinari & itabiliri debet. Et opus hocce aggressurus motus medios Solis & Lunæ ad tempus meridianum in Observatorio Regio *Grenovicensi*, die ultimo mensis *Decembris* anni 1700. st. vet. non incommode sequentes adhibebit: nempe motum medium Solis $\approx 20^{\text{gr.}} 43'. 40''$, & Apogæi ejus $\approx 7^{\text{gr.}} 44'. 30''$, & motum medium Lunæ $\approx 15^{\text{gr.}} 20'. 00''$, & Apogæi ejus $\approx 8^{\text{gr.}} 20'. 00''$, & Nodi ascendentis Ω $27^{\text{gr.}} 24'. 20''$; & differentiam meridianorum Observatorii hujus & Observatorii Regii *Parisiensis* $0^{\text{hor.}} 9^{\text{min.}} 20^{\text{sec.}}$.

PROPOSITIO XXXVI. PROBLEMA XVII.

Invenire vim Solis ad Mare movendum.

Solis vis ML seu PT , in Quadraturis Lunaribus, ad perturbandos motus Lunares, erat (per Prop. xxv. hujus) ad vim gravitatis apud nos, ut 1 ad 638092,6. Et vis $TM-LM$ seu 2 PK in Syzygiis Lunaribus, est duplo major. Hæ autem vires, si descendatur ad superficiem Terræ, diminuuntur in ratione distantiarum a centro Terræ, id est, in ratione $60\frac{1}{2}$ ad 1; adeoque vis prior in superficie Terræ, est ad vim gravitatis, ut 1 ad 38604600. Hac vi Mare deprimitur in locis quæ 90 gradibus distant



a Sole. Vi altera quæ dupla major est, Mare elevatur & sub Sole & in regione Soli opposita. Summa virium est ad vim gravitatis ut 1 ad 12868200. Et quoniam vis eadem eundem ciēt motum, five ea deprimat Aquam in regionibus quæ 90 gradibus distant à Sole, five elevet eandem in regionibus sub Sole & Soli oppositis, hæc summa erit tota Solis vis ad Mare agitandum; & eundem habebit effectum ac si tota in regionibus sub Sole & Soli oppositis Mare elevaret, in regionibus autem quæ 90 gradibus distant a Sole nil ageret.

Hæc est vis Solis ad Mare ciendum in loco quovis dato, ubi Sol tam in vertice loci versatur quam in mediocri sua distantia a Terra. In aliis Solis positionibus vis ad Mare attollendum, est ut sinus versus duplæ altitudinis Solis supra horizontem loci directe & cubus distantie Solis a Terra iaverse.

Corol. Cum vis centrifuga partium Terræ à diurno Terræ motu oriunda, quæ est ad vim gravitatis ut 1 ad 289, efficiat ut altitudo

tudo Aquæ sub Æquatore superet ejus altitudinem sub Polis mensura pedum Parisiensium 85820; vis Solaris de qua egimus, cum sit ad vim gravitatis ut 1 ad 12868200, atque adeo ad vim illam centrifugam ut 289 ad 12868200 seu 1 ad 44527, efficiet ut altitudo Aquæ in regionibus sub Sole & Soli oppositis, superet altitudinem ejus in locis quæ 90 gradibus distant a Sole, mensura tantum pedis unius Parisiensis & digitorum undecim cum octava parte digiti. Est enim hæc mensura ad mensuram pedum 85820 ut 1 ad 44527.

PROPOSITIO XXXVII. PROBLEMA XVIII.

Invenire vim Lunæ ad Mare movendum.

Vis Lunæ ad Mare movendum colligenda est ex ejus proportionem ad vim Solis, & hæc proportio colligenda est ex proportionem motuum Maris, qui ab his viribus oriuntur. Ante ostium fluvii *Avonæ* ad lapidem tertium infra *Bristoliam*, tempore verno & autumnali totus Aquæ ascensus in Conjunctione & Oppositione Luminarium (observante *Samuele Sturmio*) est pedum plus minus 45, in Quadraturis autem est pedum tantum 25. Altitudo prior ex summa virium, posterior ex earundem differentia oritur. Solis igitur & Lunæ in Æquatore versantium & mediocriter a Terra distantium sunt vires S & L, & erit $L + S$ ad $L - S$ ut 45 ad 25, seu 9 ad 5.

In portu *Plymuthi* Æstus maris (ex observatione *Samuelis Colepressi*) ad pedes plus minus sexdecim altitudine mediocri attollitur, ac tempore verno & autumnali altitudo Æstus in Syzygiis superare potest altitudinem ejus in Quadraturis, pedibus plus septem vel octo. Si maxima harum altitudinum differentia sit pedum novem, erit $L + S$ ad $L - S$ ut $20\frac{1}{2}$ ad $11\frac{1}{2}$ seu 41 ad 23. Quæ proportio satis congruit cum priore. Ob magnitudinem Æstus in portu *Bristolie*, observationibus *Sturmii* magis fidendum esse videtur, ideoque donec aliquid certius constiterit, proportionem 9 ad 5 usurpabimus.

Cæterum ob aquarum reciprocos motus, Æstus maximi non incidunt in ipsas Luminarium Syzygias, sed sunt tertii a Syzygiis ut dictum fuit, seu proxime sequuntur tertium Lunæ post Syzygias appulsum ad meridianum loci, vel potius (ut a *Sturmio* notatur) sunt tertii post diem novilunii vel plenilunii, seu post horam

ram a novilunio vel plenilunio plus minus duodecimam, adeoque incidunt in horam a novilunio vel plenilunio plus minus quadragessimam tertiam. Incidunt vero in hoc portu in horam septimam circiter ab appulsu Lunæ ad meridianum loci; ideoque proxime sequuntur appulsus Lunæ ad meridianum, ubi Luna distat a Sole vel ab oppositione Solis gradibus plus minus octodecim vel novemdecim in consequentia. *Æstas* & *Hyems* maxime vigent, non in ipsis *Solstitiis*, sed ubi Sol distat a *Solstitiis* decima circiter parte totius circuitus, seu gradibus plus minus 36 vel 37. Et similiter maximus *Æstus* maris oritur ab appulsu Lunæ ad meridianum loci, ubi Luna distat a Sole decima circiter parte motus totius ab *Æstu* ad *Æstum*. Sit distantia illa graduum plus minus 18½. Et vis Solis in hac distantia Lunæ a *Syzygiis* & *Quadraturis*, minor erit ad augendum & ad minuendum motum maris a vi Lunæ oriundum, quam in ipsis *Syzygiis* & *Quadraturis*, in ratione radii ad sinum complementi distantiae hujus duplicatae seu anguli graduum 37, hoc est, in ratione 10000000 ad 7986355. Ideoque in analogia superiore pro *S* scribi debet 0, 7986355 *S*.

Sed & vis Lunæ in *Quadraturis*, ob declinationem Lunæ ab *Æquatore*, diminui debet. Nam Luna in *Quadraturis*, vel potius in gradu 18½ post *Quadraturas*, in declinatione graduum plus minus 22. 13' versatur. Et Luminaris ab *Æquatore* declinantis vis ad Mare movendum diminuitur in duplicata ratione sinus complementi declinationis quamproxime. Et propterea vis Lunæ in his *Quadraturis* est tantum 0,8570327 *L*. Est igitur $L + 0,7986355 \text{ S ad } 0,8570327 \text{ L} - 0,7986355 \text{ S ut } 9 \text{ ad } 5$.

Præterea diametri Orbis in quo Luna absque *Eccentricitate* moveri deberet, sunt ad invicem ut 69 ad 70; ideoque distantia Lunæ a Terra in *Syzygiis* est ad distantiam ejus in *Quadraturis*, ut 69 ad 70, cæteris paribus. Et distantiae ejus in gradu 18½ a *Syzygiis* ubi *Æstus* maximus generatur, & in gradu 18½ a *Quadraturis* ubi *Æstus* minimus generatur, sunt ad mediocrem ejus distantiam, ut 69,098747 & 69,897345 ad 69½. Vires autem Lunæ ad Mare movendum sunt in triplicata ratione distantiarum inverse, ideoque vires in maxima & minima harum distantiarum sunt ad vim in mediocri distantia, ut 0,9830427 & 1,017522 ad 1. Unde fit $1,017522 \text{ L} + 0,7986355 \text{ S ad } 0,9830427 \times 0,8570327 \text{ L} - 0,7986355 \text{ S ut } 9 \text{ ad } 5$. Et *S* ad *L* ut 1 ad 4,4815. Itaque cum vis Solis sit ad vim gravitatis ut 1 ad 12868200, vis Lunæ erit ad vim gravitatis ut 1 ad 2871400.

Corol. 1. Cum Aqua vi Solis agitata ascendat ad altitudinem pedis unius & undecim digitorum cum octava parte digiti, eadem vi Lunæ ascendet ad altitudinem octo pedum & digitorum octo, & vi utraque ad altitudinem pedum decem cum semisse, & ubi Luna est in Perigæo ad altitudinem pedum duodecim cum semisse & ultra, præsertim ubi Æstus ventis spirantibus adjuvatur. Tanta autem vis ad omnes Maris motus excitandos abunde sufficit, & quantitati motuum probe respondet. Nam in maribus quæ ab Oriente in Occidentem late patent, uti in Mari *Pacífico*, & Maris *Atlantici* & *Æthiopici* partibus extra Tropicos, aqua attolli solet ad altitudinem pedum sex, novem, duodecim vel quindecim. In Mari autem *Pacífico*, quod profundius est & latius patet, Æstus dicuntur esse majores quam in *Atlantico* & *Æthiopico*. Etenim ut plenus sit Æstus, latitudo Maris ab Oriente in Occidentem non minor esse debet quam graduum nonaginta. In Mari *Æthiopico*, ascensus aquæ intra Tropicos minor est quam in Zonis temperatis, propter angustiam Maris inter *Africam* & Australem partem *Americæ*. In medio Mari aqua nequit ascendere, nisi ad littus utrumque & orientale & occidentale simul descendat: cum tamen vicibus alternis ad littora illa in Maribus nostris angustis descendere debeat. Ea de causa fluxus & refluxus in Insulis, quæ à littoribus longissime absunt, perexiguus esse solet. In Portubus quibusdam, ubi aqua cum impetu magno per loca vadosa, ad Sinus alternis vicibus implendos & evacuandos, influere & effluere cogitur, fluxus & refluxus debent esse solito majores, uti ad *Plymuthum* & pontem *Chepstowæ* in *Anglia*; ad montes *S. Michaelis* & urbem *Abrincatuorum* (vulgo *Avranches*) in *Normania*; ad *Cambaïam* & *Pegu* in *India* orientali. His in locis mare, magna cum velocitate accedendo & recedendo, littora nunc inundat nunc arida relinquit ad multa milliaria. Neque impetus influendi & remeandi prius frangi potest, quam aqua attollitur vel deprimitur ad pedes 30, 40, vel 50 & amplius. Et par est ratio fretorum oblongorum & vadosorum, uti *Magellanicis* & ejus quo *Anglia* circumdatur. Æstus in hujusmodi portubus & fretis, per impetum cursus & recursus supra modum augetur. Ad littora vero quæ descensu præcipiti ad mare profundum & apertum spectant, ubi aqua sine impetu effluendi & remeandi attolli & subsidere potest, magnitudo Æstus respondet viribus Solis & Lunæ.

DE MUNDI
SYSTEMATE,

Corol. 2. Cum vis Lunæ ad Mare movendum, sit ad vim gravitatis ut 1 ad 2871400, perspicuum est quod vis illa sit longe minor quam quæ vel in experimentis Pendulorum, vel in Staticis aut Hydrostaticis quibuscunque sentiri possit. In Æstu solo marino hæc vis sensibilem edit effectum.

Corol. 3. Quoniam vis Lunæ ad Mare movendum, est ad Solis vim confimilem ut 4,4815 ad 1, & vires illæ (per *Corol. 14. Prop. LXVI. Lib. I.*) sunt ut densitates corporum Lunæ & Solis & cubi diametrorum apparentium conjunctim; densitas Lunæ erit ad densitatem Solis, ut 4,4815 ad 1 directe & cubus diametri Lunæ ad cubum diametri Solis inverse: id est (cum diametri mediocres apparentes Lunæ & Solis sint 31'. 16" & 32'. 12") ut 4891 ad 1000. Densitas autem Solis erat ad densitatem Terræ, ut 100 ad 396; & propterea densitas Lunæ est ad densitatem Terræ, ut 4891 ad 3960 seu 21 ad 17. Est igitur corpus Lunæ densius & magis terrestre quam Terra nostra.

Corol. 4. Et cum vera diameter Lunæ (ex Observationibus Astronomicis) sit ad veram diametrum Terræ, ut 100 ad 365; erit massa Lunæ ad massam Terræ, ut 1 ad 39,371.

Corol. 5. Et gravitas acceleratrix in superficie Lunæ, erit quasi triplo minor quam gravitas acceleratrix in superficie Terræ.

Corol. 6. Et distantia centri Lunæ a centro Terræ, erit ad distantiam centri Lunæ a communi gravitatis centro Terræ & Lunæ, ut 40,371 ad 39,371.

Corol. 7. Et mediocris distantia centri Lunæ a centro Terræ, erit semidiametrorum maximarum Terræ 60½ quamproxime. Nam semidiameter maxima Terræ fuit pedum Parisiensium 19767630, & mediocris distantia centrorum Terræ & Lunæ ex hujusmodi semidiametris 60½ constans, æqualis est pedibus 1190999707. Et hæc distantia (per Corollarium superius) est ad distantiam centri Lunæ a communi gravitatis centro Terræ & Lunæ, ut 40,371 ad 39,371, quæ proinde est pedum 1161498340. Et cum Luna revolvatur respectu Fixarum, diebus 27, horis 7 & minutis primis 43½, sinus versus anguli quem Luna, tempore minuti unius primi motu suo medio, circa commune gravitatis centrum Terræ & Lunæ describit, est 1275235, existente radio 100, 000000, 000000. Et ut radius est ad hunc sinum versum, ita sunt pedes 1161498340 ad pedes 14,811833. Luna igitur vi illa qua retinetur in Orbe, cadendo in Terram, tempore minuti unius primi describet pedes 14,811833. Et si hæc vis augeatur in ratione 177½ ad 178½, habebitur

bebitur vis tota gravitatis in Orbe Lunæ, per Corol. Prop. III. LIBER
TERTIUS
 Et hac vi Luna cadendo, tempore minuti unius primi describere deberet pedes 14,89517. Et ad sexagesimam partem hujus distantiae, id est, ad distantiam pedum 19849995 a centro Terræ, corpus grave cadendo, tempore minuti unius secundi describere deberet etiam pedes 14,89517. Diminuatur hæc distantia in subduplicata ratione pedum 14,89517 ad pedes 15,12028, & habebitur distantia pedum 19701678 a qua grave cadendo, eodem tempore minuti unius secundi describet pedes 15,12028, id est, pedes 15, dig. 1, lin. 5,32. Et hac vi gravia cadunt in superficie Terræ, in Latitudine urbis *Lutetiæ Parisiorum*, ut supra ostensum est. Est autem distantia pedum 19701678 paulo minor quam semidiameter globi huic Terræ æqualis, & paulo major quam Terræ hujus semidiameter mediocris, ut oportet. Sed differentiae sunt insensibiles. Et propterea vis qua Luna retinetur in Orbe suo, ad distantiam maximarum Terræ semidiametrorum $60\frac{1}{2}$, ea est quam vis Gravitatis in superficie Terræ requirit.

Corol. 8. Distantia mediocris centrorum Terræ & Lunæ, est mediocrium Terræ semidiametrorum $60\frac{1}{2}$ quamproxime. Nam semidiameter mediocris, quæ erat pedum 19688725, est ad semidiametrum maximam pedum 19767630, ut $60\frac{1}{2}$ ad $60\frac{1}{2}$ quamproxime.

In his computationibus Attractionem magneticam Terræ non consideravimus, cujus utique quantitas perparva est & ignoratur. Siquando vero hæc Attractio investigari poterit, & mensuræ graduum in Meridiano, ac longitudes Pendulorum isochronorum in diversis parallelis, legesque motuum Maris, & parallaxis Lunæ cum diametris apparentibus Solis & Lunæ ex Phænomenis accuratius determinatæ fuerint: licebit calculum hunc omnem accuratius repetere.

PROPOSITIO XXXVIII. PROBLEMA XIX.

Invenire Figuram corporis Lunæ.

Si corpus Lunare fluidum esset ad instar Maris nostri, vis Terræ ad fluidum illud in partibus & citimis & ultimis elevandum, esset ad vim Lunæ, quæ Mare nostrum in partibus & sub Luna & Lunæ oppositis attollitur, ut gravitas acceleratrix Lunæ in Terram ad gravitatem acceleratricem Terræ in Lunam & diameter Lunæ ad
diame-

DE MUNDI
SYSTEMATE,

diametrum Terræ conjunctim; id est, ut 39,371 ad 1 & 100 ad 365 conjunctim, seu 1079 ad 100. Unde cum Mare nostrum vi Lunæ attollatur ad pedes $8\frac{1}{2}$, fluidum Lunare vi Terræ attolli deberet ad pedes 93 $\frac{1}{2}$. Eaque de causa Figura Lunæ Sphærois esset, cujus maxima diameter producta transiret per centrum Terræ, & superaret diametros perpendiculares excessu pedum 187. Talem igitur Figuram Luna affectat, eamque sub initio induere debuit.

Q. E. I.



Corol. Inde vero fit ut eadem semper Lunæ facies in Terram obvertatur. In alio enim situ corpus Lunare quiescere non potest, sed ad hunc situm oscillando semper redibit. Attamen oscillationes, ob parvitatem virium agitantium, essent longè tardissimæ: adeo ut facies illa, quæ Terram semper respicere deberet, possit alterum orbis Lunaris umbilicum, ob rationem in Prop. xvii. allatam respicere, neque statim abinde retrahi & in Terram converti.

L E M M A I.

Si APEp Terram designet uniformiter densam, centroque C & Polis P, p & Æquatore AE delineatam; & si centro C radio CP describi intelligatur Sphæra Pap e; sit autem QR planum, cui recta a centro Solis ad centrum Terræ ducta normaliter insistit; & Terræ totius exterioris Pap APEpE, quæ Sphæra modo descripta altior est, particule singule conentur recedere hinc inde a plano QR, sitque conatus particule cujusque ut ejusdem distantia a plano: Dico primo, quod tota particularum omnium, in Æquatoris circulo AE, extra globum uniformiter per totum circuitum in morem annuli dispositarum, vis & efficacia ad Terram circum centrum ejus rotandam, sit ad totam particularum totidem in Æquatoris puncto A, quod a plano QR maxime distat, consistentium vim & efficaciam, ad Terram consimili motu circulari circum centrum ejus movendam, ut unum ad duo. Et motus iste circularis circum axem, in communi sectione Æquatoris & plani QR jacentem, peragetur.

Nam centro C diametro BD describatur semicirculus BAFDC. Dividi intelligatur semicircumferentia BAD in partes

partes innumeras æquales, & a partibus singulis F ad diametrum BD demittantur sinus FT . Et summa quadratorum ex sinibus omnibus FT æqualis erit summæ quadratorum ex sinibus omnibus CT , & summa utraque æqualis erit summæ quadratorum ex totidem semidiamentis CF ; adeoque summa quadratorum ex omnibus FT , erit duplo minor quam summa quadratorum ex totidem semidiamentis CF .




Jam dividatur perimeter circuli AE in particulas totidem æquales, & ab earum unaquaque F ad planum QR demittatur perpendicularum FG , ut & a puncto A perpendicularum AH . Et vis qua particula F recedit a plano QR , erit ut perpendicularum illud FG per hypothesin, & hæc vis ducta in distantiam CG , erit efficacia particulæ F ad Terram circum centrum ejus convertendam. Adeoque efficacia particulæ in loco F , erit ad efficaciam particulæ in loco A , ut $FG \times GC$ ad $AH \times HC$, hoc est, ut FCq ad ACq ; & propterea efficacia tota particularum omnium in locis suis F , erit ad efficaciam particularum totidem in loco A , ut summa omnium FCq ad summam totidem ACq , hoc est, (per jam demonstrata) ut unum ad duo. $Q.E.D.$

Et quoniam particulæ agunt recedendo perpendiculariter a plano QR , idque æqualiter ab utraque parte hujus plani: eadem convertent circumferentiam circuli Æquatoris , eique inhærentem Terram, circum axem tam in plano illo QR quam in plano Æquatoris jacentem.

L E M M A II.

Iisdem positis: Dico, secundo quod vis & efficacia tota particularum omnium extra globum undique sitarum, ad Terram circum axem eundem rotandam, sit ad vim totam particularum totidem, in Æquatoris circulo AE, uniformiter per totum circuitum in morem annuli dispositarum, ad Terram consimili motu circulari movendam, ut duo ad quinque.

Sit enim IK circulus quilibet minor Æquatori AE parallelus, sintque L, l particulæ duæ quævis æquales in hoc circulo extra globum $Pape$ sitæ. Et si in planum QR , quod radio in Solem ducto perpendicularare est, demittantur perpendiculara LM, lm : vires totæ quibus particulæ illæ fugiunt planum QR , proportionales erunt perpendicularis illis LM, lm . Sit autem recta Ll plano $Pape$ parallela & bifecetur eadem in X , & per punctum X agatur Nn , quæ parallela sit plano QR & perpendi-



culis LM, lm occurrat in N ac n , & in planum QR demittatur perpendicularum XY . Et particularum L & l vires contrariæ, ad Terram in contrarias partes rotandam, sunt ut $LM \times MC$ & $lm \times mC$, hoc est, ut $LN \times MC + NM \times MC$ & $ln \times mC - nm \times mC$, seu $LN \times MC + NM \times MC$ & $LN \times mC - NM$

— $NM \times mC$: & harum differentia $LN \times Mm - NM \times MC + mC$,
 est vis particularum ambarum simul sumptarum ad Terram
 rotandam. Hujus differentiae pars affirmativa $LN \times Mm$ seu
 $2 LN \times NX$, est ad particularum duarum ejusdem magnitudi-
 nis in A consistentium vim $2 AH \times HC$, ut LXq ad ACq .
 Et pars negativa $NM \times MC + mC$ seu $2 XT \times CT$, ad parti-
 cularum earundem in A consistentium vim $2 AH \times HC$, ut
 CXq ad ACq . Ac proinde partium differentia, id est, par-
 ticularum duarum L & l simul sumptarum vis ad Terram rotan-
 dam, est ad vim particularum duarum iisdem æqualium & in loco
 A consistentium, ad Terram itidem rotandam, ut $LXq - CXq$
 ad ACq . Sed si circuli IK circumferentia IK dividatur in par-
 ticulas innumeras æquales L , erunt omnes LXq ad totidem IXq
 ut 1 ad 2, (per Lem. I.) atque ad totidem ACq , ut IXq ad
 $2 ACq$; & totidem CXq ad totidem ACq ut $2 CXq$ ad $2 ACq$.
 Quare vires conjunctæ particularum omnium in circuitu circuli
 IK , sunt ad vires conjunctas particularum totidem in loco A , ut
 $IXq - 2 CXq$ ad $2 ACq$: & propterea (per Lem. I.) ad vires
 conjunctas particularum totidem in circuitu circuli AE , ut
 $IXq - 2 CXq$ ad ACq .

Jam vero si Sphærae diameter Pp dividatur in partes innume-
 ras æquales, quibus insistant circuli totidem IK ; materia in peri-
 metro circuli cujusque IK erit ut IXq : ideoque vis materiæ
 illius ad Terram rotandam, erit ut IXq in $IXq - 2 CXq$. Et
 vis materiæ ejusdem, si in circuli AE perimetro confisteret, esset
 ut IXq in ACq . Et propterea vis particularum omnium ma-
 teriæ totius, extra globum in perimetris circulorum omnium con-
 sistentis, est ad vim particularum totidem in perimetro circuli
 maximi AE consistentis, ut omnia IXq in $IXq - 2 CXq$ ad
 totidem IXq in ACq , hoc est, ut omnia $ACq - CXq$ in
 $ACq - 3 CXq$ ad totidem $ACq - CXq$ in ACq , id est, ut
 omnia $ACq q - 4 ACq \times CXq + 3 CXq q$ ad totidem $ACq q$
 $- ACq \times CXq$, hoc est, ut tota quantitas fluens cujus fluxio
 est $ACq q - 4 ACq \times CXq + 3 CXq q$, ad totam quantitatem flu-
 entem cujus fluxio est $ACq q - ACq \times CXq$; ac proinde per Me-
 thodum Fluxionum, ut $ACq q \times CX - \frac{1}{2} ACq \times CX cub. + \frac{1}{2} CX q c$
 ad $ACq q \times CX - \frac{1}{2} ACq \times CX cub.$, id est, si pro CX scribatur
 tota Cp vel AC , ut $\frac{1}{2} AC q c$ ad $\frac{1}{2} AC q c$, hoc est, ut duo ad
 quingue. Q. E. D.

L E M M A III.

Iisdem positis: Dico tertio quod motus Terræ totius circum axem jam ante descriptum, ex motibus particularum omnium compositus, erit ad motum annuli prædicti circum axem eundem in ratione quæ componitur ex ratione materiæ in Terra ad materiæ in annulo, & ratione trium quadratorum ex arcu quadranti circuli cujuscunque ad duo quadrata ex diametro; id est, in ratione materiæ ad materiæ & numeri 925275 ad numerum 1000000.

Est enim motus Cylindri circum axem suum immotum revolventis, ad motum Sphæræ inscriptæ & simul revolventis, ut quælibet quatuor æqualia quadrata ad tres ex circulis sibi inscriptis: & motus Cylindri ad motum annuli tenuissimi, Sphæram & Cylindrum ad communem eorum contractum ambientis, ut duplum materiæ in Cylindro ad triplum materiæ in annulo; & annuli motus iste circum axem Cylindri uniformiter continuatus, ad ejusdem motum uniformem circum diametrum propriam, eodem tempore periodico factum, ut circumferentia circuli ad duplum diametri.

HYPOTHESIS II.

Si annulus prædictus Terra omni reliqua sublata, solus in Orbe Terræ, motu annuo circa Solem ferretur, & interea circa axem suum, ad planum Eclipticæ in angulo graduum $23\frac{1}{2}$ inclinatum, motu diurno revolveretur: idem foret motus Punctorum Æquinoctialium sive annulus iste fluidus esset, sive is ex materia rigida & firma constaret.

PRO.

PROPOSITIO XXXIX. PROBLEMA XX.

Invenire Præcessionem Æquinoctiorum.

Motus mediocris horarius Nodorum Lunæ in Orbe circulari, ubi Nodi sunt in Quadraturis, erat $16'. 35''.$ $16''.$ $36''.$ & hujus dimidium $8''.$ $17'''.$ $38''.$ $18''.$ (ob rationes supra explicatas) est motus medius horarius Nodorum in tali Orbe; fitque anno toto fidereo $20^{\text{gr.}}$ $11'.$ $46''.$ Quoniam igitur Nodi Lunæ in tali Orbe conficerent annuatim $20^{\text{gr.}}$ $11'.$ $46''.$ in antecedentia; & si plures essent Lunæ motus Nodorum cujusque, per Corollar. 16. Prop. LXVI. Lib. I. forent ut tempora periodica; si Luna spatio diei fiderei juxta superficiem Terræ revolveretur, motus annuus Nodorum foret ad $20^{\text{gr.}}$ $11'.$ $46''.$ ut dies fidereus horarum 23. 56'. ad tempus periodicum Lunæ dierum 27. 7 hor. 43'; id est, ut 1436 ad 39343. Et par est ratio Nodorum annuli Lunarum Terram ambientis; sive Lunæ illæ se mutuo non contingant, sive liquefcant & in anulum continuum formentur, sive denique annulus ille rigescat & inflexibilis reddatur.

Fingamus igitur quod annulus iste, quoad quantitatem materiæ, æqualis sit Terræ omni *PapAPepE* quæ globo *Pape* superior est; (*Vid. Fig. pag. 434.*) & quoniam globus iste est ad Terram illam superiorem ut *aCqu.* ad *ACqu.* — *aCqu.* id est (cum Terræ diameter minor *PC* vel *aC* sit ad diametrum majorem *AC* ut 229 ad 230,) ut 52441 ad 459; si annulus iste Terram secundum Æquatorem cingeret & uterque simul circa diametrum annuli revolveretur; motus annuli esset ad motum globi interioris (per hujus Lem. III.) ut 459 ad 52441 & 1000000 ad 925275 conjunctim, hoc est, ut 4590 ad 485223; ideoque motus annuli esset ad summam motuum annuli ac globi, ut 4590 ad 489813. Unde si annulus globo adhæreat, & motum suum quo ipsius Nodi seu puncta Æquinoctialia regrediuntur, cum globo communicet: motus qui restabit in annulo erit ad ipsius motum priorem, ut 4590 ad 489813; & propterea motus punctorum Æquinoctialium diminuetur in eadem ratione. Erit igitur motus annuus punctorum Æquinoctialium corporis ex annulo & globo compositi, ad motum

20^{gr}. 11'. 46", ut 1436 ad 39343 & 4590 ad 489813 conjunctum, id est, ut 100 ad 292369. Vires autem quibus Nodi Lunarum (ut supra explicui) atque adeo quibus puncta Æquinoctialia annuli regrediuntur (id est vires 3 *IT*, in *Fig. pag.* 403 & 404.) sunt in singulis particulis ut distantiae particularum à plano *QR*, & his viribus particulæ illæ planum fugiunt; & propterea (per Lem. II.) si materia annuli per totam globi superficiem, in morem figuræ *P a p A P e p E*, ad superiorem illam Terræ partem constituendam spargeretur, vis & efficacia tota particularum omnium ad Terram circa quamvis Æquatoris diametrum rotandam, atque adeo ad movenda puncta Æquinoctialia, evaderet minor quam prius in ratione 2 ad 5. Ideoque annuus Æquinoctiorum regressus jam esset ad 20^{gr}. 11'. 46", ut 10 ad 73092: ac proinde fieret 9". 56". 50^{iv}.

Cæterum hic motus, ob inclinationem plani Æquatoris ad planum Eclipticæ, minuendus est, idque in ratione sinus 91706 (qui sinus est complementi graduum 23½) ad Radium 100000. Qua ratione motus iste jam fiet 9". 7". 20^{iv}. Hæc est annua Præcessio Æquinoctiorum a vi Solis oriunda.

Vis autem Lunæ ad Mare movendum erat ad vim Solis, ut 4, 4815 ad 1 circiter. Et vis Lunæ ad Æquinoctia movenda, est ad vim Solis in eadem proportionem. Indeque prodit annua Æquinoctiorum Præcessio a vi Lunæ oriunda 40". 52". 52^{iv}; ac tota Præcessio annua a vi utraque oriunda 50". 00". 12^{iv}. Et hic motus cum Phenomenis congruit. Nam Præcessio Æquinoctiorum ex Observationibus Astronomicis est minorum secundorum plus minus quinquaginta.

Si altitudo Terræ ad Æquatorem superet altitudinem ejus ad Polos, milliaribus pluribus quam 17½, materia ejus rarior erit ad circumferentiam quam ad centrum: & Præcessio Æquinoctiorum ob altitudinem illam augeri, ob raritatem diminui debet.

Descriptimus jam Systema Solis, Terræ, Lunæ, & Planetarum: superest ut de Cometis nonnulla adjiciantur.


LEMMA

L E M M A IV.

LIBER
TERTIUS.

Cometas esse Luna superiores & in regione Planetarum versari.


Ut defectus Parallaxeos diurnæ extulit Cometas supra regiones sublunares, sic ex Parallaxi annua convincitur eorum descensus in regiones Planetarum. Nam Cometæ qui progrediuntur secundum ordinem signorum sunt omnes, sub exitu apparitionis, aut solito tardiores aut retrogradi, si Terra est inter ipsos & Solem; at justo celeriores si Terra vergit ad oppositionem. Et e contra, qui pergunt contra ordinem signorum sunt justo celeriores in fine apparitionis, si Terra versatur inter ipsos & Solem; & justo tardiores vel retrogradi si Terra sita est ad contrarias partes. Contingit hoc maxime ex motu Terræ in vario ipsius situ, perinde ut fit in Planetis, qui, pro motu Terræ vel conspirante vel contrario, nunc retrogradi sunt, nunc tardius progredi videntur, nunc vero celerius. Si Terra pergit ad eandem partem cum Cometa, & motu angulari circa Solem tanto celerius fertur, ut recta per Terram & Cometam perpetuo ducta convergat ad partes ultra Cometam, Cometa e Terra spectatus, ob motum suum tardiozem, apparet esse retrogradus; sin Terra tardius fertur, motus Cometæ,



(detracto motu Terræ) fit saltem tardior. At si Terra pergit in contrarias partes, Cometa exinde velocior apparet. Ex acceleratione autem vel retardatione vel motu retrogrado distantia Cometæ in hunc modum colligitur. Sunto νQA , νQB , νQC observatæ tres longitudines Cometæ, sub initio motus, sitque νQF longitudo ultimo observata, ubi Cometa videri definit. Agatur

DE MUNDI
SYSTEMATI,

Agatur recta ABC , cujus partes AB , BC rectis QA & QB , QB & QC interjectæ, sint ad invicem ut tempora inter observationes tres primas. Producatur AC ad G , ut sit AG ad AB ut tempus inter observationem primam & ultimam, ad tempus inter observationem primam & secundam, & jungatur QG . Et si Cometa moveretur uniformiter in linea recta, atque Terra vel quiesceret, vel etiam in linea recta, uniformi cum motu, progresseretur; foret angulus $\angle QG$ longitudo Cometæ tempore Observationis ultimæ. Angulus igitur $\angle FQG$; qui longitudinum differentia est, oritur ab inæqualitate motuum Cometæ ac Terræ. Hic autem angulus, si Terra & Cometa in contrarias partes moverentur, additur angulo $\angle QG$, & sic motum apparentem Cometæ velociorem reddit: Sin Cometa pergit in easdem partes cum Terra, eidem subducitur, motumque Cometæ vel tardiolem reddit, vel forte retrogradum, uti modo exposui. Oritur igitur hic angulus præcipue ex motu Terræ, & idcirco pro parallaxi Cometæ merito habendus est, neglecto videlicet ejus incremento vel decremento nonnullo, quod a Cometæ motu inæquabili in Orbe proprio oriri possit. Distantia vero Cometæ ex hac parallaxi sic colligitur. Designet S Solem, $a c T$ Orbem magnum, a locum Terræ in observatione prima, c locum Terræ in observatione tertia, T locum Terræ in observatione ultima, & TV lineam rectam versus principium Arietis ductam. Sumatur angulus $\angle TVV$ æqualis angulo $\angle QF$, hoc est, æqualis longitudini Cometæ ubi Terra versatur in T . Jungatur ac , & producatur ea ad g , ut sit ag ad ac ut AG ad AC , & erit g locus quem Terra tempore observationis ultimæ, motu in recta ac uniformiter continuato, attingeret. Ideoque si ducatur gV ipsi TV parallela, & capiatur angulus $\angle gV$ angulo $\angle QG$ æqualis, erit hic angulus $\angle gV$ æqualis longitudini Cometæ e loco g spectati; & angulus $\angle TVg$ parallaxis erit, quæ oritur a translatione Terræ de loco g in locum T : ac proinde V locus erit Cometæ in plano Eclipticæ. Hic autem locus V Orbe Jovis inferior esse solet.



Idem

Idem colligitur ex curvatura viæ Cometarum. Pergunt hæc corpora propemodum in circulis maximis quamdiu moventur celerius; at in fine cursus, ubi motus apparentis pars illa quæ à parallaxi oritur, majorem habet proportionem ad motum totum apparentem, deflectere solent ab his circulis, & quoties Terra movetur in unam partem, abire in partem contrariam. Oritur hæc deflexio maxime ex Parallaxi, propterea quod respondet motui Terræ; & insignis ejus quantitas, meo computo, collocavit dispa- rentes Cometas satis longe infra Jovem. Unde consequens est quod in Perigæis & Periheliis, ubi propius adsunt, descendunt sæpius infra orbes Martis & inferiorum Planetarum.

Confirmatur etiam propinquitas Cometarum ex luce capitum. Nam corporis coelestis a Sole illustrati & in regiones longinquas abeuntis, diminuitur splendor in quadruplicata ratione distantiae: in duplicata ratione videlicet ob auctam corporis distantiam a Sole, & in alia duplicata ratione ob diminutam diametrum apparentem. Unde si detur & lucis quantitas & apprens diametrum Cometæ, dabitur distantia, dicendo quod distantia sit ad distantiam Planetæ, in ratione diametri ad diametrum directæ & ratione subduplicata lucis ad lucem inverse. Sic minima capillitii Cometæ anni 1682 diameter, per Tubum opticum sexdecim pedum a *Flamstedio* observata & Micrometro mensurata, æquabat 2'. 0". Nucleus autem seu stella in medio capitis vix decimam partem latitudinis hujus occupabat, adeoque lata erat tantum 11" vel 12". Luce vero & claritate capitis superabat caput Cometæ anni 1680, stellæque primæ vel secundæ magnitudinis æmulabatur. Ponamus Saturnum cum annulo suo quasi quadruplo lucidiorem fuisse: & quoniam lux annuli propemodum æquabat lucem globi intermedii, & diameter apparens globi sit quasi 21", adeoque lux globi & annuli conjunctim æquaret lucem globi, cujus diameter esset 30": erit distantia Cometæ ad distantiam Saturni ut 1 ad $\sqrt{4}$ inverse, & 12" ad 30" directæ, id est, ut 24 ad 30 seu 4 ad 5. Rursus Cometa anni 1665 mense *Aprili*, ut author est *Hevelius*, claritate sua pene Fixas omnes superabat, quinetiam ipsam Saturnum, ratione coloris videlicet longe vividioris. Quippe lucidior erat hic Cometa altero illo, qui in fine anni præcedentis apparuerat & cum stellis primæ magnitudinis conferebatur. Latitudo capillitii erat quasi 6', at nucleus cum Planetis ope Tubi optici collatus, plane minor erat Jove, & nunc minor corpore interme-

DE MUNDI
SYSTEMATE,

dio Saturni, nunc ipsi æqualis judicabatur. Porro cum diameter capillitii Cometarum raro superet 8' vel 12', diameter vero nuclei seu stellæ centralis sit quasi decima vel forte decima quinta pars diametri capillitii, patet Stellas hæc ut plurimum ejusdem esse apparentis magnitudinis cum Planetis. Unde cum lux earum cum luce Saturni non raro conferri possit, eamque aliquando superet; manifestum est quod Cometæ omnes in Periheliis vel infra Saturnum collocandi sint, vel non longe supra. Errant igitur toto cœlo qui Cometæ in regionem Fixarum prope ablegant: quæ certe ratione non magis illustrari deberent a Sole nostro, quam Planetæ, qui hic sunt, illustrantur a Stellis fixis.

Hæc disputavimus non considerando obscurationem Cometarum per fumum illum maxime copiosum & crassum, quo caput circumdatur, quasi per nubem obtuse semper lucens. Nam quanto obscurius redditur corpus per hunc fumum, tanto propius ad Solem accedat necesse est, ut copia lucis a se reflexa Planetas æmuletur. Inde verisimile sit Cometæ longe infra sphaeram Saturni descendere, uti ex Parallaxi probavimus. Idem vero quam maxime confirmatur ex Caudis. Hæ vel ex reflexione fumi sparsi per Æthera, vel ex luce capitis oriuntur. Priore casu minuenda est distantia Cometarum, ne fumus a capite semper ortus per spatia nimis ampla incredibili cum velocitate & expansione propagetur. In posteriore referenda est lux omnis tam caudæ quam capillitii ad nucleum capitis. Igitur si concipiamus lucem hanc omnem congregari & intra discum nuclei coarctari, nucleus ille jam certe, quoties caudam maximam & fulgentissimam emittit, Jovem ipsum splendore suo multum superabit. Minore igitur cum diametro apparente plus lucis emittens, multo magis illustrabitur a Sole, adeoque erit Soli multo propior. Quinetiam capita sub Sole delitescunt, & caudas cum maximas tum fulgentissimas instar trabium ignitarum nonnunquam emittentia, eodem argumento infra orbem Veneris collocari debent. Nam lux illa omnis si in stellam congregari supponatur, ipsam Venerem ne dicam Veneres plures conjunctas quandoque superaret.

Idem denique colligitur ex luce capitum crescente in recessu Cometarum a Terra Solem versus, ac decrescente in eorum recessu a Sole versus Terram. Sic enim Cometa posterior Anni 1665 (observante *Hevelio*,) ex quo conspici cœpit, remittebat semper
de

de motu suo apparente, adeoque præterierat Perigæum; Splendor vero capitis nihilominus indies crescebat, usque dum Cometa radiis Solaribus obtectus desinit apparere. Cometa Anni 1683, observante eodem *Hevelio*, in fine Mensis *Julii* ubi primum conspectus est, tardissime movebatur, minuta prima 40 vel 45 circiter singulis diebus in Orbe suo conficiens. Ex eo tempore motus ejus diurnus perpetuo augebatur usque ad *Sept.* 4. quando evasit graduum quasi quinque. Igitur toto hoc tempore Cometa ad Terram appropinquabat. Id quod etiam ex diametro capitis Micrometro mensurata colligitur: quippe quam *Hevelius* reperit *Aug.* 6. esse tantum 6'. 5". inclusa coma, at *Sept.* 2. esse 9'. 7". Caput igitur initio longe minus apparuit quam in fine motus, at initio tamen in vicinia Solis longe lucidius extitit quam circa finem, ut refert idem *Hevelius*. Proinde toto hoc tempore, ob recessum ipsius a Sole, quoad lumen decrevit, non obstante accessu ad Terram. Cometa Anni 1618 circa medium Mensis *Decembris*, & iste Anni 1680 circa finem ejusdem Mensis, celerrime movebantur, adeoque tunc erant in Perigæis. Verum splendor maximus capitum contigit ante duas fere septimanas, ubi modo exierant de radiis Solaribus; & splendor maximus caudarum paulo ante, in majore vicinitate Solis. Caput Cometæ prioris, juxta observationes *Cysati*, *Decemb.* 1. majus videbatur stellis primæ magnitudinis, & *Decemb.* 16. (jam in Perigæo existens) magnitudine parum, splendore seu claritate luminis plurimum defecerat. *Jan.* 7. *Keplerus* de capite incertus finem fecit observandi. Die 12 mensis *Decemb.* conspectum & a *Flamstedio* observatum est caput Cometæ posterioris, in distantia novem graduum a Sole; id quod stellæ tertiæ magnitudinis vix concessum fuisset. *Decemb.* 15 & 17 apparuit idem ut stellæ tertiæ magnitudinis, diminutum utique splendore Nubium juxta Solem occidentem. *Decemb.* 26. velocissime motus, inque Perigæo propemodum existens, cedebat ori Pegasi, Stellæ tertiæ magnitudinis. *Jan.* 3. apparebat ut Stella quartæ, *Jan.* 9. ut Stella quintæ, *Jan.* 13. ob splendorem Lunæ crescentis disparuit. *Jan.* 25. vix æquabat Stellas magnitudinis septimæ. Si sumantur æqualia a Perigæo hinc inde tempora, capita quæ temporibus illis in longinquis regionibus posita, ob æquales a Terra distantias, æqualiter lucere debuissent, in plaga Solis maxime splenduerunt, ex altera Perigæi parte evanuerunt. Igitur ex magna lucis in utroque situ differentia, concluditur magna Solis & Cometæ vicinitas in situ priore. Nam lux Cometarum

DE MUNDI SYSTEMATE, regularis esse solet, & maxima apparere ubi capita velocissime moventur, atque adeo sunt in Perigæis; nisi quatenus ea major est in vicinia Solis.

Corol. 1. Splendent igitur Cometæ luce Solis a se reflexa.

Corol. 2. Ex dictis etiam intelligitur cur Cometæ tantopere frequentant regionem Solis. Si cernerentur in regionibus longe ultra Saturnum, deberent sæpius apparere in partibus Soli oppositis. Forent enim Terræ viciniore qui in his partibus versarentur, & Sol interpositus obscuraret cæteros. Verum percurrendo historias Cometarum, reperi quod quadruplo vel quintuplo plures detecti sunt in Hemisphærio Solem versus, quam in Hemisphærio opposito, præter alios procul dubio non paucos quos lux Solaris obtexit. Nimirum in descensu ad regiones nostras neque caudas emittunt, neque adeo illustrantur a Sole, ut nudis oculis se prius detegendos exhibeant, quam sint ipso Jove propiores. Spatii autem tantillo intervallo circa Solem descripti pars longe major sita est a latere Terræ quod Solem respicit; inque parte illa majore Cometæ, Soli ut plurimum viciniore, magis illuminari solent.

Corol. 3. Hinc etiam manifestum est, quod Cœli resistentia destituuntur. Nam Cometæ vias obliquas & nonnunquam cursui Planetarum contrarias secuti, moventur omnifariam liberrime, & motus suos etiam contra cursum Planetarum, diutissime conservant. Fallor ni genus Planetarum sint, & motu perpetuo in orbem redeant. Nam quod Scriptores aliqui Meteora esse volunt, argumentum a capitum perpetuis mutationibus ducentes, fundamento carere videtur. Capita Cometarum Atmosphæris ingentibus cinguntur; & Atmosphæræ inferne densiores esse debent. Unde nubes sunt, non ipsa Cometarum corpora, in quibus mutationes illæ visuntur. Sic Terra si e Planetis spectaretur, luce nubium suarum proculdubio splenderet, & corpus firmum sub nubibus prope delitesceret. Sic cingula Jovis in nubibus Planetæ illius formata sunt, quæ situm mutant inter se, & firmum Jovis corpus per nubes illas difficiliter cernitur. Et multo magis corpora Cometarum sub Atmosphæris & profundioribus & crassioribus abscondi debent.

PRO-

PROPOSITIO XL. THEOREMA XX.

Cometas in Sectionibus Conicis umbilicos in centro Solis habentibus moveri, & radiis ad Solem ductis areas temporibus proportionales describere.

Patet per Corol. 1. Propof. xiii. Libri primi, collatum cum Prop. viii, xii & xiii. Libri tertii.

Corol. 1. Hinc si Cometæ in orbem redeunt : Orbes erunt Ellipses, & tempora periodica erunt ad tempora periodica Planetarum in axium principalium ratione sesquuplicata. Ideoque Cometæ maxima ex parte supra Planetas versantes, & eo nomine Orbes axibus majoribus describentes, tardius revolventur. Ut si axis Orbis Cometæ sit quadruplo major axe Orbis Saturni, tempus revolutionis Cometæ erit ad tempus revolutionis Saturni, id est, ad annos 30, ut $4\sqrt{4}$ (seu 8) ad 1, ideoque erit annorum 240.

Corol. 2. Orbes autem erunt Parabolis adeo finitimi, ut eorum vice Parabolæ, absque erroribus sensibilibus, adhiberi possint.

Corol. 3. Et propterea, per Corol. 7. Prop. xvi. Lib. I. velocitas Cometæ omnis, erit semper ad velocitatem Planetæ cujuscvis circa Solem in circulo revolventis, in subduplicata ratione duplæ distantiae Planetæ a centro Solis, ad distantiam Cometæ a centro Solis quamproxime. Ponamus radium Orbis magni, seu Ellipseos in qua Terra revolvitur semidiametrum maximam, esse partium 100000000 : & Terra motu suo diurno mediocri describet partes 1720212, & motu horario partes 71675½. Ideoque Cometa in eadem Telluris a Sole distantia mediocri, ea cum velocitate quæ fit ad velocitatem Telluris ut $\sqrt{2}$ ad 1, describet motu suo diurno partes 2432747, & motu horario partes 101364½. In majoribus autem vel minoribus distantis, motus tum diurnus tum horarius erit ad hunc motum diurnum & horarium in subduplicata ratione distantiarum reciproce, ideoque datur.


Corol. 4. Unde si Latus rectum Parabolæ quadruplo majus sit radio Orbis magni, & quadratum radii illius ponatur esse partium 100000000 : area quam Cometa radio ad Solem ducto singulis diebus describit, erit partium 1216373½, & singulis horis area illa erit partium 50682½. Sin latus rectum majus sit vel minus in ratione quavis, erit area diurna & horaria major vel minor in eadem ratione subduplicata.

L E M M A V.

Invenire lineam curvam generis Parabolici, quæ per data quotcunque puncta transibit.

Sunto puncta illa A, B, C, D, E, F , &c. & ab iisdem ad rectam quamvis positione datam HN demitte perpendiculara quotcunque AH, BI, CK, DL, EM, FN .

Caf. 1. Si punctorum H, I, K, L, M, N æqualia sunt intervalla HI, IK, KL , &c. collige perpendicularorum AH, BI, CK , &c. differentias primas $b, 2b, 3b, 4b, 5b$, &c. secundas $c, 2c, 3c, 4c$, &c. tertias $d, 2d, 3d$, &c. id est, ita ut fit $AH - BI = b$, $BI - CK = 2b, CK - DL = 3b, DL + EM = 4b, -EM + FN = 5b$,



&c. dein $b - 2b = c$, &c. & sic pergatur ad differentiam ultimam quæ hic est f . Deinde erecta quacunq; perpendiculari RS , quæ fuerit ordinatim applicata ad curvam quæsitam: ut inveniatur hujus longitudo, pone intervalla HI, IK, KL, LM , &c. unitates esse, & dic $AH = a$, $-HS = p$, $\frac{1}{2}p$ in $-IS = q$, $\frac{1}{2}q$ in $+SK$

$=r$, $\frac{1}{4}r$ in $+SL = s$, $\frac{1}{4}s$ in $+SM = t$; pergendo videlicet ad usque penultimum perpendicularum ME , & præponendo signa negativa terminis HS, IS , &c. qui jacent ad partes puncti S versus A , & signa affirmativa terminis SK, SL , &c. qui jacent ad alteras partes puncti S . Et signis probe observatis, erit $RS = a + bp + cq + dr + es + ft$, &c.

Caf. 2. Quod si punctorum H, I, K, L &c. inæqualia sint intervalla HI, IK , &c. collige perpendicularorum AH, BI, CK , &c. differentias primas per intervalla perpendicularorum divisas $b, 2b, 3b, 4b, 5b$; secundas per intervalla bina divisas $c, 2c, 3c, 4c$, &c. tertias per intervalla terna divisas $d, 2d, 3d$, &c. quartas per inter-

intervalla quaterna divisas $e, 2e, \&c.$ & sic deinceps; id est, ita LIBER
TERTIUS
 ut sit $b = \frac{AH-BI}{HI}$, $2b = \frac{BI-CK}{IK}$, $3b = \frac{CK-DL}{KL}$, &c. dein
 $c = \frac{b-2b}{HK}$, $2c = \frac{2b-3b}{IL}$, $3c = \frac{3b-4b}{KM}$, &c. Postea $d = \frac{c-2c}{HL}$

$2d = \frac{2c-3c}{IM}$, &c. Inventis differentiis, dic $AH = a$, $-HS = p$,
 p in $-IS = q$, q in $+SK = r$, r in $+SL = s$, s in $+SM = t$;
 pergendo scilicet ad usque perpendicularum penultimum ME , & erit
 ordinatim applicata $RS = a + bp + cq + dr + es + ft$, &c.

Corol. Hinc areæ curvarum omnium inveniri possunt quampro-
 xime. Nam si curvæ cujusvis quadrandæ inveniantur puncta ali-
 quot, & Parabola per eadem duci intelligatur: erit area Parabolæ
 hujus eadem quam proxime cum area curvæ illius quadrandæ.
 Potest autem Parabola, per Methodos notissimas, semper quadrari
 Geometrice.

L E M M A VI.

*Ex observatis aliquot locis Cometæ invenire locum ejus ad
 tempus quodvis intermedium datum.*

Designent HI, IK, KL, LM tempora inter observationes,
 (in Fig. præced.) HA, IB, KC, LD, ME observatas quinque
 longitudes Cometæ, HS tempus datum inter observationem pri-
 mam & longitudinem quæsitam. Et si per puncta A, B, C, D, E
 duci intelligatur curva regularis $ABCDE$; & per Lemma supe-
 rius inveniatur ejus ordinatim applicata RS , erit RS longitudo
 quæsitæ.

Eadem methodo ex observatis quinque latitudinibus invenitur
 latitudo ad tempus datum.


Si longitudinum observatarum parvæ sint differentiæ, puta gra-
 duum tantum 4 vel 5; suffecerint observationes tres vel quatuor
 ad inveniendam longitudinem & latitudinem novam. Sin majores
 sint differentiæ, puta graduum 10 vel 20, debebunt observationes
 quinque adhiberi.

L E M M A VII.

L E M M A VII.


Per datum punctum P ducere rectam lineam BC , cujus partes PB , BC , rectis duabus positione datis AB , AC abscissæ, datam habeant rationem ad invicem.

A puncto illo P ad rectarum alterutram AB ducatur recta quævis PD , & producat eadem versus rectam alteram AC usque ad E , ut sit PE ad PD in data illa ratione. Ipsi AD parallela fit EC ; & si agatur CPB , erit PC ad PB ut PE ad PD .
Q. E. F



L E M M A VIII.

Sit ABC Parabola umbilicum habens S . Chorda AC bisecta in I abscindatur segmentum $ABCI$, cujus diameter sit $I\mu$ & vertex μ . In $I\mu$ producta capiatur μO æqualis dimidio ipsius



$I\mu$. Jungatur OS , & producat eam ad ξ , ut sit $S\xi$ æqualis $2SO$. Et si Cometa B moveatur in arcu CBA , & agatur ξB secans AC in E : dico quod punctum E abscindet de chorda AC segmentum AE temporis proportionale quamproxime.

Junga.

Jungatur enim EO secans arcum Parabolicum ABC in γ , & agatur μX quæ tangat eundem arcum in vertice μ & actæ EO occurrat in X ; & erit area curvilinea $AEX_{\mu}A$ ad aream curvilineam $ACT_{\mu}A$ ut AE ad AC . Ideoque cum triangulum ASE sit ad triangulum ASC in eadem ratione, erit area tota $ASEX_{\mu}A$ ad aream totam $ASCT_{\mu}A$ ut AE ad AC . Cum autem ξO sit ad SO ut 3 ad 1, & EO ad XO in eadem ratione, erit SX ipsi EB parallela: & propterea si jungatur BX , erit triangulum SEB triangulo XEB æquale. Unde si ad aream $ASEX_{\mu}A$ addatur triangulum EXB , & de summa auferatur triangulum SEB , manebit area $ASBX_{\mu}A$ areæ $ASEX_{\mu}A$ æqualis, atque adeo ad aream $ASCT_{\mu}A$ ut AE ad AC . Sed areæ $ASBX_{\mu}A$ æqualis est area $ASBT_{\mu}A$, quamproxime, & hæc area $ASBT_{\mu}A$ est ad aream $ASCT_{\mu}A$, ut tempus descripti arcus AB , ad tempus descripti arcus totius AC . Ideoque AE est ad AC in ratione temporum quamproxime. *Q.E.D.*

Corol. Ubi punctum B incidit in Parabolæ verticem μ , est AE ad AC in ratione temporum accurate.

Scholium.

Si jungatur $\mu \xi$ secans AC in δ , & in ea capiatur ξn quæ sit ad μB ut 27 MI ad 16 $M\mu$: acta Bn secabit chordam AC in ratione temporum magis accurate quam prius. Jaceat autem punctum n ultra punctum ξ , si punctum B magis distat a vertice principali Parabolæ quam punctum μ ; & citra, si minus distat ab eodem vertice.

LEMMA IX.


Rectæ $I_{\mu} \& \mu M \& \text{longitudo}$ $\frac{AIC}{4S_{\mu}}$ *æquantur inter se.*

Nam $4S_{\mu}$ est latus rectum Parabolæ pertinens ad verticem μ .

L E M M A X.

Si producat^{ur} $S\mu$ ad N & P , ut μN sit pars tertia ipsius μI , & SP sit ad SN ut SN ad $S\mu$. Cometa, quo tempore describit arcum $A\mu C$, si progrediretur ea semper cum velocitate quam habet in altitudine ipsi SP æquali, describeret longitudinem æqualem chordæ AC .

Nam si Cometa velocitate quam habet in μ , eodem tempore progrediretur uniformiter in recta quæ Parabolam tangit in μ ; area quam radio ad punctum S ducto describeret, æqualis esset area Parabolicæ $ASC\mu$. Ideoque contentum sub longitudine in tangente descripta & longitudine $S\mu$, esset ad contentum sub longitudinibus AC & SM , ut area $ASC\mu$ ad triangulum $ASC M$, id est, ut SN ad SM . Quare AC est ad longitudinem in tangente descriptam, ut $S\mu$ ad SN . Cum autem velocitas



Cometæ in altitudine SP sit (per Corol. 6. Prop. xvi. Lib. I.) ad velocitatem in altitudine $S\mu$, in subduplicata ratione SP ad $S\mu$ inverse, id est, in ratione $S\mu$ ad SN ; longitudo hac velocitate eodem tempore descripta, erit ad longitudinem in tangente descriptam, ut $S\mu$ ad SN . Igitur AC & longitudo hac nova velocitate descripta, cum sint ad longitudinem in tangente descriptam tam in eadem ratione, æquantur inter se. Q. E. D.

Corol. Cometa igitur ea cum velocitate, quam habet in altitudine $S\mu + \frac{1}{3}I\mu$, eodem tempore describeret chordam AC quamproxime.

L E M M A

L E M M A X I.

Si Cometa motu omni privatus de altitudine SN seu $S\mu + \frac{1}{3}I\mu$ demitteretur, ut caderet in Solem, & ea semper vi uniformiter continuata urgeretur in Solem, qua urgetur sub initio; idem semisse temporis quo in Orbe suo describat arcum AC , descensu suo describeret spatium longitudini $I\mu$ æquale.

Nam Cometa quo tempore describat arcum Parabolicum AC , eodem tempore ea cum velocitate quam habet in altitudine SP (per Lemma novissimum) describet chordam AC , adeoque (per Corol. 7. Prop. xvi. Lib. I.) eodem tempore in Circulo cujus semidiameter esset SP ; vi gravitatis suæ revolvendo, describeret arcum cujus longitudo esset ad arcus Parabolici chordam AC , in subdupplicata ratione unius ad duo. Et propterea eo cum pondere quod habet in Solem in altitudine SP , cadendo de altitudine illa in Solem, describeret semisse temporis illius (per Corol. 9. Prop. iv. Lib. I.) spatium æquale quadrato semissis chordæ illius applicato ad quadruplum altitudinis SP , id est, spatium $\frac{AIq}{4SP}$. Unde cum pondus Cometæ in Solem in altitudine SN , sit ad ipsius pondus in Solem in altitudine SP , ut SP ad $S\mu$: Cometa pondere quod habet in altitudine SN eodem tempore, in Solem cadendo, describet spatium $\frac{AIq}{4S\mu}$, id est, spatium longitudini $I\mu$ vel $M\mu$ æquale. *Q. E. D.*

PROPOSITIO XLI. PROBLEMA XXI.

Cometæ in Parabola moti Trajectoriam ex datis tribus Observationibus determinare.


Problema hocce longe difficillimum multimode aggressus, composui Problemata quædam in Libro Primo quæ ad ejus solutionem spectant. Postea solutionem sequentem paulo simpliciore excogitavi.

Seligantur tres observationes æqualibus temporum intervallis ab invicem quamproxime distantes. Sit autem temporis intervallum illud ubi Cometa tardius movetur paulo majus altero, ita videlicet

DE MUNDI
SYSTEMATE,

ut temporum differentia fit ad summam temporum, ut summa temporum ad dies plus minus sexcentos; vel ut punctum E incidat in punctum M quamproxime, & inde aberret versus I potius quam versus A . Si tales observationes non præsto sint, inveniendus est novus Cometæ locus per Lemma sextum.

Designent S Solem T , t , τ tria loca Terræ in Orbe magno, TA , tB , τC observatas tres longitudes Cometæ, V tempus inter observationem primam & secundam, W tempus inter secundam ac tertiam, X longitudinem quam Cometa toto illo tempore, ea cum velocitate quam habet in mediocri Telluris à Sole distantia, describere posset, quæque per Corol. 3. Prop. XL. Lib. III. invenienda est, & tV perpendicularum in chordam $T\tau$. In longi-



tudine media tB sumatur utcunque punctum B pro loco Cometæ in plano Eclipticæ, & inde versus Solem S ducatur linea BE , quæ sit ad sagittam tV , ut contentum sub SB & St quad. ad cubum hypotenusæ trianguli rectanguli, cujus latera sunt SB & tangens latitudinis Cometæ in observatione secunda ad radium tB .
Et

Et per punctum E agatur (per hujus Lem. vii.) recta AEC , LIBER
cujus partes AE , EC ad rectas TA & τC terminatæ, sint ad TERTIUS
invicem ut tempora V & W : & erunt A & C loca Cometæ in
plano Eclipticæ in observatione prima ac tertia quamproxime, si
modo B sit locus ejus recte assumptus in observatione secunda.


Ad AC bisectam in I erige perpendicularum Ii . Per punctum B
age occultam Bi ipsi AC parallelam. Junge occultam Si secan-
tem AC in λ , & comple parallelogrammum $iI\lambda\mu$. Cape $I\sigma$ æqua-
lem $3 I\lambda$, & per Solem S age occultam $\sigma\xi$ æqualem $3 S\sigma + 3 i\lambda$.
Et deletis jam literis A , E , C , I , a puncto B versus punctum ξ
duc occultam novam BE , quæ sit ad priorem BE in duplicatâ
ratione distantiae BS ad quantitatem $S\mu + \frac{1}{2}i\lambda$. Et per punctum
 E iterum duc rectam AEC eadem lege ac prius, id est, ita ut ejus
partes AE & EC sint ad invicem, ut tempora inter observationes
 V & W . Et erunt A & C loca Cometæ magis accurate.

Ad AC bisectam in I erigantur perpendiculara AM , CN , IO ,
quarum AM & CN sint tangentes latitudinum in observatione
prima ac tertia ad radios TA & τC . Jungatur MN secans IO
in O . Constituatür rectangulum $iI\lambda\mu$ ut prius. In IA pro-
ducta capiatür ID æqualis $S\mu + \frac{1}{2}i\lambda$, & agatur occulta OD .
Deinde in MN versus N capiatür MP , quæ sit ad longitudinem
supra inventam X , in subduplicata ratione mediocris distantiae Tel-
luris a Sole (seu semidiametri Orbis magni) ad distantiam OD .
Si punctum P incidat in punctum N ; erunt A , B , C tria loca Co-
metæ, per quæ Orbis ejus in plano Eclipticæ describi debet. Sin-
punctum P non incidat in punctum N ; in recta AC capiatür
 CG ipsi NP æqualis, ita ut puncta G & P ad easdem partes
rectæ NC jaceant.

Eadem methodo qua puncta E , A , C , G , ex assumpto puncto
 B inventa sunt, inveniuntur ex assumptis utcumque punctis aliis
 b & β puncta nova e , a , c , g , & ϵ , α , κ , γ . Deinde si per G , g , γ
ducatur circumferentia circuli $Gg\gamma$, secans rectam τC in Z : erit
 Z locus Cometæ in plano Eclipticæ. Et si in AC , ac , $\alpha\kappa$ capi-
antur AF , af , $a\phi$ ipsis CG , cg , $\kappa\gamma$ respectivè æquales, & per
puncta F , f , ϕ ducatur circumferentia circuli $Ff\phi$, secans rectam
 AT in X ; erit punctum X alius Cometæ locus in plano Eclipticæ.
Ad puncta X & Z erigantur tangentes latitudinum Cometæ ad ra-
dios TX & τZ ; & habebuntur loca duo Cometæ in Orbe proprio.
Denique (per Prop. XIX. Lib. I.) umbilico S , per loca illa duo de-
scribatur Parabola, & hæc erit Trajectoria Cometæ. Q. E. I.

DE MUNDI
SYSTEMATE,

Constructionis hujus demonstratio ex Lemmatibus consequitur : quippe cum recta AC fecetur in E in ratione temporum, per Lemma VII, ut oportet per Lem. VIII: & BE per Lem. XI. fit pars rectæ BS vel $B\xi$ in plano Eclipticæ arcui ABC & chordæ AEC interjecta; & MP (per Corol. Lem. x.) longitudo fit chordæ arcus, quem Cometa in Orbe proprio inter observationem primam ac tertiam describere debet, ideoque ipsi MN æqualis fuerit, si modo B sit verus Cometæ locus in plano Eclipticæ.



Cæterum puncta B, b, β non quælibet, sed vero proxima eligere convenit. Si angulus AQt , in quo vestigium Orbis in plano Eclipticæ descriptum secat rectam tB , præterpropter innotescat; in angulo illo ducenda erit recta occulta AC , quæ sit ad $\frac{1}{3}T\tau$ in subduplicata ratione SQ ad St . Et agendo rectam SEB cujus pars EB æquetur longitudini Vt , determinabitur punctum B quod prima vice usurpare licet. Tum recta AC deleta & secundum præcedentem constructionem iterum ducta, & inventa

inventa infuper longitudine MP ; in τB capiatur punctum b , ^{LIBER} ea lege, ut si TA , τC se mutuo fecuerint in T , sit distantia Tb ^{TERTIUS} ad distantiam TB , in ratione composita ex ratione MP ad MN & ratione subduplicata SB ad Sb . Et eadem methodo inveniendum erit punctum tertium β , si modo operationem tertio repetere lubet. Sed hac methodo operationes duæ ut plurimum suffecerint. Nam si distantia Bb perexigua obvenit; postquam inventa sunt puncta F, f & G, g , actæ rectæ Ff & Gg secabunt TA & τC in punctis quæsitis X & Z .

Exemplum.

Proponatur Cometa anni 1680. Hujus motum a *Flamstedio* observatum Tabula sequens exhibet.


		Tem. appar.	Temp. verum	Long. Solis	Long. Cometæ	Lat. Cometæ
		h. /	h. / //	gr. / //	gr. / //	gr. / //
1680 Dec.	12	4.46	4.46. 0	Ψ 1.51.23	Ψ 6.31.21	8.26. 0
	21	6.32½	6.36.59	11. 6.44	Ψ 5. 7.38	21.45.30
	24	6.12	6.17.52	14. 9.26	18.49.10	25.23.24
	26	5.14	5.20.44	16. 9.22	28.24. 6	27. 0.57
	29	7.55	8. 3. 2	19.19.43	\times 13.11.45	28.10. 5
	30	8. 2	8.10.26	20.21. 9	17.39. 5	28.11.12
1681 Jan.	5	5.51	6. 1.38	26.22.18	Υ 8.49.10	26.15.26
	9	6.49	7. 0.53	Ψ 0.29. 2	18.43.18	24.12.42
	10	5.54	6. 6.10	1.27.43	20.40.57	23.44. 0
	13	6.56	7. 8.55	4.33.20	25.59.34	22.17.36
	25	7.44	7.58.42	16.45.36	Υ 9.35.48	17.56.54
	30	8. 7	8.21.53	21.49.58	13.19.36	16.40.57
Feb.	2	6.20	6.34.51	24.46.59	15.13.48	16. 2. 2
	5	6.50	7. 4.41	27.49.51	16.59.52	15.27.23

Hic adde Observationes quasdam e nostris.

	Temp. appar.	Cometæ Longit.	Com. Lat.
Febr.	25 8h. 30'	Υ 26gr. . 18' . 17"	12gr. . 46½'
	27 8 . 15	27 . 4 . 24	12 . 36½'
Mart.	1 11 . 0	27 . 53 . 6	12 . 24½'
	2 8 . 0	28 . 12 . 27	11 . 20
	5 11 . 30	29 . 20 . 51	12 . 3½'
	9 8 . 30	Π 0 . 43 . 4	11 . 45½'

Hæ Observationes Telescopio septupedali, & Micrometro filif-
que in foco Telescopii locatis peractæ sunt: quibus instrumentis &

DE MUNDI & positiones fixarum inter se & positiones Cometæ ad fixas de-
 SYSTEMATE, terminavimus. Designet *A* stellam in sinistro calcaneo Persei
 (*Bayero* α) *B* stellam sequentem in sinistro pede (*Bayero* ζ) &
C, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, *K*, *L*, *M*, *N*, *O* stellas alias minores in eo-
 dem pede. Sintque *P*, *Q*, *R*, *S*, *T* loca Cometæ in observatio-
 nibus supra descriptis: & existente distantia *AB* partium $80\frac{7}{12}$,
 erat *AC* partium $52\frac{1}{2}$, *BC* $58\frac{1}{2}$, *AD* $57\frac{1}{12}$, *BD* $82\frac{2}{12}$, *CD* $23\frac{1}{2}$,
AE $29\frac{1}{2}$, *CE* $57\frac{1}{2}$, *DE* $49\frac{1}{12}$, *AI* $27\frac{1}{12}$, *BI* $52\frac{1}{2}$, *CI* $36\frac{1}{2}$,



DI $53\frac{1}{12}$, *AK* $38\frac{1}{2}$, *BK* 43 , *CK* $31\frac{1}{2}$, *FK* 29 , *FB* 23 , *FC* $36\frac{1}{2}$,
AH $18\frac{5}{12}$, *DH* $50\frac{1}{4}$, *BN* $46\frac{1}{12}$, *CN* $31\frac{1}{2}$, *BL* $45\frac{1}{12}$, *NL* $31\frac{1}{2}$,
HO erat ad *HI* ut 7 ad 6 & producta transibat inter stellas
D & *E*, sic ut distantia stellæ *D* ab hac recta esset $\frac{1}{2}$ *CD*. *LM*
 erat ad *LB* ut 2 ad 9 & producta transibat per stellam *H*. His
 determinabantur positiones fixarum inter se.

Die Veneris *Feb.* 25. St. vet. Hor. $8\frac{1}{2}$ P. M. Cometæ in *p* ex-
 istentis distantia a stella *E* erat minor quam $\frac{1}{12}$ *AE*, major quam
 $\frac{1}{2}$ *AE*, adeoque æqualis $\frac{1}{12}$ *AE* proxime; & angulus *Ape* non-
 nihil obtusus erat, sed fere rectus. Nempe si demitteretur ad
p *E* perpendiculum ab *A*, distantia Cometæ a perpendiculo illo
 erat $\frac{1}{2}$ *pE*.

Eadem nocte, hora $9\frac{1}{2}$, Cometæ in *P* existentis distantia a stella
E erat major quam $\frac{1}{4\frac{1}{2}}$ *AE*, minor quam $\frac{1}{5\frac{1}{2}}$ *AE*, adeoque æqua-
 lis

lis $4\frac{7}{8}$ AE , seu $\frac{7}{8}$ AE quamproxime. A perpendicularo autem a stella A ad rectam PE demisso, distantia Cometæ erat $\frac{1}{2}$ PE .

Die \odot^{is} , *Feb.* 27. hor. $8\frac{1}{2}$ P. M. Cometæ in Q existentis distantia a stella O æquabat distantiam stellarum O & H , & recta QO producta transibat inter stellas K & B . Positionem hujus rectæ ob nubes intervenientes, magis accurate definire non potui.

Die δ^{tis} , *Mart.* 1. hor. 11. P. M. Cometa in R existens, stellis K & C accurate interjacebat, & rectæ CRK pars CR paulo major erat quàm $\frac{1}{2}$ CK , & paulo minor quam $\frac{1}{2}$ $CK + \frac{1}{16}$ CR , adeoque æqualis $\frac{1}{2}$ $CK + \frac{1}{16}$ CR seu $\frac{1}{16}$ CK .

Die γ^{is} , *Mart.* 2. hor. 8. P. M. Cometæ existentis in S , distantia a stella C erat $\frac{2}{3}$ FC quamproxime. Distantia stellæ F a recta CS producta erat $\frac{1}{16}$ FC ; & distantia stellæ B ab eadem recta, erat quintuplo major quam distantia stellæ F . Item recta NS producta transibat inter stellas H & I , quintuplo vel sextuplo propior existens stellæ H quam stellæ I .

Die η^{ni} , *Mart.* 5. hor. $11\frac{1}{2}$ P. M. Cometa existente in T , recta MT æqualis erat $\frac{1}{2}$ ML , & recta LT producta transibat inter B & F , quadruplo vel quintuplo propior F quam B , auferens a BF quintam vel sextam ejus partem versus F . Et MT producta transibat extra spatium BF ad partes stellæ B , quadruplo propior existens stellæ B quam stellæ F . Erat M stella perexigua quæ per Telescopium videri vix potuit, & L stella major quasi magnitudinis octavæ.

Ex hujusmodi observationibus per constructiones figurarum & computationes (posito quod stellarum A & B distantia esset $2^{\text{gr.}}$ $6'$ $46''$, & stellæ A longitudo γ $26^{\text{gr.}}$ $41'$ $50''$ & latitudo borealis $12^{\text{gr.}}$ $8\frac{1}{2}'$, stellæque B longitudo γ $28^{\text{gr.}}$ $40'$ $24''$ & latitudo borealis $11^{\text{gr.}}$ $17'\frac{1}{2}$;) derivabam longitudes & latitudes Cometæ. Micrometro parum affabre constructo usus sum, sed longitudinum tamen & latitudinum errores (quatenus ab observationibus nostris oriantur) dimidium minuti unius primi vix superant, præterquam in observatione ultima *Mart.* 9. ubi positiones stellarum minus accurate determinare potui. *Cassinus* qui ascensionem rectam Cometæ eodem tempore observavit, declinationem ejus tanquam invariata manentem parum diligenter definivit. Nam Cometa (juxta observationes nostras) in fine

Mmm

motus

DE MUNDI ^{SYSTEMATE,} motus fui notabiliter deflectere cœpit boream versus, a paralelo quem in fine Mensis *Februarii* tenuerat.

Jam ad Orbem Cometæ determinandum; selegi ex observationibus hætenus descriptis tres, quas *Flamstedius* habuit *Dec. 21, Jan. 5, & Jan. 25*. Ex his inveni *St* partium 9842, 1 & *Vt* partium 455, quales 10000 sunt semidiameter Orbis magni. Tum ad operationem primam assumendo *tB* partium 5657, inveni *SB* 9747, *BE* prima vice 412, *Sμ* 9503, *il* 413: *BE* secunda vice 421, *OD* 10186, *X* 8528, 4, *MP* 8450, *MN* 8475, *NP* 25. Unde ad operationem secundam collegi distantiam *tb* 5640. Et per hanc operationem inveni tandem distantias *TX* 4775 & *τZ* 11322. Ex quibus Orbem definiendo, inveni Nodos ejus descendentem in \oslash & ascendentem in ψ 1^{gr} 53'; Inclinationem plani ejus ad planum Eclipticæ 61^{gr} 20 $\frac{1}{2}$ '; verticem ejus (seu Perihelium Cometæ) distare a Nodo 8^{gr} 38', & esse in \dagger 27^{gr} 43' cum latitudine australi 7^{gr} 34'; & ejus latus rectum esse 236,8, areamque radio ad Solem ducto singulis diebus descriptam 93585, quadrato semidiametri Orbis magni posito 100000000; Cometam vero in hoc Orbe secundum feriem signorum processisse, & *Decemb. 8^d. ob. 4^h. 4^m. P. M.* in vertice Orbis seu Perihelio fuisse. Hæc omnia per scalam partium æqualium & chordas angulorum ex Tabula sinuum naturalium collectas, determinavi Graphice: construendo Schema satis amplum, in quo videlicet semidiameter Orbis magni (partium 10000) æqualis esset digitis 16 $\frac{1}{2}$ pedis Anglicani.

Tandem ut constaret an Cometa in Orbe sic invento vere moveretur, collegi per operationes partium Arithmeticas partim Graphicas, loca Cometæ in hoc Orbe ad observationum quarundam tempora: uti in Tabula sequente videre licet.

	Distant. Cometæ a Sole.	Long. Collect.		Lat. Collect.		Long. Obs.		Lat. Obs.		Differ. Long.		Differ. Lat.	
		gr.	'	gr.	'	gr.	'	gr.	'		'		'
<i>Dec.</i> 12	2792	ψ 6	. 32	8	. 18 $\frac{1}{2}$	ψ 6	. 31 $\frac{1}{3}$	8	. 26	+	1	-	7 $\frac{1}{2}$
29	8403	\times 13	. 13 $\frac{3}{4}$	28	. 0	\times 13	. 11 $\frac{1}{4}$	28	. 10 $\frac{1}{12}$	+	2	-	10 $\frac{1}{12}$
<i>Febr.</i> 5	16669	γ 17	. 0	15	. 29 $\frac{3}{4}$	γ 16	. 59 $\frac{1}{2}$	15	. 27 $\frac{2}{3}$	+	0	+	2 $\frac{2}{3}$
<i>Mar.</i> 5	21737	29	. 19 $\frac{1}{2}$	12	. 4	29	. 20 $\frac{5}{8}$	12	. 3 $\frac{1}{2}$	-	1	+	$\frac{1}{2}$

Postea vero *Halleus* noster Orbitam, per calculum Arithmeticum, accuratius determinavit quam per descriptiones linearum fieri licuit; & retinuit quidem locum Nodorum in \oslash & ψ 1^{gr} 53', & Inclinationem plani Orbitæ ad Eclipticam 61^{gr} 20 $\frac{1}{2}$ ', ut & tempus Perihelii Cometæ *Decemb. 8^d. ob. 4^h.*: distantiam vero Perihelii

helii a Nodo ascendente, in Orbita Cometæ mensuratam, invenit esse $9^{\text{gr}} 20'$, & Latus rectum Parabolæ esse 243 partium, existente mediocri Solis a Terra distantia partium 10000. Et ex his datis, calculo itidem Arithmetico accurate instituto, loca Cometæ ad observationum tempora computavit, ut sequitur.

Tempus verum				Distantia Cometæ a ☉	Long. comp.			Lat. comp.			Errores in			
d.	h.	′	″		gr.	′	″	gr.	′	″	Long.	′	″	Lat.
Dec.	12.	4.	46.	0	28028	✓	6.	29.	25	8.	26.	0	0	0
	21.	6.	36.	59	61076	✓	5.	6.	30	21.	43.	20	1.	16
	24.	6.	17.	52	70008	✓	18.	48.	20	25.	22.	40	0.	44
	26.	5.	20.	44	75576	✓	28.	22.	45	27.	1.	36	1.	35
	29.	8.	3.	2	84021	✗	13.	12.	40	28.	10.	10	0.	5
Jan.	30.	8.	10.	26	86661	✓	17.	40.	5	28.	11.	20	1.	8
	5.	6.	1.	38	101440	✓	8.	49.	49	26.	15.	15	0.	11
	9.	7.	0.	53	110959	✓	18.	44.	36	24.	12.	54	1.	18
	10.	6.	6.	10	113162	✓	20.	41.	0	23.	44.	10	0.	3
	13.	7.	8.	55	120000	✓	26.	0.	21	22.	17.	30	0.	47
Feb.	25.	7.	58.	42	145370	✗	9.	33.	40	17.	57.	55	2.	8
	30.	8.	21.	53	153303	✓	13.	17.	41	16.	42.	7	1.	55
	2.	6.	34.	51	156911	✓	15.	11.	11	16.	4.	15	2.	37
	5.	7.	4.	41	165685	✓	16.	58.	25	15.	29.	13	1.	27
	25.	8.	19.	0	202370	✓	26.	15.	49	12.	48.	0	2.	31
Mar.	5.	11.	21.	0	216205	✓	29.	18.	35	12.	5.	40	2.	16

Apparuit etiam hic Cometa mense *Novembri* præcedente, & die undecimo hujus mensis stylo veteri, ad horam quintam matutinam, *Cantuarie* in *Anglia*, visus fuit in $\approx 12\frac{1}{2}$ cum latitudine boreali 2^{gr} circiter. Crassissima fuit hæc Observatio: meliores sunt quæ sequuntur.

Nov. 17, ft. vet. *Pontæus* & focii hora sexta matutina *Romæ* (id est, hora 5, $10'$ *Londini*) filis ad fixas applicatis Cometam observant in $\approx 8.30'$, cum latitudine australi $0^{\text{gr}} 40'$. Extant eorum Observationes in tractatu quem *Pontæus*, de hoc Cometa, in lucem edidit. *Cellius* qui aderat & observationes suas in Epistola ad *D. Cassinum* misit, Cometam eadem hora vidit in $\approx 8^{\text{gr}} 30'$ cum latitudine australi $0^{\text{gr}} 30'$. Eadem hora *Galletius* etiam Cometam vidit in $\approx 8^{\text{gr}}$ fine latitudine.

Nov. 18. hora matutina 6. $30'$ *Romæ* (id est, hora 5, $40'$ *Londini*) *Pontæus* Cometam vidit in $\approx 13^{\text{gr}} 30'$ cum latitudine australi $1^{\text{gr}} 20'$. *Cellius* in $\approx 13^{\text{gr}} 00'$, cum latitudine australi $1^{\text{gr}} 00'$. *Galletius* autem hora matutina 5. $30'$ *Romæ*, Cometam vidit in $\approx 13^{\text{gr}} 00'$, cum latitudine australi $1^{\text{gr}} 00'$. Et *R. P. Anglo* in *Academia Flexiensis* apud *Gallos*, hora quinta matutina (id est, hora 5, $9'$ *Londini*) Cometam vidit in medio inter stellas

Mmm 2

duas

DE MUNDI
SYSTEMATE,

duas parvas, quarum una media est trium in recta linea in Virginis australi manu, & altera est extrema alæ. Unde Cometa tunc fuit in $\approx 12. 46'$, cum latitudine australi $50'$. Eodem die *Bostonia* in *Nova-Anglia* in Latitudine $42\frac{1}{2}$ graduum, hora quinta matutina, (id est *Londini* hora matutina 9. 44') Cometa visus est prope ≈ 14 , cum latitudine australi $1^{\text{st}} 30'$, uti a *Cl. Halletio* accepi.

Nov. 19. hora mat. $4\frac{1}{2}$ *Cantabrigiæ*, Cometa (observante juvene quodam) distabat a Spica \approx quasi 2^{st} Boreazephyrum versus. Eodem die hor. 5. mat. *Bostonia* in *Nova-Anglia*, Cometa distabat a Spica \approx gradu uno, differentia latitudinum existente $40'$. Eodem die in Insula *Jamaica*, Cometa distabat a Spica intervallo quasi gradus unius. Et ex his observationibus inter se collatis colligo, quod hora 9. 44'. *Londini*, Cometa erat in $\approx 18^{\text{st}} 40'$, cum latitudine australi $1^{\text{st}} 18'$ circiter. Eodem die *D. Arthurus Storer* ad fluvium *Patuxent*, prope *Hunting-Creek* in *Mary-Land*, in confinio *Virginie* in Lat. $38\frac{1}{2}^{\text{st}}$ hora quinta matutina (id est, hora 10^{a} *Londini*) Cometam vidit supra Spicam \approx , & cum Spica propemodum conjunctum, existente distantia inter eosdem quasi $\frac{2}{3}^{\text{st}}$. Observator idem, eadem hora diei sequentis, Cometam vidit quasi 2^{st} inferiorem Spica. Congruent hæ observationes cum observationibus in *Nova-Anglia* & *Jamaica* factis, si modo distantie (pro motu diurno Cometæ) nonnihil augeantur, ita ut Cometa die priore superior esset Spica \approx , altitudine 1^{st} circiter, ac die posteriore inferior eadem stella, altitudine perpendiculari $3^{\text{st}} 40'$.

Nov. 20. *D. Montenarus* Astronomiæ Professor *Paduensis*, hora sexta matutina *Venetiis* (id est, hora 5. $10'$ *Londini*) Cometam vidit in $\approx 23^{\text{st}}$, cum latitudine australi $1^{\text{st}} 30'$. Eodem die *Bostonia*, distabat Cometa a Spica \approx , 4^{st} longitudinis in orientem, adeoque erat in $\approx 23^{\text{st}} 24'$ circiter.

Nov. 21. *Ponthaus* & focii hor. mat. $7\frac{1}{2}$ Cometam observant in $\approx 27^{\text{st}} 50'$, cum latitudine australi $1^{\text{st}} 16'$; *Ango* hora quinta matutina in $\approx 27^{\text{st}} 45'$, *Montenarus* in $\approx 27^{\text{st}} 51'$. Eodem die in Insula *Jamaica*, Cometa visus est prope principium *Scorpii*, eandemque circiter latitudinem habuit cum Spica Virginis, id est, $2^{\text{st}} 2'$.

Nov. 22. Cometa visus est a *Montenaro* in m. $2. 33'$. *Bostonia* autem in *Nova-Anglia* apparuit in m. 3^{st} circiter, eadem fere cum latitudine ac prius, id est, $1^{\text{st}} 30'$. Eodem die *Londini*, hora

hora mat. 6ⁱ *Hookius* noster Cometam vidit in $m\ 3^{\text{gr}}\ 30'$ circiter, idque in linea recta quæ transit per Spicam Virginis & Cor Leonis, non exacte quidem, sed a linea illa paululum deflecentem ad boream. *Montenarus* itidem notavit quod linea a Cometa per Spicam ducta, hoc die & sequentibus transibat per australe latus Cordis Leonis, interposito perparvo intervallo inter Cor Leonis & hanc lineam. Linea recta per Cor Leonis & Spicam Virginis transiens, Eclipticam secuit in $m\ 3^{\text{gr}}\ 46'$, in angulo $2^{\text{gr}}\ 51'$. Et si Cometa locatus fuisset in hac linea in $m\ 3^{\text{gr}}$, ejus latitudo fuisset $2^{\text{gr}}\ 26'$. Sed cum Cometa consentientibus *Hookio* & *Montenaro*, nonnihil distaret ab hac linea boream versus, latitudo ejus fuit paulo minor. Die 20. ex observatione *Montenari*, latitudo ejus propemodum æquabat latitudinem Spicæ m , eratque $1^{\text{gr}}\ 30'$ circiter, & consentientibus *Hookio*, *Montenaro*, & *Angone* perpetuo augebatur, ideoque jam sensibilibiter major erat quam $1^{\text{gr}}\ 30'$. Inter limites autem jam constitutos $2^{\text{gr}}\ 26'$ & $1^{\text{gr}}\ 30'$, magnitudine mediocri latitudo erit $1^{\text{gr}}\ 58'$ circiter. Cauda Cometæ, consentientibus *Hookio* & *Montenaro*, dirigebatur ad Spicam m , declinans aliquantulum a Stella ista, juxta *Hookium* in austrum, juxta *Montenarum* in boream; ideoque declinatio illa vix fuit sensibilis, & Cauda Æquatori fere parallela existens, aliquantulum deflectebatur ab oppositione Solis boream versus.

Nov. 24. Ante ortum Solis Cometa visus est a *Montenaro* in $m\ 12^{\text{gr}}\ 52'$, ad boreale latus rectæ quæ per Cor Leonis & Spicam Virginis ducebatur, ideoque latitudinem habuit paulo minorem quam $2^{\text{gr}}\ 38'$. Hæc latitudo, uti diximus, ex observationibus *Montenari*, *Angonis* & *Hookii*, perpetuo augebatur; ideoque jam paulo major erat quam $1^{\text{gr}}\ 58'$; & magnitudine mediocri, absque notabili errore, statui potest $2^{\text{gr}}\ 18'$. Latitudinem *Ponthæus* & *Galletius* jam decrevisse volunt, & *Cellius* & Observator in *Nova-Anglia* eandem fere magnitudinem retinuisse, scilicet gradus unius vel unius cum semisse. Crassiores sunt observationes *Ponthæi* & *Cellii*, eæ præsertim quæ per Azimuthos & Altitudines capiebantur, ut & eæ *Galletii*: meliores sunt eæ quæ per positiones Cometæ ad fixas a *Montenaro*, *Hookio*, *Angone* & Observatore in *Nova-Anglia*, & nonnunquam a *Ponthæo* & *Cellio* sunt factæ.

Jam collatis Observationibus inter se, colligere videor quod Cometa hoc mense circulum fere maximum descripsit, secantem Eclipticam in $m\ 25^{\text{gr}}\ 12'$, idque in angulo $3^{\text{gr}}\ 12'$ quamproxime. Nam & *Montenarus* Orbitam ab Ecliptica in austrum, tribus sal-

DE MUNDI
SYSTEMATE

tem gradibus declinasse dicit. Et cognita cursus positione, longitudines Cometæ ex observationibus collectæ, ad incudem jam revocari possunt & melius nonnunquam determinari, ut fit in sequentibus. *Cellius* Novemb. 17. observavit distantiam Cometæ a Spica μ , æqualem esse distantie ejus a stella lucida in dextra ala Corvi: & hinc locandus est Cometa in interseccionem hujus circuli quem Cometa motu apparente descripsit, cum circulo maximo qui a fixis illis duabus æqualiter distat, atque adeo in α 7^{gr} 54', cum latitudine australi 43'. Præterea *Montenarus*, Novemb. 20. hora sexta matutina *Venetiis*, Cometam vidit non totis quatuor gradibus distantem a Spica; dicitque hanc distantiam, vix æquasse distantiam stellarum duarum lucidarum in alis Corvi, vel duarum in juba Leonis, hoc est 3^{gr} & 30' vel 32'. Sit igitur distantia Cometæ a Spica 3^{gr} 30', & Cometa locabitur in α 22^{gr} 48', cum latitudine australi 1^{gr} 30'. Adhæc *Montenarus*, Novemb. 21, 22, 24 & 25 ante ortum Solis, Sextante æneo quintupedali ad minuta prima & semiminuta diviso & vitris Telescopicis armato, distantias mensuravit Cometæ a Spica 8^{gr} 28', 13^{gr} 10', 23^{gr} 30', & 28^{gr} 13': & has distantias, per refractionem nondum correctas, addendo longitudini Spicæ, collegit Cometam his temporibus fuisse in α 27^{gr} 51'. μ 2^{gr} 33', μ 12^{gr} 52' & μ 17^{gr} 45'. Si distantie illæ per refractiones corrigantur, & ex distantis correctis differentie longitudinum inter Spicam & Cometam probe deriventur, locabitur Cometa his temporibus in α 27^{gr} 52'. μ 2^{gr} 36', μ 12^{gr} 58' & μ 17^{gr} 53' circiter. Latitudes autem ad has longitudes in via Cometæ captas, prodeunt 1^{gr} 45', 1^{gr} 58', 2^{gr} 22' & 2^{gr} 31'. Harum quatuor observationum horas matutinas *Montenarus* non posuit. Priores duæ ante horam sextam, posteriores (ob viciniam Solis) post sextam factæ videntur. Die 22, ubi Cometa ex observatione *Montenari* locatur in μ 2^{gr} 36', *Hookius* noster eundem locavit in μ 3^{gr} 30' ut supra. *Montenarus* in defectu, *Hookius* in excessu errasse videntur. Nam Cometa, ex serie observationum, jam fuit in μ 2^{gr} 56, vel μ 3^{gr} circiter.

Observationum suarum ultimam inter vapores & diluculum captam, *Montenarus* suspectam habebat. Et *Cellius* eodem tempore (id est, Novem. 25.) Cometam per ejus Altitudinem & Azimuthum locavit in μ 15^{gr} 47', cum latitudine australi quasi gradus unius. Sed *Cellius* observavit etiam eodem tempore, quod Cometa erat in lineâ recta cum stella lucida in dextro femore
Vir-

Virginis & cum Lance australi Libræ, & hæc linea fecat viam LIBRÆ
TERTIUS
 Cometæ in m 18^{gr}. 36'. *Ponthæus* etiam eodem tempore obser-
 vavit, quod Cometa erat in recta transeunte per Chelam austra-
 nam Scorpii & per stellam quæ Lancem borealem sequitur: &
 hæc recta fecat viam Cometæ in m 16^{gr}. 34'. Observavit etiam,
 quod Cometa erat in recta transeunte per stellam supra Lancem
 australem Libræ & stellam in principio pedis secundi Scorpii: &
 hæc recta fecat viam Cometæ in m 17^{gr}. 55'. Et inter longitu-
 dines ex his tribus Observationibus sic derivatas, longitudo me-
 diocris est m 17^{gr}. 42', quæ cum observatione *Montenari* satis
 congruit.

Erravit igitur *Cellius* jam locando Cometam in m 15^{gr}. 47',
 per ejus Azimuthum & Altitudinem. Et similibus Azimuthorum
 & Altitudinum observationibus, *Cellius* & *Ponthæus* non minus
 erraverunt locando Cometam in m. 20 & m 24 diebus duobus
 sequentibus, ubi stellæ fixæ ob diluculum vix aut ne vix quidem
 apparere. Et corrigendæ sunt hæc observationes per additionem
 duorum graduum, vel duorum cum semisse.

Ex omnibus autem Observationibus inter se collatis & ad meri-
 dianum *Londini* reductis, colligo Cometam hujusmodi cursum
 quamproxime descripsisse.

Temp. med. ft. vet.			Long. Cometæ		Lat. Cometæ	
d.	h.	/	gr.	/	gr.	/
Nov. 16.	17.	10	28	8 . 0	0.44	Aust.
	17.	17 . 10		12 . 52	1 . 0	
	18.	21 . 44		18 . 40	1.18	
	19.	17 . 10		22 . 48	1.30	
	20.	17 fere		27 . 52	1.45	
	21.	17 fere	m	2 . 56	1.58	
	23.	17½ fere		12 . 58	2.20	
	24.	17½ fere		17 . 53	2.29	
	26.	18 . 00		26 vel 27 gr.	2.42	

Loca autem Cometæ in Orbe Parabolico computata, ita se habent.

Temp. verum		Dist. Com. a ☉	Long. comp.		Lat. comp.	
d.	h.		gr.	/ //	gr.	/ //
Nov. 16.	17 . 0	83920	28	8 . 0.25	0.43.20	Aust.
	18. 21. 34	78020		18.41.50	1.17.30	
	20. 16. 50	73012		27.59.40	1.44.25	
	23. 17. 5	64206	m	13.19.15	2.21. 8	
	26. 17. 0	54799		26.46.30	2.42.30	

Con-

DE MUNDI
SYSTEMATE,

Congruunt inter Observationes Astronomicæ, tam mense *Novembri* quam mensibus quatuor sequentibus, cum motu Cometæ circum Solem in Trajectoria hacce Parabolica, atque adeo unum & eundem Cometam fuisse, qui mense *Novembri* ad Solem descendit, & mensibus sequentibus ab eodem ascendit, abunde confirmant, ut & hunc Cometam in Trajectoria hacce Parabolica delatum fuisse quamproxime. Mensibus *Decembri*, *Januario*, *Februario* & *Martio*, ubi Observationes hujus Cometæ sunt satis accuratæ, congruunt eadem cum motu ejus in hac Trajectoria, non minus accurate quam observationes Planetarum congruere solent cum eorum Theoriis. Mense *Novembri*, ubi observationes sunt crassæ, errores non sunt majores quam qui crassitudini observationum tribuantur. Trajectoria Cometæ bis secuit planum Eclipticæ, & propterea non fuit rectilinea. Eclipticam secuit non in oppositis cœli partibus, sed in fine Virginis & principio Capricorni, intervallo graduum 98 circiter; ideoque cursus Cometæ plurimum deflectebatur a Circulo maximo. Nam & mense *Novembri* cursus ejus tribus saltem gradibus ab Ecliptica in austrum declinabat, & postea mense *Decembri* gradibus 29 vergebat ab Ecliptica in septentrionem, partibus duabus Orbitæ in quibus Cometa tendebat in Solem & redibat a Sole, angulo apparente graduum plus triginta ab invicem declinantibus, ut observavit *Montenarus*. Pergebat hic Cometa per signa fere novem, a Virginis scilicet duodecimo gradu ad principium Geminorum, præter signum Leonis per quod pergebat antequam videri cœpit: & nulla alia extat Theoria, qua Cometa tantam Cœli partem motu regulari percurrat. Motus ejus fuit maxime inæquabilis. Nam circa diem vigesimum *Novembris*, descripsit gradus circiter quinque singulis diebus; dein motu retardato inter *Novemb.* 26. & *Decemb.* 12, spatium scilicet dierum quindecim cum semisse, descripsit gradus tantum 40; postea vero motu iterum accelerato, descripsit gradus fere quinque singulis diebus, antequam motus iterum retardari cœpit. Et Theoria quæ motui tam inæquabili per maximam cœli partem probe respondet, quæque easdem observat leges cum Theoria Planetarum, & cum accuratis observationibus Astronomicis accurate congruit, non potest non esse vera. Cometa tamen sub finem motus deviabatur aliquantulum ab hac Trajectoria Parabolica versus axem Parabolæ, ut ex erroribus minuti unius primi duorumve in latitudinem mense *Februario* & *Martio* conspirantibus, colligere videor; & propterea in Orbe Elipptico

liptico circum Solem movebatur, spatio annorum plusquam quingentorum, quantum ex erroribus illis judicare licuit, revolutionem peragens. LIBER
TERTIUS

Cæterum Trajectoriam quam Cometa descripsit, & Caudam veram quam singulis in locis projecit, visum est annexo schemate in plano Trajectoriæ optice delineatas exhibere: Observationibus sequentibus in Cauda definienda adhibitis.

Nov. 17. Cauda gradus amplius quindecim longa *Ponthæo* apparuit. *Nov. 18.* Cauda $30^{\text{gr.}}$ longa, Solique directe opposita in *Nova-Anglia* cernebatur, & protendebatur usque ad stellam δ , quæ tunc erat in $\approx 9^{\text{gr.}} 54'$. *Nov. 19.* in *Mary-Land* cauda visa fuit gradus 15 vel 20 longa. *Dec. 10.* Cauda (observante *Flamstedio*) transibat per medium distantiae inter caudam serpentis Ophiuchi & stellam δ in Aquilæ australi ala, & definebat prope stellas *A*, ω , *b* in Tabulis *Bayeri*. Terminus igitur erat in $\vee 19\frac{1}{2}^{\text{gr.}}$ cum latitudine boreali $33\frac{1}{2}^{\text{gr.}}$ circiter. *Dec. 11.* surgebat ad usque caput Sagittæ (*Bayero*, α , β), definens in $\vee 26^{\text{gr.}} 43'$, cum latitudine boreali $38^{\text{gr.}} 34'$. *Dec. 12.* transibat per medium Sagittæ, nec longe ultra protendebatur, definens in $\approx 4^{\text{gr.}}$, cum latitudine boreali $42\frac{1}{2}^{\text{gr.}}$ circiter. Intelligenda sunt hæc de longitudine caudæ clarioris. Nam luce obscuriore, in cœlo forsan magis sereno, cauda *Dec. 12.* hora 5, 40' *Romæ* (observante *Ponthæo*) supra Cygni Uropygium ad gradus 10 sese extulit; atque ab hac stella ejus latus ad occasum & boream min. 45. deslitit. Lata autem erat cauda his diebus gradus 3, juxta terminum superiorem, ideoque medium ejus distabat a Stella illa $2^{\text{gr.}} 15'$. austrum versus, & terminus superior erat in $\times 22^{\text{gr.}}$ cum latitudine boreali $6^{\text{gr.}}$. *Dec. 21.* surgebat fere ad cathedram *Cassiopeiæ*, æqualiter distans a β & *Schedir*, & distantiam ab utraque distantiae earum ab invicem æqualem habens, adeoque definens in $\times 24^{\text{gr.}}$ cum latitudine $47\frac{1}{2}^{\text{gr.}}$. *Dec. 29.* tangebat *Scheat* sitam ad sinistram, & intervallum stellarum duarum in pede boreali *Andromedæ* accurate complebat, & longa erat $54^{\text{gr.}}$ adeoque definebat in $\gamma 19^{\text{gr.}}$ cum latitudine $35^{\text{gr.}}$. *Jan. 5.* tetigit stellam π in pectore *Dextrumæ*, ad latus suum dextrum, & stellam μ in ejus cingulo, ad latus sinistrum; & (juxta Observationes nostras) longa erat $40^{\text{gr.}}$; curva autem erat & convexo latere spectabat ad austrum. Cum circulo per Solem & caput Cometæ transeunte angulum confecit graduum 4 juxta caput Cometæ; at juxta terminum alterum inclinabatur ad circulum illum in angulo 10 vel 11 graduum & chorda caudæ cum circulo illo continebat angulum graduum

DE MUNDI ^octo. *Jan.* 13. Cauda luce fatiſſibili terminabatur inter *Ala-*
 SYSTEMATE, *mech & Algol*, & luce tenuiſſima deſinebat e regione ſtellæ α in
 latere *Perſei*. Diſtantia termini caudæ a circulo Solem & Come-
 tam jungente erat $3^{\text{gr.}} 50'$, & inclinatio chordæ caudæ ad circu-
 lum illum $8\frac{1}{2}^{\text{gr.}}$. *Jan.* 25 & 26 luce tenui micabat ad longitu-
 dinem graduum 6 vel 7; & ubi cœlum valde ſerenum erat, luce
 tenuiſſima & agerrime ſenſibili attingebat longitudinem graduum
 duodecim & paulo ultra. Dirigebatur autem ejus axis ad Luci-
 dam in humero orientali Aurigæ accurate, adeoque declinabat ab
 oppoſitione Solis boream verſus in angulo graduum decem. De-
 nique *Feb.* 10. Caudam oculis armatis aſpexi gradus duos lon-
 gam. Nam lux prædicta tenuior per vitra non apparuit. *Pon-*
thæus autem *Feb.* 7. ſe caudam ad longitudinem graduum 12
 vidiffe ſcribit.

Orbem jam deſcriptum ſpectanti & reliqua Cometæ hujus Phæ-
 nomena in animo revolventi, haud difficulter conſtabit quod cor-
 pora Cometarum ſunt ſolida, compaſta, fixa ac durabilia ad in-
 ſtar corporum Planetarum. Nam ſi nihil aliud eſſent quam vapo-
 res vel exhalationes Terræ, Solis & Planetarum, Cometa hicce in
 tranſitu ſuo per viciniam Solis ſtatim diſſipari debuiffet. Eſt enim
 calor Solis ut radiorum denſitas, hoc eſt, reciproce ut quadratum
 diſtantiæ locoꝝum a Sole. Ideoque cum diſtantia Cometæ a cen-
 tro Solis *Decemb.* 8. ubi in Perihelio verſabatur, eſſet ad diſtan-
 tiam Terræ a centro Solis ut 6 ad 1000 circiter, calor Solis apud
 Cometam eo tempore erat ad calorem Solis æſtivi apud nos ut
 1000000 ad 36, ſeu 28000 ad 1. Sed calor aquæ ebullientis eſt
 quaſi triplo major quam calor quem terra arida concipit ad æſti-
 vum Solem, ut expertus ſum: & calor ferri candentis (ſi recte
 conjector) quaſi triplo vel quadruplo major quam calor aquæ ebul-
 lientis; adeoque calor quem terra arida apud Cometam in Peri-
 helio verſantem ex radiis Solaribus concipere poſſet, quaſi 2000
 vicibus major quam calor ferri candentis. Tanto autem calore
 vapores & exhalationes, omniſque materia volatilis ſtatim conſumi
 ac diſſipari debuiffent.

Cometa igitur in Perihelio ſuo calorem immenſum ad Solem
 concepit, & calorem illum diutiſſime conſervare poteſt. Nam
 globus ferri candentis digitum unum latus, calorem ſuum omnem
 ſpatio horæ unius in aere conſiſtens vix amitteret. Globus autem
 major calorem diutius conſervaret in ratione diametri, propterea
 quod ſuperficies (ad cujus meſuram per contactum aeris ambi-
 entis

DE MONDI SYSTEMATE, evanescunt. Aeris & ascendentium vaporum tremore fit ut radii facile de angusto pupillæ spatio per vices detorqueantur, de latiore autem vitri objectivi apertura nequiquam. Inde est quod scintillatio in priori casu generetur, in posteriore autem cesset: & cessatio in posteriore casu demonstrat regularem transmissionem lucis per cœlos absque omni refractione sensibili. Nequis contendat quod caudæ non soleant videri in Cometis cum eorum lux non est satis fortis, quia tunc radii secundarii non habent satis virium ad oculos movendos, & propterea caudas Fixarum non cerni: sciendum est quod lux Fixarum plus centum vicibus augeri potest mediantibus Telescopiis, nec tamen caudæ cernuntur. Planetarum quoque lux copiosior est, caudæ vero nullæ: Cometæ autem sæpe caudatissimi sunt, ubi capitum lux tenuis est & valde obtusa: sic enim Cometa Anni 1680, Mense *Decembri*, quo tempore caput luce sua vix æquabat stellas secundæ magnitudinis, caudam emittebat splendore notabili usque ad gradus 40, 50, 60 longitudinis & ultra: postea *Jan. 27* & *28* caput apparebat ut stella septimæ tantum magnitudinis, cauda vero luce quidem pertenui sed satis sensibili longa erat 6 vel 7 gradus, & luce obscurissima, quæ cerni vix posset, porrigebatur ad gradum usque duodecimum vel paulo ultra: ut supra dictum est. Sed & *Feb. 9* & *10* ubi caput nudis oculis videri desierat, caudam gradus duos longam per Telescopium contemplatus sum. Porro si cauda oriretur & refractione materiæ cœlestis, & pro figura cœlorum deflexeretur de Solis oppositione, deberet deflexio illa in iisdem cœli regionibus in eandem semper partem fieri. Atqui Cometa Anni 1680 *Decemb. 28.* hora $8\frac{1}{2}$ P. M. *Londini*, versabatur in $\propto 8^{\text{gr}} 41'$ cum latitudine boreali $28^{\text{gr}} 6'$, Sole existente in $\psi 18^{\text{gr}} 26'$. Et Cometa Anni 1577, *Dec. 29.* versabatur in $\propto 8^{\text{gr}} 41'$ cum latitudine boreali $28^{\text{gr}} 40'$, Sole etiam existente in $\psi 18^{\text{gr}} 26'$ circiter. Utroque in casu Terra versabatur in eodem loco, & Cometa apparebat in eadem cœli parte: in priori tamen casu cauda Cometæ (ex meis & aliorum Observationibus) declinabat angulo graduum $4\frac{1}{2}$ ab oppositione Solis aquilonem versus; in posteriore vero (ex Observationibus *Tychonis*) declinatio erat graduum 21 in austrum. Igitur repudiata cœlorum refractione, superest ut Phænomena Caudarum ex materia aliqua reflectente deriventur.

Caudas autem a capitibus oriri & in regiones a Sole averfas ascendere confirmatur ex legibus quas observant. Ut quod in planis

planis Orbium Cometarum per Solem transeuntibus jacentes, deviant ab oppositione Solis in eas semper partes, quas capita in Orbibus illis progredientia relinquunt. Quod spectatori in his planis constituto apparent in partibus a Sole directe averfis; digrediente autem spectatore de his planis, deviatio paulatim sentitur, & indies apparet major. Quod deviatio cæteris paribus minor est ubi cauda obliquior est ad Orbem Cometæ, ut & ubi caput Cometæ ad Solem propius accedit; præsertim si spectetur deviationis angulus juxta caput Cometæ. Præterea quod caudæ non deviantes apparent rectæ, deviantes autem incurvantur. Quod curvatura major est ubi major est deviatio, & magis sensibilis ubi cauda cæteris paribus longior est: nam in brevioribus curvatura ægre animadvertitur. Quod deviationis angulus minor est juxta caput Cometæ, major juxta caudæ extremitatem alteram, atque adeo quod cauda convexo sui latere partes respicit a quibus fit deviatio, quæque in recta sunt linea a Sole per caput Cometæ in infinitum ducta. Et quod caudæ quæ prolixiores sunt & latiores, & luce vegetiore micant, sint ad latera convexa paulo splendidiore & limite minus indistincto terminatæ quam ad concava. Pendent igitur Phænomena caudæ a motu capitis, non autem a regione cœli in qua caput conspicitur; & propterea non fiunt per refractionem cœlorum, sed a capite suppeditante materiam oriuntur. Etenim ut in Aere nostro fumus corporis cujusvis igni petit superiora, idque vel perpendiculariter si corpus quiescat, vel oblique si corpus moveatur in latus: ita in Cœlis ubi corpora gravitant in Solem, fumi & vapores ascendere debent à Sole (uti jam dictum est) & superiora vel recta petere, si corpus fumans quiescit; vel oblique, si corpus progrediendo loca semper deserit a quibus superiores vaporis partes ascenderant. Et obliquitas ista minor erit ubi ascensus vaporis velocior est: nimirum in vicinia Solis & juxta corpus fumans. Ex obliquitatis autem diversitate incurvabitur vaporis columna: & quia vapor in columnæ latere præcedente paulo recentior est, ideo etiam is ibidem aliquanto densior erit, lucemque propterea copiosius reflectet, & limite minus indistincto terminabitur. De Caudarum agitationibus subitanis & incertis, deque earum figuris irregularibus, quas nonnulli quandoque describunt, hic nihil adjicio; propterea quod vel a mutationibus Aeris nostri, & motibus nubium caudas aliqua ex parte obscurantium oriantur; vel forte a partibus Viæ Lactææ, quæ cum caudis prætereuntibus confundi possint, ac tanquam earum partes spectari.

DE MUNDI
SYSTEMATE,

Vapores autem, qui spatiis tam immensis implendis sufficiant, ex Cometarum Atmosphæris oriri posse, intelligitur ex raritate Aeris nostri. Nam Aer juxta superficiem Terræ spatium occupat quasi 850 partibus majus quam Aqua ejusdem ponderis, ideoque Aeris columna cylindrica pedes 850 alta, ejusdem est ponderis cum Aquæ columna pedali latitudinis ejusdem. Columna autem Aeris ad summitatem Atmosphæræ assurgens æquat pondere suo columnam Aquæ pedes 33 altam circiter; & propterea si columnæ totius Aereæ pars inferior pedum 850 altitudinis dematur, pars reliqua superior æquabit pondere suo columnam Aquæ altam pedes 32. Inde vero (ex Hypothesi multis experimentis confirmata, quod compressio Aeris sit ut pondus Atmosphæræ incumbens, quodque gravitas sit reciproce ut quadratum distantiae locorum a centro Terræ) computationem per Corol. Prop. xxii. Lib. II. ineundo, inveni quod Aer, si ascendatur a superficie Terræ ad altitudinem semidiametri unius terrestris, rarior sit quam apud nos in ratione longe majori, quam spatii omnis infra Orbem Saturni ad globum diametro digiti unius descriptum. Ideoque globus Aeris nostri digitum unum latus, ea cum raritate quam haberet in altitudine semidiametri unius terrestris, implet omnes Planetarum regiones ad usque sphaeram Saturni & longe ultra. Proinde cum Aer adhuc altior in immensum rarefcat; & coma seu Atmosphæra Cometæ, ascendendo ab illius centro, quasi decuplo altior sit quam superficies nuclei, deinde cauda adhuc altius ascendat, debeat cauda esse quam rarissima. Et quamvis, ob longe crassio rem Cometarum Atmosphæram, magnamque corporum gravitationem Solem versus, & gravitationem particularum Aeris & vaporum in se mutuo, fieri possit ut Aer in spatiis cœlestibus inque Cometarum caudis non adeo rarefcat; per exiguam tamen quantitatem Aeris & vaporum, ad omnia illa caudarum Phænomena abunde sufficere, ex hac computatione perspicuum est. Nam & caudarum insignis raritas colligitur ex astris per eas translucentibus. Atmosphæra terrestris luce Solis splendens, crassitudine sua paucorum milliarum, & astra omnia & ipsam Lunam obscurat & extinguit penitus: per immensam vero caudarum crassitudinem, luce pariter Solari illustratam, astra minima absque claritatis detrimento transluere noscuntur. Neque major esse solet caudarum plurimarum splendor, quam Aeris nostri in tenebroso cubiculo latitudine digiti unius duorumve, lucem Solis in jubare reflectentis.

Quo

Quo temporis spatio vapor a capite ad terminum caudæ ascen-^{LIBER}dit, cognosci fere potest ducendo rectam a termino caudæ ad So-^{TERTIUS}lem, & notando locum ubi recta illa Trajectoriam fecat. Nam vapor in termino caudæ, si recta ascendat a Sole, ascendere cœpit a capite quo tempore caput erat in loco intersectionis. At vapor non recta ascendit à Sole, sed motum Cometæ, quem ante ascensum suum habebat, retinendo, & cum motu ascensus sui eundem componendo, ascendit oblique. Unde verior erit Problematis solutio, ut recta illa quæ Orbem fecat, parallela sit longitudini caudæ, vel potius (ob motum curvilineum Cometæ) ut eadem a linea caudæ divergat. Hoc pacto inveni quod vapor qui erat in termino caudæ *Jan. 25*, ascendere cœperat a capite ante *Dec II*, adeoque ascensu suo toto dies plus 45 consumpserat. At cauda illa omnis quæ *Dec. 10*. apparuit, ascenderat spatio dierum illorum duorum, qui a tempore Perihelii Cometæ elapsi fuerant. Vapor igitur sub initio in vicinia Solis celertime ascendebat, & postea cum motu per gravitatem suam semper retardato ascendere pergebat; & ascendendo augebat longitudinem caudæ: cauda autem quamdiu apparuit ex vapore fere omni constabat qui a tempore Perihelii ascenderat; & vapor, qui primus ascendit, & terminum caudæ composuit, non prius evanuit quam ob nimiam suam tam a Sole illustrante quam ab oculis nostris distantiam videri desiit. Unde etiam caudæ Cometarum aliorum quæ breves sunt, non ascendunt motu celeri & perpetuo à capitibus & mox evanescent, sed sunt permanentes vaporum & exhalationum columnæ, a capitibus lentissimo multorum dierum motu propagatæ, quæ, participando motum illum capitum quem habuere sub initio, per cœlos una cum capitibus moveri pergunt. Et hinc rursus colligitur spatia cœlestia vi resistendi destitui; utpote in quibus non solum solida Planetarum & Cometarum corpora, sed etiam rarissimi caudarum vapores motus suos velocissimos liberrime peragunt ac diutissime conservant.

Ascensum caudarum ex Atmosphæris capitum & progressum in partes a Sole averfas *Keplerus* adscribit actioni radiorum lucis materiam caudæ secum rapientium. Et auram longe tenuissimam in spatiis liberrimis actioni radiorum cedere, non est a ratione prorsus alienum, non obstante quod substantiæ crassæ, impeditissimæ in regionibus nostris, a radiis Solis sensibilibiter propelli nequeant. Alius particulas tam leves quam graves dari posse existimat, & materiam caudarum levitare, perque levitatem suam a Sole ascen-
dere.

DE MUNDI
SYSTEMATE, dere. Cum autem gravitas corporum terrestrium sit ut materia in corporibus, ideoque servata quantitate materiæ intendi & remitti nequeat, suspicor ascensum illum ex rarefactione materiæ caudarum potius oriri. Ascendit fumus in camino impulsu Aeris cui innatat. Aer ille per calorem rarefactus ascendit, ob diminutam suam gravitatem specificam, & fumum implicatum rapit secum. Quidni cauda Cometæ ad eundem modum ascenderit a Sole? Nam radii Solares non agitant Media quæ permeant, nisi in reflexione & refractione. Particulæ reflectentes ea actione calefactæ calefacient auram ætheream cui implicantur. Illa calore sibi communicato rarefiet, & ob diminutam ea raritatem gravitatem suam specificam qua prius tendebat in Solem, ascendet & secum rapiet particulas reflectentes ex quibus cauda componitur: Ad ascensum vaporum conducit etiam quod hi gyranter circa Solem & ea actione conantur a Sole recedere, at Solis Atmosphæra & materia cœlorum vel plane quiescit, vel motu solo quem a Solis rotatione acceperint, tardius gyatur. Hæ sunt causæ ascensus caudarum in vicinia Solis, ubi Orbes curviores sunt, & Cometæ intra densiorem & ea ratione graviorem Solis Atmosphæram consistunt, & caudas quam longissimas mox emittunt. Nam caudæ quæ tunc nascuntur, conservando motum suum & interea versus Solem gravitando, movebuntur circa Solem in Ellipsis pro more capitum, & per motum illum capita semper comitabuntur & iis liberrime adhærebunt. Gravitas enim vaporum in Solem non magis efficiet ut caudæ postea decendant a capitibus Solem versus, quam gravitas capitum efficere possit ut hæc decendant a caudis. Communi gravitate vel simul in Solem cadunt, vel singuli in ascensu suo retardabuntur; adeoque gravitas illa non impedit, quo minus caudæ & capita positionem quamcunque ad invicem a causis jam descriptis, aut aliis quibuscunque, facillime accipiant & postea liberrime servant.

Caudæ igitur quæ in Cometarum Periheliis nascuntur, in regiones longinquas cum eorum capitibus abibunt, & vel inde post longam annorum seriem cum iisdem ad nos redibunt, vel potius ibi rarefactæ paulatim evanescent. Nam postea in descensu capitum ad Solem caudæ novæ breviusculæ lento motu a capitibus propagari debebunt, & subinde, in Periheliis Cometarum illorum qui adusque Atmosphæram Solis descendunt, in immensum augeri. Vapor enim in spatiis illis liberrimis perpetuo rarefcit ac dilatur. Qua ratione sit ut cauda omnis ad extremitatem superiorem

riorem latior sit quam juxta caput Cometæ. Ea autem rarefactione vaporem perpetuo dilatatum diffundi tandem & spargi per cœlos universos, deinde paulatim in Planetas per gravitatem suam attrahi & cum eorum Atmosphæris misceri, rationi consentaneum videtur. Nam quemadmodum Mariæ ad constitutionem Terræ hujus omnino requiruntur, idque ut ex iis per calorem Solis vapores copiose satis excitentur, qui vel in nubes coacti decidunt in pluviis, & terram omnem ad procreationem vegetabilium irrigent & nutrant; vel in frigidis montium verticibus condensati (ut aliqui cum ratione philosophantur) decurrant in fontes & flumina: sic ad conservationem marium & humorum in Planetis, requiri videntur Cometæ, ex quorum exhalationibus & vaporibus condensatis, quicquid liquoris per vegetationem & putrefactionem consumitur & in terram aridam convertitur, continuo suppleri & refici possit. Nam vegetabilia omnia ex liquoribus omnino crescunt, dein magna ex parte in terram aridam per putrefactionem abeunt, & limus ex liquoribus putrefactis perpetuo decedit. Hinc moles Terræ aridæ indies augetur, & liquores, nisi aliunde augmentum fumerent, perpetuo decrescere deberent, ac tandem deficere. Porro suspicor Spiritum illum, qui Aeris nostri pars minima est sed subtilissima & optima, & ad rerum omnium vitam requiritur, ex Cometis præcipue venire.

Atmosphæræ Cometarum in descensu eorum in Solem, excurrendo in caudas, diminuuntur, & (ea certe in parte quæ Solem respicit) angustiores redduntur: & vicissim in recessu eorum a Sole, ubi jam minus excurrunt in caudas, ampliantur si modo Phænomena eorum *Hevelius* recte notavit. Minimæ autem apparent ubi capita jam modo ad Solem calefacta in caudas maximas & fulgentissimas abiere, & nuclei fumo forsan crassiore & nigriore in Atmosphærarum partibus infimis circundantur. Nam fumus omnis ingenti calore excitatus, crassior & nigrior esse solet. Sic caput Cometæ de quo egimus, in æqualibus a Sole ac Terra distantiiis, obscurius apparuit post Perihelium suum quam antea. Mense enim *Decembri* cum stellis tertiæ magnitudinis conferri solebat, at Mense *Novembri* cum stellis primæ & secundæ. Et qui utrumque viderant, majorem describunt Cometam priorem. Nam Juveni cuidam *Cantabrigiensi*, *Novemb.* 19, Cometa hicce luce sua quantumvis plumbea & obtusa, æquabat Spicam Virginis, & clarius micabat quam postea. Et *D. Storer* literis quæ in manus nostras incidere, scripsit caput ejus Mense *Decembri*, ubi caudam

DE MUNDI
SYSTEMATE,

maximam & fulgentissimam emittebat, parvum esse & magnitudine visibili longe cedere Cometæ, qui Mense *Novembri* ante Solis ortum apparuerat. Cujus rei rationem esse conjectabatur, quod materia capitis sub initio copiosior esset, & paulatim consumeretur.

Eodem spectare videtur quod capita Cometarum aliorum, qui caudas maximas & fulgentissimas emiserunt, apparuerint subobscura & exigua. Nam Anno 1668. *Mart.* 5. St. nov. hora septima vespertina *R. P. Valentinus Estancius, Brasiliæ* agens, Cometam vidit Horizonti proximum ad occasum Solis brumalem, capite minimo & vix conspicuo, cauda vero supra modum fulgente, ut stantes in littore speciem ejus e mari reflexam facile cernerent. Speciem utique habebat trabis splendentis longitudine 23 graduum, ab occidente in austrum vergens, & Horizonti fere parallela. Tantus autem splendor tres solum dies durabat, subinde notabiliter decrescens; & interea decrescente splendore aucta est magnitudine cauda. Unde etiam in *Portugallia* quartam fere coeli partem (id est, gradus 45) occupasse dicitur, ab occidente in orientem splendore cum insigni protensa; nec tamen tota apparuit, capite semper in his regionibus infra Horizontem delitescente. Ex incremento caudæ & decremento splendoris manifestum est quod caput a Sole recessit, eique proximum fuit sub initio, pro more Cometæ anni 1680. Et similis legitur Cometa anni 1106, *cujus Stella erat parva & obscura* (ut ille anni 1680) *sed splendor qui ex ea exivit valde clarus & quasi ingens trabs ad Orientem & Aquilonem tendebat*, ut habet *Hevelius* ex *Simeone Dunelmensi* Monacho. Apparuit initio Mensis *Februarii*, circa vesperam, ad occasum Solis brumalem. Inde vero & ex situ caudæ colligitur caput fuisse Soli vicinum. *A Sole*, inquit *Matthæus Parisiensis*, *distabat quasi cubito uno, ab hora tertia* [rectius sexta] *usque ad horam nonam radium ex se longum emittens*. Talis etiam erat ardentissimus ille Cometa ab *Aristotele* descriptus Lib. I. *Meteor.* 6. *cujus caput primo die non conspectum est, eo quod ante Solem vel saltem sub radiis solaribus occidisset, sequente vero die quantum potuit visum est. Nam quam minima fieri potest distantia Solem reliquit, & mox occubuit. Ob nimium ardorem* [caudæ scilicet] *nondum apparebat capitis sparsus ignis, sed procedente tempore* (ait *Aristoteles*) *cum* [cauda] *jam minus flagraret, reddita est* [capiti] *Cometæ sua facies. Et splendorem suum ad tertiam usque cæli partem* [id est, ad 60^{gr.}] *extendit. Apparuit autem tempore*

tempore hyberno, & ascendens usque ad cingulum Orionis ibi evanuit. LIBER
Cometa ille anni 1618, qui e radiis Solaribus caudatissimus emerfit, TERTIUS.
stellas primæ magnitudinis æquare vel paulo superare videbatur,
sed majores apparuere Cometæ non pauci qui caudas breviores
habuere. Horum aliqui Jovem, alii Venerem vel etiam Lunam
æquasse traduntur.

Diximus Cometæ esse genus Planetarum in Orbibus valde eccentricis circa Solem revolvuntium. Et quemadmodum e Planetis non caudatis, minores esse solent qui in Orbibus minoribus & Soli propioribus gyrantur, sic etiam Cometæ, qui in Periheliis suis ad Solem propius accedunt, ut plurimum minores esse, ne Solem attractione sua nimis agitent, rationi consentaneum videtur. Orbium vero transversas diametros & revolutionum tempora periodica, ex collatione Cometarum in iisdem Orbibus post longa temporum intervalla redeuntium, determinanda relinquo. Interea huic negotio Propositio sequens lumen accendere potest.

PROPOSITIO XLII. PROBLEMA XXII.

Trajectoriam Cometæ Graphice inventam corrigere.

Oper. 1. Assumatur positio plani Trajectoriæ, per Propositionem superiorem Graphice inventa; & seligantur tria loca Cometæ observationibus accuratissimis definita, & ab invicem quam maxime distantia; sitque A tempus inter primam & secundam, ac B tempus inter secundam ac tertiam. Cometam autem in eorum aliquo in Perigæo versari convenit, vel saltem non longe a Perigæo abesse. Ex his locis apparentibus inveniantur, per operationes Trigonometricas, loca tria vera Cometæ in assumpto illo plano Trajectoriæ. Deinde per loca illa inventa, circa centrum Solis ceu umbilicum, per operationes Arithmeticas, ope Prop. XXI. Lib. I. institutas, describatur Sectio Conica: & ejus areæ, radiis a Sole ad loca inventa ductis terminatæ, sunt D & E; nempe D area inter observationem primam & secundam, & E area inter secundam ac tertiam. Sitque T tempus totum quo area tota D+E, velocitate Cometæ per Prop. XVI. Lib. I. inventa, describi debet.

Oper. 2. Augeatur longitudo Nodorum Plani Trajectoriæ, additis ad longitudinem illam 20' vel 30', quæ dicantur P; & fervetur plani illius inclinatio ad planum Eclipticæ. Deinde ex
Ooo 2 præ-

prædictis tribus Cometæ locis observatis, inveniantur in hoc novo plano loca tria vera (ut supra:) deinde etiam Orbis per loca illa transiens, & ejusdem areæ duæ inter observationes descriptæ, quæ sint d & e , nec non tempus totum t quo area tota $d + e$ describi debeat.

Oper. 3. Servetur Longitudo Nodorum in operatione prima, & augeatur inclinatio Plani Trajectoriæ ad planum Eclipticæ, additis ad inclinationem illam $20'$ vel $30'$, quæ dicantur Q . Deinde ex observatis prædictis tribus Cometæ locis apparentibus, inveniantur in hoc novo Plano loca tria vera, Orbisque per loca illa transiens, ut & ejusdem areæ duæ inter observationes descriptæ, quæ sint δ & ε , & tempus totum τ quo area tota $\delta + \varepsilon$ describi debeat.

Jam sit C ad 1 ut A ad B , & G ad 1 ut D ad E , & g ad 1 ut d ad e , & γ ad 1 ut δ ad ε ; sitque S tempus verum inter observationem primam ac tertiam; & signis $+$ & $-$ probe observatis quarantur numeri m & n , ea lege, ut sit $2G - 2C = mG - mg + nG - n\gamma$, & $2T - 2S$ æquale $mT - mt + nT - n\tau$. Et si, in operatione prima, I designet inclinationem plani Trajectoriæ ad planum Eclipticæ, & K longitudinem Nodi alterutrius, erit $I + nQ$ vera inclinatio Plani Trajectoriæ ad Planum Eclipticæ, & $K + mP$ vera longitudo Nodi. Ac denique si in operatione prima, secunda ac tertia, quantitates R , r & ρ designent Latera recta Trajectoriæ, & quantitates $\frac{1}{L}$, $\frac{1}{l}$, $\frac{1}{\lambda}$ ejusdem Latera trans-

versa respective: erit $R + mr - mR + n\rho - nR$ verum Latus rec-

tum, & $\frac{I}{L + ml - mL + n\lambda - nL}$ verum Latus transversum Tra-

jectoriæ quam Cometa describit. Dato autem Latere transverso datur etiam tempus periodicum Cometæ. *Q. E. I.*

Cæterum Cometarum revolvantium tempora periodica, & Orbium latera transversa, haud satis accurate determinabuntur, nisi per collationem Cometarum inter se, qui diversis temporibus apparent. Si plures Cometæ, post æqualia temporum intervalla, eundem Orbem descripsisse reperiantur, concludendum erit hos omnes esse unum & eundem Cometam, in eodem Orbe revolventem. Et tum demum ex revolutionum temporibus, dabuntur Orbium latera transversa, & ex his lateribus determinabuntur Orbes Elliptici.

In

In hunc finem computandæ sunt igitur Cometarum plurium Trajectoriæ, ex hypothefi quod sint Parabolicæ. Nam hujusmodi Trajectoriæ cum Phænomenis semper congruent quamproxime. Id liquet, non tantum ex Trajectoria Parabolica Cometæ anni 1680, quam cum observationibus supra contuli, sed etiam ex ea Cometæ illius insignis, qui annis 1664 & 1665 apparuit, & ab *Hevelio* observatus fuit. Is ex observationibus suis longitudes & latitudes hujus Cometæ computavit, sed minus accurate. Ex iisdem observationibus, *Halleius* noster loca Cometæ hujus denuo computavit, & tum demum ex locis sic inventis Trajectorium Cometæ determinavit. Invenit autem ejus Nodum ascendentem in Π $21^{\text{gr.}} 13' 55''$, Inclinationem Orbitæ ad planum Eclipticæ $21^{\text{gr.}} 18' 40''$, distantiam Perihelii a Nodo in Orbita $49^{\text{gr.}} 27' 30''$. Perihelium in Ω $8^{\text{gr.}} 40' 30''$ cum Latitudine austrina heliocentrica $16^{\text{gr.}} 1' 45''$. Cometam in Perihelio *Novemb.* $24^{\text{d.}}$ $11^{\text{h.}}$ $52'$ P. M. tempore æquato *Londini*, vel $13^{\text{h.}}$ $8'$ *Gedani*, stylo veteri, & Latus rectum Parabolæ 410286, existente mediocri Terræ a Sole distantia 100000. Quam probe loca Cometæ in hoc Orbe computata, congruunt cum observationibus, patebit ex Tabula sequente ab *Halleio* supputata.

Temp. Appar. <i>Gedani</i>	Observata Cometæ distantia	Loca observata.	Loca computata in Orbe.
<i>Decemb.</i>			
3 ^d . 18 ^h . 29 ^m $\frac{1}{2}$	a Corde Leonis a Spica Virginis	Long. $\frac{1}{2}$ 7. 1. 0 Lat. austr. 21. 39. 0	$\frac{1}{2}$ 7. 1. 29 21. 38. 50
4. 18. 12 ¹	a Corde Leonis a Spica Virginis	Long. $\frac{1}{2}$ 6. 15. 0 Lat. a. 22. 24. 0	$\frac{1}{2}$ 6. 16. 5 22. 24. 0
7. 17. 48	a Corde Leonis a Spica Virginis	Long. $\frac{1}{2}$ 3. 6. 0 Lat. a. 25. 22. 0	$\frac{1}{2}$ 3. 7. 33 25. 21. 40
17. 14. 43	a Corde Leonis ab Humero Orionis dext.	Long. Ω 2. 56. 0 Lat. a. 49. 25. 0	Ω 2. 56. 0 49. 25. 0
19. 9. 25	a Procyone a Lucid. Mandib. Ceti	Long. Π 28. 40. 30 Lat. a. 45. 48. 0	Π 28. 43. 0 45. 46. 0
20. 9. 53 $\frac{1}{2}$	a Procyone a Lucid. Mandib. Ceti	Long. Π 11. 3. 0 Lat. a. 39. 54. 0	Π 13. 5. 0 39. 53. 0
21. 9. 51 $\frac{1}{2}$	ab Hum. dext. Orionis a Lucid. Mandib. Ceti	Long. Π 2. 16. 0 Lat. a. 33. 41. 0	Π 2. 18. 30 33. 39. 40
23. 9. 0	ab Hum. dext. Orionis a Lucid. Mandib. Ceti	Long. α 24. 24. 0 Lat. a. 27. 45. 0	α 24. 27. 0 27. 46. 0
26. 7. 58	a Lucida Arietis ab Aldebaran	Long. α 9. 0. 0 Lat. a. 12. 36. 0	α 9. 2. 28 12. 34. 13
		0003	Temp.

DE MUNDI
SYSTEMATE,

Temp. Appar. <i>Gedani</i>			Observata Cometæ distantia			Loca observata			Loca computata in Orbe.		
d.	h.	/		gr.	/ //		gr.	/ //		gr.	/ //
27.	6.	45	a Lucida Arietis ab Aldebaran	20. 45. 0 28. 10. 0		Long. γ 7. 5. 49 Lat. a. γ 10. 23. 0			γ 7. 8. 54 10. 23. 13		
28.	7.	39	a Lucida Arietis a Palilicio	18. 29. 0 29. 37. 0		Long. γ 5. 24. 45 Lat. a. γ 8. 22. 50			γ 5. 27. 52 8. 23. 37		
31.	6.	45	a Cing. Androm. a Palilicio	30. 48. 10 32. 53. 30		Long. γ 2. 7. 40 Lat. a. γ 4. 13. 0			γ 2. 8. 20 4. 16. 25		
<i>Jun.</i> 7.	7.	37½	a Cing. Androm. a Palilicio	25. 11. 0 37. 12. 25		Long. γ 28. 24. 47 Lat. bor. γ 0. 54. 0			γ 28. 24. 0 0. 53. 0		
24.	7.	29	a Palilicio a Cing. Androm.	40. 5. 0 20. 32. 15		Long. γ 26. 29. 15 Lat. bor. γ 5. 25. 50			γ 26. 28. 50 5. 26. 0		
<i>Mar.</i> 1.	8.	6	Cometa ab <i>Hookis</i> prope secundam Arietis observabatur, <i>Mar.</i> 1 ^a , 7 ^h . 0' <i>Londoni</i> , cum			Long. γ 29. 17. 20 Lat. bor. γ 8. 37. 10			γ 29. 18. 20 8. 36. 12		

Apparuit hic Cometa per menses tres, signaque fere sex descripsit, & uno die gradus fere viginti confecit. Cursus ejus a circulo maximo plurimum deflexit, in boream incurvatus; & motus ejus sub finem ex retrogrado factus est directus. Et non obstante cursu tam insolito, Theoria a principio ad finem cum observationibus non minus accurate congruit, quam Theoriæ Planetarum cum eorum observationibus congruere solent, ut insipienti Tabulam patebit. Subducenda tamen sunt minuta duo prima circiter, ubi Cometa velocissimus fuit; id quod fiet auferendo duodecim minuta secunda ab angulo inter Nodum ascendentem & Perihelium, seu constituendo angulum illum 49^{gr} 27'. 18". Cometæ utriusque (& hujus & superioris) parallaxis annua insignis fuit, & inde demonstratur motus annuus Terræ in Orbe magno.

Confirmatur etiam Theoria per motum Cometæ qui apparuit anno 1683. Hic fuit retrogradus in Orbe cujus planum cum plano Eclipticæ angulum fere rectum continebat. Hujus Nodus ascendens (computante *Halleio*) erat in π 23^{gr} 23'; Inclinatio Orbitæ ad Eclipticam 83^{gr} 11'; Perihelium in π 25^{gr} 29'. 30"; Distantia perihelia a Sole 56020, existente radio Orbis magni 100000, & tempore Perihelii *Julii* 2^d. 3^h. 50'. Loca autem Cometæ in hoc Orbe ab *Halleio* computata, & cum locis a *Flamstedio* observatis collata, exhibentur in Tabula sequente.

1683 Temp.

1683 Temp. Æquat.	Locus Solis.	Cometæ Long. Comp.	Lat. Bor. Comp.	Cometæ Long. Obs.	Lat. Bor. Obs.	Differ. Long.	Differ. Lat.
d. h. /	gr. / //	gr. / //	gr. / //	gr. / //	gr. / //	/ //	/ //
<i>Jul.</i> 13. 12. 55	Ω 1. 2. 30	♄ 13. 5. 42	29. 28. 13	♄ 13. 6. 42	29. 28. 20	+ 1. 0	+ 0. 7
15. 11. 15	2. 53. 12	11. 37. 48	29. 34. 0	11. 39. 43	29. 34. 50	+ 1. 55	+ 0. 50
17. 10. 20	4. 45. 45	10. 7. 6	29. 33. 30	10. 8. 40	29. 34. 0	+ 1. 34	+ 0. 30
23. 13. 40	10. 38. 21	5. 10. 27	28. 51. 42	5. 11. 30	28. 50. 28	+ 1. 3	+ 1. 14
25. 14. 5	12. 35. 28	3. 27. 53	24. 24. 47	3. 27. 0	28. 23. 40	- 0. 53	- 1. 7
31. 9. 42	18. 9. 22	II 27. 55. 3	26. 22. 52	II 27. 54. 24	26. 22. 25	- 0. 39	- 0. 27
31. 14. 55	18. 21. 53	27. 41. 7	26. 16. 57	27. 41. 8	26. 14. 50	+ 0. 1	- 2. 7
2. 14. 56	20. 17. 16	25. 29. 32	25. 16. 19	25. 28. 46	25. 17. 28	- 0. 46	+ 1. 9
4. 10. 49	22. 2. 56	23. 18. 20	24. 10. 49	23. 16. 55	24. 12. 19	- 1. 25	+ 1. 30
6. 10. 9	23. 56. 45	20. 42. 23	22. 47. 5	20. 40. 32	22. 49. 5	- 1. 51	+ 2. 0
9. 10. 26	26. 50. 52	16. 7. 57	20. 6. 37	16. 5. 55	20. 6. 10	- 2. 2	- 0. 27
15. 14. 1	II 2. 47. 13	3. 30. 48	11. 37. 33	3. 26. 18	11. 32. 1	- 4. 30	+ 5. 32
16. 15. 10	3. 48. 2	0. 43. 7	9. 34. 16	0. 41. 55	9. 34. 13	- 1. 12	- 0. 3
18. 15. 44	5. 45. 33	♄ 24. 52. 53	5. 11. 15	♄ 24. 49. 5	5. 9. 11	- 3. 48	- 2. 4
				Austr.			
22. 14. 44	9. 35. 49	11. 7. 14	5. 16. 53	11. 7. 12	5. 16. 50	- 0. 2	- 0. 3
23. 15. 52	10. 36. 48	7. 2. 18	8. 17. 9	7. 1. 17	8. 16. 41	- 1. 1	- 0. 38
26. 16. 2	13. 31. 10	Υ 24. 45. 31	16. 38. 0	Υ 24. 44. 0	16. 38. 20	- 1. 31	+ 0. 20

Confirmatur etiam Theoria per motum Cometæ retrogradi qui apparuit anno 1682. Hujus Nodus ascendens (computante *Hal-*
leio) erat in γ 21^{gr.} 16'. 30". Inclinatio Orbitæ ad planum Eclip-
ticæ 17^{gr.} 56' 0". Perihelium in α 2^{gr.} 52'. 50". Distantia peri-
helii a Sole 58328. Et tempus æquatum Perihelii *Sept.* 4^{d.} 7^{h.} 39'.
Loca vero ex observationibus *Flamstedii* computata, & cum locis
per Theoriam computatis collata, exhibentur in Tabula fe-
quente.

1682 Temp. Apar.	Locus Solis.	Cometæ Long. Comp.	Lat. Bor. Comp.	Cometæ Long. Obs.	Lat. Bor. Obs.	Differ. Long.	Differ. Lat.
d. h. /	gr. / //	gr. / //	gr. / //	gr. / //	gr. / //	/ //	/ //
<i>Aug.</i> 19. 16. 38	♄ 7. 0. 7	Ω 18. 14. 28	25. 50. 7	Ω 18. 14. 40	25. 49. 55	- 0. 12	+ 0. 12
20. 15. 38	7. 55. 52	24. 46. 23	26. 14. 42	24. 46. 22	26. 12. 52	+ 0. 1	+ 1. 50
21. 8. 21	8. 36. 14	29. 37. 15	26. 20. 3	29. 38. 2	26. 17. 37	- 0. 47	+ 2. 26
22. 8. 8	9. 33. 55	♄ 6. 29. 53	26. 8. 42	♄ 6. 30. 3	26. 7. 12	- 0. 10	+ 1. 30
29. 8. 20	16. 22. 40	♄ 12. 37. 54	18. 37. 47	♄ 12. 37. 49	18. 34. 5	+ 0. 5	+ 3. 42
30. 7. 45	17. 19. 41	15. 36. 1	17. 26. 43	15. 35. 18	17. 27. 17	+ 0. 43	+ 0. 34
1. 7. 33	19. 16. 9	20. 30. 53	15. 13. 0	20. 27. 4	15. 9. 49	+ 3. 49	+ 3. 11
4. 7. 22	22. 11. 28	25. 42. 0	12. 23. 48	25. 40. 58	12. 22. 0	+ 1. 2	+ 1. 48
5. 7. 32	23. 10. 29	27. 0. 46	11. 33. 8	26. 59. 24	11. 33. 51	+ 1. 22	- 0. 43
8. 7. 16	26. 5. 58	29. 58. 44	9. 26. 46	29. 58. 45	9. 26. 43	- 0. 1	+ 0. 3
9. 7. 26	27. 5. 9	♄ 0. 44. 10	8. 49. 10	♄ 0. 44. 4	8. 48. 25	+ 0. 6	+ 0. 45

His exemplis abunde satis manifestum est, quod motus Come-
tarum per Theoriam a nobis expositam non minus accurate ex-
hibentur,

DE MUNDI
SYSTEMATE,

hibentur, quam solent motus Planetarum per eorum Theorias. Et propterea Orbes Cometarum per hanc Theoriam enumerari possunt, & tempus periodicum Cometæ in quolibet Orbe revolvantis tandem sciri, & tum demum Orbium Ellipticorum latera transversa & Apheliorum altitudines innotescent.

Cometa retrogradus qui apparuit anno 1607, descripsit Orbem cujus Nodus ascendens (computante *Halleio*) erat in α 20^{gr} 21'. Inclinatio plani Orbis ad planum Eclipticæ erat 17^{gr} 2'. Perihelium erat in π 2^{gr} 16', & distantia perihelia a Sole erat 58680, existente radio Orbis magni 100000. Et Cometa erat in Perihelio *Octob.* 16^d. 3^h. 50'. Congruit hic Orbis quamproxime eum Orbe Cometæ qui apparuit anno 1682. Si Cometæ hi duo fuerint unus & idem, revolvetur hic Cometa spatio annorum 75, & axis major Orbis ejus erit ad axem majorem Orbis magni, ut $\sqrt{c} : 75 \times 75$ ad 1, seu 1778 ad 100 circiter. Et distantia aphelia Cometæ hujus a Sole, erit ad distantiam mediocrem Terræ a Sole, ut 35 ad 1 circiter. Quibus cognitis, haud difficile fuerit Orbem Ellipticum Cometæ hujus determinare. Atque hæc ita se habebunt si Cometa spatio annorum septuaginta quinque, in hoc Orbe posthac redierit. Cometæ reliqui majori tempore revolvi videntur & altius ascendere.

Cæterum Cometæ, ob magnum eorum numerum, & magnam Apheliorum a Sole distantiam, & longam moram in Apheliis, per gravitates in se mutuo nonnihil turbari debent, & eorum eccentricitates & revolutionum tempora nunc augeri aliquantulum, nunc diminui. Proinde non est expectandum ut Cometa idem, in eodem Orbe & iisdem temporibus periodicis, accurate redeat. Sufficit si mutationes non majores obvenerint, quam quæ a causis prædictis oriantur.

Et hinc ratio redditur cur Cometæ non comprehendantur Zodiaco (more Planetarum) sed inde migrent & motibus variis in omnes coelorum regiones ferantur. Scilicet eo fine, ut in Apheliis suis ubi tardissime moventur, quam longissime distent ab invicem & se mutuo quam minime trahant. Qua de causa Cometæ qui altius descendunt, adeoque tardissime moventur in Apheliis, debent altius ascendere.

Cometa qui anno 1680 apparuit, minus distabat a Sole in Perihelio suo quam parte sexta diametri Solis; & propter summam velocitatem in vicinia illa, & densitatem aliquam Atmosphæræ Solis, resistentiam nonnullam sentire debuit, & aliquantulum retardari,

dari & propius ad Solem accedere : & singulis revolutionibus accedendo ad Solem, incidet is tandem in corpus Solis. Sed & in Aphelio ubi tardissime movetur, aliquando per attractionem aliorum Cometarum retardari potest & subinde in Solem incidere. Sic etiam Stellæ fixæ quæ paulatim expirant in lucem & vapores, Cometis in ipsas incidentibus resciri possunt, & novo alimento accensæ pro Stellis Novis haberi. Vapores autem qui ex Sole & Stellis fixis & caudis Cometarum oriuntur, incidere possunt per gravitatem suam in Atmosphæras Planetarum, & ibi condensari & converti in aquam & spiritus humidos, & subinde per lentum calorem in sales, & sulphura, & tincturas, & limum, & lutum, & argillam, & arenam, & lapides, & coralla, & substantias alias terrestres paulatim migrare. Decrescente autem corpore Solis motus medii Planetarum circum Solem paulatim tarDESCENT, & crescente Terra motus medius Lunæ circum Terram paulatim augebitur. Et collatis quidem observationibus Eclipsium *Babylonicis* cum iis *Albategnii* & cum hodiernis, *Halleus* noster motum medium Lunæ cum motu diurno Terræ collatum, paulatim accelerari, primus omnium quod sciam deprehendit.

SCHOLIUM GENERALE.

Hypothesis Vorticum multis premitur difficultatibus. Ut Planetæ unusquisque radio ad Solem ducto areas describat tempori proportionales, tempora periodica partium Vorticis deberent esse in duplicata ratione distantiarum a Sole. Ut periodica Planetarum tempora sint in proportionem sesquiplicata distantiarum a Sole, tempora periodica partium Vorticis deberent esse in eadem distantiarum proportionem. Ut Vortices minores circum Saturnum, Jovem & alios Planetas gyrați conserventur & tranquille natent in Vortice Solis, tempora periodica partium Vorticis Solaris deberent esse æqualia. Revolutiones Solis & Planetarum circum axes suos ab omnibus hisce proportionibus discrepant. Motus Cometarum sunt summe regulares, & easdem leges cum Planetarum motibus observant, & per Vortices explicari nequeunt. Feruntur Cometæ motibus valde eccentricis in omnes cœlorum partes, quod fieri non potest nisi Vortices tollantur.

Projectilia, in aere nostro, solam aeris resistantiam sentiunt. Sublato aere, ut fit in Vacuo *Boylano*, resistantia cessat, siquidem pluma tenuis & aurum solidum æquali cum velocitate in hoc

Ppp

Vacuo

DE MUNDI SYSTEMATE, Vacuo cadunt. Et par est ratio spatiorum cœlestium quæ sunt supra atmosphæram Terræ. Corpora omnia in istis spatiis liberrime moveri debent; & propterea Planetæ & Cometæ in orbibus specie & positione datis, secundum leges supra expositas, perpetuo revolvunt. Perseverabunt quidem in orbibus suis per leges gravitatis, sed regularem orbium situm primitus acquirere per leges hæc minime potuerunt.

Planetæ sex principales revolvuntur circum Solem in circulis Soli concentricis, eadem motus directione, in eodem plano quamproxime. Lunæ decem revolvuntur circum Terram, Jovem & Saturnum in circulis concentricis, eadem motus directione, in planis orbium Planetarum quamproxime. Et hi omnes motus regulares originem non habent ex causis Mechanicis; siquidem Cometæ in Orbibus valde eccentricis, & in omnes cœlorum partes libere feruntur. Quo motus genere Cometæ per Orbes Planetarum celerissime & facillime transeunt, & in Apheliis suis ubi tardiores sunt & diutius morantur, quam longissime distant ab invicem, & se mutuo quam minime trahunt. Elegantissima hæc Solis, Planetarum & Cometarum compages non nisi consilio & dominio Entis intelligentis & potentis oriri potuit. Et si Stellæ fixæ sint centra similibus systematum; hæc omnia simili consilio constructa, suberunt *Unius* dominio: præsertim cum lux Fixarum sit ejusdem naturæ ac lux Solis, & systemata omnia lucem in omnia invicem immittant.

Hic omnia regit, non ut Anima mundi, sed ut univerforum Dominus; & propter dominium suum Dominus Deus minus; & dici solet. Nam *Deus* est vox relativa & ad servos refertur: & *Deitas* est dominatio Dei non in corpus proprium, (uti sentiunt quibus Deus est Anima Mundi) sed in servos. *Deus summus* est Ens æternum, infinitum, absolute perfectum; sed Ens utcumque perfectum sine dominio, non est *Dominus Deus*. Dicimus enim *Deus meus*, *Deus vester*, *Deus Israelis*: sed non dicimus *Æternus meus*, *Æternus vester*, *Æternus Israelis*; non dicimus *Infinitus meus*, *Infinitus vester*, *Infinitus Israelis*; non dicimus *Perfectus meus*, *Perfectus vester*, *Perfectus Israelis*. Hæ appellationes relationem non habent ad servos. Vox *Deus* passim significat *Dominum*, sed omnis Dominus non est Deus. Dominatio Entis spiritualis *Deum* constituit, vera verum, summa summum, ficta fictum. Et ex dominatione vera sequitur, Deum verum esse vivum, intelligentem & potentem; ex reliquis perfectionibus summum esse

* Id est, Imperator universalis.

* παντοκράτωρ

esse vel summe perfectum. *Æternus est & Infinitus, Omnipotens & Omnisciens*, id est, durat ab æterno in æternum & adest ab infinito in infinitum, omnia regit & omnia cognoscit quæ fiunt aut sciri possunt. Non est æternitas vel infinitas, sed æternus & infinitus; non est duratio vel spatium, sed durat & adest. Durat semper & adest ubique, & existendo semper & ubique durationem & spatium, æternitatem & infinitatem constituit. Cum unaquæque spatii particula sit *semper*, & unumquodque durationis indivisibile momentum *ubique*; certe rerum omnium Fabricator ac Dominus non erit *nunquam nusquam*. Omnipræsens est non per *virtutem* solam, sed etiam per *substantiam*; nam virtus sine substantia subsistere non potest. In ipso * continentur & moventur universa, sed absque mutua *passione*. Deus nihil patitur ex corporum motibus: illa nullam sentiunt resistantiam ex omnipræsencia Dei. Deum summum necessario existere in confesso est: Et eadem necessitate *semper* est & *ubique*. Unde etiam totus est sui similis, totus oculus, totus auris, totus cerebrum, totus brachium, totus vis sentiendi, intelligendi & agendi; sed more minime humano, more minime corporeo, more nobis prorsus incognito. Ut cæcus ideam non habet colorum, sic nos ideam non habemus modorum quibus Deus sapientissimus sentit & intelligit omnia. Corpore omni & figura corporea prorsus destituitur, ideoque videri non potest, nec audiri, nec tangi, nec sub specie rei alicujus corporeæ coli debet. Ideas habemus attributorum ejus, sed quid sit rei alicujus Substantia minime cognoscimus. Videmus tantum corporum figuras & colores, audimus tantum sonos, tangimus tantum superficies externas, olfacimus odores solos, & gustamus sapes; Intimas substantias nullo sensu, nulla actione reflexa cognoscimus, & multo minus ideam habemus substantiæ Dei. Hunc cognoscimus solummodo per proprietates suas & attributa, & per sapientissimas & optimas rerum structuras, & causas finales; veneramur autem & colimus ob dominium. Deus enim sine dominio, providentia, & causis finalibus, nihil aliud est quam Fatum & Natura. Et hæc de Deo; de quo utique ex Phænomenis differere, ad *Philosophiam Experimentalem* pertinet.

Hactenus Phænomena cælorum & maris nostri per Vim gravitatis exposui, sed causam Gravitatis nondum assignavi. Oritur utique hæc Vis a causa aliqua quæ penetrat ad usque centra Solis

* Ita sentiebant veteres, Aratus in Phænom. sub initio. Paulus in Act. 7. 27. 28. Moysi Deut. 4. 39. & 10. 14. David Psal. 139. 7. 8. Solomon 1. Reg. 8. 27. Job. 22. 12. Jeremias Propheta 23. 23, 24.

DE MUNDI
SYSTEMATE.

& Planetarum, sine virtutis diminutione; quæque agit non pro quantitate *superficierum* particularum in quas agit (ut solent causæ Mechanicæ,) sed pro quantitate materiæ *solidæ*; & cujus actio in immensas distantias undique extenditur, decrescendo semper in duplicata ratione distantiarum. Gravitatis in Solem componitur ex gravitatibus in singulas Solis particulas, & recedendo a Sole decrescit accurate in duplicata ratione distantiarum ad usque orbem Saturni, ut ex quiete Apheliorum Planetarum manifestum est, & ad usque ultima Cometarum Aphelia, si modo Aphelia illa quiescant. Rationem vero harum Gravitatis proprietatum ex Phænomenis nondum potui deducere, & Hypotheses non fingo. Quicquid enim ex Phænomenis non deducitur, *Hypothesis* vocanda est; & Hypotheses seu Metaphysicæ, seu Physicæ, seu Qualitatum occultarum, seu Mechanicæ, in *Philosophia Experimentalis* locum non habent. In hac Philosophia Propositiones deducuntur ex Phænomenis, & redduntur generales per Inductionem. Sic impenetrabilitas, mobilitas, & impetus corporum & leges motuum & gravitatis innotuerunt. Et satis est quod Gravitatis revera existat, & agat secundum leges à nobis expostas, & ad corporum cœlestium & maris nostri motus omnes sufficiat.

Adjicere jam liceret nonnulla de Spiritu quodam subtilissimo corpora crassa pervadente, & in iisdem latente, cuius vi & actionibus particulæ corporum ad minimas distantias se mutuo attrahunt, & contiguæ factæ cohærent; & corpora Electrica agunt ad distantias majores, tam repellendo quam attrahendo corpuscula vicina; & Lux emittitur, reflectitur, refringitur, inflectitur, & corpora calefacit; & Sensatio omnis excitatur, & membra Animalium ad voluntatem moventur, vibrationibus scilicet hujus Spiritus per solida nervorum capillamenta ab externis sensuum organis ad cerebrum & a cerebro in musculos propagatis. Sed hæc paucis exponi non possunt; neque adeo sufficiens copia Experimentorum, quibus leges actionum hujus Spiritus accurate determinari & monstrari debent.

F I N I S.

I N.

INDEX RERUM

ALPHABETICUS.

N. B. *Citationes factæ sunt ad normam sequentis Exempli. III, 10: 444, 20: 471, 28 designant Libri tertii Propositionem decimam: Paginae 444^a lineam 20^{am}: Paginae 471^a lineam 28^{am}:*

A.

Æ Quinquecentorum præcessio
causæ hujus motus indicantur III, 21

quantitas motus ex causis computatur III, 39

Aeris

densitas ad quamlibet altitudinem colligitur ex Prop. 22. Lib. II. quanta sit ad altitudinem unius semidiаметri Terrestris ostenditur 470, 11

elastica vis quali causæ tribui possit II. 23.

gravitas cum Aquæ gravitate collata 470, 3
resistentia quanta sit, per Experimenta Pendulorum colligitur 286, 28; per Experimenta corporum cadentium & Theoriam accuratius invenitur 327, 13

Anguli contactus non sunt omnes ejusdem generis, sed alii aliis infinite minores p. 32.

Aspidum motus expenditur I, Sect. 9.

Aeræ quas corpora in gyros acta, radiis ad centrum virium ductis, describunt, conferuntur cum temporibus descriptionum I, 1, 2, 3. 58, 65

Attractio corporum universorum demonstratur III, 7; qualis sit hujus demonstrationis certitudo ostenditur 358, 28: 484, 11

Attractionis causam vel modum nullibi definit Auctor 5, 17: 147, 32: 172, 31: 483, 34.

C.

Calore virga ferrea comperta est augeri longitudine 386, 4

Calor Solis quantus sit in diversis a Sole distantis 466, 20

quantus apud Mercurium 372, 12

quantus apud Cometam anni 1680 in Perihelio versantem 466, 22

Centrum commune gravitatis corporum plurimum, ab actionibus corporum inter se, non mutat statum suum vel motus vel quietis p. 17

Centrum commune gravitatis Terræ, Solis & Planetarum omnium quiescere III, 11; confirmatur ex Cor. 2. Prop. 14. Lib. III.

Centrum commune gravitatis Terræ & Lunæ motu annuo percurrit Orbem magnum 376, 6 quibus intervallis distat a Terra & Luna 430, 22

Centrum Virium quibus corpora revolvuntur in Orbibus retinentur

quali Arearum indicio invenitur 38, 14
qua ratione ex datis revolvantium velocitatibus invenitur I, 5

Circuli circumferentia, qua lege vis centripetæ tendentis ad punctum quodcunque datum describi potest a corpore revolvente I, 4, 7, 8

Cœli

resistentia destituuntur III, 10: 444, 20: 471, 28; & propterea Fluido omni corporeo 328, 18

transitum Luci præbent absque ulla refractione 467, 33.

Cometæ

Genus sunt Planetarum, non Meteororum 444, 24: 466, 15

Luna superiores sunt, & in regione Planetarum versantur p. 439

Distantia eorum qua ratione per Observationes colligi potest quamproxime 439, 21

Plures observati sunt in hemisphærio Solem versus, quam in hemisphærio opposito; & unde hoc fiat 444, 5

Splendent luce Solis a se reflexa 444, 4; Lux illa quanta esse solet 441, 12

Cinguntur Atmosphæris ingentibus 442, 12: 444, 27

Qui ad Solem propius accedunt ut plurimum minores esse existimantur 475, 7

Quo fine non comprehenduntur Zodiaco (more Planetarum) sed in omnes cœlorum regiones varie feruntur 480, 30

Possunt aliquando in Solem incidere & novum illi alimentum ignis præbere 480, 37

Usus eorum suggeritur 473, 1: 481, 7

Ppp 3.

Come-

INDEX RERUM.

Cometarum caudæ

avertuntur a Sole 468, 39
maximæ sunt & fulgentissimæ statim post
transitum per viciniam Solis 467, 8
insignis earum raritas 470, 32
origo & natura earundem 442, 19: 467, 13
quo temporis spatio a capite ascendunt 471, 1

Cometæ

Moventur in Sectionibus Conicis umbilicos
in centro Solis habentibus, & radii ad So-
lem ductis describunt areas temporibus pro-
portionales. Et quidem in Ellipsis mo-
ventur si in Orbem redeunt, hæc tamen
Parabolis erunt maxime finitimæ III, 40

Trajectoria Parabolica ex datis tribus Obser-
vationibus invenitur III, 41; Inventa cor-
rigitur III, 42

Locus in Parabola invenitur ad tempus da-
tum 445, 30: I, 30

Velocitas cum velocitate Planetarum confer-
tur 445, 17

Cometa annorum 1664 & 1665

Hujus motus observatus expenditur, & cum
Theoria accurate congruere deprehenditur
p. 477.

Cometa annorum 1680 & 1681

Hujus motus observatus cum Theoria accu-
rate congruere invenitur p. 455 & seqq.

Videbatur in Ellipsi revolvi spatio annorum
plusquam quingentorum 464, 37

Trajectoria illius & Cauda singulis in locis
delineantur p. 465

Cometa anni 1682

Hujus motus accurate respondet Theoriæ
p. 479

Comparuisse visus est anno 1607, iterumque re-
diturus videtur periodo 75 annorum 480, 6

Cometa anni 1683

Hujus motus accurate respondet Theoriæ
p. 478

Curvæ distinguuntur in Geometricæ rationales &
Geometricæ irrationales 100, 5

Curvatura figurarum qua ratione æstimanda sit
235, 28: 398, 33

Cycloidis seu Epicycloidis

rectificatio I, 48, 49: 142, 18

Evoluta I, 50: 142, 22

Cylindri attractio ex particulis trahentibus com-
positi quarum vires sunt reciproce ut qua-
drata distantiarum 198, 1

D.

Dei Natura p. 482 & 483

Descensus gravium in vacuo quantus sit, ex lon-
gitudine Penduli colligitur 370, 1

Descensus vel Ascensus rectilinei spatia descrip-
ta, tempora descriptionum & velocitates ac-

quisitæ conferuntur, posita cujuscunque ge-
neris vi centripetæ I, Sect. 7.

Descensus & Ascensus corporum in Mediis re-
sistentibus II, 3, 8, 9, 40, 13, 14.

E.

Ellipses

qua lege vis centripetæ tendentis ad centrum
figuræ describitur a corpore revolvente
I, 10, 64

qua lege vis centripetæ tendentis ad umbili-
cum figuræ describitur a corpore revol-
vente I, 11

F.

Fluidi definitio p. 260

Fluidorum densitas & compressio quas leges ha-
bent, ostenditur II, Sect. 5

Fluidorum per foramen in vase factum efflu-
entium determinatur motus II, 36

Fumi in camino ascensus obiter explicatur 472, 4

G.

Graduum in Meridiano Terrestris mensura exhi-
betur, & quam sit exigua inæqualitas osten-
ditur ex Theoria III, 20

Gravitas

diversi est generis a vi Magnetica 368, 29
mutua est inter Terram & ejus partes 22, 18
ejus causa non assignatur 483, 34

datur in Planetas universos 365, 15, & per-
gendo a superficiebus Planetarum sursum
decrefcit in duplicata ratione distantiarum
a centro III, 8, deorsum decrefcit in sim-
plici ratione quamproxime III, 9

datur in corpora omnia, & proportionalis est
quantitati materiæ in singulis III, 7

Gravitatem esse vim illam qua Luna retinetur
in Orbe III, 4, computo accuratiori com-
probatur 430, 25

Gravitatem esse vim illam qua Planetæ primarii
& Satellites Jovis & Saturni retinentur in
Orbibus III,

H.

Hydrostaticæ principia traduntur II, Sect. 5.

Hyperbola

qua lege vis centrifugæ tendentis a figuræ cen-
tro describitur a corpore revolvente 47, 26

qua lege vis centrifugæ tendentis ab umbilico
figuræ describitur a corpore revolvente 51, 6

qua lege vis centripetæ tendentis ad umbilicum
figuræ describitur a corpore revolvente I, 12

Hypotheses cujuscunque generis rejiciuntur ab
hac Philosophia 484, 8

I. Iner-

I.
Inertia vis definitur p. 2
Jovis
 distantia a Sole 361, 1
 semidiameter apparens 371, 3
 semidiameter vera 371, 14
 attractiva vis quanta sit 370, 33
 pondus corporum in ejus superficie 371, 19
 densitas 371, 37
 quantitas materiæ 371, 27
 perturbatio a Saturno quanta sit 375, 33
 diametrorum proportio computo exhibetur 381, 27
 conversio circum axem quo tempore absolvitur 381, 25
 cingulæ caula subindicatur 444, 32.

L.

Locus definitur, & distinguitur in absolutum & relativum 6, 12
Loca corporum in Sectionibus concis motorum inveniuntur ad tempus assignatum I, Sect. 6
Lucus
 propagatio non est instantanea 207, 5; non fit per agitationem Medii alicujus Ætherei 342, 36
 velocitas in diversis Mediis diversa I, 95
 reflexio quædam explicatur I, 96
 refractio explicatur I, 94; non fit in puncto solum incidentiæ 207, 29
 incurvatio prope corporum terminos Experimentis observata 207, 8
Lunæ
 corporis figura computo colligitur III, 38
 inde causa patefacta, cur eandem semper faciem in Terram obvertat 432, 9
 & librationes explicantur III, 17
 diameter mediocris apparens 430, 12
 diameter vera 430, 17
 pondus corporum in ejus superficie 430, 20
 densitas 430, 15
 quantitas materiæ 430, 19
 distantia mediocris a Terra quot continet maximas Terræ semidiametros 430, 25, quot mediocres 431, 18
 parallaxis maxima in longitudinem paulo major est quam parallaxis maxima in latitudinem 387, 8
 vis ad Mare movendum quanta sit III, 37; non sentiri potest in Experimentis pendulorum, vel in Staticis aut Hydrostaticis quibuscunque 430, 1
 tempus periodicum 430, 32
 tempus revolutionis synodicæ 398, 1
 motus medius cum diurno motu Terræ col-

latus paulatim accelerari deprehenditur ab Halleio 481, 16
Lunæ motus & motuum inæqualitates a causis suis derivantur III, 22: p. 421 & seqq.
 tardius revolvitur Luna dilatato Orbe, in perihelio Terræ; citius in aphelio, contracto Orbe III, 22: 421, 6
 tardius revolvitur, dilatato Orbe, in Apogæi Syzygiis cum Sole; citius in Quadraturis Apogæi, contracto Orbe 422, 1
 tardius revolvitur, dilatato Orbe, in Syzygiis Nodi cum Sole; citius in Quadraturis Nodi, contracto Orbe 422, 21
 tardius movetur in Quadraturis suis cum Sole, citius in Syzygiis; & radio. ad Terram ducto describit aream pro tempore minorem in priore casu, majorem in posteriore III, 22: Inæqualitas harum Arearum computatur III, 26. Orbem insuper habet magis curvum & longius a Terra recedit in priore casu, minus curvum habet Orbem & propius ad Terram accedit in posteriore III, 22. Orbis hujus figura & proportio diametrorum ejus computo colligitur III, 28. Et subinde proponitur methodus inveniendi distantiam Lunæ a Terra ex motu ejus horario III, 27
 Apogæum tardius movetur in Aphelio Terræ, velocius in Perihelio III, 22: 421, 21
 Apogæum ubi est in Solis Syzygiis, maxime progreditur; in Quadraturis regreditur III, 22: 421, 37
 Eccentricitas maxima est in Apogæi Syzygiis cum Sole, minima in Quadraturis III, 22: 422, 39
 Nodi tardius moventur in Aphelio Terræ, velocius in Perihelio III, 22: 421, 21
 Nodi quiescunt in Syzygiis suis cum Sole, & velocissime regrediuntur in Quadraturis III, 22. Nodorum motus & inæqualitates motuum computantur ex Theoria Gravitatis III, 30, 31, 32, 33
 Inclinatio Orbis ad Eclipticam maxima est in Syzygiis Nodorum cum Sole, minima in Quadraturis I, 66 Cor. 10. Inclinationis variationes computantur ex Theoria Gravitatis III, 34, 35
Lunarium motuum Æquationes ad usus Astro-nomicos p. 421 & seqq.
Motus medii Lunæ
 Æquatio annua 421, 4
 Æquatio semestris prima 422, 1
 Æquatio semestris secunda 422, 21
 Æquatio centri prima 423, 20: p. 101 & seqq.
 Æquatio centri secunda 424, 15
 Variatio prima III, 29
 Variatio secunda 425, 5

Motus

INDEX RERUM.

Motus medii Apogæi
Æquatio annua 421, 21
Æquatio semestris 422, 37
Eccentricitatis
Æquatio semestris 422, 37
Motus medii Nodorum
Æquatio annua 421, 21
Æquatio semestris III, 33
Inclinationis Orbite ad Eclipticam
Æquatio semestris 420, 22
Lunarium motuum Theoria, qua Methodo stabi-
bilenda sit per Observationes 425, 33.

M.

Magnetica vis 22, 13: 271, 25: 368, 29:
431, 23
Maris æstus a causis suis derivatur III, 24, 36, 37
Martis
distantia a Sole 361, 1
Aphelii motus 376, 33
Materiæ
quantitas definitur p. 1
vis insita seu vis inertie definitur p. 2
vis impressa definitur p. 2
extensio, durities, impenetrabilitas, mobilitas,
vis inertie, gravitas, qua ratione innotescunt 357, 16: 484, 10
divisibilitas nondum constat 358, 18
Materia subtilis *Cartesianorum* ad examen quoddam revocatur 292, 12
Materia vel subtilissima Gravitate non destituitur 368, 1
Mechanicæ, quæ dicuntur, Potentiæ explicantur & demonstrantur p. 14 & 15: p. 23
Mercurii
distantia a Sole 361, 1
Aphelii motus 376, 33
Methodus
Rationum primarum & ultimarum I. Sect. 1
Transmutandi figuras in alias quæ sunt ejusdem Ordinis Analytici I, Lem. 22. pag. 79
Fluxionum II, Lem. 2. p. 224
Differentialis III, Lemm. 5 & 6. pagg. 446 & 447
Inveniendi Curvarum omnium quadraturas proxime veras 447, 8
Serierum convergentium adhibetur ad solutionem Problematum difficiliorum p. 127, 118: 202: 235: 414
Motus quantitas definitur p. 1
Motus absolutus & relativus p. 6: 7: 8: 9 ab invicem discerni possunt, exemplo demonstratur p. 10
Motus Leges pag. 12. & seqq.
Motuum compositio & resolutio p. 14
Motus corporum congregantium post reflexionem, quali Experimento recte colligi possunt,

offenditur 19, 21
Motus corporum
in Conicis sectionibus eccentricis I, Sect. 3
in Orbibus mobilibus I, Sect. 9
in Superficiebus datis & Funependulorum motus reciprocus I, Sect. 10.
Motus corporum viribus centripetis se mutuo petentium I, Sect. 11
Motus corporum Minimorum, quæ viribus centripetis ad singulas Magni alicujus corporis partes tendentibus agitantur I, Sect. 14
Motus corporum quibus resistitur
in ratione velocitatis II, Sect. 1
in duplicata ratione velocitatis II, Sect. 2
partim in ratione velocitatis, partim in ejusdem ratione duplicata II, Sect. 3
Motus
corporum sola vi insita progredientium in Mediis resistentibus II, 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12: 302, 1
corporum recta ascendendum vel descendendum in Mediis resistentibus, agente vi Gravitatis uniformi II, 3, 8, 9, 40, 13, 14
corporum projectorum in Mediis resistentibus, agente vi Gravitatis uniformi II, 4, 10
corporum circumgyrantium in Mediis resistentibus II, Sect. 4
corporum Funependulorum in Mediis resistentibus II, Sect. 6
Motus & resistentia Fluidorum II, Sect. 7
Motus per Fluida propagatus II, Sect. 8
Motus circularis seu Vorticofus Fluidorum II, Sect. 9
Mundus originem non habet ex causis Mechanicis p. 482, 12.

N.

Navium constructioni Propositio non inutilis 300, 4

O.

Opticarum ovalium inventio quam *Cartesius* celaverat I, 97. *Cartesiani* Problematis generalior solutio I, 98
Orbitarum inventio
quas corpora deseribunt, de loco dato data cum velocitate, secundum datam rectam egressa; ubi vis centripeta est reciproce ut quadratum distantie & vis illius quantitas absoluta cognoscitur I, 17
quas corpora describunt ubi vires centripetæ sunt reciproce ut cubi distantiarum 45, 18: 118, 27: 125, 25
quas corpora viribus quibuscunque centripetis agitata deseribunt I, Sect. 8.

P. Para-

INDEX RERUM.

P.

Parabola, qua lege vis centripetæ tendentis ad umbilicum figuræ, describitur a corpore revolvente I, 13
 Pendulorum affectiones explicantur I, 50, 51, 52, 53: II, Sect. 6.
 Pendulorum isochronorum longitudines diversæ in diversis locorum Latitudinibus inter se conferuntur, tum per Observationes, tum per Theoriam Gravitatis III, 20
 Philosophandi Regulæ p. 357.
 Planetæ
 non deferuntur a Vorticibus corporeis 352,
 37: 354, 25: 481, 21
 Primarij
 Solem cingunt 360, 7
 moventur in Ellipsis umbilicum habentibus in centro Solis III, 13
 radiis ad Solem ductis describunt areæ temporibus proportionales 361, 15: III, 13
 temporibus periodicis revolvuntur quæ sunt in sesquialata ratione distantiarum a Sole 360, 17: III, 13, & I, 15
 retinentur in Orbibus suis a vi Gravitatis quæ respicit Solem, & est reciproce ut quadratum distantiae ab ipsius centro III, 2, 5
 Secundarij
 moventur in Ellipsis umbilicum habentibus in centro Primariorum III, 22
 radiis ad Primarios suos ductis describunt areæ temporibus proportionales 359, 3, 22: 361, 27: III, 22
 temporibus periodicis revolvuntur quæ sunt in sesquialata ratione distantiarum a Primariis suis 359, 3, 22: III, 22, & I, 15
 retinentur in Orbibus suis a vi Gravitatis quæ respicit Primarios, & est reciproce ut quadratum distantiae ab eorum centrīs III, 1, 3, 4, 5
 Planetarum
 distantiæ a Sole 361, 1
 Orbium Aphelia & Nodi prope quiescunt III, 14
 Orbes determinantur III, 15, 16
 loca in Orbibus inveniuntur I, 31
 densitas calori quem a Sole recipiunt, accommodatur 372, 7
 conversionis diurnæ sunt æquabiles III, 17
 axes funt minores diametris quæ ad eisdem axes normaliter ducuntur III, 18
 Pondera corporum
 in Terram vel Solem vel Planetam quemvis, paribus distantis ab eorum centrīs sunt ut quantitates materiæ in corporibus III, 6
 non pendent ab eorum formis & texturis 367: 35

in diversis Terræ regionibus inveniuntur & inter se comparantur III, 20
 Problematis
 Kepleriani solutio per Trochoidem & per Approximationes I, 31
 Veterum de quatuor lineis, a *Pappo* memoratis, a *Cartesio* per calculum Analyticum tentati, compositio Geometrica 70, 19
 Projectilia, seposita Medij resistentia, moveri in Parabola colligitur 47, 23: 202, 23: 236, 29
 Projectilium motus in Mediis resistentibus II, 4, 10
 Pulsuum Aeris, quibus Soni propagantur, determinantur intervalla seu latitudines II, 50: 344, 18. Hæc intervalla in apertarum Fistularum Sonis æquari duplis longitudinibus Fistularum verosimile est 344, 26

Q.

Quadratura generalis Ovalium dari non potest per finitos terminos I, Lem. 28: p. 98
 Qualitates corporum qua ratione innotescunt & admittuntur 357, 16
 Quies vera & relativa p. 6, 7, 8, 9.

R.

Resistentiæ quantitas
 in Mediis non continuis II, 35
 in Mediis continuis II, 38
 in Mediis cujuscunque generis 301, 32
 Resistentiarum Theoria confirmatur
 per Experimenta Pendulorum II, 30, 31, Sch. Gen. p. 284
 per Experimenta corporum cadentium II, 40, Sch. p. 319
 Resistentia Mediorum
 est ut eorundem densitas, cæteris paribus 290, 29: 291, 35: II, 33, 35, 38: 327, 14
 est in duplicata ratione velocitatis corporum quibus resistitur, cæteris paribus 219, 24: 284, 33: II, 33, 35, 38: 324, 23
 est in duplicata ratione diametri corporum Sphaericorum quibus resistitur, cæteris paribus 288, 4: 289, 11: II, 33, 35, 38: Sch. p. 319
 non minuitur ab actione Fluidi in partes possicas corporis moti 312, 23
 Resistentia Fluidorum duplex est; oriturque vel ab Inertia materiæ fluidæ, vel ab Elasticitate, Tenacitate & Frictione partium ejus 318, 1.
 Resistentia quæ sentitur in Fluidis fere tota est prioris generis 326, 32, & minui non potest per subtilitatem partium Fluidi, manente densitate 328, 7
 Resistentiæ Globi ad resistentiam Cylindri proportio, in Mediis non continuis II, 34
 Q q q Resisten-

INDEX RERUM.

Resistentia quam patitur a Fluido frustum Conicum, qua ratione fiat minima 299, 30
Resistentiæ minimæ solidum 300, 15.

S.

Satellitibus

Jovialis extimi elongatio maxima heliocentrica a centro Jovis 370, 35
Hugeniæ elongatio maxima heliocentrica a centro Saturni 371, 5

Satellitum

Jovialium tempora periodica & distantia a centro Jovis 359, 12
Saturniorum tempora periodica & distantia a centro Saturni 360, 1
Jovialium & Saturniorum inæquales motus a motibus Lunæ derivari posse ostenditur III, 23

Saturni

distantia a Sole 361, 1
semidiameter apparens 371, 9
semidiameter vera 371, 14
vis attractiva quanta sit 370, 33
pondus corporum in ejus superficie 371, 19
densitas 371, 37
quantitas materiæ 371, 27
perturbatio a Jove quanta sit 375, 16
diameter apparens Annuli quo cingitur 371, 8
Sectiones Conicæ, qua lege vis centripetæ tendentis ad punctum quodcunque datum, describuntur a corporibus revolventibus 58, 20
Sectionum Conicarum descriptio Geometrica ubi dantur Umbilici I, Sect. 4.
ubi non dantur Umbilici I, Sect. 5. ubi dantur Centra vel Asymptoti 87, 9

Sesquialtata ratio definitur 31, 40

Sol

circum Planetarum omnium commune gravitatis centrum movetur III, 12
semidiameter ejus mediocris apparens 371, 12
semidiameter vera 371, 14
parallaxis ejus horizontalis 370, 33
parallaxis mensura 376, 4
vis ejus attractiva quanta sit 370, 33
pondus corporum in ejus superficie 371, 19
densitas ejus 371, 27
quantitas materiæ 371, 27
vis ejus ad perturbandos motus Lunæ 363, 15: III, 25
vis ad Mare movendum III, 36

Sonorum

natura explicatur II, 43, 47, 48, 49, 50
propagatio divergit a recto tramite 332, 9.
sit per agitationem Aeris 343, 1
velocitas computo colligitur 343, 8, paululum major esse debet æstivo quam Hyberno tempore, per Theoriam 344, 11
cessatio sit statim ubi cessat motus corporis sonori 344, 29

augmentatio per tubos stentorophonicos. 344, 32

Spatium

absolutum & relativum p. 6, 7
non est æqualiter plenum 368, 16
Sphaeroidis attractio, cujus particularum vires sunt reciproce ut quadrata distantiarum 198, 21
Spiralis quæ secat radios suos omnes in angulato, qua lege vis centripetæ tendentis ad centrum Spiralis describi potest a corpore revolvente, ostenditur I, 6: II, 15, 16
Spiritus quendam corpora pervadentem & in corporibus latentem, ad plurima naturæ phænomena solvenda, requiri suggeritur 484, 17
Stellarum fixarum quies demonstratur 376, 18
radiatio & scintillatio quibus causis referenda sint 467, 38
Stellæ Novæ unde oriri possint 481, 5
Substantiæ rerum omnium occultæ sunt 483, 22

T.

Tempus absolutum & relativum p. 5, 7

Temporis Aequatio Astronomica per Horologium oscillatorium & Eclipses Satellitum Jovis comprobatur 7, 15

Tempora periodica corporum revolventium in Ellipsis, ubi vires centripetæ ad umbilicum tendunt I, 15

Terræ

dimensio per *Picartum* 378, 11, per *Cassinum* 378, 21, per *Norwoodum* 378, 28
figura invenitur, & proportio diametrorum, & mensura graduum in Meridiano III, 19, 20
altitudinis ad Aequatorem supra altitudinem ad Polos quantus sit excessus 381, 7: 387, 1
semidiameter maxima, minima & mediocris 387, 10
globus densior est quam si totus ex Aqua constaret 372, 31
globus densior est ad centrum quam ad superficiem 386, 1
molem indicis augeri verosimile est 473, 18: 481, 13
axis nutatio III, 21
motus annuus in Orbe magno demonstratur III, 12, 13: 478, 26
Eccentricitas quanta sit 421, 15
Apheliæ motus quantus sit 376, 33

V.

Vacuum datur, vel spatia omnia (si dicantur esse plena) non sunt æqualiter plena 328, 18. 368, 25.

Veloci-

INDEX RERUM.

Velocitas maxima quam Globus, in Medio resistente cadendo, potest acquirere II, 38, Cor. 2
 Velocitates corporum in Sectionibus conicis motorum, ubi vires centripetæ ad umbilicum tendunt I, 16
 Veneris
 distantia a Sole 361, 1
 tempus periodicum 370, 23
 Aphelii motus 376, 33
 Virium compositio & resolutio p. 14
 Vires attractivæ corporum
 sphaericorum ex particulis quacunque lege trahentibus compositorum, expendantur I, Sect. 12
 non sphaericorum ex particulis quacunque lege trahentibus compositorum, expendantur I, Sect. 13
 Vis centrifuga corporum in Æquatore Terræ quanta sit 379, 22
 Vis centripeta definitur p. 2
 quantitas ejus absoluta definitur p. 4
 quantitas acceleratrix definitur p. 4
 quantitas motrix definitur p. 4
 proportio ejus ad vim quamlibet notam, quæ ratione colligenda sit, ostenditur 40, 1
 Virium centripetarum inventio, ubi corpus in spatio non resistente, circa centrum immobile, in Orbe quocunque revolvitur I, 6: I, Sect. 2 & 3
 Viribus centripetis datis ad quodcunque punctum tendentibus, quibus Figura quævis a

corpore revolvente describi potest; dantur vires centripetæ ad aliud quodvis punctum tendentes, quibus eadem Figura eodem tempore periodico describi potest 44, 3
 Viribus centripetis datis quibus Figura quævis describitur a corpore revolvente; dantur vires quibus Figura nova describi potest, si Ordinatae augeantur vel minuantur in ratione quacunque data, vel angulus Ordinationis utcunque mutetur, manente tempore periodico 47, 28
 Viribus centripetis in duplicata ratione distantiarum decrefcentibus, quænam Figuræ describi possunt, ostenditur 53, 1: 150, 8
 Vi centripeta
 quæ sit reciproce ut cubus ordinatim applicatæ tendentis ad centrum virium maxime longinquum, corpus movebitur in data quavis conicæ sectione 45, 1
 quæ sit ut cubus ordinatim applicatæ tendentis ad centrum virium maxime longinquum, corpus movebitur in Hyperbola 202, 26
 Umbra Terrestris in Eclipsibus Lunæ augenda est, propter Atmosphæræ refractionem 425, 27
 Umbræ Terrestris diametri non sunt æquales; quanta sit differentia ostenditur 387, 8
 Undarum in aquæ stagnantis superficie propagatarum velocitas invenitur II, 46
 Vorticum natura & constitutio ad examen revocatur II, Sect. 9: 481, 21
 Ut. Hujus voculæ significatio Mathematica definitur 30, 19

F I N I S.





ANALYSIS

Per Quantitatum

SERIES, FLUXIONES,

A C

DIFFERENTIALS:

CUM

Enumerationem Linearum

TERTII ORDINIS.



AMSTÆLODAMI,
SUMPTIBUS SOCIETATIS.

M. D. CCXIII.



PRÆFATIO EDITORIS.

T*Ractatus aliquot Mathematicos Viri Illustris-
simi D. Newtoni in lucem edimus, quorum
primus & ultimus nunc primum prodeunt, re-
liqui vero vel à se vel ab aliis ante hac publici
juris facti sunt. Hæc autem Editio casui,
sed tamen non sine ipsius consensu prius impetrato, ortum ac-
ceptum refert.*

*Etenim secundus jam agitur annus ex quo scrinia D. Col-
linfii (qui, uti notum est, amplissimum cum sui seculi Ma-
thematicis commercium habuit) meas in manus inciderunt;
& in illis plurima reperi à cunctis fere totius Europæ erudi-
tis ipsi communicata; & inter ea non pauca, quæ à Viro
Cl. D. Newtono scripta fuerunt; quæ cum tantæ molis es-
sent, ut simul Tractatum breviusculum possent conficere, cæ-
pi de iis edendis cogitare. Quum autem animadvertissem
scripta ejus quæ jam in lucem prodierunt ferme idem cum
hisce argumentum habere, haud operæ pretium me facturum,
si typis mandarem, existimaui.*

*Unus tamen erat brevis de Curvarum Quadratura Trac-
tatus adeo luculenter & concinne scriptus, atque ita accom-
modatus ad insitituendos eos, qui nondum totam istam Metho-*

P R Æ F A T I O.

dum perspectam habeant, ut abstinere non potuerim, quominus Auctoris licentiam eundem edendi peterem. Quam Ille non solum summa cum humanitate concessit; sed & insuper veniam dedit reliqua ipsius colligendi, quæ ad idem argumentum spectabant.

Hicce Tractatus, quem D. Collinsii manu exaratum comperi, inscriptus fuit De Analyti per Æquationes Infinitas, & licet neque Auctoris nomen, neque tempus quo scriptus fuerat ullibi comparuerit; multa tamen continere ad D. Newtoni Methodos spectantia statim agnovi, utpote Epistolarum autographo illi ad amissum respondentia, quod antea ipse D. Newtonus ad D. Oldenburgum miserat. Unde suspicabar totum ex eodem fonte emanasse; nihilominus suspenso eram animo, usque dum inventis, inter easdem chartas, Epistolis aliquot D. Barrovii ad D. Collinsium scriptis; tres reperi ad hunc Tractatum immediate spectantes; ex quibus facile intellexi quomodo D. Collinsius eum obtinuerat.

In una Epistolarum e Collegio S. S. Tr. data 20 Julii 1669, versus finem D. Barrovius hæc scribit.

* Amicus quidam apud nos commorans, qui eximio in
 „ his rebus pollet ingenio, nudiuftertius chartas quas-
 „ dam mihi tradidit, in quibus Magnitudinum dimensio-
 „ nes supputandi Methodos, Mercatoris methodo simi-
 „ les, maxime vero Generales, descripsit, simulque Æ-
 „ qua-

* A Friend of mine here, that hath an excellent Genius to these things, brought me the other Day, some Papers, wherein he hath set down Methods of Calculating the Dimensions of Magnitudes, like that of Mr. Mercator, but very general, as also of Resolving Equations, which I suppose will please you, and I shall send you them by the next.

P R Æ F A T I O.

„ quationes resolvendi , quæ , ut opinor , tibi place-
 „ bunt , quas una cum proximis literis ad te mittam.

*In hac Epistola narrat argumentum chartarum Amici
 sui fuisse Computationem dimensionum Magnitudinum , &
 Æquationum resolutionem , quod cum Tractatus hujus argu-
 mento quadrat.*

*Versus finem alterius Epistolæ ad D. Collinsium e Col-
 legio S. S. Tr. datæ ult. Julii 1669, D. Barrovius ita scribit.*

† Mitto quas pollicitus eram Amici chartas , quæ uti
 „ spero haud parum te oblectabunt. Remittas , quæso ,
 „ quum eas quantum tibi visum fuerit perlegeris ; id enim
 „ postulavit Amicus meus , cum primum eum rogavi , ut
 „ eas tecum communicare mihi liceret. Quantocyus igi-
 „ tur , obsecro , te eas recepisse fac me certiores , quod
 „ illis metuo , quippe qui eas per Veredarium publicum
 „ ad te mittere non dubitaverim , quo tibi morem gere-
 „ rem quam citissime.

*Ex hac Epistola constat D. Barrovium dictum Librum mi-
 sisse , ea lege , ut sibi remitteretur. Unde manifestum est ,
 quare Tractatus , quem inveni , D. Collinsii manu scriptus
 fuit , autographo nempe ipsi Auctori restituto.*

In tertia a D. Barrovio ad D. Collinsium Epistola da-

a 3

ta

† I send you the Papers of my Friend I promis'd , which I presume will give you much satis-
 faction ; I pray , having perus'd them so much as you think good , remand them to me , accord-
 ing to his desire when I ask'd him the liberty to impart them to you ; I pray give me notice of
 your receiving them , with your soonest convenience , that I may be satisfied of their reception ;
 because I am afraid of them , venturing them by the Post , that I may not longer delay to cor-
 respond with your desire.

P R Æ F A T I O.

ta 20 Augusti 1669, constat D. Newtonum fuisse, Amicum illum, de quo D. Barrovius in duabus prioribus Epistolis mentionem fecerat, quod his verbis consignat.

* Amici chartas tibi placuisse gaudeo; est illi nomen
 „ *Newtonus*, Collegii nostri Socius, & juvenis, (secun-
 „ dus enim, ex quo Artium Magistri gradum cepit, jam
 „ agitur annus,) & qui, eximio quo est acumine, per-
 „ magnos in hac re progressus fecit. Illas, si vis, cum
 „ Nobili Domino Vicecomite *Brounkero* communica.

Perspecto jam D. Newtonum hujus Tractatus Auctorem esse; ab eo sciscitatus sum num penes se adhuc esset autographum, quod quidem ille exquirens invenit, & mihi tradidit, cum exemplari Collinsiano ad verbum usque conveniens.

Etiam si vero hic Tractatus ad D. Collinsium missus fuisset mense Julii 1669, quod aliquantulum erat posteaquam D. Mercator Logarithmotechniam suam in lucem ediderat; manifestum est ex quibusdam aliis Epistolis, (quæ itidem inter D. Collinsii chartas fuerunt,) quod antea scriptus esset, imo quod D. Newtonus invenisset Methodum investigandi Magnitudinum Dimensiones per Infinitas Series vel aliquot annos antequam D. Mercator Librum suum in vulgus edidit; ut liquet ex Epistola a Collinsio ad D. Jacobum Gregorium data 25. Novemb. 1669, ubi hæc sunt verba.

* *Bar-*

* I am glad my Friend's Paper gives you so much satisfaction; his Name is Mr. *Newton*, a Fellow of our College, and very young, (being but the second Year Master of Arts,) but of an extraordinary Genius and Proficiency in these things; you may impart the Papers, if you please, to my Lord *Brounker*.

P R Æ F A T I O.

* *Barrovius* Provinciam suam Publice prælegendi remi-
 „ fit cuidam nomine *Newtono Cantabrigiensi*, quem tan-
 „ quam Virum acutissimi ingenii, in Præfatione Prælec-
 „ lectionum Opticarum memorat, & qui, antequam
 „ ederetur *Mercatoris* Logarithmotechnia, Methodum
 „ invenerat eandem, eamque ad omnes Curvas generali-
 „ ter, & ad Circulum diversimode applicârat.

Quinetiam D. Collinsius in Epistola ad D. Strobe, data
 26. Julii 1672, sic scribit.

† Mense *Septembri* 1668, *Mercator* Logarithmotech-
 „ niam edidit suam, quæ specimen hujus Methodi (i. e.
 „ Serierum Infinitarum) in unica tantum Figura, nempe,
 „ Quadratura Hyperbolæ continet. Haud multo post-
 „ quam in publicum prodiret liber, exemplar unum Cl.
 „ *Wallisio Oxoniam* misi, qui suum de eo judicium in *Ac-*
 „ *tis Philosophicis* statim fecit: alterum *Barrovio Canta-*
 „ *brigiam*, qui quasdam *Newtoni* chartas, qui jam *Bar-*
 „ *rovium* in Mathematicis Prælectionibus publicis excipit,
 „ extemplo remisit: Ex quibus & aliis, quæ olim ab
 „ Auc-

* Mr. Barrow hath resign'd his Lecture's Place to one Mr. Newton of Cambridge, whom he mentions in his Optic Preface as a very ingenious Person; one who hath, before Mr. Mercator's Logarithmotechnia was extant, invented the same Method, and applied it generally to all Curves, and divers ways to the Circle.

† In September 1668. Mr. Mercator publish'd his Logarithmotechnia, containing a Specimen of this Method, (that is, of Infinite Series) in one only Figure, to wit in the Quadrature of the Hyperbola. Not long after the Book came out, I sent one of them to Dr. Wallis at Oxford, who forthwith gave his sense of it in the Philos. Transactions: another of them I sent to Dr. Barrow at Cambridge, who forthwith sent me up some Papers of Mr. Newton, who is since become the Doctor's Successor in the Mathematical Lectures there. By which, and former communications made thereof from the Author to the Doctor, it appears that the said Method was invented some Years before by the said Mr. Newton, and generally applied: so that thereby in any Curvilinear Figure propos'd, that is determin'd by one or more common Properties, by the same Method may be obtain'd the Quadrature or Area of the said Figure, accurately when it can be done, but always infinitely near; the Evolution, or Length of the said Curve Line; the Centre of the Figure; its round Solids made by Rotation, and their Surfaces; and all perform'd without any Extraction of Roots.

P R Æ F A T I O.

„ Auctore cum *Barrovia* communicata fuerant, patet il-
 „ lam Methodum a dicto *Newtono* aliquot annis ante ex-
 „ cogitatam, & modo generali applicatam fuisse : ita ut
 „ ejus ope in quavis Figura Curvilinea proposita, quæ
 „ una vel pluribus Proprietatibus definitur, Quadratura
 „ vel Area dictæ Figuræ, accurata si possibile sit, sin mi-
 „ nus infinite propinqua; Evolutio vel Longitudo lineæ
 „ Curvæ; Centrum gravitatis Figuræ; Solida ejus rota-
 „ tione genita, & eorum Superficies; sine ulla Radicum
 „ Extractione obtineri queant.

*Ubi obiter notemus in hac Collinsii historiola, methodum
 argumentandi usurpatam a D. Newtono in Tractatu suo De
 Quadratura Curvarum, quasi digito monstrari, dum dicit
 hanc Methodum exhibere Quadraturam Figurarum accura-
 tam, si modo fieri possit, sin minus in infinitum approximan-
 tem, atque ista omnia fieri sine ulla Extractione Radicum;
 Hæc enim ipsa est argumentatio in dicto Tractatu observata :
 & propterea hanc Methodum saltem Anno 1672 coætaneam
 extitisse non est dubitandum.*

*Inveni etiam in exemplari Epistolæ, a D. Collinsio ad
 D. Davidem Gregorium prædicti Jacobi fratrem, datæ 11
 Aug. 1676, præter eadem fere quæ D. Strobe scripserat,
 etiam verba sequentia.*

* „ Supradicta Serierum Infinitarum doctrina, a *Newtono*
 „ biennium ante excogitata fuit, quam ederetur *Mercato-*
ris

* The said Doctrine of Infinite Series was invented by Mr. *Newton*, about two Years before the Publication of Mr. *Mercator's* Logarithmotechnia, and generally applied to all Curves.

P R Æ F A T I O.

„ *ris* Logarithmotechnia, & generaliter omnibus Figuris
„ applicata.

Simulque affirmat se olim cum quibusdam Academicis Parisiensibus hæc eadem scripto communicasse.

Quapropter, cum D. Mercator Librum suum Anno 1668 in lucem ediderit, sequitur eandem Doctrinam Infinitarum Serierum Figuris omnibus generaliter applicatam fuisse Anno 1666.

Denique in Epistola, circa idem tempus ad D. Oldenburgum scripta, asserit Collinſius, Jacobum Gregorium non nisi conspecta aliqua e Seriebus Newtoni, quam illi imperierat, in eandem Serierum Methodum incidisse.

Ex Newtoni autem Schedis quibusdam a me visis intellexi, quod is Quadraturam Circuli, Hyperbolæ, & aliarum quarundam Curvarum per Series Infinitas ex Wallisii nostri Arithmetica Infinitorum, per Interpolationem Serierum ejus, primo deduxit, idque Anno 1665; deinde Methodum excogitavit easdem Series per Divisiones & Extractiones Radicum inveniendi, quam Anno sequente generalem reddidit.

Et cum scriptus fuerit hic Tractatus, quo tempore hæc recens inventa essent, ideo Cl. Auctor dignatus est multa in eo dilucidare, ad Resolutionem Æquationum per Infinitas Series spectantia, quæ in aliis Libris frustra quæras.

His subjunximus diversa Epistolarum Auctoris fragmenta, quæ ad easdem Doctrinas pertinent, quæque olim inter Cl.

b

Wal-

P R Æ F A T I O.

Wallisii Opera in lucem prodire. Epistolas haud dedi integras, ut evitarem repetitionem non necessariam multarum rerum, quæ supra in Tractatu De Analyfi per Æquationes Infinitas traditæ sunt: Quinimo Exempla quædam in iis Epistolis prætermisi ipsius Cl. Auctoris monitu, Regulas suas per se satis claras esse credentis, neque ullam dilucidationem desiderare.

Inter D. Collinsii schedas reperi autographum Epistolæ datæ 8. Novemb. 1676, cujus fragmentum sub finem adjeci, & dignum luce putavi; quoniam in eo memoratur solutio Problematis admodum generalis in Comparatione Curvarum usus, quæ perficitur in Cor. 2. Prop. 10. Tract. De Quadratura Curvarum: Unde Lector intelligat solutionem illam Auctori jam tum innotuisse.

Hiscæ Fragmentis annexus est ille ipse Tractatus De Quadratura Curvarum; una cum altero De Enumeratione Linearum Tertii Ordinis; quorum uterque primum typis mandatus est Anno 1704, ad finem Optices eximie ejusdem Cl. Auctoris.

Coronidis loco subjicitur Tractatulus, cui titulo est, Methodus Differentialis, quem Cl. Auctoris permissu ex ejus autographo descripsi; Complectitur autem Doctrinam describendi Curvas ex datis Differentiis differentiarum Ordinatarum. Hæc Methodus Differentialis innititur Problemati ducendi Curvam Parabolici generis per data quocunque puncta; de quo Cl. Auctor olim mentionem fecerat in Epistola sua ad D. Oldenburgum 1676 missa; & cujus solutionem dedit in Lem. 5. Lib. 3. Princip. Philos. non tamen prorsus eandem quoad

P R Æ F A T I O.

quoad Constructionem cum ea quam impræsentiarum tradimus.

Hujus Geometriæ Newtonianæ non minimam esse laudem duco, quod dum per limites Rationum Primarum & Ultimarum argumentatur, æque demonstrationibus Apodicticis ac illa Veterum munitur; utpote quæ haud innititur duriusculæ illi Hypothesi quantitatum Infinite parvarum vel Indivisibilium, quarum Evanescentia obstat quominus eas tanquam quantitates speculemur. Neque parum præcellere videtur, quod tam paucis innixa Propositionibus tam late sese extendat hæc Mathesis, intra se omnia Problemata difficiliora vulgatas Methodos eludentia complectens; siquidem quicquid propomitur poterit Geometrice per alicujus Curvæ Aream effingi; vel per Methodum Universalem Extrahendi Radices ex Æquatione quavis erui; vel ad summum, ducendo Curvam per terminos quantitatum datarum solvi.

W. JONES.

INDEX

INDEX OPUSCULORUM

Quae in hoc Libro continentur.

	<i>Pag.</i>
D E Analyfi per <i>Æ</i> quationes Infinitas	1
<i>Fragmenta</i> { <i>Ad D.</i> Oldenburgum 12 Jun. 1676.	23
<i>Epiftolarum.</i> { <i>Ad D.</i> Oldenburgum 24 Octob. 1676.	32
{ <i>Ad D.</i> Wallifium Anno 1692.	35
{ <i>Ad D.</i> Collinfium Nov. 8. 1676.	39
De Quadratura Curvarum.	41
Enumeratio Linearum Tertii Ordinis.	71
Methodus Differentialis.	99



DE ANALYSI


Per Æquationes Numero Terminorum

INFINITAS.

Methodum generalem quam de Curvarum quantitate per Infinitam terminorum Seriem mensuranda, olim excogitaveram, in sequentibus breviter explicatam potius quam accuratè demonstratam habes.



ASI AB Curvæ alicujus AD , sit Applicata BD perpendicularis: Et vocetur $AB = x$, $BD = y$, & sint a, b, c , &c. Quantitates datæ, & m, n , Numeri Integri. Deinde,



Curvarum Simplicium Quadratura.

R E G U L A I.

Si $ax^m = y$; Erit $\frac{ay}{m+n} x^{\frac{m+n}{n}} = \text{Area } ABD.$

A

Res

Res Exemplo patebit.

1. Si $x^3 (=1x^{\frac{3}{1}}) = y$, hoc est, $a=1=n$, & $m=2$; Erit $\frac{1}{3}x^3 = ABD$.

2. Si $4\sqrt{x} (=4x^{\frac{1}{2}}) = y$; Erit $\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} (= \frac{4}{3}\sqrt{x} x^3) = ABD$.


3. Si $\sqrt{x^5} (=x^{\frac{5}{2}}) = y$; Erit $\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} (= \frac{1}{2}\sqrt{x} x^5) = ABD$.

4. Si $\frac{1}{x^2} (=x^{-2}) = y$, id est, si $a=1=n$, & $m=-2$;

Erit $(-\frac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}}) = -x^{-\frac{1}{3}} (= \frac{-1}{x^{\frac{1}{3}}}) = aBD$,
infinite versus a protensæ, quam Calculus
ponit negativam, propterea quod jacet ex al-
tera parte Lineæ BD.

5. Si $\frac{1}{\sqrt{x^3}} (=x^{-\frac{3}{2}}) = y$; Erit $(-\frac{2}{5}x^{-\frac{1}{2}}) = \frac{2}{\sqrt{x}}$
 $= BDa$.

6. Si $\frac{1}{x} (=x^{-1}) = y$; Erit $\frac{1}{2}x^0 = \frac{1}{2}x^0 =$
 $\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$ = Infinitæ, qualis est Area Hyperbo-
læ ex utraque parte Lineæ BD.

*Compositarum Curvarum Quadratura ex Simplicibus.*

R E G U L A II.

*Si valor ipsius y ex pluribus istiusmodi Terminis componitur,
Area etiam componetur ex Areis quæ a singulis Terminis
emanant.*


Exempla Prima.

Si $x^3 + x^2 = y$; Erit $\frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} = ABD$.

Etenim si semper sit $x^2 = BF$, & $x^{\frac{3}{2}} = FD$,
erit, ex præcedente Regula, $\frac{1}{3}x^3 =$ superficiæ
AFB descriptæ per Lineam BF, & $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} =$
AFD descriptæ per DF; Quare $\frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} =$
toti ABD.

Sic si $x^3 - x^2 = y$; Erit $\frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} = ABD$.

Et si $3x - 2x^2 + x^3 - 5x^4 = y$; Erit
 $\frac{3}{2}x^2 - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{4}x^4 - x^5 = ABD$.




Ex-


Exempla Secunda.

Si $x^{-2} + x^{-\frac{1}{2}} = y$; Erit $-x^{-1} - 2x^{-\frac{3}{2}} = aBD$. Vel si $x^{-2} - x^{-\frac{1}{2}} = y$; Erit $-x^{-1} + 2x^{-\frac{3}{2}} = aBD$.

Quarum signa si mutaveris habebis Affirmativum valorem ($x^{-1} + 2x^{-\frac{3}{2}}$ vel $x^{-1} - 2x^{-\frac{3}{2}}$) superficiiei aBD , modo tota cadat supra basim ABa .




Sin aliqua pars cadat infra (quod fit cum Curva decussat suam Basim inter B & a , ut hic vides in δ .) ista parte a parte superiori subducta, habebis valorem Differentiæ: Earum vero Summam si cupis, quære utramque Superficiem seorsim, & adde. Quod idem in reliquis hujus Regulæ exemplis notandum volo.



Exempla Tertia.

Si $x^3 + x^{-2} = y$; Erit $\frac{1}{4}x^3 - x^{-1} =$ Superficiiei descriptæ. Sed hic notandum est, quod dictæ Superficiiei partes sic inventæ jacent ex diverso latere Lineæ BD .

Nempe, posito $x^2 = BF$, & $x^{-2} = FD$; Erit $\frac{1}{4}x^3 = ABF$ Superficiiei per BF descriptæ, & $-x^{-1} = DF$ Superficiiei descriptæ per DF .



Et hoc semper accidit cum Indices ($\frac{m+n}{n}$) rationum Basis x in valore Superficiiei quæsitæ, sint variis Signis affecti. In hujusmodi Casibus,

fibus, pars aliqua $BD\delta$ Superficie media (quæ sola dari poterit, cum Superficies sit utrinque infinita) sic invenitur.

Subtrahe Superficiem ad minorem Basin $A\beta$ pertinentem, a Superficie ad maiorem Basin AB pertinente, & habebis $\beta BD\delta$ Superficiem differentiæ Basin insistentem. Sic in hoc Exemplo. (*Vide Fig. Præcedentem.*)

Si $AB = 2$, & $A\beta = 1$; Erit $\beta BD\delta = \frac{17}{4}$:

Etenim Superficies ad AB pertinens (viz. $ABF - DF\alpha$) erit $\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$ five $\frac{1}{12}$; & superficies ad $A\beta$ pertinens (viz. $A\phi\beta - \delta\phi\alpha$) erit $\frac{1}{3} - 1$, five $-\frac{2}{3}$: & earum differentia (viz. $ABF - DF\alpha - A\phi\beta + \delta\phi\alpha = \beta BD\delta$) erit $\frac{1}{12} + \frac{2}{3}$ five $\frac{17}{12}$.


Eodem modo, si $A\beta = 1$, $AB = x$; Erit $\beta BD\delta = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}x^3 - x^{-2}$.

Sic si $2x^3 - 3x^5 - \frac{2}{3}x^{-4} + x^{-\frac{2}{3}} = y$, & $A\beta = 1$;

Erit $\beta BD\delta = \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}x^5 + \frac{2}{3}x^{-3} + \frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}} - \frac{4}{15}$.

Denique notari poterit quod si quantitas x^{-1} in valore ipsius y reperiatur, iste Terminus (cum Hyperbolicam superficiem generat) seorsim a reliquis considerandus est.

Ut si $x^2 + x^{-3} + x^{-1} = y$; Sit $x^{-1} = BF$, & $x^2 + x^{-3} = FD$, ac $A\beta = 1$; Et erit $\delta\phi FD = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{3}x^{-2}$, utpote quæ ex Terminis $x^2 + x^{-3}$ generatur.



Quare, si reliqua Superficies $\beta\phi FB$, quæ Hyperbolica est, ex Calculo aliquo sit data, dabitur tota $\beta BD\delta$.

Aliarum Omnium Quadratura.

REGULA III.

Sin valor ipsius y, vel aliquis ejus Terminus sit præcedentibus magis composuit, in Terminos Simpliciores reducendus est; operando in Literis ad eundem Modum quo Arithmetici in Numeris Decimalibus dividunt, Radices extrahunt, vel affectas Æquationes solvunt; & ex istis Terminis quæsitam Curvæ Superficiem. per præcedentes Regulas deinceps elicies.


Exempla Dividendo.

Sit $\frac{aa}{b+x} = y$; Curva nempe existente Hyperbola.

Jam ut Æquatio ista a Denominatore suo liberetur, Divisionem sic instituo.

$$b+x) aa + 0 \left(\frac{aa}{b} - \frac{aax}{b^2} + \frac{aax^2}{b^3} - \frac{aax^3}{b^4} \&c. \right.$$

$$\begin{array}{r} aa + \frac{aax}{b} \\ \underline{0 - \frac{aax}{b} + 0} \\ \frac{aa}{b} - \frac{aax}{b^2} \\ \underline{0 + \frac{aax^2}{b^2} + 0} \\ \frac{aa}{b} - \frac{aax}{b^2} + \frac{aax^2}{b^3} \\ \underline{+ \frac{aax^2}{b^3} + \frac{aax^3}{b^4}} \\ 0 - \frac{aax^3}{b^3} + 0 \\ \underline{- \frac{aax^3}{b^3} - \frac{aax^4}{b^4}} \\ 0 + \frac{aax^4}{b^4} \\ \&c. \end{array}$$



Et sic vice hujus $y = \frac{aa}{b+x}$, nova prodit $y = \frac{a^2}{b} - \frac{a^2x}{b^2} + \frac{a^2x^2}{b^3} - \frac{a^2x^3}{b^4}$, &c.
 serie istac infinite continuata; Adeoque (per Regulam Secundam)
A 3
Area

PER ÆQUATIONES INFINITAS.

7

Unde, pro Æquatione $\sqrt{aa+xx} = y$, nova producitur, viz.

$y = a + \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7} \&c.$ Et (per Reg. 2.) Area quæsitæ ABDC erit $= ax + \frac{x^3}{6a} - \frac{x^5}{40a^3} + \frac{x^7}{112a^5} - \frac{5x^9}{1152a^7} \&c.$ Et hæc est Quadratura Hyperbolæ.

Eodem modo, si fit $\sqrt{xx-aa} = y$, ejus Radix erit

$$a - \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} - \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7} \&c.$$

Adeoquæ Area quæsitæ ABDC erit

$$\text{æqualis } ax - \frac{x^3}{6a} - \frac{x^5}{40a^3} - \frac{x^7}{112a^5} - \frac{5x^9}{1152a^7} \&c.$$

Et hæc est Quadratura Circuli.

Vel si ponas $\sqrt{x-xx} = y$; erit Radix æqualis infinitæ seriei.



$$x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{7}{2}} - \frac{5}{128}x^{\frac{9}{2}} \&c.$$

Et Area quæsitæ ABD æqualis erit

$$\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{72}x^{\frac{9}{2}} - \frac{1}{768}x^{\frac{11}{2}} \&c.$$

sive $x^{\frac{1}{2}}$ in $\frac{2}{3}x - \frac{1}{5}x^2 - \frac{1}{28}x^3 - \frac{1}{72}x^4 - \frac{1}{768}x^5 \&c.$

Et hæc est Area Circuli Quadratura.



Si $\frac{\sqrt{1-bx^2}}{\sqrt{1-bx^2}} = y$, (Cujus Quadratura dat Longitudinem curvæ Ellipticæ;) Extrahendo radicem utramque prodit

$$\frac{1 + \frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{8}a^2x^4 + \frac{1}{16}a^3x^6 - \frac{5}{128}a^4x^8}{1 - \frac{1}{2}bx^2 - \frac{1}{8}b^2x^4 - \frac{1}{16}b^3x^6 - \frac{5}{128}b^4x^8} \&c.$$

Et Dividendo, sicut fit in Fractionibus Decimalibus, habes

$$\begin{aligned} &1 + \frac{1}{2}bx^2 + \frac{1}{8}b^2x^4 + \frac{1}{16}b^3x^6 + \frac{1}{128}b^4x^8 \&c. \\ &+ \frac{1}{2}ba + \frac{1}{8}ab + \frac{1}{16}ab^2 + \frac{1}{128}ab^3 \\ &- \frac{1}{8}a^2 - \frac{1}{16}a^2b - \frac{1}{128}a^3b^2 \\ &+ \frac{1}{16}a^3 + \frac{1}{128}a^3b \\ &- \frac{1}{128}a^4 \end{aligned}$$

Adeoquæ Aream quæsitam $x + \frac{1}{2}bx^3 + \frac{1}{8}b^2x^5 \&c.$

$$\begin{aligned} &+ \frac{1}{8}a + \frac{1}{16}ab \\ &- \frac{1}{16}a^2 \end{aligned}$$

Sed observandum est, quod Operatio non raro abbreviatur per debitam

bitam Æquationis præparationem, ut in allato Exemplo $\frac{\sqrt{1+ax^3}}{\sqrt{1-bx^2}} = y$
 Si utramque partem fractionis per $\sqrt{1-bx^2}$ multiplices prodibit

$\frac{\sqrt{1+ax^3-abx^2}}{1-bx^2} = y$, & reliquum opus perficitur extrahendo Radicem Numeratoris tantum, & dividendo per Denominatorem.

Ex hisce, credo, satis patebit modus reducendi quemlibet valorem ipsius y (quibuscumque Radicibus vel Denominatoribus sit perplexus, ut hic videre est;

$$x^3 + \frac{\sqrt{x-\sqrt{1-x}}}{\sqrt{ax^2-x^3}} - \frac{\sqrt{x^3+2x^2-x^2}}{\sqrt{x-x^3}} - \frac{\sqrt{2x-x^3}}{\sqrt{2x-x^3}} = y) \text{ in series Infinitas}$$

simplicium Terminorum, ex quibus, per Regulam Secundam, quæ sita Superficies cognoscetur.

Exempla per Resolutionem Æquationum.

NUMERALIS ÆQUATIONUM AFFECTARUM RESOLUTIO

Quia tota difficultas in Resolutione latet, modum quo ego utor in Æquatione Numerali primum illustrabo.

Sit $y^3 - 2y - 5 = 0$, resolvenda: Et sit 2, numerus qui minus quam decima sui parte differt a Radice quæsitâ. Tum pono $2 + p = y$, & substituo hunc ipsi valorem in Æquationem, & inde nova prodit $p^3 + 6p^2 + 10p - 1 = 0$, cujus Radix p exquirenda est, ut quotienti addatur: Nempe (neglectis $p^3 + 6p^2$ ob parvitatem) $10p - 1 = 0$, sive $p = 0$, 1 prope veritatem est; itaque scribo 0, 1 in quotiente, & suppono 0, 1 + $q = p$, & hunc ejus valorem, ut prius substituo, unde prodit $q^3 + 6,3q^2 + 11,23q + 0,061 = 0$.

Et cum $11,23q + 0,061$ veritati prope accedit, sive fere sit q æqualis $-0,0054$ (dividendo nempe donec tot eliciantur Figuræ quot locis primæ Figuræ hujus & principalis quotientis exclusive distant) scribo $-0,0054$ in inferiori parte quotientis, cum negativa sit.

Et supponens $-0,0054 + r = q$, hunc ut prius substituo, & operationem sic produco quo usque placuerit. Verum si ad bis tot figuras

figuras tantum quot in Quotiente jam reperiuntur una dempta, operam continuare cupiam, pro q substituo $-0,0054 + r$ in hanc $6,3q^2 + 11,23q + 0,061$, scilicet primo ejus termino (q^2) propter exilitatem

$y^3 - 2y - 5 = 0$		$+ 2,10000000$ $- 0,00544853$ $+ 2,09455147 = y$
$2 + p = y$	$+ y^3$ $+ 2y$ $- 5$	$+ 8 + 12p + 6p^2 + p^3$ $- 4 - 2p$ $- 5$
	Summa	$- 1 + 10p + 6p^2 + p^3$
$0,1 + q = p$	$+ p^3$ $+ 6p^2$ $+ 10p$ $- 1$	$+ 0,001 + 0,03q + 0,3q^2 + q^3$ $+ 0,06 + 1,2 + 6,0$ $+ 1, + 10,$ $- 1,$
	Summa	$+ 0,061 + 11,23q + 6,3q^2 + q^3$
$- 0,0054 + r = q$	$+ 6,3q^2$ $+ 11,23q$ $+ 0,061$	$+ 0,000183708 - 0,06804r + 6,3r^2$ $- 0,060642 + 11,23$ $+ 0,061$
	Summa	$+ 0,000541708 + 11,16196r + 6,3r^2$
$- 0,00004854 + s = r$		

suam neglecto, & prodit $6,3r^2 + 11,16196r + 0,000541708 = 0$ fere, five (rejectione $6,3r^2$) $r = \frac{-0,000541708}{11,16196} = -0,00004853$ fere, quam scribo in negativa parte Quotientis. Denique negativam partem Quotientis ab Affirmativa subducens habeo $2,09455147$ Quotientem quasi-tam.

Æquationes plurium dimensionum nihilo secius resolvuntur, & operam sub fine, ut hic factum fuit, levabis, si primos ejus terminos gradatim omiseris.

Præterea notandum est quod in hoc exemplo, si dubitarem an $0,1 = p$ veritati satis accederet, pro $10p - 1 = 0$, finxissem $6p^2 + 10p - 1 = 0$, & ejus radices primam figuram in Quotiente scripsissem, & secundam vel tertiam Quotientis figuram sic explorare convenit, ubi in Æquatione ista ultimo resultante quadratum coefficientis penultimi termini, non sit decies majus quam factus ex ultimo termino ducto in coefficientem termini antepenultimi.

B

Imo

Imo laborem plerumque minues præsertim in *Æquationibus* plurimarum dimensionum, si figuras omnes Quotienti addendas dicto modo (hoc est extrahendo minorem radicem, ex tribus ultimis terminis *Æquationis* novissime resultantis) exquiras: Isto enim modo figuras duplo plures qualibet vice Quotienti lucraberis.

Hæc *Methodus* resolvendi *Æquationes* pervulgata an sit nescio, certe mihi videtur præ reliquis simplex, & usui accommodata. Demonstratio ejus ex ipso modo operandi patet, unde cum opus sit, in memoriam facile revocatur.

Æquationes in quibus vel aliqui vel nulli Termini desint, eadem fere facilitate tractantur; & *Æquatio* semper relinquitur, cujus Radix una cum acquisita Quotiente adæquat Radicem *Æquationis* primo propositæ. Unde Examinatio Operis hic æque poterit institui ac in reliqua Arithmetica, auferendo nempe Quotientem a Radice primæ *Æquationis* (sicut *Analystis* notum est) ut *Æquatio* ultima vel Termini ejus duo tresve ultimi producantur inde. Quicquid laboris hic est, istud in Operatione substituendi quantitates unas pro aliis reperietur: Id quod varie perficias, at sequentem modum maxime expeditum puto, præsertim ubi Numeri Coefficientes constant ex pluribus Figuris.

Sit $p + 3$ substituenda pro y in hanc $y^4 - 4y^3 + 5y^2 - 12y + 17 = 0$. Et cum ista possit resolvi in hanc formam

$$\begin{aligned} y - 4 \times y + 5 \times y - 12 \times y + 17 &= 0. \quad \text{Æquatio nova sic generabitur} \\ p - 1 \times p + 3 &= p^2 + 2p - 3. \quad \& \quad p^2 + 2p + 2 \text{ in } p + 3 = p^3 + 5p^2 + 8p + 6. \\ \& \quad p^3 + 5p^2 + 8p - 6 \text{ in } p + 3 &= p^4 + 8p^3 + 23p^2 + 18p - 18. \quad \& \quad p^4 + 8p^3 \\ + 23p^2 + 18p - 18 &= 0, \quad \text{quæ quærebatur.} \end{aligned}$$

LITERALIS ÆQUATIONUM AFFECTARUM RESOLUTIO

His in numeris sic ostensis: Sit *Æquatio* literalis $y^3 + a^3y - 2a^3 + axy - x^3 = 0$, resolvenda.

Primum inquirò valorem ipsius y cum x sit nulla, hoc est, elicio Radicem hujus *Æquationis* $y^3 + a^3y - 2a^3 = 0$, & invenio esse $+a$. Itaque scribo $+a$ in Quotiente, & supponens $+a + p = y$, substituo pro y valorem ejus, & Terminos inde resultantes ($p^3 + 3ap^2 + 4a^2p$, &c.) margini appono; Ex quibus assumo $+4a^2p + a^3x$ terminos utique
ubi

ubi p & x seorsim sunt minimarum dimensionum, & eos nihilo fere æquales esse suppono, sive $p = -\frac{1}{4}x$ fere, vel $p = -\frac{1}{4}x + q$. Et scribens $-\frac{1}{4}x$ in Quotiente, substituo $-\frac{1}{4}x + q$ pro p ; Et terminos inde resultantes iterum in margine scribo, ut vides in annexo schemate, & inde assumo Quantitates $+4a^2q - \frac{1}{16}ax^2$, in quibus utique q & x seorsim sunt minimarum dimensionum, & fingo $q = \frac{xx}{64a}$ fere, sive $q = +\frac{xx}{64a} + r$; & adnectens $+\frac{xx}{64a}$ Quotienti, substituo $\frac{xx}{64a} + r$ pro q ; & sic procedo quo usque placuerit.

$y^3 + a^2y - 2a^3 + axy - x^3 = 0$		
$y = a - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{64a} - \frac{131x^3}{512a^2} + \frac{509x^4}{16384a^3} \&c.$		
$+a+p=y$	$+y^3$ $+a^2y$ $+axy$ $-2a^3$ $-x^3$	$+a^3 + 3a^2p + 3ap^2 + p^3$ $+a^3 + a^2p$ $+a^2x + axp$ $-2a^3$ $-x^3$
$-\frac{1}{4}x+q=p$	$+p^3$ $+3ap^2$ $+4a^2p$ $+axp$ $+a^2x$ $-x^3$	$-\frac{1}{64}x^3 + \frac{3}{16}x^2q - \frac{3}{4}xq^2 + q^3$ $+\frac{1}{16}ax^3 - \frac{1}{2}axq + 3aq^2$ $-a^2x + 4a^2q$ $-\frac{1}{4}ax^2 + axq$ $+a^2x$ $-x^3$
$+\frac{x^2}{64a}+r=q$	$+3aq^2$ $+4a^2q$ $-\frac{1}{2}axq$ $+\frac{3}{16}x^2q$ $-\frac{1}{16}ax^2$ $-\frac{6}{64}x^3$	$+\frac{3x^4}{4096a} + \frac{1}{32}x^2r + 3ar^2$ $+\frac{1}{16}ax^2 + 4a^2r$ $-\frac{1}{128}x^3 - \frac{1}{2}axr$ $-\frac{3x^4}{3072a} + \frac{3}{16}x^2r$ $-\frac{1}{16}ax^2$ $-\frac{6}{64}x^3$
$+4a^2 - \frac{1}{2}ax + \frac{9}{32}x^2 + \frac{15x^4}{4096a} (+ \frac{132x^3}{512a^2} + \frac{509x^4}{16384a^3})$		

Sin duplo tantum plures Quotienti terminos, uno dempto, jungendos adhuc vellem: Primo termino (q^3) Æquationis novissime resultantis misso, & ista etiam parte ($-\frac{1}{4}q^3$) secundi, ubi x est tot dimensionum quot in penultimo Quotientis; la reliquos terminos ($3aq^2$
 B 2 + $4a^2q$,

+ $4a^2q$, &c.) margini adscriptos ut vides, substituo $\frac{x^2}{64a} + r$ pro q ; & ex ultimis duobus terminis $\left(\frac{15x^4}{4096a} - \frac{131}{128}x^3 + \frac{9}{32}x^2r - \frac{1}{2}axr + 4a^2r\right)$ Equationis inde resultantis, facta divisione $4a^2 - \frac{1}{2}ax + \frac{9}{32}x^2$ + $\frac{131}{128}x^3 - \frac{15x^4}{4096a}$ elicio + $\frac{131x^3}{512a} + \frac{509x^2}{16384a^2}$ Quotienti adnectendos.

Denique Quotiens ista $\left(a - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{64a}\right)$ &c.) per Regulam secundam, dabit $ax - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{192a} + \frac{131x^4}{2048a^2} + \frac{509x^5}{81920a^3}$, &c. pro Area quæ sita, quæ ad veritatem tanto magis accedit, quanto x sit minor.

Alius modus easdem Resolvendi.

Sin valor Areæ tanto magis ad veritatem accedere debet quanto x sit major; Exemplum esto $y^3 + axy + x^2y - a^3 - 2x^3 = 0$. Itaque hanc resoluturus excerpo terminos $y^3 + x^2y - 2x^3$ in quibus x & y vel seorsim, vel simul multiplicatæ, sunt & plurimarum, & æqualium ubique dimensionum; & ex iis quasi nihilo æqualibus Radicem elicio. Hanc invenio esse x , & in Quotiente scribo. Vel quod eodem recidit, ex $y^3 + y - 2$ (unitate pro x substituta) Radicem extraho quæ hic prodit 1, & eam per x multiplico, & factum (x) in Quotiente scribo. Denique pono $x + p = y$, & sic procedo ut in priori Exemplo, donec habeam Quotientem $x - \frac{a}{4} + \frac{aa}{64x} + \frac{131a^3}{512x^2} + \frac{509a^4}{16384x^3}$, &c. adeoque Aream $\frac{xy}{2} - \frac{ax}{4} + \frac{aa}{64x} - \frac{131a^3}{512x^2} - \frac{509a^4}{32768x^3}$, de qua vide exempla tertia Regulæ secundæ. Lucis gratia dedi hoc exemplum in omnibus idem cum priori, modo x & a sibi invicem ibi substituantur, ut non opus esset aliud Resolutionis exemplum hic adjungere.

Area autem $\left(\frac{xx}{2} - \frac{ax}{4} + \frac{aa}{64x}\right)$ &c. terminatur ad Curvam quæ juxta Asymptoton aliquam in infinitum serpit; & Termini initiales $(x - \frac{1}{2}a)$ valoris extracti de y , in Asymptoton istam semper terminantur; unde portionem Asymptoti facile invenies. Idem semper notandum est cum Area designatur terminis plus plufque divis per x continue, præterquam quod vice Asymptoti rectæ quandoque habeatur Parabola Conica, vel alia magis composita.

Sed

Sed hunc modum missum faciens, utpote particularem, quia non applicabilem Curvis in orbem ad instar Ellipsium flexis; de altero modo per exemplum $y^3 + a^2y + axy - 2a^3 - x^3 = 0$, supra ostenso (scilicet quo dimensiones ipsius x in numeratoribus quotientis perpetuo augeantur) annotabo sequentia.

1. Si quando accidit quod valor ipsius y , cum x nullum esse fingitur, fit quantitas furda vel penitus ignota, licebit illam litera aliqua designare. Ut in exemplo, $y^3 + a^2y + axy - 2a^3 - x^3 = 0$, si radix hujus $y^3 + a^2y - 2a^3$ fuisset furda vel ignota, finxissem quamlibet (b) pro ea ponendam; & resolutionem ut sequitur perfecissem. Scribens b in Quotiente, suppono $b + p = y$, & istum pro y substituo, ut vides; unde nova $p^3 + 3bp^2$, &c. resultat, rejectis terminis $b^3 + a^2b - 2a^3$, qui nihilo sunt æquales, propterea quod b supponitur Radix hujus $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$. Deinde termini $3b^2p + a^2p + abx$ dant $-\frac{abx}{3b^2 + a^2}$ quotienti apponendum, & $-\frac{abx}{3b^2 + a^2} + q$ substituendum pro p , &c.

$y^3 + a^2y + axy - 2a^3 - x^3 = 0$. Sit $cc = 3b^2 + a^2$.	
$y = b - \frac{abx}{c^2} + \frac{a^2bx^2}{c^6} + \frac{x^3}{c^2} + \frac{a^3b^3x^3}{c^8} - \frac{a^5bx^3}{c^2} + \frac{a^7b^3x^3}{c^{10}} \&c.$	
$b + p = y$	$y^3 + b^3 + 3b^2p + 3bp^2 + p^3$ $+ axy + abx + axp$ $+ aay + aab + aap$ $- x^3 - x^3$ $- 2a^3 - 2a^3$
$-\frac{abx}{cc} + q = p$	$p^3 - \frac{a^3b^3x^3}{c^6} \&c.$ $+ 3bp^2 + \frac{3a^2b^3x^2}{c^4} - \frac{6ab^2x}{c^2} q \&c.$ $+ axp - \frac{a^2bx^2}{c^2} + axq$ $+ ccp - abx + ccq$ $- x^3 - x^3$ $+ abx + abx$
$c^2 + ax - \frac{6ab^2x}{cc} + \frac{a^4bx^2}{c^6} + x^3 + \frac{a^3b^3x^3}{c^6} \left(\frac{a^4bx^2}{c^6} + \frac{x}{c^2} + \frac{a^3b^3x^3}{c^6} \right) \&c.$	

Completo opere, sumo numerum aliquem pro a , & hanc $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$, sicut de numerali æquatione ostensum supra resolvo; & radicem ejus pro b substituo.

2. Si dictus valor sit nihil, hoc est si in æquatione resolvenda nul-

lus sit terminus nisi qui per x vel y sit multiplicatus, ut in hac $y^3 - axy + x^3 = 0$; tum terminos ($-axy + x^3$) feligo in quibus x seorsim & y etiam seorsim si fieri potest, alias per x multiplicata, sit minimarum dimensionum. Et illi dant $+\frac{xx}{a}$ pro primo termino quotientis, & $\frac{xx}{a} + p$ pro y substituendum. In hac $y^3 - a^2y + axy - x^3 = 0$, licebit primum terminum quotientis vel ex $-a^2y - x^3$, vel ex $y^3 - a^2y$ elicere.

3. Si valor iste sit imaginarius, ut in hac $y^4 + y^2 - 2y + 6 - x^2y^2 - 2x + x^2 + x^3 = 0$, augeo vel imminuo quantitatem x donec dictus valor evadit realis.

Sic in annexo schemate, cum AC (x) nulla est, tum CD (y) est imaginaria.


Sin minuatur AC per datam AB, ut BC fiat x ; tum posito quod BC (x) sit nulla, CD (y) erit valore quadruplici (CE, CF, CG, vel CH) realis; quarum radicem (CE, CF, CG, vel CH) quælibet potest esse primus terminus quotientis, prout superficies BEDC, BFDC, BGDC, vel BHDC desideratur. In aliis etiam casibus, si quando hæsitas, te hoc modo extricabis.

Denique si index potestatis ipsius x vel y sit fractio, reduco ipsum ad integrum: ut in hoc exemplo $y^3 - xy^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{4}{3}} = 0$. Posito $y^{\frac{1}{2}} = v$, & $x^{\frac{1}{3}} = z$, resultabit $v^6 - z^3v + z^4 = 0$, cujus radix est $v = z + z^3$, &c. five (restituendo valores) $y^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{3}} + x$, &c. & quadrando $y = x^{\frac{2}{3}} + 2x^{\frac{4}{3}}$, &c.

Et hæc de arcis curvarum investigandis dicta sufficiant. Imo cum Problemata omnia de curvarum Longitudine, de quantitate & superficie solidorum, deque Centro Gravitatis, possunt eo tandem reduci ut quærat quantitas Superficiæ planæ linea curva terminatæ, non opus est quicquam de iis adjungere. In istis autem quo ego operor modo dicam brevissime.

Applicatio prædictorum ad reliqua istiusmodi Problemata.


Sit ABD curva quævis, & AHKB rectangulum cujus latus AH vel BK est unitas. Et cogita rectam DBK uniformiter ab AH motam, arcus ABD & AK describere; & quod BK (1) sit momentum quo AK (x) & BD (y) momentum quo ABD gradatim augeatur; & quod ex momento BD perpetim dato, possis, per prædictas regulas, aream ABD ipso descriptam investigare, live cum AK (x) momento 1 descripta conferre.



Jam qua ratione Superficies ABD ex momento suo perpetim dato, per præcedentes regulas elicitur, eadem quælibet alia quantitas ex momento suo sic dato elicitur. Exemplo res fiet clarior.

Longitudines Curvarum invenire.

Sit ADLE circulus cujus arcus AD longitudo est indaganda. Ducto tangente DHT, & completo indefinite parvo rectangulo HGBK, & posito $AE = r = 2AC$. Erit ut BK five GH, momentum Basis AB (x), ad HD momentum Arcus AD :: BT : DT :: BD ($\sqrt{x-x^2}$) : DC ($\frac{1}{2}$) :: 1 (BK) :



$\frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$ (DH). Adeoque $\frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$ five $\frac{\sqrt{x-x^2}}{2x-2xx}$ est momentum Arcus AD.

Quod reductum fit $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{4}x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{12}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{24}x^{\frac{7}{2}} + \frac{63}{512}x^{\frac{9}{2}} \&c.$

Quare, per regulam secundam, longitudo Arcus AD est

$x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{6}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{40}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{112}x^{\frac{7}{2}} + \frac{1}{1152}x^{\frac{9}{2}} + \frac{63}{262144}x^{\frac{11}{2}} \&c.$

five $x^{\frac{1}{2}}$ in $1 + \frac{1}{6}x + \frac{1}{40}x^2 + \frac{1}{112}x^3 + \frac{1}{1152}x^4 + \frac{63}{262144}x^5, \&c.$

Non secus ponendo CB esse x , & radium CA esse 1, invenies Arcum LD esse $x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{40}x^5 + \frac{1}{112}x^7, \&c.$

Sed notandum est quod unitas ista quæ pro momento ponitur est Superficies cum de Solidis, & linea cum de superficiebus, & punctum cum de lineis (ut in hoc exemplo) agitur.

Nec vereor loqui de unitate in punctis, five lineis infinite parvis, si quidem proportionibus ibi jam contemplantur Geometræ, dum utuntur methodis Indivisibilium.

Ex his fiat conjectura de superficiebus & quantitatibus solidorum, ac de Centris Gravitatum.

Invenire prædictorum conversum.


Verum si e contra ex area vel longitudine &c. Curvæ alicujus data longitudo Basis AB desideratur, ex æquationibus per præcedentes regulas inventis extrahatur radix de x .

Inven-

Inventio Basis ex Area data.

Ut si ex area ABDC Hyperbolæ ($\frac{z}{1+z} = y$) data, cupiam basim AB invelligare, area ista z nominata, extraho radicem hujus z (ABCD) $= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4$, &c. neglectis illis terminis in quibus x est plurium dimensionum quam z in quotiente desideratur.

Ut si vellem quod z ad quinque tantum dimensiones in quotiente ascendat, negligo omnes $-\frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{8}x^8$, &c. & radicem hujus tantum $\frac{1}{2}x^5 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - z = 0$ extraho.



$x = z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{4}z^4 + \frac{1}{5}z^5$ &c.		
$z + p = x$	+	$\frac{1}{2}x^5$
	+	$\frac{1}{3}z^5$, &c.
	-	$\frac{1}{4}x^4$
	-	$\frac{1}{4}z^4 - z^3p$, &c.
	+	$\frac{1}{3}x^3$
	+	$\frac{1}{3}z^3 + z^2p + zp^2$, &c.
	-	$\frac{1}{2}x^2$
	-	$\frac{1}{2}z^2 - zp - \frac{1}{2}p^2$
	+	x
	+	$z + p$
	-	z
	-	z
$\frac{1}{2}z^2 + q = p$	+	zp^2
	+	$\frac{1}{2}z^5$, &c.
	-	$\frac{1}{2}p^2$
	-	$\frac{1}{2}z^4 - \frac{1}{2}z^2q$, &c.
	-	z^3p
	-	$\frac{1}{2}z^4$, &c.
	+	z^2p
	+	$\frac{1}{2}z^4 + z^2q$
	-	z^2p
	-	$\frac{1}{2}z^3 - zq$
	+	p
	+	$\frac{1}{2}z^2 + q$
	+	$\frac{1}{2}z^5$
	+	$\frac{1}{2}z^5$
	-	$\frac{1}{4}z^4$
	-	$\frac{1}{4}z^4$
	+	$\frac{1}{3}z^3$
	+	$\frac{1}{3}z^3$
	-	$\frac{1}{2}z^2$
	-	$\frac{1}{2}z^2$
$I - z + \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{4}z^4 - \frac{1}{5}z^5 (\frac{1}{2}z^3 + \frac{1}{3}z^4 + \frac{1}{5}z^5)$		

Analyfin ut vides exhibui propter adnotanda duo sequentia.

1. Quod inter substituendum, istos terminos semper omitto quos nulli deinceps usui fore prævideam. Cujus rei regula esto, quod post primum terminum ex qualibet quantitate sibi collateraliter resultantem non


non addo plures terminos dextrorsum quam istius primi termini index dimensionis ab indice dimensionis maximæ unitatibus distat. Ut in hoc exemplo, ubi maxima dimensio est 5, omisi omnes terminos post z^5 , post z^4 posui unicum, & duos tantum post z^3 . Cum radix extrahenda (x) sit parium ubique, vel imparium dimensionum, hæc esto regula; Quod post primum terminum ex qualibet quantitate sibi collateraliter resultantem non addo plures terminos dextrorsum, quam istius primi termini index dimensionis ab indice dimensionis maximæ binis unitatibus distat; vel ternis unitatibus, si indices dimensionum ipsius x unitatibus ubique ternis a se invicem distant, & sic de reliquis.

2. Cum video p , q , vel r , &c. in æquatione novissime resulante esse unius tantum dimensionis, ejus valorem, hoc est, reliquos terminos quotienti addendos, per divisionem quæro. Ut hic vides factum.

Inventio Basis ex data Longitudine Curvæ.

Si ex dato arcu aD Sinus AB desideratur; æquationis $z = x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5 + \frac{1}{120}x^7$, &c. supra inventæ, (posito nempe $AB = x$, $aD = z$, & $Aa = 1$), radix extracta erit $x = z - \frac{1}{2}z^3 + \frac{1}{24}z^5 - \frac{1}{720}z^7 + \frac{1}{30240}z^9$, &c.

Et præterea si Cosinum $A\beta$ ex isto arcu dato cupis, fac $A\beta$ ($= \sqrt{1-z^2}$) $= 1 - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{24}z^4 - \frac{1}{720}z^6 + \frac{1}{40320}z^8 - \frac{1}{3628800}z^{10}$, &c.



De Serie progressionum continuanda.

Hic obiter notetur, quod 5 vel 6 terminis istarum radicum cognitæ, eas plerumque ex analogia observata poteris ad arbitrium producere.

Sic hanc $x = z + \frac{1}{2}z^3 + \frac{1}{24}z^5 + \frac{1}{120}z^7 + \frac{1}{30240}z^9$, &c. produces dividendo ultimum terminum per hos ordine numeros 2, 3, 4, 5, 6, 7, &c.

Et hanc $x = z - \frac{1}{2}z^3 + \frac{1}{24}z^5 - \frac{1}{720}z^7 + \frac{1}{30240}z^9$, &c. per hos 2×3 , 4×5 , 6×7 , 8×9 , 10×11 , &c.

Et hanc $x = 1 - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{24}z^4 - \frac{1}{720}z^6 + \frac{1}{30240}z^8$, &c. per hos 1×2 , 3×4 , 5×6 , 7×8 , 9×10 , &c.

Et hanc $z = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{80}x^5 + \frac{5}{112}x^7$, &c. multiplicando per hos $\frac{1 \times 1}{2 \times 3}$, $\frac{3 \times 3}{4 \times 5}$, $\frac{5 \times 5}{6 \times 7}$, $\frac{7 \times 7}{8 \times 9}$, &c. Et sic in reliquis.


C

Ap-

*Applicatio prædictorum ad Curvas
Mechanicas.*

Et hæc de curvis Geometricis dicta sufficiant. Quinetiam curva etiamfi Mechanica sit, methodum tamen nostram nequaquam respuit.

Exemplo sit Trochoides, ADFG, cujus vertex A, & axis AH, & AKH rota qua describitur. Et quærat Superficies ABD. Jam posito $AB=x$, $BD=y$, ut supra, & $AH=1$; primo quæro Longitudinem ipsius BD. Nempe ex natura Trochoidis est $KD = \text{arctui } AK$. Quare tota $BD = BK + \text{arc. } AK$. Sed est BK




$(= \sqrt{x-xx}) - x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{7}{2}}, \&c. \& (\text{ex prædictis}) \text{ arcus } AK = x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{6}x^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{80}x^{\frac{5}{2}} + \frac{5}{112}x^{\frac{7}{2}}, \&c. \text{ Ergo tota } BD = 2x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{72}x^{\frac{7}{2}}, \&c. \text{ Et (per Reg. 2.) area } ABD = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{12}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{72}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{315}x^{\frac{9}{2}}, \&c.$

Vel brevius sic : Cum recta AK tangenti TD parallela fit, erit AB ad BK sicut momentum lineæ AB ad momentum lineæ BD, hoc est $x : \sqrt{x-xx} :: 1 : \frac{1}{x}\sqrt{x-xx} = x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{8}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{112}x^{\frac{7}{2}}, \&c. \text{ Quare (per Reg. 2.) } BD = 2x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{72}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{315}x^{\frac{9}{2}}, \&c. \text{ Et superficies } ABD = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{12}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{72}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{315}x^{\frac{9}{2}}, \&c.$

Non dissimili modo (posito C centro circuli, & $CB=x$) obtinebis aream CBDF, &c.

Sit area ABDV Quadratricis VDE (cujus vertex est V, & A centrum circuli interioris VK cui aptatur) invenienda. Ducta qualibet AKD, demitto perpendiculares DB, DC, KG. Eritque KG: AG :: AB (x): BD (y), five $\frac{x \times AG}{KG} = y$. Verum ex natura Quadratricis est BA (=DC) = arcui VK, five $VK=x$. Quare posito $AV=1$, erit $GK=x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{120}x^5, \&c. \text{ ex supra ostensis, \& } GA=1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{2520}x^6, \&c.$



Adeoque

Adeoque $y = \frac{x \times AG}{KG} = \frac{1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{720}x^6}{1 - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{120}x^4 - \frac{1}{10080}x^6}$ &c, five, divisio-

ne facta, $y = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{345}x^6$, &c. & (per Reg. 2.) area AVDB
 $= x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5 - \frac{1}{6615}x^7$, &c.

Sic longitudo Quadratricis VD, licet calculo difficiliori, determinabilis est.

Nec quicquam hujusmodi scio ad quod hæc methodus idque variis modis, sese non extendit. Imo tangentes ad curvas Mechanicas (si quando id non alias fiat) hujus ope ducantur. Et quicquid vulgaris Analysis per æquationes ex finito terminorum numero constantes (quando id sit possibile) perficit, hæc per æquationes infinitas semper perficiat: Ut nil dubitaverim nomen Analysis etiam huic tribuere. Ratiocinia nempe in hac non minus certa sunt quam in illa, nec æquationes minus exactæ; licet omnes earum terminos, nos homines & rationis finitæ nec designare neque ita concipere possimus, ut quantitates inde desideratas exacte cognoscamus: Sicut radices surdæ finitarum æquationum nec numeris nec quavis arte Analytica ita possunt exhiberi ut alicujus quantitas a reliquis distincta exacte cognoscatur.

Denique ad Analyticam merito pertinere censeatur cujus beneficio curvarum areæ & longitudines &c. (id modo fiat) exacte & Geometrice determinentur. Sed ista narrandi non est locus, respicienti duo præ reliquis demonstranda occurrunt.

1. Demonstratio quadraturæ curvarum simplicium in Regula prima.


Præparatio pro Regula prima demonstranda.

Sit itaque curvæ alicujus ADδ Basis AB=x, perpendiculariter applicata BD=y, & area ABD=z, ut prius. Item sit Bβ=o, BK=v, & rectangulum BβHK (ov) æquale spatio BβδD.

Est ergo Aβ=x+o, & Aδβ=z+ov. His præmissis, ex relatione inter x & z ad arbitrium assumpta quæro y isto, quem sequentem vides, modo.

Pro lubitu sumatur $\frac{1}{3}x^3 = z$, five $\frac{1}{3}x^3 = z$.

Tum x+o (Aβ) pro x, & z+ov (Aδβ) pro z substitutis, prodibit



bit $\frac{1}{2}$ in $x^3 + 3x^2o + 3xo^2 + o^3 = (\text{ex natura curvæ}) z^3 + 2zov + o^2v^2$.
 Et sublatis $(\frac{1}{2}x^3 \& z^3)$ æqualibus, reliquisque per o divis, restat $\frac{1}{2}$ in
 $3x^2 + 3xo + o^2 = 2zv + ov^2$. Si jam supponamus $\beta\beta$ in infinitum diminui
 & evanescere, sive o esse nihil, erunt v & y æquales, & termini per
 o multiplicati evanescent, quare restabit $\frac{1}{2} \times 3xx = 2zv$, sive $\frac{1}{2}xx (=zy)$
 $= \frac{1}{2}xy$, sive $x\frac{1}{2} (= \frac{xy}{2}) = y$. Quare e contra si $x\frac{1}{2} = y$, erit $\frac{1}{2}x^2 = z$.

Demonstratio.

Vel generaliter, si $\frac{n}{m+n} \times ax^{\frac{m+n}{n}} = z$; sive, ponendo $\frac{na}{m+n} = c$, & m
 $+n=p$, si $cx^n = z$, sive $c^n x^p = z^n$: tum $x+o$ pro x , & $z+ov$ (sive,
 quod perinde est, $z+oy$) pro z , substitutis, prodit c^n in $x^p + pox^{p-1}$,
 &c. $= z^n + noyz^{n-1}$, &c. reliquis nempe terminis, qui tandem eva-
 nescent, omisiss. Jam sublatis $c^n x^p$ & z^n æqualibus, reliquisque per
 o divis, restat $c^n px^{p-1} = nyz^{n-1}$ ($= \frac{nyz^n}{z} = \frac{ny c^n x^p}{c^n x^n}$ sive, dividendo per $c^n x^p$,
 erit $px^{p-1} = \frac{ny}{c^n}$ sive $pcx^{\frac{p-n}{n}} = ny$; vel restituendo $\frac{na}{m+n}$ pro c , & $m+n$ pro
 p , hoc est, m pro $p-n$, & na pro pc , fiet $ax^{\frac{m}{m+n}} = y$. Quare e contra,
 si $ax^{\frac{m}{m+n}} = y$, erit $\frac{n}{m+n} ax^{\frac{m+n}{n}} = z$. Q. E. D.

Inventio curvarum quæ possunt quadrari.

Hinc in transitu notetur modus quo curvæ tot quot placuerit, qua-
 rum aræ sunt cognitæ, possunt inveniri; sumendo nempe quamlibet
 æquationem pro relatione inter aream z & basin x ut inde quæratur
 applicata y . Ut si supponas $\sqrt{aa+xx} = z$, ex calculo invenies $\frac{x}{\sqrt{aa+xx}} = y$.
 Et sic de reliquis.


2. Demonstratio resolutionis æquationum affectarum.

Alterum demonstrandum est literalis æquationum affectarum reso-
 lutio. Nempe quod Quotiens, cum x fit satis parva, quo magis pro-
 duci-

ducitur eo magis ad veritatem accedit, ut defectus (p, q , vel r , &c.) quo distat ab exacto valore ipsius y , tandem evadat minor quavis data quantitate; & in infinitum producta sit ipsi y æqualis. Quod sic patebit.

1. Quoniam ex ultimo termino æquationum quarum p, q, r , &c. sunt radices, quantitas illa in qua x est minimæ dimensionis (hoc est, plusquam dimidium istius ultimi termini, si supponis x satis parvam esse) in qualibet operatione perpetuo tollitur: iste ultimus terminus (per 1. 10. *Elem.*) tandem evadet minor quavis data quantitate; & prorsus evanescet si opus infinite continuatur.

Nempe si $x = \frac{1}{2}$, erit x dimidium omnium $x + x^2 + x^3 + x^4$, &c. & x^2 dimidium omnium $x^2 + x^3 + x^4 + x^5$, &c. Itaque si $x = \frac{1}{2}$, erit x plusquam dimidium omnium $x + x^2 + x^3$, &c. & x^2 plusquam dimidium omnium $x^2 + x^3 + x^4$, &c. Sic



fi $\frac{x}{b} = \frac{1}{2}$, erit x plusquam dimidium omnium $x + \frac{x^2}{b}$

$+ \frac{x^3}{bb}$, &c. Et sic de reliquis. Et numeros coefficientes quod attinet, illi plerumque decrescunt perpetuo, vel si quando increscant, tantum opus est ut x aliquoties adhuc minor supponatur.

2. Si ultimus terminus alicujus æquationis continuo diminuatur donec tandem evanescat, una ex ejus radicibus etiam diminuetur donec cum ultimo termino simul evanescat.

3. Quare quantitatatum p, q, r , &c. unus valor continuo decrescit donec tandem, cum opus in infinitum producitur, penitus evanescat.

4. Sed valores istarum p, q , vel r , &c. una cum quotiente eatenus extracta adæquant radices æquationis propositæ (Sic in resolutione æquationis $y^3 + aay + axy - 2a^2 - x^3 = 0$, supra ostensa, percipies $y = a + p = a - \frac{1}{2}x + q = a - \frac{1}{2}x + \frac{xx}{64a} + r$, &c.) Unde satis liquet propositum quod quotiens infinite producta est una ex valoribus de y .

Idem patebit substituendo quotientem pro y in æquationem propositam. Videbis enim terminos illos sese perpetuo destruere in quibus x est minimarum dimensionum.

*CUM in Epistolis D. Newtoni, vel in lucem jam-
dudum editis, vel quæ in manus nostras inciderunt,
reperiantur aliqua quæ ad hanc Doctrinam pertinent, ea
excerpere & huic Tractatui adjungere visum est.*

EXCERPTA

Ex Epistolis D. NEWTONI

Ad Methodum

FLUXIONUM,

E T

SERIERUM INFINITARUM

Spectantibus.

Fragmentum Epistolæ ad D. Oldenburgium 13 Junii 1676 missæ.*

Ractiones in Infinitas Series reducuntur per divisionem; & quantitates radicales per extractionem radicum, perinde instituendo operationes istas in speciebus ac institui solent in decimalibus numeris. Hæc sunt fundamenta harum reductionum; sed extractiones radicum, multum abbreviantur per hoc *Theorema.*

$$P + PQ^{\frac{m}{n}} = P^{\frac{m}{n}} + \frac{m}{n} AQ + \frac{m-m}{2n} BQ + \frac{m-2n}{3n} CQ + \frac{m-3n}{4n} DQ + \&c.$$

Ubi $P + PQ$ significat quantitatem cujus Radix, vel etiam dimensio quævis, vel radix dimensionis, investiganda est. P , primum terminum quantitatis ejus; Q , reliquos terminos divisos per primum. Et $\frac{m}{n}$, numeralem indicem dimensionis ipsius $P + PQ$: Sive dimensio illa integra sit; sive (ut ita loquar) fracta; sive affirmativa, sive negativa. Nam, sicut Analystæ, pro aa , aaa , &c. scribere solent a^2 , a^3 , &c. sic ego, pro \sqrt{a} , $\sqrt[3]{a}$, $\sqrt[4]{a}$, scribo $a^{\frac{1}{2}}$, $a^{\frac{1}{3}}$, $a^{\frac{1}{4}}$, & pro $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{aa}$, $\frac{1}{a^3}$, scribo a^{-1} , a^{-2} , a^{-3} .

Et

* Extat Epistola in Tom. 3. Operum Wallisii.

Ex sic pro $\sqrt[aa]{c^2 a^3 + b^2 x}$ scribo $aa \times a^3 + b^2 x | - \frac{1}{2}$; & pro $\sqrt[ab]{c^2 a^3 + b^2 x \times a^3 + b^2 x}$ scribo $a^2 b \times a^3 + b^2 x | - \frac{1}{3}$: In quo ultimo casu, si $a^3 + b^2 x | - \frac{1}{3}$ concipiatur esse $P + PQ \frac{m}{n}$ in Regula; erit $P = a^3$, $Q = \frac{b^2 x}{a^3}$, $m = -2$, & $n = 3$. Denique, pro terminis inter operandum inventis in quoto, usurpo A, B, C, D, &c. nempe A pro primo termino $P \frac{m}{n}$, B pro secundo $\frac{m}{n} A Q$, & sic deinceps. Cæterum usus Regulæ patebit exemplis.

Exempl. 1. Est $\sqrt[3]{c^2 + x^2}$ (feu $c^2 + x^2 | \frac{1}{2}$) $= c + \frac{x^2}{2c} - \frac{x^4}{8c^3} + \frac{x^6}{16c^5} - \frac{5x^8}{128c^7} + \frac{7x^{10}}{256c^9}$ &c. Nam, in hoc casu, est $P = c^2$, $Q = \frac{x^2}{c^2}$, $m = 1$, $n = 2$, $A (= P \frac{m}{n} = \frac{c^2 x^2}{2}) = c$, $B (= \frac{m}{n} A Q) = \frac{x^2}{2c}$, $C (= \frac{m-n}{2n} B Q) = -\frac{x^4}{8c^3}$, & sic deinceps.

Exempl. 2. Est $\sqrt[5]{c^5 + c^4 x - x^5}$ (i. e. $c^5 + -c^4 x - x^5 | \frac{1}{5}$) $= c + \frac{c^4 x - x^5}{5c^4} - \frac{2c^3 x^2 + 4c^2 x^3 - 2x^{10}}{25c^9} + \&c.$ Ut patebit substituendo in allatam Regulam, 1 pro m , 5 pro n , c^5 pro P, & $\frac{c^4 x - x^5}{c^4}$ pro Q. Potest etiam $-x^5$ substitui pro P, & $\frac{c^4 x + c^5}{-x^5}$ pro Q, & tunc evadet $\sqrt[5]{c^5 + c^4 x - x^5} = -x + \frac{c^4 x + c^5}{5x^4} + \frac{2c^3 x^2 + 4c^2 x^3 + c^5}{25x^9} + \&c.$ Prior modus eligendus est, si x valde parvum sit; posterior, si valde magnum.

Exempl. 3. Est $\sqrt[3]{N \times y^3 - a^2 y}$ (hoc est, $N \times y^3 - a^2 y | - \frac{1}{3}$) æqualis $N \times \frac{1}{y} + \frac{a^2}{3y^3} + \frac{2a^4}{9y^5} + \frac{14a^6}{81y^7} + \&c.$ Nam $P = y^3$, $Q = \frac{-aa}{y^2}$, $m = -1$, $n = 3$. $A (= P \frac{m}{n} = y^3 \times -\frac{1}{3}) = y^{-1}$, hoc est $\frac{1}{y}$. $B (= \frac{m}{n} A Q = -\frac{1}{3} \times \frac{1}{y} \times \frac{-aa}{y^2}) = \frac{aa}{3y^3}$, &c.

Exempl. 4. Radix cubica ex quadrato-quadrato ipsius $d + e$, (hoc est, $\overline{d+e} | \frac{1}{3}$) est $d^{\frac{1}{3}} + \frac{4ed^{\frac{1}{3}}}{3} + \frac{2e^2}{9d^{\frac{1}{3}}} - \frac{e^3}{81d^{\frac{5}{3}}} + \&c.$

Nam $P = d$, $Q = \frac{e}{d}$, $m = 4$, $n = 3$, $A (= P \frac{m}{n}) = d^{\frac{4}{3}}$, &c.

Exempl. 5. Eodem modo simplices etiam potestates eliciuntur. Ut si quadrato-cubus ipsius $d + e$, (hoc est, $\overline{d+e} | \frac{1}{5}$, feu $\overline{d+e} | \frac{1}{5}$) desideretur: erit, juxta Regulam, $P = d$, $Q = \frac{e}{d}$, $m = 5$, & $n = 1$; adeoque $A (= P \frac{m}{n}) = d^5$, $B (= \frac{m}{n} A Q) = 5d^4 e$, & sic $C = 10d^3 e^2$, $D = 10d^2 e^3$, $E = 5d e^4$, $F = e^5$, & $G (= \frac{m-n}{6n} F Q) = 0$. Hoc est, $\overline{d+e} | \frac{1}{5} = d^5 + 5d^4 e + 10d^3 e^2 + 10d^2 e^3 + 5d e^4 + e^5$.

Exem.

Exempl. 6. Quinetiam Divisio, five simplex fit, five repetita, per eandem Regulam perficitur. Ut si $\frac{1}{d+e}$ (hoc est $d+e|^{-1}$ five

$\overline{d+e}|^{-1}$) in seriem simplicium terminorum resolvendum sit: Erit juxta Regulam $P = d$, $Q = \frac{e}{d}$, $m = -1$, $n = 1$, & $A (=P^{\frac{m}{n}} = d^{-1}) = d^{-1}$ seu $\frac{1}{d}$, $B (= \frac{m}{n} A Q = -1 \times \frac{1}{d} \times \frac{e}{d} = -\frac{e}{d^2}$, & sic $C = \frac{ee}{d^3}$, $D = -\frac{e^3}{d^4}$, &c. Hoc est $\frac{1}{d+e} = \frac{1}{d} - \frac{e}{d^2} + \frac{e^2}{d^3} - \frac{e^3}{d^4} + \&c.$

Exempl. 7. Sic & $\overline{d+e}|^{-3}$ (hoc est unitas ter divisa per $d+e$, vel semel per cubum ejus,) evadit $\frac{1}{d^3} - \frac{3e}{d^4} + \frac{6e^2}{d^5} - \frac{10e^3}{d^6} + \&c.$

Exempl. 8. Et $N \times \overline{d+e}|^{-\frac{1}{3}}$, (hoc est N divisum per radicem cubicam ipsius $d+e$,) evadit $N \times \frac{1}{d^{\frac{1}{3}}} - \frac{e}{3d^{\frac{4}{3}}} + \frac{2e^2}{9d^{\frac{5}{3}}} - \frac{14e^3}{81d^{\frac{2}{3}}} + \&c.$

Exempl. 9. Et $N \times \overline{d+e}|^{-\frac{1}{2}}$ (hoc est N divisum per radicem quadrato-cubicam ex cubo ipsius $d+e$, five $\frac{N}{\sqrt{5d^3+3d^2e+3de^2+e^3}}$) evadit

$$N \times \frac{1}{d^{\frac{3}{2}}} - \frac{3e}{5d^{\frac{5}{2}}} + \frac{12e^2}{25d^{\frac{7}{2}}} - \frac{52e^3}{125d^{\frac{9}{2}}} + \&c.$$

Per eandem Regulam Genesis Potestatum, Divisiones per Potestates aut per quantitates radicales, & Extractiones radicum altiorum in numeris etiam commode instituuntur.

Extractiones Radicum affectarum in speciebus imitantur earum extractiones in numeris, sed methodus *Vietæ* & *Oughtredi* nostri huic negotio minus idonea est: Quapropter aliam excogitare adactus sum. [*Hujus specimen exhibetur in Tractatu præcedente Pag. 8.*]

Quomodo ex æquationibus, sic ad infinitas series reductis, Aræ & Longitudines curvarum, Contenta & Superficies solidorum, vel quorumlibet segmentorum figurarum quarumvis, eorumque Centra gravitatis determinantur; & quomodo etiam Curvæ omnes Mechanicæ ad ejusmodi æquationes infinitarum ferierum reduci possint, indeque Problemata circa illas resolveri perinde ac si Geometricæ essent; nimis longum foret describere, sufficiat specimina quædam talium Problematum recensuisse: Inque iis, brevitatis gratia, literas A, B, C, D, &c. pro terminis seriei, sicut sub initio, nonnunquam usurpabo.

I. Si ex dato sinu recto, vel sinu verso, Arcus desideretur: Sit radius

D

dus r , & finus rectus x : Eritque Arcus $= x + \frac{x^3}{6r^2} + \frac{3x^5}{40r^4} + \frac{5x^7}{112r^6} + \&c.$ hoc est, $= x + \frac{1 \times 1 \times x^3}{2 \times 3 \times r^2} A + \frac{3 \times 3 \times x^5}{4 \times 5 \times r^4} B + \frac{5 \times 5 \times x^7}{6 \times 7 \times r^6} C + \frac{7 \times 7 \times x^9}{8 \times 9 \times r^8} D + \&c.$

Vel, sit d diameter, ac x finus versus; & erit Arcus æqualis

$$dx^{\frac{1}{2}} + \frac{\frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}}}{6d^{\frac{3}{2}}} + \frac{\frac{5}{8}x^{\frac{5}{2}}}{40d^{\frac{5}{2}}} + \frac{\frac{35}{112}x^{\frac{7}{2}}}{112d^{\frac{7}{2}}} + \&c. \text{ hoc est, } = \sqrt{dx} \text{ in}$$

$$1 + \frac{x}{6d} + \frac{3x^2}{40d^2} + \frac{5x^3}{112d^3} + \&c.$$

2. Si vicissim, ex dato Arcu desideretur finus: Sit radius r , & arcus z . Eritque finus rectus $= z - \frac{z^3}{6r^2} + \frac{z^5}{120r^4} - \frac{z^7}{5040r^6} + \frac{z^9}{362880r^8} - \&c.$

hoc est, $= z - \frac{z^3}{2 \times 3 \times r^2} A - \frac{z^5}{4 \times 5 \times r^4} B - \frac{z^7}{6 \times 7 \times r^6} C - \&c.$ Et finus versus

$$= \frac{z^2}{2r} - \frac{z^4}{24r^3} + \frac{z^6}{720r^5} - \frac{z^8}{40320r^7} + \&c. \text{ hoc est, } = \frac{z^2}{1 \times 2r} - \frac{z^4}{3 \times 4r^3} A - \frac{z^6}{5 \times 6r^5} B - \frac{z^8}{7 \times 8r^7} C - \&c.$$

3. Si Arcus capiendus sit in ratione data ad alium Arcum: Esto diameter $= d$, chorda arcus dati $= x$, & arcus quæsitus ad arcum illum datum ut n ad 1; Eritque arcus quæsitus Chorda $= nx + \frac{1-nn}{2 \times 3dd} xx A + \frac{9-nn}{4 \times 5dd} xx B + \frac{25-nn}{6 \times 7dd} xx C + \frac{36-nn}{8 \times 9dd} xx D + \frac{49-nn}{10 \times 11dd} xx E + \&c.$ Ubi nota, quod cum n est numerus impar, series desinet esse infinita, & evadet eadem quæ prodit per Vulgarem Algebram ad multiplicandum datum angulum per istum numerum n .


4. Si in Axe alterutro AB, Ellipseos ABD (cujus centrum C, & axis alter DH) detur punctum aliquod E, circa quod recta EG occurrens Ellipsi in G, motu angulari feretur; & ex data area sectoris Elliptici BEG, quæratu recta GF, quæ a puncto G ad axem AB normaliter demittitur: Esto BC $= q$, DC $= r$, EB $= t$, ac duplum areæ BEG $= z$; & erit GF $= \frac{1}{t} z - \frac{q}{6r^2 + t^4} z^3 + \frac{10q^2 - 9qt}{120r^4 + 7} z^5$

$$- \frac{280q^3 + 504q^2t - 225qt^2}{5040r^6 + 110} z^7 + \&c. \text{ Sic itaque Astronomicum illud Kepleri.}$$

Problema resolvi potest.

5. In eadem Ellipsi, si statuatur CD $= r$, $\frac{CB}{CD} = c$, & CF $= x$:

Erit



$$\begin{aligned} \text{Erit arcus Ellipticus DG} = & x + \frac{1}{6c^3} x^3 + \frac{1}{107c^5} x^5 + \frac{1}{1471c^7} x^7 + \frac{8}{1873c^9} x^9 + \frac{1}{2274c^{11}} \\ & - \frac{1}{40c^9} - \frac{1}{287c^7} - \frac{1}{2471c^5} - \frac{1}{2273c^3} \\ & + \frac{1}{112c^6} + \frac{1}{487c^4} + \frac{3}{887c^2} \\ & - \frac{5}{1112c^8} - \frac{1}{3527c^6} \\ & + \frac{7}{2815c^{10}} \end{aligned}$$

Hic numerales Coefficientes supremorum terminorum ($\frac{1}{6}$, $\frac{1}{107}$, $\frac{1}{1471}$, &c.) sunt in Musica progressionem: Et numerales Coefficientes omnium inferiorum in unaquaque columna prodeunt multiplicando continuo numeralem Coefficientem supremi termini per terminos hujus progressionis $\frac{\frac{1}{2}n-1}{2}$, $\frac{\frac{1}{2}n-3}{4}$, $\frac{\frac{1}{2}n-5}{6}$, $\frac{\frac{1}{2}n-7}{8}$, $\frac{\frac{1}{2}n-9}{10}$, &c. Ubi n significat numerum dimensionum ipsius c in denominatore istius supremi termini. E. g. ut terminorum infra $\frac{1}{2274c^{11}}$ numerales coefficientes inveniuntur, pono $n=6$, ducoque $\frac{1}{22}$ (numeralem coefficientem ipsius $\frac{1}{2274c^6}$) in $\frac{\frac{1}{2}n-1}{2}$, hoc est, in 1; & prodit $\frac{1}{22}$, numeralis coefficientis termini proxime inferioris: dein duco hunc $\frac{1}{22}$ in $\frac{\frac{1}{2}n-3}{4}$, sive in $\frac{n-3}{4}$, hoc est, in $\frac{1}{4}$; & prodit $\frac{1}{88}$ numeralis coefficientis tertii termini in ista columna. Atque ista $\frac{1}{88} \times \frac{\frac{1}{2}n-5}{6}$ facit $\frac{1}{352}$ numeralem coefficientem quarti termini; & $\frac{1}{352} \times \frac{\frac{1}{2}n-7}{8}$ facit $\frac{1}{2815}$ numeralem coefficientem infini termini. Idem in aliis ad infinitum utque columnis præstari potest: Adeoque valor ipsius DG per hanc Regulam pro lubitu produci.

Adhæc, si BF dicatur x , sitque r latus rectum Ellipseos, & e $= \frac{r}{AB}$; Erit Arcus Ellipticus

$$\text{BG} = \sqrt{rx} \text{ in } 1 + \frac{2}{3r} \left\{ x - \frac{2}{3e} \right\} x + \frac{4}{5r^2} \left\{ x^2 - \frac{9e}{4} \right\} x^2 + \frac{10}{7r^3} \left\{ x^3 - \frac{30e}{8} \right\} x^3 + \frac{14}{9r^4} \left\{ x^4 - \frac{63e}{16} \right\} x^4 + \&c.$$

Quare, si ambitus totius Ellipseos desideretur; Biseca CB in F, & quære Arcum DG, per prius Theorema, & Arcum BG per posterius.


6. Si, vice versa, ex dato arcu Elliptico DG, quærat^r Sinus ejus CF; tum dicto $CD=r$, $\frac{CB^2}{CD}=c$, & arcu illo $DG=z$; Erit

$$CF = z - \frac{1}{6c^2} z^3 - \frac{1}{10c^3} z^5 - \frac{1}{147^2 c^4} z^7 - &c.$$

$$+ \frac{13}{120c^4} + \frac{71}{4290c^5} - \frac{493}{5040c^6}$$

Quæ autem de Ellipfi dicta sunt, omnia facile accommodantur ad Hyperbolam; mutatis tantum signis ipsorum c & e ubi sunt imparium dimensionum.


7. Præterea, si sit CE Hyperbola, cujus Asymptoti AD, AF rectum angulum FAD constituent; & ad AD erigantur utcumque perpendiculara BC, DE occurrentia Hyperbolæ in C & E: AB dicatur a , BC b , & area BCED z ;



Erit $BD = \frac{z}{b} + \frac{z^2}{2ab^2} + \frac{z^3}{6a^2b^3} + \frac{z^4}{24a^3b^4} + \frac{z^5}{120a^4b^5} + &c.$ Ubi coefficientes denominatorum prodeunt multiplicando terminos hujus Arithmetice progressionis, 1, 2, 3, 4, 5, &c. in se continuo. Et hinc ex Logarithmo dato potest numerus ei competens invenire.

8. Esto VDE Quadratrix, cujus vertex est V, existente A centro & AE semi-diametro Circuli ad quem aptatur, & angulo VAE recto: Demissoque ad AE perpendicularo quovis DB, & acta Quadratricis Tangente DT occurrente axi ejus AV in T: Dic AV = a , & AB = x ; Eritque $DB = a - \frac{x^2}{3a}$

$-\frac{x^4}{45a^3} - \frac{2x^6}{945a^5} - &c.$ Et $VT = \frac{x^2}{3a} + \frac{x^4}{15a^3} + \frac{2x^6}{189a^5} + &c.$ Et Area AVDB = $ax - \frac{x^3}{9a} - \frac{x^5}{215a^3} - \frac{2x^7}{6615a^5} - &c.$ Et Arcus VD = $x + \frac{2x^3}{27a^2} + \frac{14x^5}{2025a^4} + \frac{604x^7}{893025a^6} + &c.$ Unde vicissim, ex dato BD, vel VT, aut area AVDB, arcuve VD, per resolutionem affectarum æquationum erui potest x seu AB.



9. Esto denique AEB Sphæroides, revolutione Ellipseos AEB circa axem AB genita, & secta planis quatuor, AB per axem transiente, DG parallelo AB, CDE perpendiculariter bifecante axem, & FG parallelo CE: sitque recta CB = a , CE = c , CF = x , & FG = y . Et

Et Sphæroideos segmentum CDGF dictis quatuor planis comprehensum, erit + $2cx y - \frac{x}{3c} y^3 - \frac{x}{20c^3} y^5 - \frac{x}{56c^5} y^7 - \frac{5x}{576c^7} y^9 - \&c.$


$$-\frac{cx^3}{3a^2} - \frac{x^3}{18ca^2} - \frac{x^3}{40c^3a^2} - \frac{5x^3}{336c^5a^2} - \&c.$$

$$-\frac{cx^5}{20a^4} - \frac{x^5}{40ca^4} - \frac{3x^5}{160c^3a^4} - \&c.$$

$$-\frac{cx^7}{56a^6} - \frac{5x^7}{336ca^6} - \&c.$$

$$-\frac{5cx^9}{576a^8} - \&c.$$

$$-\&c.$$



Ubi numerales coefficientes supremorum terminorum ($2, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{18}, -\frac{1}{336}, \&c.$) in infinitum producuntur multiplicando primum coefficientem 2 continuo per terminos hujus progressionis

$$-\frac{1 \times 1}{2 \times 3}, \frac{1 \times 3}{4 \times 5}, \frac{3 \times 5}{6 \times 7}, \frac{5 \times 7}{8 \times 9}, \frac{7 \times 9}{10 \times 11}, \&c. \text{ Et numerales coefficientes terminorum}$$

in unaquaque columna descendunt in infinitum producuntur multiplicando continuo coefficientem supremi termini in prima columna per eandem progressionem, in secunda autem per terminos hujus

$$\frac{1 \times 1}{2 \times 3}, \frac{3 \times 3}{4 \times 5}, \frac{5 \times 5}{6 \times 7}, \frac{7 \times 7}{8 \times 9}, \&c. \text{ in tertia per terminos hujus } \frac{3 \times 1}{2 \times 3}, \frac{5 \times 3}{4 \times 5}, \frac{7 \times 5}{6 \times 7}, \frac{9 \times 7}{8 \times 9}, \&c.$$

in quarta per terminos hujus $\frac{5 \times 1}{2 \times 3}, \frac{7 \times 3}{4 \times 5}, \frac{9 \times 5}{6 \times 7}, \&c.$ in quinta per terminos

$$\text{hujus } \frac{7 \times 1}{2 \times 3}, \frac{9 \times 3}{4 \times 5}, \frac{11 \times 5}{6 \times 7}, \&c. \text{ Et sic in infinitum.}$$

Et eodem modo segmenta aliorum solidorum designari, & valores eorum aliquando commodè per series quasdam numerales in infinitum produci possunt.

Ex his videre est, quantum fines Analyseos per hujusmodi infinitas æquationes ampliantur: Quippe quæ, earum beneficio, ad omnia pæne dixerim problemata (si numeralia *Diophanti* & similia excipias) sese extendit.

Non tamen omnino universalis evadit, nisi per ultiores quasdam methodos eliciendi series infinitas. Sunt enim quædam Problemata in quibus non liceat ad series infinitas per divisionem vel extractionem radicum simplicium affectarumve, pervenire. Sed quomodo in istis casibus procedendum sit, jam non vacat dicere; ut neque alia quædam tradere quæ circa reductionem infinitarum series in finitas, ubi rei natura tulerit, excogitavi. Nam parcius scribo, quod hæc speculationes diu mihi fastidio esse coeperint, adeo ut ab iisdem jam per quinque fere annos abstinerim.

Unum tamen addam: quod postquam Problema aliquod ad infinitam æquationem deducitur, possint inde variæ approximationes


Gbe abscindet Tangentem *Ee* quam proxime æqualem arcui *BAb*; errore tantum existente $\frac{16x^3}{525d^3} \sqrt{dx} + \text{vel} - \&c.$ multo minore scilicet quam in Theoremate *Hugenii*. Quod si fiat $7AK : 3AH :: 3DH : n$; & capiatur $KG = CH - n$, erit error adhuc multo minor.

Atque ita, si Circuli segmentum aliquod *BAb* per Mechanicam designandum esset: Primo reducerem Aream istam in Infinitam seriem, puta hanc $BbA = \frac{4}{3}d^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} - \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{5d^{\frac{3}{2}}} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{14d^{\frac{5}{2}}} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{36d^{\frac{7}{2}}} - \&c.$ Dein quærerem

construções Mechanicas quibus hanc seriem proxime assequeretur; cujusmodi sunt hæ: Age rectam *AB*, & erit segmentum *BbA* $= \frac{2}{3}AB + BD \times \frac{1}{3}AD$ proxime; existente scilicet errore tantum $\frac{x^3}{70d^3} \sqrt{dx} + \&c.$ in defectu: Vel proximius, erit segmentum illud (bisecto *AD* in *F*, & acta recta *BF*) $= \frac{4BF + AB}{15} \times 4AD$; existente errore solummodo $\frac{x^3}{560d^3} \sqrt{dx} + \&c.$ qui semper minor erit quam $\frac{1}{1500}$ totius segmenti, etiamsi segmentum illud ad usque semicirculum augeatur.


Sic & in Ellipsi *BAb*, [*Vid. Fig. Præcedent.*] cujus vertex *A*, axis alteruter *AK*, & latus rectum *AP*; cape $PG = \frac{1}{2}AP + \frac{19AK - 21AP}{10AK} \times AP$. In Hyperbola vero, cape $PG = \frac{1}{2}AP + \frac{19AK + 21AP}{10AK} \times AP$. Et acta recta *GBE* abscindet tangentem *AE* quam proxime æqualem arcui Elliptico vel Hyperbolico *AB*, dummodo Arcus ille non sit nimis magnus.

Et pro Area segmenti Hyperbolici *BbA*; in *DP* cape $MD = \frac{3AD^2}{4AK}$, & ad *D* & *M* erige perpendiculara *Dβ*, *MN* occurrentia semicirculo super Diametro *AP* descripto: Eritque $\frac{4AN + AB}{15} \times 4AD = BbA$ proxime: Vel proximius, erit $\frac{21AN + 4AB}{75} \times 4AD = BbA$; si modocapiatur $DM = \frac{5AD^2}{7AK}$.



Fragmentum Epistolæ D. Newtoni, ad D. Oldenburgium 24 Octob. 1676 *missæ*.

Longitudo *Cissoïdis* sic constructur. Sit VD *Cissoïis*, AV Diameter Circuli ad quem aptatur, V vertex, AF Asymptota ejus, ac DB perpendicularare quodvis ad AV demissum. Cum semi-axe AF = AV, & semi-parametro AG = $\frac{1}{2}$ AV, describatur Hyperbola Fkk; & inter AB & AV sumpta AC media proportionali, erigantur ad C & V perpendiculara Ck, VK Hyperbolæ occurrentia in k & K; Et agantur rectæ KT, kt tangentés Hyperbolam in eisdem K & k, & occurrentes AV in T & t; Et ad AV constituatur rectangulum AVNM æquale spatio TKkt. Et *Cissoïdis* VD longitudo erit Sextupla altitudinis VN. Demonstratio perbrevis est.



[Quæ sequuntur scripta sunt in explicationem Epistolæ præcedentis.]

Quod vero attinet ad Inventionem terminorum *p*, *q*, *r*, (*vide* pag. 25 & 8:) in extractione Radicis affectæ, primum *p* sic eruo.


Descripto Angulo recto BAC, latera ejus BA, CA divido in partes æquales; & inde normales erigo distribuentes angulare spatium in æqualia parallelogramma vel quadrata, quæ concipio denominata esse a dimensionibus duarum indefinitarum specierum, puta *x* & *y*, regulariter ascendentium a termino A; prout vides in Fig. 1. inscriptas. Ubi *y* denotat Radicem extrahendam; & *x* alteram indefinitam quantitatem, ex cujus potestatibus series conficienda est. Deinde, cum Æquatio aliqua proponitur, parallelogramma singulis ejus terminis correspondentia insignio nota aliqua: Et Regula ad duo vel forte plura ex insignitis parallelogrammis applicata; quorum unum sit humillimum in columna sinistra juxta AB, & alia ad Regulam dextrorsum sita, cæteraque omnia non contingentia Regulam supra eam jaceant; Seligo

Fig. 1.

B	x ⁴	x ³ y	x ² y ²	xy ³	y ⁴
	x ³	x ² y	xy ²	xy ³	x ³ y ⁴
	x ²	x ² y	x ² y ²	x ² y ³	x ² y ⁴
	x	xy	xy ²	xy ³	xy ⁴
A	0	y	y ²	y ³	y ⁴
C					

terminos *Æquationis* per parallelogramma contingentia Regulam designatos, & inde quæro quantitatem Quotientis addendam.

Fig. 2.



Sic ad extrahendam Radicem y , ex $y^6 - 5xy^5 + \frac{x^2}{a}y^4 - 7a^2x^3y^3 + 6a^3x^4 + b^5x^5 = 0$; parallelogramma hujus terminis respondentia signo nota aliqua *; ut vides in Fig. 2. Dein applico Regulam DE ad inferiorem e locis signatis in sinistra columna; eamque ab inferioribus ad superiora dextrorsum gyrrare facio, donec alium similiter vel forte

plura e reliquis signatis locis cœperit attingere. Videoque loca sic attacta esse x^3 , x^2y^2 , & y^6 . E terminis itaque, $y^6 - 7a^2x^3y^3 + 6a^3x^4 - 5xy^5 + \frac{x^2}{a}y^4 = 0$, ponendo $y = v\sqrt{ax}$, quæro valorem y , & invenio quadruplicem, $+ \sqrt{ax}$, $- \sqrt{ax}$, $+ \sqrt{2ax}$, & $- \sqrt{2ax}$, quorum quemlibet pro primo termino Quotientis accipere licet, prout e radicibus quampiam extrahere decretum est.

Sic *Æquatio* $y^3 + axy + aay - x^3 - 2a^2 = 0$, quam resolvebam in priori Epistola, dat $-2a^3 + aay + y^3 = 0$, & inde $y = a$ proxime: Cum itaque a sit primus terminus valoris y , pono p pro cæteris omnibus in infinitum, & substituo $a + p = y$. (Obvenient hic aliquando difficultates nonnullæ; sed ex iis, credo, lector se proprio Marte extricabit.) Subsequentes vero termini q , r , s , &c. eodem modo ex æquationibus secundis, tertiis, cæterisque eruuntur, quo primus p e prima, sed cura leviori; quia cæteri valores y solent prodire dividendo terminum involventem infimam potestatem indefinitæ quantitatis x per Coefficientem radices p , q , r , aut s .

Intellexi credo ex superioribus, regressionem ab Areis curvarum ad Lineas rectas, fieri per hanc extractionem Radicis affectæ. Sed duo alii sunt modi quibus idem perficio.

Eorum unus affinis est Computationibus quibus colligebam approximationes sub finem alterius Epistolæ, & intelligi potest per hoc exemplum. Proponatur *Æquatio* ad Aream Hyperbolæ $z = x + \frac{1}{2}xx + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5$, &c. Et partibus ejus multiplicatis in se, emerget $z^2 = x^2 + x^3 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^5$, &c. $z^3 = x^3 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{4}x^5$, &c. $z^4 = x^4 + 2x^5$, &c. $z^5 = x^5$, &c. Jam de z aufero $\frac{1}{2}z^2$, & restat $z - \frac{1}{2}z^2 = x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{60}x^5$, &c. Huic addo $\frac{1}{6}z^3$, & fit $z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 = x + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{40}x^5$, &c. Aufero $\frac{1}{24}z^4$, & restat $z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 - \frac{1}{24}z^4 = x - \frac{1}{720}x^5$,

E

$-\frac{1}{120}x^5$, &c. Addo $\frac{1}{120}x^5$, & fit $z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 - \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5 = x$ quamproxime; five $x = z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 - \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5$, &c.

Eodem modo, Series de una indefinita quantitate, in aliam transferri possunt. Quemadmodum si posito r radio circuli, x sinu recto arcus z , & $x + \frac{x^3}{6r} + \frac{3x^5}{40r^3} + \&c.$ longitudine arcus istius; atque hanc Seriem a Sinu recto ad Tangentem vellem transferre: Quæro longitudinem Tangentis $\frac{rx}{\sqrt{1-x^2}}$, & reduco in infinitam Seriem $x + \frac{x^3}{2r} + \frac{3x^5}{8r^3} + \&c.$ Vocetur hæc quantitas, t . Colligo potestates ejus $t^3 = x^3 + \frac{3x^5}{2r^2}$ &c. $t^5 = x^5 + \&c.$ Aufero autem t de z , & restat $z - t = -\frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{120}x^5 - \&c.$ Addo $\frac{1}{2}t^3$, & fit $z - t + \frac{1}{2}t^3 = \frac{1}{2}x^5 + \&c.$ Aufero $\frac{1}{2}t^5$, & restat $z - t + \frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{2}t^5 = 0$ quamproxime. Quare est $z = t - \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{2}t^5 - \&c.$ Sed si quis in usus Trigonometricos me iussisset exhibere expressionem Arcus per Tangentem; eam non hoc circuitu, sed directa methodo quæsissem.

Per hoc genus Computi colliguntur etiam Series ex duabus vel pluribus indefinitis quantitatibus constantes; & Radices affectarum Æquationum magna ex parte extrahuntur. Sed ad hunc posteriorem usum adhibeo potius methodum in altera Epistola descriptam tanquam generaliore, & (Regulis pro Elisione superfluatorum terminorum habitis) paulo magis expeditam.

Pro Regressionem vero ab Arcis ad Lineas rectas, & similibus, possunt hujusmodi *Theoremata* adhiberi.

THEOREMA I. Sit $z = ay + by^2 + cy^3 + dy^4 + ey^5$, &c.

Et vicissim erit $y =$

$$\begin{aligned} & -\frac{b}{a^3} z^2 \\ & + \frac{2b^2 - ac}{a^5} z^3 \\ & + \frac{5abc - 5b^2 - a^2d}{a^7} z^4 \\ & + \frac{3a^2c^2 - 21ab^2c + 6a^2bd + 14b^3 - a^2e}{a^9} z^5 + \&c. \end{aligned}$$

Exempli gratia. Proponatur Æquatio ad Aream Hyperbolæ, $z = y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5$ &c. Et substitutis in Regula 1 pro a , $-\frac{1}{2}$ pro b , $\frac{1}{3}$ pro c , $-\frac{1}{4}$ pro d , & $\frac{1}{5}$ pro e ; vicissim exurgit, $y = z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4 + \&c.$

THEO.

THEOREMA II. Sit $z = ay + by^3 + cy^5 + dy^7 + ey^9 + \&c.$

Et vicissim erit $y = \frac{z}{a}$

$$- \frac{b}{a^4} z^3 \\ + \frac{3b^2 - ac}{a^7} z^5 \\ + \frac{8abc - a^2d - 12b^3}{a^{10}} z^7 \\ + \frac{55b^4 - 55ab^2c + 10a^2bd + 5c^2 - a^3e}{a^{13}} z^9 + \&c.$$

Exempli gratia. Proponatur Aequatio ad Arcum circuli, $z = y + \frac{y^3}{6rr} + \frac{3y^5}{40r^3} + \frac{5y^7}{112r^5} + \&c.$ Et substitutis in Regula 1 pro a , $\frac{1}{6r^2}$ pro b , $\frac{3}{40r^3}$ pro c , $\frac{5}{112r^5}$ pro d &c; orietur $y = z - \frac{z^3}{6r^2} + \frac{z^5}{120r^4} - \frac{z^7}{5040r^6} + \&c.$

*Fragmentum * Epistolæ D. Newtoni, ad D. Wallisium Anno 1692, missæ.*

Sub finem Epistolæ anni 1676 [*Hæc sunt verba Wallisii*] scribit [*D. Newtonus*] etiam Problema determinandi Curvas per conditiones Tangentium in sua potestate esse, una cum aliis difficilioribus; ad quæ solvenda se usum esse dicit duplici methodo, una concinniore, altera generaliore; & utramque literis transpositis celat: quæ in ordinem redactæ hanc sententiam exhibent. *Una methodus consistit in Extractione fluentis quantitatis ex æquatione simul involvente fluxionem ejus. Altera tantum in assumptione seriei pro quantitate qualibet incognita ex qua cætera commodè derivari possunt; & in collatione terminorum homologorum æquationis resultantis ad eruendos terminos assumptæ Seriei.* Harum methodorum Secunda ex verbis jam recitatis absque ulteriore explicatione intelligi potest; priorem ab Authore jam accepi ut sequitur.

Hæc methodus, ait, ejusdem est generis cum ea pro extrahendo radices ex æquationibus affectis superius descripta. Pone quod Problema resolvendum reducat ad æquationem fluentes quantitates y & z una cum earum fluxionibus \dot{y} & \dot{z} involventem, & quod fluxio ipsius z uniformis sit. Ut hæc fluxio ex æquatione evanescat, pro ea ponatur unitas, & manebit æquatio solas y , z & \dot{y} involvens, quam *Resolvendam* vocat. Proponitur, inventio ipsius y in Serie infinita convergente, quæ solam z involvet. Hoc in aliquibus æquationibus impossibile est, in aliis præparationem æquationum requirit, ubi vero directe confici possit resolutio est hujusmodi.

E 2

PRO-

* *Extat Epistola in Tom. 2, Operum Wallisii.*

P R O B L E M A.

Ex æquatione fluxionem radicis involvente radicem extrahere.

R E S O L U T I O.

TErmini omnes, ex eodem æquationis latere consistentes, æquantur nihilo, & ipsarum y & y dignitates (si opus sit) exaltentur vel deprimantur, sic ut earum indices nec alicubi negativi sint, nec tamen altiores quam ad hunc effectum requiritur; & sit kz^{λ} terminus infimæ dignitatis eorum qui neque per y neque per ejus fluxionem \dot{y} neque per earum dignitatem quamvis multiplicantur. Sit $lz^{\mu}y^{\nu}y^{\beta}$ terminus alius quilibet, & omnes ordine terminos percurrendo collige ex singulis seorsim numerum $\frac{\lambda-\mu+\nu}{\alpha+\beta}$ sic, ut tot habeas ejusmodi numeros quot sunt termini. Horum numerorum maximus vocetur ν , & z^{ν} erit dignitas primi termini Seriei. Pro ejus coefficiente ponatur a , & in æquatione quæ *resolvenda* dicitur scribe az^{ν} pro y , & $\nu az^{\nu-1}$ pro \dot{y} ; ac termini omnes resultantes in quibus z ejusdem est dignitatis ac in termino kz^{λ} , sub propriis signis collecti, ponantur æquales nihilo. Nam hæc æquatio debite reducta dabit coefficientem a . Sic habes az^{ν} terminum primum Seriei.

O P E R A T I O S E C U N D A.

Pro reliquis omnibus hujus Seriei terminis nondum inventis pone p , & habebis Æquationem $y = az^{\nu} + p$, & inde etiam Æquationem $\dot{y} = \nu az^{\nu-1} + \dot{p}$. In resolvenda, pro y & \dot{y} scribe hos eorum valores & habebis Resolvendam novam, ubi p officium præstat ipsius y : & ex hac Resolvenda primum extrahes terminum Seriei p eodem modo atque terminum primum Seriei totius $y = az^{\nu} + p$ ex Resolvenda prima extraxisti.

OPE-

OPERATIO TERTIA ET SEQUENTES.

Dein tertiam Resolvendam eadem ratione invenias atque secundam invenisti, & ex ea terminum tertium Seriei totius extrahes. Et similiter Resolvendam quartam invenies, & ex ea quartum Seriei terminum, & sic in infinitum. Series autem sic inventa erit radii Aequationis quam extrahere oportuit.

E X E M P L U M.

Ex Aequatione $y^2 z^2 - z^2 \ddot{y}y - d^2 z \dot{z} + dz \dot{z}^2 = 0$, extrahenda sit radix y . Pone $z = 1$, & Aequatio evadet $y^2 - z^2 y - dd + dz = 0$, quæ est Resolvenda. Jam vero terminus infimus in quo nec y neque \dot{y} reperitur, est dd , qui ipsi kz^2 æquatus dat $\lambda = 0$. Terminis reliquis y^2 , $-z^2 y$ pone $lz^{\mu} y^{\beta}$ æqualem successive, & inde in primo casu habebis $\mu = 0$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$, in secundo $\mu = 2$, $\alpha = 0$, & $\beta = 1$. Et hinc $\frac{\lambda - \mu + \beta}{\alpha + \beta}$ fit in primo casu 0, in secundo -1 . Unde y est 0, & az^{α} & $yz^{\alpha-1}$ sunt a & 0; quarum ultimæ duæ a & 0 in Resolvenda pro y & \dot{y} scriptæ, producunt $aa + 0z^2 - dd + dz$; & termini aa & $-dd$, in quibus index dignitatis z est λ seu 0, positi æquales nihilo dant $a = d$. Unde primus Seriei terminus az^{α} evadit d .

OPERATIO SECUNDA.

Pro terminis reliquis pone p , & habebis æquationem $y = d + p$, & inde $\dot{y} = \dot{p}$; qui valores in Resolvenda pro y & \dot{y} substituti dant Resolvendam novam $2dp + pp - zz\dot{p} + dz = 0$, ubi p & \dot{p} vices subeunt ipsarum y & \dot{y} . Terminus unicus in quo nec p neque \dot{p} reperitur est dz , qui cum termino kz^2 collatus dat $\lambda = 1$. Terminis reliquis $2dp$, pp & $-zz\dot{p}$ pone $lz^{\mu} p^{\alpha} \dot{p}^{\beta}$ æqualem successive; & inde in primo casu habebis $\mu = 0$, $\alpha = 1$, & $\beta = 0$; in secundo $\mu = 0$, $\alpha = 2$, & $\beta = 0$; & in tertio $\mu = 2$, $\alpha = 0$, & $\beta = 1$. Et hinc $\frac{\lambda - \mu + \beta}{\alpha + \beta}$ evadit primo casu 1, in secundo $\frac{1}{2}$, in tertio 0. Unde y est 1, & az^{α} & $yz^{\alpha-1}$ sunt az & a . Termini duo ultimi az & a in Resolvenda pro p & \dot{p} respective scripti, producunt $2daz + a^2 z^2 - az^2 + dz$. Et termini $2daz$

& dz in quibus index dignitatis z est λ seu 1 , positi æquales nihilo, dant $a = -\frac{1}{2}$. Unde az' terminus primus Seriei p fit $-\frac{1}{2}z$.

OPERATIO TERTIA.

Pro terminis reliquis nondum inventis pone q & habebis æquationem $p = -\frac{1}{2}z + q$, & inde $\dot{p} = -\frac{1}{2} + \dot{q}$: Qui valores pro p & \dot{p} in Resolvenda novissima substituti producant Resolvendam novam $2dq - zq + qq + \frac{1}{2}zz - zz\dot{q} = 0$. Ubi q & \dot{q} vices suppleant ipsorum y & \dot{y} . Terminus unicus in quo neque q nec \dot{q} reperitur est $\frac{1}{2}zz$, qui cum kz^λ collatus dat $\lambda = 2$. Terminis reliquis $2dq$, $-zq$, $+qq$, $-zz\dot{q}$ pone $1z^\mu q^\alpha \dot{q}^\beta$ æqualem successive; & inde in primo casu habebis $\mu = 0$, $\alpha = 1$, & $\beta = 0$; in secundo, $\mu = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$; in tertio, $\mu = 0$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$; in quarto $\mu = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$: & inde $\frac{\lambda - \mu + \beta}{\alpha + \beta}$ evadit in primo casu 2 , in secundo, tertio, & quarto 1 . Et hinc ν est 2 , vel az^ν & $\nu az^{\nu-1}$ sunt az^2 & $2az$: qui valores in Resolvenda pro q & \dot{q} substituti dant $2daz^2 - az^3 + aaz^2 + \frac{1}{2}zz - 2az^3$; & termini $2daz^2 + \frac{1}{2}zz$ in quibus index dignitatis z est λ seu 2 , positi æquales nihilo, dant $a = -\frac{3}{8d}$. Unde az' terminus primus Seriei q evadit $-\frac{3z}{8d}$.

OPERATIO QUARTA.

Pro reliquis Seriei terminis nondum inventis pone r , & habebis æquationes $q = -\frac{3z}{8d} + r$, & $\dot{q} = -\frac{3z}{4d} + \dot{r}$; & inde resolvendam novam $2dr + \frac{9z}{8d} - zr + \frac{9z^2}{64dd} - \frac{3z\dot{r}}{4d} + rr - zz\dot{r} = 0$; & ex ea per Methodum superiorem habebis $-\frac{9z}{16dd}$ terminum primum Seriei r . Et sic pergitur in infinitum.

Est igitur radix extrahenda $y = d + p = d - \frac{1}{2}z + q = d - \frac{1}{2}z - \frac{3z}{8d} + r = d - \frac{1}{2}z - \frac{3z}{8d} - \frac{9z}{16dd} + \text{\&c.}$ Et operationem continuando producere licet radicem ad terminos plures.

Et eadem methodo, dicit *Newtonus*, radices æquationum, fluxiones secundas, tertias, quartas, (\ddot{y} , $\ddot{\dot{y}}$, $\ddot{\ddot{y}}$,) aliasque involventium, extrahi posse.

His utitur radicum extractionibus ubi aliæ Methodi nil profunt.
Nam

Nam in Epistola prædicta anni 1676 docet, quod in Solutione problematum de Tangentibus inverforum, casus aliqui dantur in quibus hæc Methodus generalis non requiritur: & particulariter, si in triangulo rectangulo quod ab ordinata, tangente, & interjacente parte abscissæ constituitur, relatio duorum quorumlibet e lateribus tribus per æquationem quamvis definiatur; Problema absque Methodo hæc generali solvi poterit.

Methodi autem hæc omnes tam particulares quam generales collectionem sumptæ, solutionem exhibent secundæ partis problematis, quod *Newtonus* sub initio istius Epistolæ his verbis proposuit. *Data æquatione quotcunque fluentes quantitates involvente fluxiones invenire, & vice versa.* Nam tota fluxionum Methodus in hujus directæ & inversæ solutione consistit.

Part of a Letter from Sir *Is. Newton*, to
Mr. *J. Collins*, Novemb. 8. 1676.

THere is no Curve-line express'd by any Equation of three terms, tho' the unknown quantities affect one another in it, or the Indices of their Dignities be surd quantities (suppose $ax^{\lambda} + bx^{\mu}y^{\sigma} + cy^{\tau} = 0$, where x signifies the Base, y the Ordinate, $\lambda, \mu, \sigma, \tau$ the Indices of the dignities of x and y , and a, b, c known quantities with their signs $+$ or $-$.) I say, there is no such Curve-line, but I can, in less than half a quarter of an hour, tell whether it may be Squar'd, or what are the simplest Figures it may be compar'd with, be those Figures Conic Sections, or others: And then by a direct and short way, (I dare say the shortest the nature of the thing admits of, for a general one,) I can compare them. And so if any two Figures express'd by such Equations be propounded, I can, by the same Rule, compare them if they may be compar'd. This may seem a bold assertion, because it's hard to say a Figure may, or may not, be Squar'd, or Compar'd with another; but it's plain to me by the fountain I draw it from, tho' I will not undertake to prove it to others. The same Method extends to Equations of four Terms, and others also, but not so generally.

*Fragmentum Epistolæ D. Newtoni ad D. Collinium,
Novemb. 8. 1676, Latine redditum.*

Nulla extat Curva cujus Æquatio ex tribus constat terminis, in qua, licet quantitates incognitæ se mutuo afficiant, vel Indices dignitatum sint surdæ quantitates (v. g. $ax^{\lambda} + bx^{\mu}y^{\sigma} + cy^{\tau} = 0$, ubi x designat Basim, y Ordinatam $\lambda, \mu, \sigma, \tau$ Indices dignitatum ipsius x & y , & a, b, c quantitates cognitæ una cum signis suis + vel —) nulla inquam hujusmodi est Curva, de qua, an Quadrari possit, necne, vel quænam sint Figuræ simplicissimæ quibuscum comparari possit, siue sint Conicæ sectiones siue aliæ magis complicatæ, intra horæ octantem respondere non possim. Deinde * methodo directæ & brevi, imo methodorum omnium generalium brevissima eas comparare queo. Quinetiam si duæ quævis Figuræ per hujusmodi Æquationes expressæ proponantur, per eandem Regulam, eas, modo comparari possint, comparo.

Affirmatio quidem videri potest temeraria, propterea quod perdifficile sit dictu an Figura Quadrari vel cum alia comparari possit, necne; mihi autem manifestum est, ex eo unde deduxi fonte, quantum id aliis demonstrare in me suscipere nollem. Eadem methodus Æquationes quatuor terminorum aliasque complectitur, haud tamen adeo generaliter.



TRAC-

* Methodum habes in Coroll. 2. Prop. 10. Tract. sequentis.

TRACTATUS

D E

Quadratura Curvarum.

F

TRACTATUS

DE

Quædam Philosophia

INTRODUCTIO

A D

Quadraturam Curvarum.



Quantitates Mathematicas non ut ex partibus quam minimis constantes, sed ut motu continuo descriptas hic considero. Lineæ describuntur ac describendo generantur non per appositionem partium sed per motum continuum punctorum, superficies per motum linearum, solida per motum superficierum, anguli per rotationem laterum, tempora per fluxum continuum, & sic in cæteris. Hæ Geneses in rerum natura locum vere habent & in motu corporum quotidie cernuntur. Et ad hunc modum Veteres ducendo rectas mobiles in longitudinem rectarum immobilium genesin docuerunt rectangulorum.

Considerando igitur quod quantitates æqualibus temporibus crescentes & crescendo genitæ, pro velocitate majori vel minori quæ crescunt ac generantur, evadunt majores vel minores; methodum quærebam determinandi quantitates ex velocitatibus motuum vel incrementorum quibus generantur; & has motuum vel incrementorum velocitates nominando *Fluxiones* & quantitates genitas nominando *Fluentes*, incidi paulatim *Annis* 1665 & 1666 in Methodum Fluxionum qua hic usus sum in Quadratura Curvarum.

Fluxiones sunt quam proxime ut Fluentium augmenta æqualibus temporis particulis quam minimis genita, & ut accurate loquar, sunt in prima ratione augmentorum nascentium; exponi autem possunt per lineas quascunque quæ sunt ipsis proportionales.

Ut si areæ ABC, ABDG Ordinatis BC, BD super basi AB uniformi cum motu progredientibus describantur, harum arearum fluxiones erunt inter se ut Ordinatæ describentes BC & BD, & per Ordina-

Fluat quantitas x uniformiter & invenienda sit fluxio quantitatis x^n . Quo tempore quantitas x fluendo evadit $x + o$, quantitas x^n evadet $\frac{x+o}{x} \frac{x^n}{o}$, id est per methodum serierum infinitarum, $x^n + nox^{n-1} + \frac{nn-n}{2} oo x^{n-2} + \&c.$ Et augmenta o & $no x^{n-1} + \frac{nn-n}{2} oo x^{n-2} + \&c.$ sunt ad invicem ut 1 & $nx^{n-1} + \frac{nn-n}{2} oo x^{n-2} + \&c.$ Evanescant jam augmenta illa, & eorum ratio ultima erit 1 ad nx^{n-1} : ideoque fluxio quantitatis x est ad fluxionem quantitatis x^n ut 1 ad nx^{n-1} .

Similibus argumentis per methodum rationum primarum & ultimarum colligi possunt fluxiones linearum seu rectarum seu curvarum in casibus quibuscunque, ut & fluxiones superficierum, angulorum & aliarum quantitatum. In finitis autem quantitatibus Analysis sic instituere, & finitarum nascentium vel evanescentium rationes primas vel ultimas investigare, consonum est Geometriæ Veterum: & volui ostendere quod in Methodo Fluxionum non opus sit figuras infinite parvas in Geometriam introducere. Peragi tamen potest Analysis in figuris quibuscunque seu finitis seu infinite parvis quæ figuris evanescentibus finguntur similes, ut & in figuris quæ per Methodos Indivisibilium pro infinite parvis haberi solent, modo caute procedas.

Ex Fluxionibus invenire Fluentes Problema difficilius est, & solutionis primus gradus æquipollet Quadraturæ Curvarum; de qua sequentia olim scripsi.



D E

Quadratura Curvarum.

Quantitates indeterminatas ut motu perpetuo crescentes vel decrescientes, id est ut fluentes vel defluentes in sequentibus considero, designoque literis z, y, x, v , & earum fluxiones seu celeritates crescendi noto iisdem literis punctatis $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{v}$. Sunt & harum fluxionum fluxiones seu mutationes magis aut minus celeres quas ipsarum z, y, x, v , fluxiones secundas nominare licet & sic designare $\ddot{z}, \ddot{y}, \ddot{x}, \ddot{v}$, & harum fluxiones primas seu ipsarum z, y, x, v fluxiones tertias sic $\ddot{\dot{z}}, \ddot{\dot{y}}, \ddot{\dot{x}}, \ddot{\dot{v}}$, & quartas sic $\ddot{\ddot{z}}, \ddot{\ddot{y}}, \ddot{\ddot{x}}, \ddot{\ddot{v}}$. Et quemadmodum $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{v}$ sunt fluxiones quantitatum z, y, x, v , & hæ sunt fluxiones quantitatum $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{v}$, & hæ sunt fluxiones quantitatum primarum z, y, x, v : sic hæ quantitates considerari possunt ut fluxiones aliarum quas sic designabo, $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{v}$, & hæ ut fluxiones aliarum, $\ddot{z}, \ddot{y}, \ddot{x}, \ddot{v}$, & hæ ut fluxiones aliarum $\ddot{\dot{z}}, \ddot{\dot{y}}, \ddot{\dot{x}}, \ddot{\dot{v}}$. Designant igitur $\dot{z}, \dot{z}, \dot{z}, \dot{z}, \dot{z}, \dot{z}, \dot{z}, \dot{z}$, &c. seriem quantitatum quarum quælibet posterior est fluxio præcedentis & quælibet prior est fluens quantitas fluxionem habens subsequenter. Similis est series $\sqrt{\frac{az+zz}{az-zz}}, \sqrt{\frac{az+zz}{az-zz}}, \sqrt{\frac{az+zz}{az-zz}}, \sqrt{\frac{az+zz}{az-zz}}, \sqrt{\frac{az+zz}{az-zz}}, \sqrt{\frac{az+zz}{az-zz}}$, ut & series $\frac{az+zz}{a-z}, \frac{az+zz}{a-z}, \frac{az+zz}{a-z}, \frac{az+zz}{a-z}, \frac{az+zz}{a-z}, \frac{az+zz}{a-z}$.

Et notandum est quod quantitas quælibet prior in his seriebus est ut area figuræ curvilinæ cujus ordinatim applicata rectangula est quantitas posterior & abscissa est z : uti $\frac{az+zz}{a-z}$ area curvæ cujus ordinata est $\sqrt{az-zz}$ & abscissa z . Quo autem spectant hæc omnia patebit in Propositionibus quæ sequuntur.

PROP.

PROP. I. PROB. I.

Data æquatione quocunque fluentes quantitates involvente, invenire fluxiones.

Solutio.

Multiplicetur omnis æquationis terminus per indicem dignitatis quantitatis cujusque fluentis quam involvit, & in singulis multiplicationibus mutetur dignitatis latus in fluxionem suam, & aggregatum factorum omnium sub propriis signis erit æquatio nova.

Explicatio.

Sunto a, b, c, d &c. quantitates determinatæ & immutabiles, & proponatur æquatio quævis quantitates fluentes z, y, x &c. involvens, uti $x^3 - xy^2 + a^2z - b^3 = 0$. Multiplicentur termini primo per indices dignitatum x , & in singulis multiplicationibus præ dignitatis latere, seu x unius dimensionis, scribatur x , & summa factorum erit $3xx^2 - xy^2$. Idem fiat in y & prodibit $-2xyy$. Idem fiat in z & prodibit $aa z$. Ponatur summa factorum æqualis nihilo, & habebitur æquatio $3xx^2 - xy^2 - 2xyy + a^2z = 0$. Dico quod hac æquatione definitur ratio fluxionum.

Demonstratio.

Nam fit o quantitas admodum parva & sunt oz, oy, ox , quantitatum z, y, x momenta id est incrementa momentanea synchrona. Et si quantitates fluentes jam sunt z, y & x hæc post momentum temporis incrementis suis oz, oy, ox auctæ, evadent $z + oz, y + oy, x + ox$, quæ in æquatione prima pro z, y , & x scrip-

scriptæ dant æquationem $\dot{x}^3 + 3\dot{x}^2\dot{o}\dot{x} + 3\dot{x}\dot{o}^2\dot{x}\dot{x} + \dot{o}^3\dot{x}^3 - \dot{x}\dot{y}^2 - \dot{o}\dot{x}\dot{y}^2$
 $- 2\dot{x}\dot{o}\dot{y}\dot{y} - 2\dot{x}\dot{o}^2\dot{y}\dot{y} - \dot{x}\dot{o}^3\dot{y}\dot{y} - \dot{x}\dot{o}^3\dot{y}\dot{y} + a^2\dot{z} + a^2\dot{o}\dot{z} - b^3 = 0.$

Subducatur æquatio prior, & residuum divisum per \dot{o} erit $3\dot{x}\dot{x}^2$
 $+ 3\dot{x}\dot{x}\dot{o}\dot{x} + \dot{x}^3\dot{o}^2 - \dot{x}\dot{y}^2 - 2\dot{x}\dot{y}\dot{y} - 2\dot{x}\dot{o}\dot{y}\dot{y} - \dot{x}\dot{o}\dot{y}\dot{y} - \dot{x}\dot{o}^2\dot{y}\dot{y} + a^2\dot{z} = 0.$ Mi-
 nuatur quantitas \dot{o} in infinitum, & neglectis terminis evanescentibus
 restabit $3\dot{x}\dot{x}^2 - \dot{x}\dot{y}^2 - 2\dot{x}\dot{y}\dot{y} + a^2\dot{z} = 0.$ Q. E. D.

Explicatio plenior.

Ad eundem modum si æquatio esset $\dot{x}^3 - \dot{x}\dot{y}^2 + a^2\sqrt{\dot{a}\dot{x} - \dot{y}} - b^3 = 0,$
 produceretur $3\dot{x}^2\dot{x} - \dot{x}\dot{y}^2 - 2\dot{x}\dot{y}\dot{y} + a^2\sqrt{\dot{a}\dot{x} - \dot{y}} = 0.$ Ubi si fluxionem
 $\sqrt{\dot{a}\dot{x} - \dot{y}}$ tollere velis, pone $\sqrt{\dot{a}\dot{x} - \dot{y}} = z,$ & erit $\dot{a}\dot{x} - \dot{y}^2 = z^2,$ & (per
 hanc Propositionem) $\dot{a}\dot{x} - 2\dot{y}\dot{y} = 2z\dot{z}$ seu $\frac{\dot{a}\dot{x} - 2\dot{y}\dot{y}}{2z} = \dot{z},$ hoc est $\frac{\dot{a}\dot{x} - 2\dot{y}\dot{y}}{2\sqrt{\dot{a}\dot{x} - \dot{y}}}$
 $= \sqrt{\dot{a}\dot{x} - \dot{y}}.$ Et inde $3\dot{x}^2\dot{x} - \dot{x}\dot{y}^2 - 2\dot{x}\dot{y}\dot{y} + \frac{\dot{a}^3\dot{x} - 2\dot{a}^2\dot{y}\dot{y}}{2\sqrt{\dot{a}\dot{x} - \dot{y}}} = 0.$

Et per operationem repetitam pergitur ad fluxiones secundas, ter-
 tias & sequentes. Sit æquatio $\dot{z}\dot{y}^3 - \dot{z}^4 + a^4 = 0,$ & fiet per opera-
 tionem primam $\dot{z}\dot{y}^3 + 3\dot{z}\dot{y}\dot{y}^2 - 4\dot{z}\dot{z}^3 = 0,$ per secundam $\dot{z}\dot{y}^3 + 6\dot{z}\dot{y}\dot{y}^2$
 $+ 3\dot{z}\dot{y}\dot{y}^2 + 6\dot{z}\dot{y}^2\dot{y} - 4\dot{z}\dot{z}^3 - 12\dot{z}^2\dot{z}^2 = 0,$ per tertiam $\dot{z}\dot{y}^3 + 9\dot{z}\dot{y}\dot{y}^2 + 18\dot{z}\dot{y}^2\dot{y}$
 $+ 3\dot{z}\dot{y}\dot{y}^2 + 18\dot{z}\dot{y}\dot{y}\dot{y} + 6\dot{z}\dot{y}^3 - 4\dot{z}\dot{z}^3 - 36\dot{z}\dot{z}\dot{z}^2 - 24\dot{z}^3\dot{z} = 0.$

Ubi vero sic pergitur ad fluxiones secundas, tertias & sequentes,
 convenit quantitatem aliquam ut uniformiter fluentem considerare,
 & pro ejus fluxione prima unitatem scribere, pro secunda vero & se-
 quentibus nihil. Sit æquatio $\dot{z}\dot{y}^3 - \dot{z}^4 + a^4 = 0,$ ut supra; & fluat z
 uniformiter, sitque ejus fluxio unitas, & fiet per operationem pri-

mam $\dot{y}^3 + 3\dot{z}\dot{y}\dot{y}^2 - 4\dot{z}^3 = 0,$ per secundam $6\dot{y}\dot{y}^2 + 3\dot{z}\dot{y}\dot{y}^2 + 6\dot{z}\dot{y}^2\dot{y} - 12\dot{z}^2$
 $= 0,$ per tertiam $9\dot{y}\dot{y}^2 + 18\dot{y}^2\dot{y} + 3\dot{z}\dot{y}\dot{y}^2 + 18\dot{z}\dot{y}\dot{y}\dot{y} + 6\dot{z}\dot{y}^3 - 24\dot{z}^3 = 0.$

In hujus autem generis æquationibus concipiendum est quod fluxio-
 nes in singulis terminis sint ejusdem ordinis, id est vel omnes primi

ordinis \dot{y} , \dot{z} , vel omnes secundi \ddot{y} , \dot{y}^2 , $\dot{y}\dot{z}$, \dot{z}^2 , vel omnes tertii \ddot{y} , $\ddot{y}\dot{y}$, $\dot{y}\dot{z}$, \dot{y}^3 , $\dot{y}^2\dot{z}$, $\dot{y}\dot{z}^2$, \dot{z}^3 , &c. Et ubi res aliter se habet complendus est ordo per subintellectas fluxiones quantitatis uniformiter fluentis.

Sic æquatio novissima complendo ordinem tertium fit $9\ddot{y}\dot{y}^2 + 18\dot{z}\dot{y}^2\dot{y} + 3\dot{z}\dot{y}\dot{y}^2 + 18\ddot{z}\dot{y}\dot{y}\dot{y} + 6\dot{z}\dot{y}^3 - 24\dot{z}\dot{z}^3 = 0$.

PROP. II. PROB. II.

Invenire Curvas quæ quadrari possunt.

Sit ABC figura inveniendi, BC Ordinatum applicata rectangula, & AB abscissa. Producat CB ad E ut sit BE = 1, & compleatur parallelogrammum ABED, & arearum ABC, ABED fluxiones erunt ut BC & BE. Affumatur igitur æquatio quævis qua relatio arearum definitur, & inde dabitur relatio ordinatarum BC & BE per Prop. I. Q. E. I.



Hujus rei exempla habentur in Propositionibus duabus sequentibus.

PROP. III. THEOR. I.

Si pro abscissa AB & area AE seu $AB \times 1$ promiscue scribatur z , & si pro $e + fz^n + gz^{2n} + hz^{3n} + \&c.$ scribatur R: sit autem area Curvæ $z^b R^a$, erit ordinatum applicata BC æqualis

$$\frac{\theta e + \theta \times f z^n + \theta \times g z^{2n} + \theta \times h z^{3n} + \&c. \times z^{b-1} R^{a-1}}{+ \lambda \eta \quad + 2 \lambda \eta \quad + 3 \lambda \eta}$$

Demonstratio.

Nam si fit $z^b R^a = v$, erit (per Prop. I) $\theta z z^{b-1} R^a + \lambda z^b R R^{a-1} = \dot{v}$. Pro R^a in primo æquationis termino & z^b in secundo scribe RR^{a-1} & $z z^{b-1}$, & fiet $\theta z R + \lambda z R$ in $z^{b-1} R^{a-1} = v$. Erat autem $R = e + fz^n + gz^{2n}$

$+gz^{2n} + bz^{3n} + \&c.$ & inde (per Prop. I) fit $\dot{R} = \eta f z^{2n-1} + 2\eta g z^{2n-2} + 3\eta h z^{2n-3} + \&c.$ quibus substitutis & scripta BE seu x pro z , fiet

$$\frac{\theta e + \theta \times f z^{2n} + \theta \times g z^{2n} + \theta \times h z^{3n} + \&c. \times z^{\theta-1} R^{\lambda-1}}{+ \lambda \eta \quad + 2 \lambda \eta \quad + 3 \lambda \eta} = \dot{v} = BC.$$

Q. E. D.

PROP. IV. THEOR. II.

Si Curvæ abscissa AB fit z , & si pro $e + fz^n + gz^{2n} + \&c.$ scribatur R , & pro $k + lz^n + mz^{2n} + \&c.$ scribatur S ; fit autem area Curvæ $z^\theta R^\lambda S^\mu$: Erit ordinatim applicata BC æqualis

$$\left. \begin{array}{l} \theta ek + \theta \times f k z^n + \theta \times g k z^{2n} \dots * \dots * \dots \\ + \lambda \eta \quad + 2 \lambda \eta \\ + \theta \times e l z^n + \theta \times f l z^{2n} + \theta \times g l z^{3n} \dots * \dots \\ + \mu \eta \quad + \lambda \eta \quad + 2 \lambda \eta \\ + \mu \eta \quad + \mu \eta \\ + \theta \times e m z^{2n} + \theta \times f m z^{3n} + \theta \times g m z^{4n} \\ + 2 \mu \eta \quad + \lambda \eta \quad + 2 \lambda \eta \\ \quad + 2 \mu \eta \quad + 2 \mu \eta \end{array} \right\} \times z^{\theta-1} R^{\lambda-1} S^{\mu-1}$$

Demonstratur ad modum Propositionis superioris.

PROP. V. THEOR. III.

Si Curvæ abscissa AB fit z , & pro $e + fz^n + gz^{2n} + bz^{3n} + \&c.$ scribatur R : fit autem Ordinatum applicata $z^{\theta-1} R^{\lambda-1} \times a + bz^n + cz^{2n} + dz^{3n} + \&c.$ & ponatur $\frac{\theta}{n} = r$, $r + \lambda = s$, $s + \lambda = t$, $t + \lambda = v$, &c.

Erit Area = $z^\theta R^\lambda$ in $+$

$$\begin{array}{l} \frac{\frac{1}{n} a}{r \times} \\ + \frac{\frac{1}{n} b - f A}{r + 1 \times e} z^\eta \\ + \frac{\frac{1}{n} c - f + 1 \times f B - f g A}{r + 1 \times e} z^{2\eta} \\ + \frac{\frac{1}{n} d - f + 2 \times f c - f + 1 \times g B - v b A}{r + 1 \times e} z^{3\eta} \\ + \frac{\frac{1}{n} e - f + 3 \times f d - f + 2 \times g c - v + 1 \times h B}{r + 1 \times e} z^{4\eta} \\ + \&c. \end{array}$$

G 2

Ubi

Ubi A, B, C, D , &c. denotant totas coefficientes datas terminorum singulorum in serie cum signis suis + & —, nempe

A primi termini coefficientem $\frac{\frac{1}{n}a}{re}$

B secundi termini coefficientem $\frac{\frac{1}{n}b - \frac{1}{r}fA}{r+1 \times e}$

C tertii termini coefficientem $\frac{\frac{1}{n}c - \frac{1}{r+1} \times fB - \frac{1}{r}gA}{r+2 \times e}$

Et sic deinceps.

Demonstratio.

Sunto juxta Propositionem tertiam:

CURVARUM ORDINATÆ	ARÆÆ
1. $\theta eA + \theta \times fAz^n + \theta \times gAz^{2n} + \theta \times bAz^{3n}, \&c.$	$\left\{ \begin{array}{l} Az^{\theta} R^{\lambda} \\ Bz^{\theta+n} R^{\lambda} \\ Cz^{\theta+2n} R^{\lambda} \\ Dz^{\theta+3n} R^{\lambda} \end{array} \right.$
2. $\dots + \theta + \eta \times eBz^n + \theta + \eta \times fBz^{2n} + \theta + \eta \times gBz^{3n} \&c.$	
3. $\dots + \theta + 2\eta \times eCz^{2n} + \theta + 2\eta \times fCz^{3n} \&c.$	
4. $\dots + \theta + 3\eta \times eDz^{3n} \&c.$	

$\left. \begin{array}{l} \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \end{array} \right\} \times z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$

Et si summa Ordinarum ponatur æqualis Ordinatæ $a + bz^n + cz^{2n} + dz^{3n} + \&c.$ in $z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$, summa arearum $z^{\theta} R^{\lambda}$ in $A + Bz^n + Cz^{2n} + Dz^{3n} + \&c.$ æqualis erit aræ Curvæ cujus ista est Ordinata. Æquatur igitur Ordinarum termini correspondentes,

& fiet $a = \theta eA,$

$b = \theta + \lambda\eta \times fA + \theta + \eta \times eB,$

$c = \theta + 2\lambda\eta \times gA + \theta + \eta + \lambda\eta \times fB + \theta + 2\eta \times eC,$
&c.

& inde $A = \frac{a}{\theta e}$

$B = \frac{b - \theta - \lambda\eta \times fA}{\theta + \eta \times e}$

$C = \frac{c - \theta - 2\lambda\eta \times gA - \theta - \eta - \lambda\eta \times fB}{\theta + 2\eta \times e}$

Et sic deinceps in infinitum.

Pone

Ponē jam $\frac{b}{a}=r$, $r+\lambda=s$, $s+\lambda=t$, &c. & in area $z^0 R^a$ in $A+Bz^n+Cz^{2n}+Dz^{3n}+\&c.$ scribe ipsorum A, B, C , &c. valores inventos, & prodibit series proposita. Q. E. D.

Et notandum est quod Ordinata omnis duobus modis in seriem resolvitur. Nam index η vel affirmativus esse potest vel negativus.

Proponatur Ordinata $\frac{3k-lz}{z\sqrt{kz-lz+mz}}$: Hæc vel sic scribi potest $z^{-\frac{1}{2}} \times 3k - lz^2 \times k - lz^2 + mz^3 \Big|^{-\frac{1}{2}}$,
vel sic $z^{-2} \times l + 3kz^{-2} \times m - lz^{-1} + kz^{-3} \Big|^{-\frac{1}{2}}$.

In casu priore est $a=3k$, $b=0$, $c=-l$, $e=k$, $f=0$, $g=-l$, $h=m$, $\lambda=\frac{1}{2}$, $\eta=1$, $\theta=1$, $\theta=-\frac{1}{2}$, $\theta=-\frac{1}{2}=r$, $s=-1$, $t=-\frac{1}{2}$, $v=0$.

In posteriore est $a=-l$, $b=0$, $c=3k$, $e=m$, $f=-l$, $g=0$, $h=k$, $\lambda=\frac{1}{2}$, $\eta=-1$, $\theta=1$, $\theta=-2$, $\theta=-1$, $r=1$, $s=1$, $t=2$, $v=2\frac{1}{2}$. Tentandus est casus uterque. Et si serierum alterutra ob terminos tandem deficientes abruptitur ac terminatur habebitur area Curvæ in terminis finitis. Sic in exempli hujus priore casu scribendo in serie valores ipsorum $a, b, c, e, f, g, h, \lambda, \theta, r, s, t, v$, termini omnes post primum evanescunt in infinitum & area Curvæ prodit $-2\sqrt{\frac{k-lz+mz}{z}}$. Et hæc area ob signum negativum adjacet ab-

scissæ ultra ordinatam productæ. Nam area omnis affirmativa adjacet tam abscissæ quam ordinatæ, negativa vero cadit ad contrarias partes ordinatæ & adjacet abscissæ productæ, manente scilicet signo Ordinatæ. Hoc modo series alterutra & nonnunquam utraque semper terminatur & finita evadit si Curva geometricè quadrari potest. At si Curva talem quadraturam non admittit, series utraque continuabitur in infinitum, & earum altera converget & aream dabit approximando, præterquam ubi r (propter aream infinitam) vel nihil est vel numerus integer & negativus, vel ubi $\frac{z^n}{r}$ æqualis est unitati. Si $\frac{z^n}{r}$ minor est unitate, converget series in qua index η affirmativus est: si $\frac{z^n}{r}$ unitate major est, converget series altera. Si in uno casu area adjacet abscissæ ad usque ordinatam ductæ, in altero adjacet abscissæ ultra ordinatam productæ.

Nota insuper quod si Ordinata contentum est sub factore rationali Q & factore furdo irreducibili R^r & factoris furdi latus R non dividit factorem rationalem Q ; erit $\lambda=1$ π & $R^{a-1}=R^r$. Sin factoris fur-

di latus R dividit factorem rationalem semel, erit $\lambda - 1 = \pi + 1$ & $R^{\lambda-1} = R^{\pi+1}$: si dividit bis, erit $\lambda - 1 = \pi + 2$ & $R^{\lambda-1} = R^{\pi+2}$: si ter, erit $\lambda - 1 = \pi + 3$, & $R^{\lambda-1} = R^{\pi+3}$: & sic deinceps.

Si Ordinata est fractio rationalis irreducibilis cum denominatore ex duobus vel pluribus terminis composito: resolvendus est denominator in divisores suos omnes primos. Et si divisor sit aliquis cui nullus alius est æqualis, Curva quadrari nequit: Sin duo vel plures sint divisores æquales, rejiciendus est eorum unus, & si adhuc alii duo vel plures sint sibi mutuo æquales & prioribus inæquales, rejiciendus est etiam eorum unus, & sic in aliis omnibus æqualibus si adhuc plures sint: deinde divisor qui relinquitur vel contentum sub divisoribus omnibus qui relinquuntur, si plures sunt, ponendum est pro R , & ejus quadrati reciprocum R^{-2} pro $R^{\lambda-1}$, præterquam ubi contentum illud est quadratum vel cubus vel quadrato quadratum, &c. quo casu ejus latus ponendum est pro R & potestatis index 2 vel 3 vel 4 negative sumptus pro λ . & Ordinata ad denominatorem R^3 vel R^3 vel R^4 vel R^5 &c. reducenda.

Ut si Ordinata sit $\frac{z^5 + z^4 - 8z^3}{z^5 + z^4 - 3z^3 - z^2 + 8z - 4}$; quoniam hæc fractio irreducibilis est & denominatoris divisores sunt pares, nempe $z - 1$, $z - 1$, $z - 1$ & $z + 2$, $z + 2$, rejicio magnitudinis utriusque diviso rem unum, & reliquorum $z - 1$, $z - 1$, $z + 2$ contentum $z^3 - 3z + 2$ pono pro R & ejus quadrati reciprocum $\frac{1}{R^2}$ seu R^{-2} pro $R^{\lambda-1}$. Dein Ordinam ad denominatorem R^2 seu $R^{\lambda-1}$ reduco, & fit $\frac{z^6 - 9z^4 + 8z^3}{z^3 - 3z + 2}$, i. e. $z^3 \times \frac{z^3 - 9z + 8}{z^3 - 3z + 2}$. Et inde est $a = 8$, $b = -9$, $c = 0$, $d = 1$, &c. $e = 2$, $f = -3$, $g = 0$, $h = 1$, $\lambda - 1 = -2$, $\lambda = -1$, $\eta = 1$, $\theta - 1 = 3$, $\theta = 4 = r$, $s = 3$, $t = 2$, $v = 1$. Et his in serie scriptis prodit area $\frac{z^4}{z^3 - 3z + 2}$, terminis omnibus in tota serie post primum evanescen-
tibus.

Si denique Ordinata est fractio irreducibilis & ejus denominator contentum est sub factore rationali Q & factore furdo irreducibili R^r , inveniendi sunt lateris R diviso res omnes primi, & rejiciendus est divisor unus magnitudinis cujusque & per diviso res qui restant, siqui sint, multiplicandus est factor rationalis Q : & si factum æquale est lateri R vel lateris illius potestati alicui cujus index est numerus integer, esto index ille m , & erit $\lambda - 1 = -\pi - m$, & $R^{\lambda-1} = R^{-\pi-m}$.

Ut

Ut si Ordinata sit $\frac{3q^2 - 9qx + 9q^2x - q^2x^2 - 6x^3}{q^2 - x^2 \times q^2 + q^2x - qx^2 - x^2} \frac{1}{3}$, quoniam factoris furdi latus

R seu $q^3 + q^2x - qx^2 - x^3$ divisores habet $q + x$, $q + x$, $q - x$ qui duarum sunt magnitudinum, rejicio divisorem unum magnitudinis utriusque & per divisorem $q + x$ qui relinquitur, multiplico factorem rationalem $q^2 - x^2$. Et quoniam factum $q^3 + q^2x - qx^2 - x^3$ æquale est lateri R , pono $m = 1$, & inde, cum π sit $\frac{1}{3}$, fit $\lambda - 1 = -\frac{4}{3}$. Ordinatum igitur reduco ad denominatorem $R - \frac{1}{3}$, & fit

$$x^0 \times \frac{3q^6 + 2q^5x + 8q^4x^2 + 8q^3x^3 - 7q^2x^4 - 6qx^5 \times q^3 + q^2x - qx^2 - x^3}{q^2 - x^2} \frac{1}{3}$$

Unde est $a = 3q^6$, $b = 2q^5$ &c. $e = q^3$, $f = q^2$ &c. $\theta = 0$, $\theta = 1 = \eta$, $\lambda = -\frac{4}{3}$, $r = 1$, $s = \frac{1}{3}$, $t = \frac{1}{3}$, $v = 0$. Et his in serie scriptis prodit area $\frac{3q^2x + 3x^3}{q^2 + q^2x - qx^2 - x^3} \frac{1}{3}$, terminis omnibus in serie tota post tertium evanescentibus.

PROP. VI. THEOR. IV.

Si Curvæ abscissa AB fit z , & scribantur R pro $e + fz^{2n} + gz^{2n} + bz^{2n} + \&c.$ & S pro $k + lz^{2n} + mz^{2n} + nz^{2n} + \&c.$ fit autem Ordinatum applicata z^{2n-1} $R^{\lambda-1}$ $S^{\mu-1}$ in $a + bz^{2n} + cz^{2n} + dz^{2n} + \&c.$ & si terminorum, $e, f, g, h, \&c.$ & $k, l, m, n, \&c.$ rectangula sint

$$\begin{aligned} ek \quad fk \quad gk \quad hk \quad \&c. \\ el \quad fl \quad gl \quad hl \quad \&c. \\ em \quad fm \quad gm \quad hm \quad \&c. \\ en \quad fn \quad gn \quad hn \quad \&c. \end{aligned}$$

Et si rectangulorum illorum coefficientes numerales sint respective

$$\frac{e}{n} = r. \quad r + \lambda = s. \quad s + \lambda = t. \quad t + \lambda = v. \quad \&c.$$

$$r + \mu = s. \quad s + \mu = t. \quad t + \mu = v. \quad v + \mu = w. \quad \&c.$$

$$s + \mu = t. \quad t + \mu = v. \quad v + \mu = w. \quad w + \mu = x. \quad \&c.$$

$$t + \mu = v. \quad v + \mu = w. \quad w + \mu = x. \quad x + \mu = y. \quad \&c.$$

Area

Area Curvæ erit hæc

$$\begin{aligned}
 & z^{\theta} R^{\lambda} S^{\eta} \ln + \frac{\frac{1}{2} a}{r k} \\
 & + \frac{\frac{1}{2} b - \frac{1}{2} f k A}{r + 1 \times e k} \\
 & + \frac{\frac{1}{2} c - \frac{1}{2} g + \frac{1}{2} f k B - \frac{1}{2} h l A}{r + 1 \times e l - 1 \times e m} z^{2\eta} \\
 & + \frac{\frac{1}{2} d - \frac{1}{2} i + \frac{1}{2} g k C - \frac{1}{2} j f l B - \frac{1}{2} k h k A}{r + 2 \times e k} \\
 & + \frac{\frac{1}{2} e - \frac{1}{2} l + \frac{1}{2} h k C - \frac{1}{2} i' + \frac{1}{2} f l' B - \frac{1}{2} j' f m}{r + 3 \times e k} z^{3\eta} \\
 & + \&c.
 \end{aligned}$$

Ubi A denotat termini primi coefficientem datam $\frac{1}{2} \frac{a}{r k}$ cum signo suo + vel —, B coefficientem datam secundi, C coefficientem datam tertii, & sic deinceps. Terminorum vero, $a, b, c, \&c. e, f, g, \&c. k, l, m, \&c.$ unus vel plures deesse possunt.

Demonstratur Propositio ad modum præcedentis, & quæ ibi notantur hic obtinent. Pergit autem series talium Propositionum in infinitum, & progressio seriei manifesta est.

PRO P. VII. THEOR. V.

Si pro $e + f z^{\eta} + g z^{2\eta} + \&c.$ scribatur R ut supra, & in Curvæ aliqujus Ordinata $z^{\theta \pm \eta \tau} R^{\lambda \pm \tau}$ maneant quantitates datæ $\theta, \eta, \lambda, e, f, g, \&c.$ & pro σ ac τ scribantur successive numeri quicunque integri: & si detur Area unius ex Curvis quæ per Ordinatæ innúmeras sic prodeuntes designantur si Ordinatæ sunt duorum nominum in vinculo radices, vel si dentur Areæ duarum ex Curvis si Ordinatæ sunt trium nominum in vinculo radices, vel Areæ trium ex Curvis si Ordinatæ sunt quatuor nominum in vinculo radices, & sic deinceps in infinitum: dico quod dabuntur Areæ curvarum omnium. Pro nominibus hic habeo terminos omnes in vinculo radices tam deficientes quam plenos quorum indices dignitatum sunt in progressionē arithmetica. Sic Ordinata $\sqrt[4]{a^4 - a x^2 + x^4}$ ob terminos duos inter a^4 & $-a x^2$ deficientes pro quinquinomio haberi debet.

At

At $\sqrt{a^2+x^2}$ binomium est, & $\sqrt{a^2+x^2-\frac{x^2}{a^2}}$ trinomium, cum progressio jam per majores differentias procedat. Propositio vero sic demonstratur.

C A S. I.

Sunto Curvarum duarum Ordinatae $pz^{\theta-1} R^{\lambda-1}$ & $qz^{\theta+\eta-1} R^{\lambda-1}$, & Areae pA & qB , existente R quantitate trium nominum $e + fz^{\eta} + gz^{2\eta}$. Et cum per Prop. 3. fit $z^{\theta} R^{\lambda}$ area Curvæ cujus Ordinata est $\theta e + \theta + \lambda\eta \times fz^{\eta} + \theta + 2\lambda\eta \times gz^{2\eta}$ in $z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$, subduc Ordinatas & Areas priores de Area & Ordinata posteriori, & manebit $\theta e - p + \theta \times f - q \times z^{\eta} - \theta \times gz^{2\eta}$
 $+ \lambda\eta \quad + 2\lambda\eta$
 $\times z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$ Ordinata nova Curvæ, & $z^{\theta} R^{\lambda} - pA - qB$ ejusdem Area.

Pone $\theta e = p$, & $\theta f + \lambda\eta = q$, & Ordinata evadet $\theta + 2\lambda\eta \times gz^{2\eta} \times z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$, & Area $z^{\theta} R^{\lambda} - \theta e A - \theta f B - \lambda\eta f B$. Divide utramque per $\theta g + 2\lambda\eta g$, & Aream prodeuntem dic C , & assumpta utcunque r , erit rC Area Curvæ cujus Ordinata est $rz^{\theta+2\eta-1} R^{\lambda-1}$. Et qua ratione ex Areis pA & qB Aream rC Ordinatae $rz^{\theta+2\eta-1} R^{\lambda-1}$ congruentem invenimus, licebit ex Areis qB & rC Aream quartam puta sD , Ordinatae $sz^{\theta+3\eta-1} R^{\lambda-1}$ congruentem invenire, & sic deinceps in infinitum. Et par est ratio progressionis ab Areis B & A in partem contrariam pergentis. Si terminorum θ , $\theta + \lambda\eta$, & $\theta + 2\lambda\eta$ aliquis deficit & seriem abruptit, assumatur Area pA in principio progressionis unius & Area qB in principio alterius, & ex his duabus Areis dabuntur Areae omnes in progressionem utraque. Et contra; ex aliis duabus Areis assumptis fit regressus per Analysin ad Areas A & B , adeo ut ex duabus datis cæteræ omnes dentur. Q. E. O.

Hic est casus Curvarum ubi ipsius z index θ augetur vel diminuitur perpetua additione vel subtractione quantitatis η . Casus alter est Curvarum ubi index λ augetur vel diminuitur unitatibus.

C A S. II.

Ordinatae $pz^{\theta-1} R^{\lambda}$ & $qz^{\theta+\eta-1} R^{\lambda}$, quibus Areae pA & qB jam respondeant, si in R seu $e + fz^{\eta} + gz^{2\eta}$ ducantur ac deinde ad R vicissim applicentur, evadunt $pe + pfz^{\eta} + pgz^{2\eta} \times z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$, & $qe + qfz^{\eta} + qgz^{2\eta} \times z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$.

H

E

Et (per Prop. 3.) est $az^{\theta} R^{\lambda}$ area Curvæ cujus Ordinata est $\theta ae + \theta + \lambda \eta \times afz^{\eta} + \theta + 2\lambda \eta \times agz^{2\eta} \times z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$, & $bz^{\theta+\eta} R^{\lambda}$ area Curvæ cujus Ordinata est $\theta + \eta \times be z^{\eta} + \theta + \eta + \lambda \eta \times bfz^{2\eta} + \theta + \eta + 2\lambda \eta \times bgz^{3\eta} \times z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$.

Et harum quatuor Arearum summa est $pA + qB + az^{\theta} R^{\lambda} + bz^{\theta+\eta} R^{\lambda}$, & summa respondentium Ordinarum

$$\begin{array}{r} \theta ae + \theta + \lambda \eta \times afz^{\eta} + \theta + 2\lambda \eta \times agz^{2\eta} + \theta + \eta + 2\lambda \eta \times bgz^{3\eta} \times z^{\theta-1} R^{\lambda-1} \\ + pe + \theta + \eta \times be + \theta + \eta + \lambda \eta \times bf + \theta + \eta + 2\lambda \eta \times bgz^{3\eta} \times z^{\theta-1} R^{\lambda-1} \\ + 1 \times pf + 1 \times pg + 1 \times qg \\ + 1 \times qe + 1 \times qf \end{array}$$

Si terminus primus tertius & quartus ponantur seorsim æquales nihilo, per primum fiet $\theta ae + pe = 0$, seu $-\theta a = p$, per quartum $-\theta b - \eta b - 2\lambda \eta b = q$, & per tertium (eliminando p & q) $\frac{2\lambda \eta}{f} = b$. Unde secundus fit $\frac{\lambda \eta af - 4\lambda \eta ag}{f}$, adeoque summa quatuor Ordinarum est $\frac{\lambda \eta af - 4\lambda \eta ag}{f} z^{\theta+\eta-1} R^{\lambda-1}$, & summa totidem respondentium Arearum est $az^{\theta} R^{\lambda} + \frac{2\lambda \eta}{f} z^{\theta+\eta-1} R^{\lambda} - \theta a A + \frac{2\eta + 2\theta + 4\lambda \eta}{f} ag B$. Dividantur hæc summæ per $\frac{\lambda \eta af - 4\lambda \eta ag}{f}$, & si Quotum posterius dicatur \mathcal{D} , erit \mathcal{D} Area curvæ cujus Ordinata est Quotum prius $z^{\theta+\eta-1} R^{\lambda-1}$. Et eadem ratione ponendo omnes Ordinatæ terminos præter primum æquales nihilo potest Area Curvæ inveniri cujus Ordinata est $z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$. Dicatur Area ista C , & qua ratione ex Areis A & B inventæ sunt Areæ C ac \mathcal{D} , ex his Areis C ac \mathcal{D} inveniri possunt aliæ duæ E & F Ordinatis $z^{\theta-1} R^{\lambda-2}$ & $z^{\theta+\eta-1} R^{\lambda-2}$ congruentes, & sic deinceps in infinitum. Et per Analysin contrariam regredi licet ab Areis E & F ad Areas C ac \mathcal{D} , & inde ad Areas A & B , aliasque quæ in progressionem sequuntur. Igitur si index λ perpetua unitatum additione vel subtractione augeatur vel minuatur, & ex Areis quæ Ordinatis sic procedentibus respondent duæ simplicissimæ habentur; dantur aliæ omnes in infinitum. Q. E. O.

C A S. III.

Et per casus hosce duos conjunctos, si tam index θ perpetua additione vel subtractione ipsius η , quam index λ perpetua additione vel sub-

subductione unitatis, utcumque augeatur vel minuatur, dabuntur Areæ singulis prodeuntibus Ordinatis respondentes. Q. E. O.

C A S. IV.

Et simili argumento si Ordinata constet ex quatuor nominibus in vinculo radicali & dantur tres Arearum, vel si constet ex quinque nominibus & dantur quatuor Arearum, & sic deinceps: dabuntur Areæ omnes quæ addendo vel subducendo numerum η indici θ vel unitatem indici λ generari possunt. Et par est ratio Curvarum ubi Ordinatæ ex binomiis constantur, & Area una earum quæ non sunt Geometrice quadrabiles datur. Q. E. O.

P R O P. VIII. T H E O R. VI.

Si pro $e + fz^{\eta} + gz^{2\eta} + \&c.$ & $k + lz^{\eta} + mz^{2\eta} + \&c.$ scribantur R & S ut supra, & in Curvæ alicujus Ordinata $z^{\theta \pm \tau}$ $R^{\lambda \pm \tau}$ $S^{\mu \pm \nu}$ maneant quantitates datæ $\theta, \eta, \lambda, \mu, e, f, g, k, l, m, \&c.$ & pro $\sigma, \tau, \& \nu$, scribantur successive numeri quicunque integri: & si dentur Areæ duarum ex curvis quæ per Ordinatas sic prodeunt designantur si quantitates R & S sunt binomia, vel si dentur Areæ trium ex curvis si R & S conjunctim ex quinque nominibus constant, vel Areæ quatuor ex curvis si R & S conjunctim ex sex nominibus constant, & sic deinceps in infinitum: dico quod dabuntur Areæ curvarum omnium.

Demonstratur ad modum propositionis superioris.

P R O P. IX. T H E O R. VII.

Æquantur Curvarum Areæ inter se quarum Ordinatæ sunt reciproce ut fluxiones Abcissarum.

Nam contenta sub Ordinatis & fluxionibus Abcissarum erunt æqualia, & fluxiones Arearum sunt ut hæc contenta.

C O R O L. I.

Si assumatur relatio quævis inter Abcissas duarum Curvarum, & inde per Prop. I. quærat relatio fluxionum Abcissarum, &

ponantur Ordinatæ reciproce proportionales fluxionibus, inveniri possunt innumeræ Curvæ quarum Areæ sibi mutuo æquales erunt.

COROL. II.

Si enim Curva omnis cujus hæc est Ordinata $z^{b-1} \times \overline{e + fz^n + gz^{2n} + \&c.}^\lambda$, assumendo quantitatem quamvis pro v , & ponendo $\frac{n}{v} = s$, & $z^s = x$, migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est $\frac{1}{n} x^{\frac{1b-n}{s}} \times \overline{e + fx^n + gx^{2n} + \&c.}^\lambda$.

COROL. III.

Et Curva omnis cujus Ordinata est $z^{b-1} \times \overline{a + bz^n + cz^{2n} + \&c. \times e + fz^n + gz^{2n} + \&c.}^\lambda$, assumendo quantitatem quamvis pro v , & ponendo $\frac{n}{v} = s$, & $z^s = x$, migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est $\frac{1}{n} x^{\frac{1b-n}{s}} \times \overline{a + bx^n + cx^{2n} + \&c. \times e + fx^n + gx^{2n} + \&c.}^\lambda$.

COROL. IV.

Et Curva omnis cujus Ordinata est $z^{b-1} \times \overline{a + bz^n + cz^{2n} + \&c. \times e + fz^n + gz^{2n} + \&c.}^\lambda \times \overline{k + lz^n + mz^{2n} + \&c.}^\mu$, assumendo quantitatem quamvis pro v , & ponendo $\frac{n}{v} = s$, & $z^s = x$, migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est $\frac{1}{n} x^{\frac{1b-n}{s}} \times \overline{a + bx^n + cx^{2n} + \&c. \times e + fz^n + gx^{2n} + \&c.}^\lambda \times \overline{k + lx^n + mx^{2n} + \&c.}^\mu$.

COROL. V.

Et Curva omnis cujus Ordinata est $z^{b-1} \times \overline{e + fz^n + gz^{2n} + \&c.}^\lambda$, ponendo $\frac{1}{z} = x$, migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est $\frac{1}{x^{b+1}} \times \overline{e + fx^{-n} + gx^{-2n} + \&c.}^\lambda$ id est $\frac{1}{x^{b+1+2n\lambda}} \times \overline{f + ex^n}^\lambda$ si duo sunt nomina in vinculo radices, vel $\frac{1}{x^{b+1+2n\lambda}} \times \overline{g + fx^n + ex^{2n}}^\lambda$ si tria sunt nomina; & sic deinceps.

C O R O L. VI.

Et Curva omnis cujus Ordinata est

$z^{\beta-1} \times e + fz^n + gz^{2n} + \&c. |^{\lambda} \times k + lz^n + mz^{2n} + \&c. |^{\mu}$, ponendo $\frac{1}{z} = x$,
migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est

$$\frac{1}{x^{\beta+1}} \times e + fx^{-n} + gx^{-2n} + \&c. |^{\lambda} \times k + lx^{-n} + mx^{-2n} + \&c. |^{\mu}$$

id est $\frac{1}{x^{\beta+1+2n\lambda+2n\mu}} \times \overline{f+ex^n} |^{\lambda} \times \overline{l+kx^n} |^{\mu}$ si bina sunt nomina in vinculis
radicum, vel $\frac{1}{x^{\beta+1+2n\lambda+2n\mu}} \times \overline{g+fx^n+ex^{2n}} |^{\lambda} \times \overline{l+kx^n} |^{\mu}$ si tria sunt no-
mina in vinculo radices prioris ac duo in vinculo posterioris: &
sic in aliis.

Et nota quod Area duæ æquales in novissimis hisce duobus Corol-
lariis jacent ad contrarias partes Ordinatorum. Si Area in alterutra
Curva adjacet Abscissæ, Area huic æqualis in altera Curva adjacet
Abscissæ productæ.

C O R O L. VII.

Si relatio inter Curvæ alicujus Ordinatam y & Abscissam z defini-
atur per æquationem quamvis affectam hujus formæ,

$$y^{\alpha} \times e + fy^n z^{\beta} + gy^{2n} z^{2\beta} + hy^{3n} z^{3\beta} + \&c. = z^{\beta} \times k + ly^n z^{\beta} + my^{2n} z^{2\beta} + \&c.$$

hæc Figura assumendo $s = \frac{n-\beta}{n}$, $x = \frac{1}{z}$, & $\lambda = \frac{n-\beta}{n-\beta}$, migrat in
aliam sibi æqualem cujus Abscissa x , ex data Ordinata v , deter-
minatur per æquationem non affectam $\frac{1}{x^{\alpha\lambda}} \times e + fv^n + gv^{2n} + \&c. |^{\alpha}$
 $\times k + lv^n + mv^{2n} + \&c. |^{-\lambda} = x$.

C O R O L. VIII.

Si relatio inter Curvæ alicujus Ordinatam y & Abscissam z defini-
tur per æquationem quamvis affectam hujus formæ,

$$y^{\alpha} \times e + fy^n z^{\beta} + gy^{2n} z^{2\beta} + \&c. = z^{\beta} \times k + ly^n z^{\beta} + my^{2n} z^{2\beta} + \&c.$$

$$+ zv \times p + qy^n z^{\beta} + ry^{2n} z^{2\beta} + \&c.$$

hæc Figura assumendo $s = \frac{n-\beta}{n}$, $x = \frac{1}{z}$, $\mu = \frac{\alpha\beta+\beta n}{n-\beta}$, $v = \frac{\alpha\beta+\beta n}{n-\beta}$, migrat

in aliam sibi æqualem cujus Abscissa x ex data Ordinata v determinatur per æquationem minus affectam $v^a \times e + f v^n + g v^{2n} + \&c.$

$$\begin{aligned} &= s'' x'' \times k + l v^n + m v^{2n} + \&c. \\ &+ s' x' \times p + q v^n + r v^{2n} + \&c. \end{aligned}$$

COROL. IX.

Curva omnis cujus Ordinata est

$$\begin{aligned} &\pi z^{b-1} \times v e + v + \eta f z^n + v + 2 \eta g z^{2n} + \&c. \times e + f z^n + g z^{2n} + \&c. |^{\lambda-1} \text{ in} \\ &a + b \times e z^n + f z^{1+n} + g z^{1+2n} + \&c. |^{\tau \omega}, \text{ si sit } \theta = \lambda v, \text{ \& affumantur} \\ &x = e z^n + f z^{1+n} + g z^{1+2n} + \&c. |^{\tau}, \sigma = \frac{\tau}{\pi}, \text{ \& } \vartheta = \frac{\lambda - \pi}{\pi}, \text{ migrat in aliam} \end{aligned}$$

sibi æqualem cujus Ordinata est $x^\vartheta \times a + b x^\tau |^\omega$. Et nota quod Ordinata prior in hoc Corollario evadit simplicior ponendo $\lambda = 1$, vel ponendo $\tau = 1$, & efficiendo ut radix dignitatis extrahi possit cujus index est ω , vel etiam ponendo $\omega = -1$, & $\lambda = 1 = \tau = \sigma = \pi$, ut alios casus præteream.

COROL. X.

$$\begin{aligned} &\text{Pro } e z^n + f z^{1+n} + g z^{1+2n} + \&c. v e z^{b-1} + v + \eta f z^n + v + 2 \eta g z^{1+2n} + \&c. \\ &k + l z^n + m z^{2n} + \&c. \text{ \& } \eta l z^{b-1} + 2 \eta m z^{2n-1} + \&c. \text{ scribantur } R, r, S \text{ \& } s \end{aligned}$$

respective, & Curva omnis cujus Ordinata est $\pi S r + \phi R s \times R^{\lambda-1} S^{\mu-1}$
 $\times a S^\tau + b R^\tau |^\omega$, si sit $\frac{\mu - v \omega}{\lambda} = \frac{v}{\pi} = \frac{\phi}{\pi}$, $\frac{\tau}{\pi} = \tau$, $\frac{\lambda - \pi}{\pi} = \vartheta$, & $R^\tau S^\vartheta = x$,
 migrat in aliam sibi æqualem cujus Ordinata est $x^\vartheta \times a + b x^\tau |^\omega$. Et nota quod Ordinata prior evadit simplicior, ponendo unitates pro τ , v ,
 & λ vel μ , & faciendo ut radix dignitatis extrahi possit cujus index est ω , vel ponendo $\omega = -1$ vel $\mu = 0$.

PROP.

PROP. X. PROB. III.

Invenire Figuras simplicissimas cum quibus Curva quævis Geometrice comparari potest, cujus Ordinatum applicata y per æquationem non affectam ex data Abscissa z determinatur.

C A S. I.

Sit Ordinata az^{b-1} , & Area erit $\frac{1}{b} az^b$, ut ex Prop. 5. ponendo $b=0=c=d=f=g=b$, & $e=1$, facile colligitur.

C A S. II.

Sit Ordinata $az^{b-1} \times \sqrt[n]{e + fz^n + gz^{2n} + \&c.}^{\lambda-1}$, & si Curva cum Figuris rectilineis Geometrice comparari potest, quadrabitur per Prop. 5. ponendo $b=0=c=d$. Sin minus convertetur in aliam Curvam sibi

æqualem cujus Ordinata est $\frac{a}{n} x^{\frac{b-n}{n}} \times \sqrt[n]{e + fz^n + gz^{2n} + \&c.}^{\lambda-1}$ per Corol. 2.

Prop. 9. Deinde si de dignitatum indicibus $\frac{b-n}{n}$ & $\lambda-1$ per Prop. 7. rejiciantur unitates donec dignitates illæ fiant quam minimæ, devenietur ad Figuras simplicissimas quæ hac ratione colligi possunt. Dein harum unaquæque per Corol. 5. Prop. 9. dat aliam quæ nonnunquam simplicior est. Et ex his per Prop. 3. & Corol. 9. & 10. Prop. 9. inter se collatis, Figuræ adhuc simpliciores quandoque prodeunt. Denique ex Figuris simplicissimis assumptis facto regressu computabitur Area quæsitæ.

C A S. III.

Sit Ordinata $z^{b-1} \times \sqrt[n]{a + bz^n + cz^{2n} + \&c.} \times \sqrt[n]{e + fz^n + gz^{2n} + \&c.}^{\lambda-1}$, & hæc Figura si quadrari potest, quadrabitur per Prop. 5. Sin minus,

distinguenda est Ordinata in partes $z^{b-1} \times a \times e + fz^n + gz^{2n} + \&c. |^{a-1}$,
 $z^{b-1} \times bz^n \times e + fz^n + gz^{2n} + \&c. |^{a-1}$, &c. & per Caf. 2. inveniendæ sunt
 Figuræ simpliciffimæ cum quibus Figuræ partibus illis responden-
 tes comparari possunt.

Nam Area figurarum partibus illis respondentium sub signis suis +
 & — conjunctæ component Aream totam quæsitam.

C A S. IV.

Sit Ordinata $z^{b-1} \times a + bz^n + cz^{2n} + \&c. \times e + fz^n + gz^{2n} + \&c. |^{a-1}$ in
 $k + lz^n + mz^{2n} + \&c. |^{u-1}$, & si Curva quadrari potest, quadrabitur
 per Prop. 6. Sin minus, convertetur in simpliciolem per Corol. 4.
 Prop. 9. ac inde comparabitur cum Figuris simpliciffimis per Prop.
 8. & Corol. 6, 9 & 10. Prop. 9. ut fit in Casu 2 & 3.

C A S. V.

Si Ordinata ex variis partibus constat, partes singulæ pro Ordina-
 tæ curvarum totidem habendæ sunt, & Curvæ illæ quotquot qua-
 drari possunt, sigillatim quadrandæ sunt, earumque Ordinatæ de
 Ordinata tota demendæ. Dein Curva quam Ordinatæ pars residua
 designat seorsim (ut in Casu 2, 3 & 4.) cum Figuris simpliciffi-
 mis comparanda est cum quibus comparari potest. Et summa Area-
 rum omnium pro Area Curvæ propositæ habenda est.

C O R O L. I.

Hinc etiam Curva omnis cujus Ordinata est radix quadratica
 affecta æquationis suæ, cum Figuris simpliciffimis seu rectilineis
 seu curvilineis comparari potest. Nam radix illa ex duabus partibus
 semper constat quæ seorsim spectatæ non sunt æquationum radices
 affectæ.

Pro-

Proponatur æquatio $a^2y^2 + z^2y^2 = 2a^2y + 2z^2y - z^4$, & extracta radix erit $y = \frac{a^2 + z^2 + a\sqrt{a^2 + 2az - z^2}}{aa + zz}$, cujus pars rationalis $\frac{a^2 + z^2}{aa + zz}$ & pars irrationalis $\frac{a\sqrt{a^2 + 2az - z^2}}{aa + zz}$ sunt Ordinatæ curvarum quæ per hanc Propositionem vel quadrari possunt vel cum Figuris simplicissimis comparari cum quibus collationem Geometricam admittunt.

C O R O L. II.

Et Curva omnis cujus Ordinata per æquationem quamvis affectam definitur quæ per Corol. 7. Prop. 9. in æquationem non affectam migrat, vel quadratur per hanc Propositionem si quadrari potest, vel comparatur cum Figuris simplicissimis cum quibus comparari potest. Et hac ratione Curva omnis quadratur cujus æquatio est trium terminorum. Nam æquatio illa si affecta sit, transmutatur in non affectam per Corol. 7. Prop. 9. ac deinde per Corol. 2. & 5. Prop. 9. in simplicissimam migrando, dat vel quadraturam Figuræ si quadrari potest, vel Curvam simplicissimam quacum comparatur.

C O R O L. III.

Et Curva omnis cujus Ordinata per æquationem quamvis affectam definitur quæ per Corol. 8. Prop. 9. in æquationem quadraticam affectam migrat; vel quadratur per hanc Propositionem & hujus Corol. 1. si quadrari potest, vel comparatur cum Figuris simplicissimis cum quibus collationem Geometricam admittit.

S C H O L I U M.

Ubi quadrandæ sunt Figuræ; ad Regulas hæc generales semper recurrere nimis molestum esset: præstat Figuras quæ simpliciores sunt & magis usui esse possunt semel quadrare & quadraturas in Ta-
I bu-

bulam referre, deinde Tabulam consulere quoties ejusmodi Curvam aliquam quadrare oportet. Hujus autem generis sunt Tabulæ duæ sequentes, in quibus z denotat Abscissam, y Ordinatam rectangulam, & t Aream Curvæ quadrandæ, & d, e, f, g, b, η sunt quantitates datæ cum signis suis + & —.

TABULA		
CURVARUM SIMPLICIORUM QUÆ QUADRARI POSSUNT		
CURVARUM FORMÆ		CURVARUM AREÆ
I	$dz^{\eta-1} = y$	$\frac{d}{\eta} z^{\eta} = t$
II	$\frac{dz^{\eta-1}}{z^e + \eta f z^{\eta} + f z^{2\eta}} = y$	$\frac{dz^{\eta}}{\eta e z + \eta f z^{\eta}} = t$ vel $\frac{-d}{\eta f + \eta f z^{\eta}} = t$
III	1 $dz^{\eta-1} \sqrt{e + f z^{\eta}} = y$	$\frac{2e}{3\eta} R^3 = t$, existente $R = \sqrt{e + f z^{\eta}}$
	2 $dz^{2\eta-1} \sqrt{e + f z^{\eta}} = y$	$\frac{-4e + 6f z^{\eta}}{15\eta^2} dR^3 = t$
	3 $dz^{3\eta-1} \sqrt{e + f z^{\eta}} = y$	$\frac{16e^3 - 24efz^{\eta} + 30f^2 z^{2\eta}}{105\eta^3} dR^3 = t$
	4 $dz^{4\eta-1} \sqrt{e + f z^{\eta}} = y$	$\frac{-96e^3 + 144e^2 f z^{\eta} - 180ef^2 z^{2\eta} + 210f^3 z^{3\eta}}{945\eta^4} dR^3 = t$
IV	1 $\frac{dz^{\eta-1}}{\sqrt{e + f z^{\eta}}} = y$	$\frac{2d}{\eta} R = t$
	2 $\frac{dz^{2\eta-1}}{\sqrt{e + f z^{\eta}}} = y$	$\frac{-4e + 2f z^{\eta}}{3\eta^2} dR = t$
	3 $\frac{dz^{3\eta-1}}{\sqrt{e + f z^{\eta}}} = y$	$\frac{16e^3 - 8efz^{\eta} + 6f^2 z^{2\eta}}{15\eta^3} dR = t$
	4 $\frac{dz^{4\eta-1}}{\sqrt{e + f z^{\eta}}} = y$	$\frac{-96e^3 + 48e^2 f z^{\eta} - 36ef^2 z^{2\eta} + 30f^3 z^{3\eta}}{105\eta^4} dR = t$

In Tabulis hisce, series Curvarum cujusque formæ utrinque in infinitum continuari potest. Scilicet in Tabula prima, in numeratoribus Arearum formæ tertiæ & quartæ, numeri coefficientes initium terminorum (2, —4, 16, —96, 868, &c.) generantur multiplicando numeros—2, —4, —6, —8, —10, &c. in se continuo, & subsequen-
pli-

plicando ipsos gradatim, in Forma quidem tertia, per $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{6}, \&c.$ in quarta vero per $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{6}, \&c.$ Et Denominatorum coefficientes 3, 15, 105, &c. prodeunt multiplicando numeros 1, 3, 5, 7, 9, &c. in se continue.

In secunda vero Tabula, series Curvarum formæ primæ, secundæ, quintæ, sextæ, nonæ, & decimæ ope solius divisionis, & formæ reliquæ ope Propositionis tertiæ & quartæ, utrinque producuntur in infinitum.

Quinetiam hæ series mutando signum numeri η variari solent. Sic enim e. g. Curva $\frac{d}{dz} \sqrt{e+fz} = y$, evadit $\frac{d}{z^{\frac{1}{2}}\eta+1} \sqrt{f+ez} = y$.

PROP. XI. THEOR. VIII.

Sit ADIC Curva quævis Abscissam habens $AB=z$, & Ordinatum $BD=y$, & sit AEKC Curva alia cujus Ordinata BE æqualis est prioris areæ ADB ad unitatem applicatæ, & AFLC Curva tertia cujus Ordinata BF æqualis est secundæ Areæ AEB ad unitatem applicatæ, & AGMC Curva quarta cujus Ordinata BG æqualis est tertiæ areæ AFB ad unitatem applicatæ, & AHNC Curva quinta cujus Ordinata BH æqualis est quartæ Areæ AGB ad unitatem applicatæ, & sic deinceps in infinitum. Et funto A, B, C, D, E, &c. Areæ Curvarum Ordinatas habentium y, zy, z^2y, z^3y, z^4y , &c. & Abscissam communem z .

Detur Abscissa quævis $AC=t$, sitque $BC=t-z=x$, & funto P, Q, R, S, T Areæ Curvarum Ordinatas habentium y, xy, x^2y, x^3y, x^4y &c. & Abscissam communem x .

Terminentur autem hæ Areæ omnes ad Abscissam totam datam AC, nec non ad Ordinatum positione datam & infinite productam CI:


Et erit Arearum sub initio positarum

Prima ADIC = A = P.

Secunda AEKC = tA - B = Q.

I 2

Ter-



$$\text{Tertia AFLC} = \frac{1^2 A - 2^2 B + C}{2} = \frac{1}{2} R.$$

$$\text{Quarta AGMC} = \frac{1^3 A - 3^2 B + 3^2 C - D}{6} = \frac{1}{6} S.$$

$$\text{Quinta AHNC} = \frac{1^4 A - 4^3 B + 6^2 C - 4^2 D + E}{24} = \frac{1}{24} T.$$

C O R O L.

Unde si Curvæ quarum Ordinatæ sunt y , zy , z^2y , z^3y , &c. vel y , xy , x^2y , x^3y , &c. quadrari possunt, quadrabuntur etiam Curvæ ADIC, AEKC, AFLC, AGMC, &c. & habebuntur Ordinatæ BE, BF, BG, BH, Areis Curvarum proportionales.

S C H O L I U M.

Quantitatum fluentium Fluxiones esse primas, secundas, tertias, quartas, aliasque diximus supra. Hæ Fluxiones sunt ut termini ferri-erum infinitarum convergentium.

Ut si z^n sit quantitas fluens & fluendo evadat $z + o^n$, deinde resol-
vatur in seriem convergentem $z^n + n o z^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} o^2 z^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} o^3 z^{n-3}$
+ &c. terminus primus hujus seriei z^n erit quantitas illa fluens, se-
cundus $n o z^{n-1}$ erit ejus incrementum primum seu differentia prima cui
nascenti proportionalis est ejus Fluxio prima, tertius $\frac{n(n-1)}{2} o^2 z^{n-2}$ erit ejus
incrementum secundum seu differentia secunda cui nascenti propor-
tionalis est ejus Fluxio secunda, quartus $\frac{n(n-1)(n-2)}{6} o^3 z^{n-3}$ erit ejus incre-
mentum tertium seu differentia tertia cui nascenti Fluxio tertia pro-
portionalis est, & sic deinceps in infinitum.

Exponi autem possunt hæ Fluxiones per Curvarum Ordinatas BD, BE, BF, BG, BH, &c.

Ut si Ordinata BE ($= \frac{ADB}{1}$) sit quantitas fluens, erit ejus Fluxio pri-
ma ut Ordinata BD.

Si BF ($= \frac{AEB}{1}$) sit quantitas fluens, erit ejus Fluxio prima ut Ordi-
nata BE, & Fluxio secunda ut Ordinata BD:

Si BH ($= \frac{AGB}{1}$) sit quantitas fluens, erunt ejus Fluxiones prima, se-
cunda, tertia & quarta, ut Ordinatæ BG, BF, BE, BD respective.

Et hinc in æquationibus quæ quantitates tantum duas incognitas
involvunt, quarum una est quantitas uniformiter fluens & altera est
Fluxio quælibet quantitatis alterius fluentis, inveniri potest fluens illa
al-

altera per quadraturam Curvarum. Exponatur enim Fluxio ejus per Ordinatam BD, & si hæc sit Fluxio prima, quærat Area ADB = BE × I, si Fluxio secunda, quærat Area AEB = BF × I, si Fluxio tertia, quærat Area AFB = BG × I, &c. & Area inventa erit exponens fluentis quæsitæ.


Sed & in æquationibus quæ fluentem & ejus fluxionem primam sine altera fluente, vel duas ejusdem fluentis fluxiones, primam & secundam, vel secundam & tertiam, vel tertiam & quartam, &c. sine alterutra fluente involvunt: inveniri possunt fluentes per quadraturam Curvarum. Sit æquatio $aa\dot{v} = a\dot{v} + v\dot{v}$, existente $v = BE$, $\dot{v} = BD$, $z = AB$, & $\dot{z} = I$, & æquatio illa complendo dimensiones Fluxionum, evadet $aa\dot{v} = a\dot{v}z + v\dot{v}z$, seu $\frac{aa\dot{v}}{a\dot{v} + v\dot{v}} = z$.

Jam fluat v uniformiter, & sit ejus Fluxio $\dot{v} = I$, & erit $\frac{aa}{a\dot{v} + v\dot{v}} = z$, & quadrando Curvam cujus Ordinata est $\frac{aa}{a\dot{v} + v\dot{v}}$ & Abscissa v , habebitur fluens z . Adhæc sit æquatio $aa\ddot{v} = a\ddot{v} + v\ddot{v}$, existente $v = BF$, $\dot{v} = BE$, $\ddot{v} = BD$, & $z = AB$, & per relationem inter \dot{v} & \ddot{v} seu BD & BE invenietur relatio inter AB & BE, ut in exemplo superiore. Deinde per hanc relationem invenietur relatio inter AB & BF quadrando Curvam AEB.

Æquationes quæ tres incognitas quantitates involvunt aliquando reduci possunt ad æquationes quæ duas tantum involvunt, & in his casibus fluentes invenientur ex fluxionibus ut supra. Sit æquatio $a - bx^m = cxy^ny + dy^{2n}xy$, ponatur $y^ny = \dot{v}$, & erit $a - bx^m = cx\dot{v} + d\dot{v}\dot{v}$. Hæc æquatio quadrando Curvam cujus Abscissa est x & Ordinata \dot{v} dat Aream v , & æquatio altera $y^ny = \dot{v}$, regrediendo ad fluentes, dat $\frac{1}{n+1}y^{n+1} = v$: Unde habetur fluens y .

Quinetiam in æquationibus, quæ tres incognitas involvunt, & ad æquationes quæ duas tantum involvunt, reduci non possunt, fluentes quandoque prodeunt per quadraturam Curvarum. Sit æquatio

$$ax^m + bx^p = rex^{r-1}y^s + sex^{s-1}y^{r-1} - fyy^s, \text{ existente } \dot{x} = I; \text{ Et pars posterior}$$



rior $rex^{m-1}y' + sexxy^{m-1} - fyy$, regrediendo ad fluentes, fit $exxy' - \frac{f}{1+1}y'^{+1}$, quæ proinde est ut Area Curvæ cujus Abfciffa est x & Ordinata $ax^m + bx^n$, & inde datur fluens y .

Sit æquatio $xxax^m + bx^n = \frac{dy^{m-1}}{ve+fy}$, Et fluens cujus Fluxio est $x \times ax^m + bx^n$ erit ut Area Curvæ cujus Abfciffa est x & Ordinata est $ax^m + bx^n$. Item fluens cujus Fluxio est $\frac{dy^{m-1}}{ve+fy}$ erit ut Area Curvæ cujus

Abfciffa est y & Ordinata $\frac{dy^{m-1}}{ve+fy}$, id est (per Casum 1. Formæ quartæ Tab.I.) ut Area $\frac{2d}{nf} \sqrt{ve+fy}$. Pono ergo $\frac{2d}{nf} \sqrt{ve+fy}$ æqualem Area Curvæ cujus Abfciffa est x & Ordinata $ax^m + bx^n$, & habebitur fluens y .

Et nota quod fluens omnis, quæ ex Fluxione prima colligitur, augeri potest vel minui quantitate quavis non fluente. Quæ ex Fluxione secunda colligitur, augeri potest vel minui quantitate quavis cujus Fluxio secunda nulla est. Quæ ex fluxione tertia colligitur, augeri potest vel minui quantitate quavis cujus fluxio tertia nulla est. Et sic deinceps in infinitum.

Postquam fluentes ex fluxionibus collectæ sunt, si de veritate Conclusionis dubitatur, fluxiones fluentium inventarum vicissim colligendæ sunt, & cum Fluxionibus sub initio propositis comparandæ. Nam si prodeunt æquales, Conclusio recte se habet: sin minus, corrigendæ sunt fluentes sic, ut earum Fluxiones fluxionibus sub initio propositis æquantur. Nam & fluens pro lubitu assumi potest, & assumptio corrigi, ponendo fluxionem fluentis assumptæ æqualem Fluxioni propositæ, & terminos homologos inter se comparando.

Et his principiis via ad majora sternitur.

ENUMERATIO
LINEARUM
TERTII ORDINIS.

ANNUAL REPORT

LINEARUM

TERMINI ORIGINIS

E N U M E R A T I O

L I N E A R U M

T E R T I I O R D I N I S.

I. *Linearum Ordines.*



Lineæ Geometricæ secundum numerum dimensionum æquationis qua relatio inter Ordinatæ & Abscissas definitur, vel (quod perinde est) secundum numerum punctorum in quibus a linea recta secari possunt, optime distinguuntur in Ordines. Qua ratione linea primi Ordinis erit Recta sola, eæ secundi sive quadratici Ordinis erunt sectiones Conicæ & Circulus, & eæ tertii sive cubici Ordinis Parabola Cubica, Parabola *Neiliana*, Cissois veterum, & reliquæ quas hic enumerare suscepimus. Curva autem primi Generis, (siquidem recta inter Curvas non est numeranda) eadem est cum Linea secundi Ordinis, & Curva secundi Generis eadem cum Linea Ordinis tertii. Et Linea Ordinis infinitesimi ea est quam recta in punctis infinitis secare potest, qualis est Spiralis, Cyclois, Quadratrix, & linea omnis quæ per radii vel rotæ revolutiones infinitas generatur.

II. *Proprietates Sectionum Conicarum competunt Curvis superiorum Generum.*

Sectionum Conicarum proprietates præcipuæ a Geometris passim traduntur. Et consimiles sunt proprietates Curvarum secundi Generis, & reliquarum, ut ex sequenti proprietatum præcipuarum enumeratione constabit.

1. De Curvarum secundi generis Ordinatis, Diametris, Verticibus, Centris, Axibus.

Si rectæ plures parallelæ & ad Conicam sectionem utrinque terminatæ ducantur, recta duas earum bifecans bifecabit alias omnes, ideoque dicitur *Diameter* figuræ & rectæ bifectæ dicuntur *Ordinativè applicatæ* ad Diametrum, & concursus omnium Diametrorum est *Centrum* figuræ, & interseccio Curvæ & diametri *Vertex* nominatur, & diameter illa *Axis* est cui Ordinativè applicatæ insistant ad angulos rectos. Et ad eundem modum in Curvis secundi Generis, si rectæ duæ quævis parallelæ ducantur occurrentes Curvæ in tribus punctis: recta quæ ita fecat has parallelas ut summa duarum partium ex uno secantis latere ad Curvam terminatarum æquetur parti tertiæ ex altero latere ad curvam terminatæ, eodem modo secabit omnes alias his parallelas curvæque in tribus punctis occurrentes rectas, hoc est, ita ut summa partium duarum ex uno ipsius latere semper æquetur parti tertiæ ex altero latere. Has itaque tres partes quæ hinc inde æquantur, *Ordinativè applicatas*, & rectam secantem cui Ordinativè applicatur *Diametrum*, & interseccionem diametri & Curvæ *Verticem*, & concursum duarum Diametrorum *Centrum* nominare licet. Diameter autem ad Ordinatas rectangula si modo aliqua sit, etiam *Axis* dici potest, & ubi omnes Diametri in eodem puncto concurrunt, istud erit *Centrum generale*.

2. De Asymptotis & earum proprietatibus.

Hyperbola primi generis duas *Asymptotas*, ea secundi tres, ealtertius quatuor & non plures habere potest, & sic in reliquis. Et quemadmodum partes lineæ cujusvis rectæ inter Hyperbolam Conicam & duas ejus Asymptotas sunt hinc inde æquales: sic in Hyperbolis secundi Generis si ducatur recta quævis secans tam Curvam quam tres ejus Asymptotas in tribus punctis, summa duarum partium istius rectæ quæ a duobus quibusvis Asymptotis in eandem plagam ad duo puncta Curvæ extenduntur, æqualis erit parti tertiæ quæ a tertia Asymptoto in plagam contrariam ad tertium Curvæ punctum extenditur.

3. *De Lateribus rectis & transversis.*

Et quemadmodum in Conicis sectionibus non Parabolicis quadratum Ordinatum applicatæ, hoc est, rectangulum Ordinarum quæ ad contrarias partes Diametri ducuntur, est ad rectangulum partium Diametri quæ ad Vertices Ellipseos vel Hyperbolæ terminantur, ut data quædam linea quæ dicitur *Latus rectum*, ad partem Diametri quæ inter Vertices jacet & dicitur *Latus transversum*: sic in Curvis non Parabolicis secundi Generis parallelepipedum sub tribus Ordinatis applicatis est ad parallelepipedum sub partibus Diametri ad Ordinatæ & tres Vertices figuræ abscissis, in ratione quadam data: in qua ratione si sumantur tres rectæ ad tres partes diametri inter vertices figuræ fitas, singulæ ad singulas, tunc illæ tres rectæ dici possunt *Latera recta* figuræ, & illæ partes Diametri inter Vertices *Lateratransversa*. Et sicut in Parabola Conica quæ ad unam & eandem diametrum unicum tantum habet Verticem, rectangulum sub Ordinatis æquatur rectangulo sub parte Diametri quæ ad Ordinatæ & Verticem abscinditur & recta quadam data quæ *Latus rectum* dicitur: sic in Curvis secundi Generis quæ non nisi duos habent Vertices ad eandem Diametrum, parallelepipedum sub Ordinatis tribus æquatur parallelepipedo sub duabus partibus Diametri ad Ordinatæ & Vertices illos duos abscissis & recta quadam data quæ proinde *Latus rectum* dici potest.

4. *De Ratione contentorum sub Parallelarum segmentis.*

Denique sicut in Conicis sectionibus ubi duæ parallelæ ad Curvam utrinque terminatæ secantur a duabus parallelis ad Curvam utrinque terminatis, prima a tertia, & secunda a quarta, rectangulum partium primæ est ad rectangulum partium tertiæ ut rectangulum partium secundæ ad rectangulum partium quartæ: sic ubi quatuor tales rectæ occurrunt Curvæ secundi Generis, singulæ in tribus punctis, parallelepipedum partium primæ rectæ erit ad parallelepipedum partium tertiæ, ut parallelepipedum partium secundæ ad parallelepipedum partium quartæ.

5. *De Cruribus Hyperbolicis & Parabolicis & eorum plagis.*

Curvarum secundi & superiorum Generum æque atque primi cru-

ra omnia in infinitum progredientia vel *Hyperbolici* sunt generis vel *Parabolici*. Crus *Hyperbolicum* voco quod ad Asymptoton aliquam in infinitum appropinquat; *Parabolicam* quod Asymptoto destituitur. Hæc crura ex Tangentibus optime dignoscuntur. Nam si punctum contactus in infinitum abeat, Tangens cruris Hyperbolici cum Asymptoto coincidit, & Tangens cruris Parabolici in infinitum recedit, evanescet & nullibi reperietur. Invenitur igitur Asymptotos cruris cujusvis quærendo Tangentem cruris illius ad punctum infinite distans. Plaga autem cruris infiniti invenitur quærendo positionem rectæ cujusvis quæ Tangenti parallela est ubi punctum contactus in infinitum abit. Nam hæc recta in eandem plagam cum crure infinito dirigitur.

III. *Reductio Curvarum omnium Generis Secundi ad equationum casus quatuor.*

Lineæ omnes Ordinis primi, tertiæ, quinti, septimi & imparis-
jusque duo habent ad minimum crura in infinitum versus plagas op-
positas progredientia. Et lineæ omnes tertiæ Ordinis duo habent ejus-
modi crura in plagas oppositas progredientia in quas nulla alia earum
crura infinita (præterquam in Parabola *Cartesiana*) tendunt.

CAS. I.

Si crura illa sint Hyperbolici generis, sit GAS eorum Asymptotos,

& huic parallela agatur recta quævis CBc ad Curvam utrinque (si fieri potest) terminata, eademque bifecetur in puncto X, & locus puncti illius X erit Hyperbola Conica (puta $X \Phi$) cujus una Asymptotos est AG. Sit ejus altera Asymptotos AB, & æquatio qua relatio inter Ordinatum BC & Abscissam AB definitur, si AB dicatur x , & BC y , semper induet hanc formam $xyy + ey = ax^3 + bxx + cx + d$. Ubi termini, e, a, b, c, d , designant quantitates datas signis suis & — affectas, quarum quælibet deesse possunt


modo ex earum defectu figura in sectionem Conicam non vertatur. Potest autem Hyperbola illa Conica cum Asymptotis suis coincidere, id est punctum X in recta AB locari : & tunc terminus $\frac{1}{2}ey$ deest.

CAS.

C A S. II.

At si recta illa CBc non potest utrinque ad Curvam terminari, sed Curvæ in unico tantum puncto occurrit: age quamvis positione datam rectam AB Asymptoto AS occurrentem in A, ut & aliam quamvis BC Asymptoto illi parallelam Curvæque occurrentem in puncto C, & æquatio qua relatio inter Ordinatam BC & Abscissam AB definitur, semper induet hanc formam,


$$xy = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$



C A S. III.

Quod si crura illa opposita Parabolici sint generis, recta CBc ad Curvam utrinque, si fieri potest, terminata in plagam crurum ducatur & bisecetur in B, & locus puncti B erit Linea recta. Sit ista AB, terminata ad datum quodvis punctum A, & æquatio qua relatio inter Ordinatam BC & Abscissam AB definitur, semper induet hanc formam,


$$yy = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$



C A S. IV.

At vero si recta illa CBc in unico tantum puncto occurrat Curvæ, ideoque ad Curvam utrinque terminari non possit: sit punctum illud C, & incidat recta illa ad punctum B in rectam quamvis aliam positione datam & ad datum quodvis punctum A terminatam AB: & æquatio qua relatio inter Ordinatam BC & Abscissam AC definitur, semper induet hanc formam,

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$



Nomina formarum.

Enumerando Curvas horum casuum, Hyperbolam vocabimus, *Inscriptam*, quæ tota jacet in Asymptoton angulo ad instar Hyperbolæ conicæ; *Circumscriptam*, quæ Asymptotos secat & partes Abscissas in sinu suo amplectitur; *Ambigenam*, quæ uno crure infinito inscribitur & altero circumscribitur; *Convergentem*, cujus crura concavitate sua se invicem respiciunt & in plagam eandem diriguntur; *Divergentem*, cujus crura convexitate sua se invicem respiciunt & in plagas contrarias diriguntur; *Cruribus Contrariis præditam*, cujus crura in partes contrarias convexa sunt & in plagas contrarias infinita; *Conchoidalem*, quæ vertice concavo & cruribus divergentibus ad Asymptoton applicatur; *Anguineam*, quæ flexibus contrariis Asymptoton secat & utrinque in crura contraria producit; *Cruciformem*, quæ conjugatam decussat; *Nodatam*, quæ seipsam decussat in orbem redeundo; *Cuspidatam*, cujus partes duæ in angulo contactus concurrunt & ibi terminantur; *Punctatam*, quæ conjugatam habet Ovalem infinite parvam id est punctum; & *Param*, quæ per impossibilitatem duarum radicum Ovali, Nodo, Cuspide & Puncto conjugato privatur. Eodem sensu Parabolam quoque *convergentem*, *divergentem*, *cruribus contrariis præditam*, *cruciformem*, *nodatam*, *cuspidatam*, *punctatam* & *param* nominabimus.

In casu primo si terminus ax^3 affirmativus est, Figura erit Hyperbola triplex cum sex cruribus Hyperbolicis quæ juxta tres Asymptotos quarum nullæ sunt parallelæ, in infinitum progrediuntur, binæ juxta unamquamque in plagas contrarias. Et hæ Asymptoti si terminus bx^2 non deest, se mutuo secabunt in tribus punctis triangulum (Ddd) inter se continentes, sin terminus bx^2 deest, convergent omnes ad idem punctum. In priori casu cape $AD = \frac{b}{2a}$, & $Ad = Ad = \frac{b}{2\sqrt{a}}$, ac junge Dd, Dd, & erunt Ad, Dd, Dd tres Asymptoti. In posteriori duc Ordinatam quamvis BC, Ordinatæ principali AG parallelam, & in ea utrinque producta cape hinc inde BF & Bf sibi mutuo æquales & in ea ratione ad AB quam habet \sqrt{a} ad 1, jungeque AF, Af & erunt AG, AF, Af tres Asymptoti. Hanc Hyperbolam vocamus *Redundantem*, quia numero crurum Hyperbolicorum Sectiones Conicas superat.


In Hyperbola omni Redundante, si neque terminus ey desit, neque sit $bb - 4ac$ æquale $+ aey$, Curva nullam habebit Diametrum, fin

fin eorum alterutrum accidit Curva habebit unicam Diametrum, & tres si utrumque. Diameter autem semper transit per intersectionem duarum Asymptoton, & bifecat rectas omnes quæ ad Asymptotos illas utrinque terminantur & parallelæ sunt Asymptoto tertiæ. Estque Abcissa AB diameter Figuræ quoties terminus *ey* deest. *Diameter* vero absolute dictam hic & in sequentibus in vulgari significato usurpo, nempe pro Abcissa quæ passim habet Ordinatæ binas æquales ad idem punctum hinc inde insistentes.

IV. Enumeratio Curvarum.


1. De Hyperbolis novem redundantibus quæ diametro destituuntur & tres habent Asymptotos triangulum capientes.

Si Hyperbola redundans nullam habet diametrum, quærantur Equationis hujus $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + ee = 0$ radices quatuor seu valores ipsius x . Eæ sunt AP, A π , A π , Ap. Erigantur Ordinatæ PT, $\pi\tau$, $\pi\eta$, pt, & hæ tangent Curvam in punctis totidem T, τ , η , t, & tangendo dabunt limites Curvæ per quos Species ejus innotescet.



Nam si radices omnes AP, A π , Ap, (Fig. 1, 2.) sunt reales, ejusdem signi & inæquales, Curva constat ex tribus Hyperbolis, (inscripta, circumscripta & ambigena) cum *Ovali*. Hyperbolarum una jacet versus D, altera versus d, tertia versus δ , & Ovalis semper jacet intra Triangulum Ddd, atque etiam inter medios limites


tes γ & τ , in quibus utique tangitur ab Ordinatis $\pi\gamma$ & $\omega\tau$. Et hæc est *Species prima*.



Si e radicibus duæ maximæ $A\pi$, Ap , (Fig. 2.) vel duæ minimæ AP , $A\omega$ (Fig. 4.) æquantur inter se, & ejusdem sunt signi cum alteris duobus, Ovalis & Hyperbola circumscripta sibi invicem junguntur coeuntibus earum punctis contactus γ & τ vel T & τ , & crura Hyperbolæ sese decussando in Ovalem continuantur, figuram *Nodatam* efficiunt. Quæ *Species est secunda*.

Si e radicibus tres maximæ Ap , $A\pi$, $A\omega$, (Fig. 5.) vel tres minimæ $A\pi$, $A\omega$, AP (Fig. 6.) æquantur inter se, Nodus in *Cuspidem* acutissimum convertetur. Nam crura duo Hyperbolæ circumscriptæ ibi in angulo contactus concurrent & non ultra producentur. Et hæc est *Species tertia*.


Si e radicibus duæ mediæ $A\omega$ & $A\pi$ (Fig. 7.) æquantur inter se, puncta contactus τ & γ coincidunt, & propterea Ovalis interjecta in punctum evanuit, & constat figura ex tribus Hyperbolis, inscripta, circumscripta & ambigena cum *Puncto* conjugato. Quæ est *Species quarta*.



Si duæ ex radicibus sunt impossibiles & reliquæ duæ inæquales & ejusdem signi (nam signa contraria habere nequeunt,) *Puræ* habebuntur


tur Hyperbolæ tres sine Ovali vel Nodo vel Cuspide vel Puncto conjugato, & hæ Hyperbolæ vel ad latera trianguli ab Asymptotis comprehensi vel ad angulos ejus jacebunt; & perinde *Speciem* vel *quintam* (Fig. 7. 8.) vel *sextam* (Fig. 9, 10.) constituent.

Si e radicibus duæ sunt æquales & alteræ duæ vel impossibiles sunt (Fig. 11. 13.) vel reales (Fig. 12. 14.) cum signis quæ a signis æqualium radicum diversa sunt, figura *Cruciformis* habebitur, nempe duæ ex Hyperbolis se invicem decussabunt idque vel ad verticem trianguli ab Asymptotis comprehensi (Fig. 13, 14) vel ad ejus basem (Fig. 11, 12.) Quæ duæ *Species* sunt *septima* & *octava*.



Si denique radices omnes sunt impossibiles (Fig. 15.) vel si omnes sunt reales & inæquales (Fig. 16.) & earum duæ sunt affirmativæ & alteræ duæ negativæ, tunc duæ habebuntur Hyperbolæ ad angulos oppositos duarum Asymptotonum cum Hyperbola *Anguinea* circa Asymptotonum tertiam. Quæ *Species* est *nona*.


Et hi sunt omnes radicum casus possibiles. Nam si duæ radices sunt æquales inter se, & aliæ duæ sunt etiam inter se æquales, Figura evadet Sectio Conica cum Linea recta.



2. De Hyperbolis duodecim redundantibus unicam tantum Diametrum habentibus.

Si Hyperbola redundant habet unicam tantum Diametrum, sit ejus Diameter Abscissa AB, & æquationis hujus $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ quære tres radices seu valores x .

Si radices illæ sunt omnes reales & ejusdem signi, Figura constabit ex Ovali intra triangulum Ddd (Fig. 17.) jacente & tribus Hyperbolis ad angulos ejus, nempe Circumscripta ad angulum D & Inscriptis duabus ad angulos d & δ. Et hæc est Species decima.




Si radices duæ majores sunt æquales & tertia ejusdem signi, crura Hyperbolæ jacentis versus D (Fig. 18.) sese decussabunt in forma Nodi propter contactum Ovalis. Quæ Species est undecima.

Si tres radices sunt æquales, Hyperbola ista fit Cuspidata sine Ovali, (Fig. 19.) Quæ Species est duodecima.

Si radices duæ minores sunt æquales & tertia ejusdem signi, Ovalis in Punctum evanuit, (Fig. 20.) Quæ Species est decima tertia.


In speciebus quatuor novissimis Hyperbola quæ jacet versus D, Asymptotos in sinu suo amplectitur, reliquæ duæ in sinu Asymptoton jacent.

Si duæ ex radicibus sunt impossibiles habebuntur tres Hyperbolæ.




Pura sine Ovali decussatione vel cuspide. Et hujus casus Species sunt quæ-


quatuor : nempe *decima quarta* si Hyperbola Circumscripta jacet versus D, (Fig. 20.) & *decima quinta* si Hyperbola Inscripta jacet versus D, (Fig. 21.) *decima sexta* si Hyperbola Circumscripta jacet sub basi dd trianguli Ddd, (Fig. 22.) & *decima septima* (Fig. 23.) si Hyperbola Inscripta jacet sub eadem basi.



Si duæ radices sunt æquales & tertia signi diversi figura erit *Cruciformis*. Nempe duæ ex tribus Hyperbolis se invicem decussabunt idque vel ad verticem trianguli ab Asymptotis comprehensi (Fig. 24.) vel ad ejus basem, (Fig. 25.) Quæ duæ Species sunt *decima octava*, & *decima nona*.




Si duæ radices sunt inæquales & ejusdem signi & tertia est signi diversi, duæ habebuntur Hyperbolæ in oppositis angulis duarum Asymptoton cum *Conchoidal* intermedia. *Conchoidalis* autem vel jacebit ad easdem partes Asymptoti suæ cum triangulo ab Asymptotis constituto, (Fig. 26.) vel ad partes contrarias, (Fig. 27.) Et hi duo casus constituunt *Speciem vigesimam* & *vigesimam primam*.



3. De Hyperbolis duabus redundantibus cum tribus Diametris.

Hyperbola redundans quæ habet tres diametros, constat ex tribus Hyperbolis in sinibus Asymptoton jacentibus, idque vel ad angulos trianguli ab Asymptotis comprehensi (Fig. 28.) vel ad ejus latera (Fig. 29.) Casus prior dat *Speciem vigesimam secundam*, & posterior *Speciem vigesimam tertiam*.




4. De Hyperbolis novem redundantibus cum Asymptotis tribus ad commune punctum convergentibus.

Si tres Asymptoti in puncto communi se mutuo decussant, vertuntur species quinta & sexta in *vigesimam quartam*, (Fig. 30.) septima & octava in *vigesimam quintam*, (Fig. 31.) & nona in *vigesimam sextam* (Fig. 32.) ubi Anguinea non transit per concursum Asymptoton, & in *vigesimam septimam* ubi transit per concursum illum, (Fig. 33.) quo casu termini *b* ac *d* desunt, & concursus Asymptoton est Centrum figuræ ab omnibus ejus partibus oppositis æqualiter distans. Et hæc quatuor species diametrum non habent.


Vertuntur etiam *Species decima quarta* ac *decima sexta* in *vigesimam octavam*, (Fig. 34.) *decima quinta* ac *decima septima* in *vigesimam*

nam nonam, (Fig. 35.) decima octava & decima nona in tricesimam, (Fig. 36.) & vigesima cum vigesima prima in tricesimam primam, (Fig. 37.) Et hæ species unicam habent Diametrum.



Ac denique species vigesima secunda & vigesima tertia vertuntur in Speciem tricesimam secundam cujus tres sunt Diametri per concursum Asymptoton transeuntes. (Fig. 38.)

Quæ omnes conversiones facillime intelliguntur faciendo ut triangulum ab Asymptotis comprehensum diminuatur donec in punctum evanescat.



5. De Hyperbolis sex defectivis diametrum non habentibus.


Si in primo æquationum casu terminus ax^3 negativus est, Figura erit Hyperbola defectiva unicam habens Asymptoton & duo tantum crura Hyperbolica juxta Asymptoton illam in plagas contrarias infinite progredientia. Et Asymptotos illa est Ordinata prima & principalis AG. Si terminus ey non deest figura nullam habebit Diametrum, si deest habebit unicam. In priori casu species sic enumerantur.

Si æquationis hujus $ax^4 = bx^3 + cx^2 + dx + \frac{1}{2}ee$ radices omnes $A\pi$, AP , Ap , $A\varpi$, (Fig. 39.) sunt reales & inæquales, Figura erit Hyperbola Anguinea asymptoton flexu contrario amplexa, cum Ovali conjugata. Quæ Species est tricesima tertia.


Si radices duæ mediæ AP & Ap (Fig. 40.) æquantur inter se, Ovalis & Anguinea junguntur sese decussantes in forma *Nodi*. Quæ est *Species tricesima quarta*.

Si tres radices sunt æquales, Nodus vertetur in *Cuspidem* acutissimum in vertice Anguinæ, (Fig. 41.) Et hæc est *Species tricesima quinta*.

Si e tribus radicibus ejusdem signi duæ maximæ Ap & $A\infty$ (Fig. 43.) sibi mutuo æquantur, Ovalis in *Punctum* evanuit. Quæ *Species* est *tricesima sexta*.



Si radices duæ quævis imaginariæ sunt, sola manebit Anguinea *Pura* sine Ovali, Decussatione, Cuspide vel Puncto conjugato. Si Anguinea illa non transit per punctum A (Fig. 42.) *Species* est *tricesima septima*; sin transit per punctum illud A (id quod contingit ubi termini b ac d defunt,) punctum illud A erit centrum figuræ rectas omnes per ipsum ductas & ad Curvam utrinque terminatas biseans, (Fig. 43.) Et hæc est *Species tricesima octava*.



6. De Hyperbolis septem defectivis diametrum habentibus.

In altero casu ubi terminus ey deest & propterea figura Diametrum habet, si æquationis hujus $ax^3 = bx^2 + cx + d$ radices omnes AT , At , Ar , (Fig. 44.) sunt reales, inæquales & ejusdem signi, figura erit Hyperbola Conchoidalit cum Ovali ad convexitatem. Quæ est *Species tricesima nona*.
Si

Si duæ radices sunt inæquales & ejusdem signi & tertia est signi contrarii, *Ovalis* jacebit ad concavitatem *Conchoidalis*, (Fig. 45.) Estque *Species quadragesima*.


Si radices duæ minores AT , At , (Fig. 46.) sunt æquales, & tertia $A\tau$ est ejusdem signi, *Ovalis* & *Conchoidalis* jungentur sese decussando in modum *Nodi*. Quæ *Species* est *quadragesima prima*.

Si tres radices sunt æquales, *Nodus* mutabitur in *Cuspidem*, & figura erit *Cissois Veterum*, (Fig. 47.) Et hæc est *Species quadragesima secunda*.

Si radices duæ majores sunt æquales, & tertia est ejusdem signi, *Conchoidalis* habebit *Punctum* conjugatum ad convexitatem suam, (Fig. 49.) Estque *Species quadragesima tertia*.

Si radices duæ sunt æquales, & tertia est signi contrarii *Conchoidalis* habebit *Punctum* conjugatum ad concavitatem suam, (Fig. 49.) Estque *Species quadragesima quarta*.

Si radices duæ sunt impossibiles habebitur *Conchoidalis Pura* sine *Ovali*, *Nodo*, *Cuspide* vel *Puncto* conjugato (Fig. 48. 49.) Quæ *Species* est *quadragesima quinta*.



7. De Hyperbolis septem Parabolicis Diametrum non habentibus.

Si quando in primo æquationum casu terminus ax^3 deest & terminus bx^2 non deest, Figura erit Hyperbola Parabolica duo habens crura Hyperbolica ad unam Asymptoton SAG & duo Parabolica in plagam unam & eandem convergentia. Si terminus ey non deest figura nullam habebit diametrum, sin deest habebit unicam. In priori casu Species sunt hæc.

Si tres radices AP , $A\pi$, $A\tau$ (Fig. 50.) æquationis hujus $bx^3 + cx^2 + dx + ee = 0$ sunt inæquales & ejusdem signi, figura constabit ex *Ovali* & aliis duabus Curvis quæ partim Hyperbolicae sunt & partim Parabolicae. Nempe crura Parabolica continuo ductu junguntur
crura


cruribus Hyperbolicis sibi proximis. Et hæc est *Species quadragesima sexta*.

Si radices duæ minores sunt æquales, & tertia est ejusdem signi, Ovalis & una Curvarum illarum Hyperbolo-Parabolicarum junguntur & se decussant in formam *Nodi* (Fig. 51.) Quæ *Species* est *quadragesima septima*.

Si tres radices sunt æquales, Nodus ille in Cuspide[m] vertitur (Fig. 52.) Estque *Species quadragesima octava*.


Si radices duæ majores sunt æquales & tertia est ejusdem signi, Ovalis in *Punctum* conjugatum evanuit (Fig. 53.) Quæ *Species* est *quadragesima nona*.

Si duæ radices sunt impossibiles, manebunt *Puræ* illæ duæ curvæ Hyperbolo-parabolicæ sine Ovali, Decussatione, Cuspide vel *Puncto* conjugato; & *Speciem quinquagesimam* constituent. (Fig. 53. 54.)



Si radices duæ sunt æquales & tertia est signi contrarii, Curvæ illæ Hyperbolo-parabolicæ junguntur sese decussando in morem crucis (Fig. 55.) Estque *Species quinquagesima prima*.

Si radices duæ sunt inæquales & ejusdem signi & tertia est signi contrarii, figura evadet Hyperbola Anguinea circa Asymptoton AG, (Fig. 56.) cum Parabola conjugata. Et hæc est *Species quinquagesima secunda*.



8. De Hyperbolis quatuor Parabolicis Diametrum habentibus.

In altero casu ubi terminus ey deest & figura Diametrum habet, si duæ radices æquationis hujus $bx^2 + cx + d = 0$ sunt impossibiles, duæ habentur figuræ Hyperbolo-parabolicæ a Diametro AB (Fig. 57.) hinc inde æqualiter distantes. Quæ Species est *quingagesima tertia*.

Si æquationis illius radices duæ sunt impossibiles, Figuræ Hyperbolo-parabolicæ junguntur sese decussantes in morem crucis; & Speciem *quingagesimam quartam* constituunt. (Fig. 58.)

Si radices illæ sunt inæquales & ejusdem signi, habetur Hyperbola Conchoidalis cum Parabola ex eodem latere Asymptoti (Fig. 59.) Estque Species *quingagesima quinta*.

Si radices illæ sunt signi contrarii, habetur Conchoidalis cum Parabola ad alteras partes Asymptoti (Fig. 60.) Quæ Species est *quingagesima sexta*.

9. De Quatuor Hyperbolismis Hyperbolæ.

Si quando in primo æquationum casu terminus uterque ax^3 & bx^2 deest, figura erit Hyperbolismus sectionis alicujus Conicæ. Hyperbolismum figuræ voco cujus Ordinata prodit applicando contentum sub Ordinata figuræ illius & recta data ad Abscissam communem. Hac ratione linea recta vertitur in Hyperbolam Conicam, & sectio omnis Conica vertitur in aliquam figurarum quas hic Hyperbolismos sectionum Conicarum voco. Nam æquatio ad figuras

de quibus agimus, nempe $xy^2 + ey = cx + d$, dat $y = \frac{e \pm \sqrt{ee + 4dx + 4cxx}}{2x}$


quæ generatur applicando contentum sub Ordinata sectionis Conicæ

$\frac{e \pm \sqrt{ee + 4dx + 4cxx}}{2m}$ & recta data m , ad curvarum Abscissam communem x .

Unde liquet quod figura genita Hyperbolismus erit Hyperbolæ, Ellipseos vel Parabolæ, perinde ut terminus cx affirmativus est vel negativus vel nullus.

M


Hy-



Hyperbolismus Hyperbolæ tres habet Asymptotos, quarum una est Ordinata prima & principalis Ad, alteræ duæ sunt parallelæ Abscissæ AB, ab eadem hinc inde æqualiter distant. In Ordinata principali Ad, cape Ad, Ad hinc inde æquales quantitati \sqrt{c} ; & per puncta d ac d age dg, dγ Asymptotos Abscissæ AB parallelas.


Ubi terminus ey non deest figura nullam habet diametrum. In hoc casu, si æquationis hujus $cx^2 + dx + ee = 0$ radices duæ AP, Ap (Fig. 61.) sunt reales & inæquales (nam æquales esse nequeunt nisi figura sit Conica sectio) figura constabit ex tribus Hyperbolis sibi oppositis quarum una jacet inter Asymptotos parallelas & alteræ duæ jacent extra. Et hæc est *Species quinquagesima septima*.

Si radices illæ duæ sunt impossibiles, habentur Hyperbolæ duæ oppositæ extra Asymptotos parallelas & Anguinea Hyperbolica intra easdem. Hæc figura duarum est specierum. Nam centrum non habet ubi terminus d non deest (Fig. 62.) sed si terminus ille deest punctum A est ejus centrum (Fig. 63.) Prior *Species est quinquagesima octava*, posterior *quinquagesima nona*.



Quod si terminus ey deest, figura constabit ex tribus Hyperbolis oppositis, quarum una jacet inter Asymptotos parallelas & alteræ duæ jacent extra ut in specie quinquagesima quarta, & præterea

terea diametrum habet quæ est Abscissa AB (Fig. 64.) Et hæc est *Species sexagesima*.



10. De tribus Hyperbolismis Ellipseos.


Hyperbolismus Ellipseos per hanc æquationem definitur $xy^2 + ey = cx + d$, & unicam habet Asymptoton quæ est Ordinata principalis Ad (Fig. 65.) Si terminus ey non deest, figura est Hyperbola Anginea sine diametro, atque etiam sine centro si terminus d non deest. Quæ *Species* est *sexagesima prima*.

At si terminus d deest, figura habet centrum sine diametro, & centrum ejus est punctum A (Fig. 66.) *Species* vero est *sexagesima secunda*.

Et si terminus ey deest, & terminus d non deest, figura est Conchoidalis ad Asymptoton AG (Fig. 67.) habetque diametrum sine centro, & diameter ejus est Abscissa AB. Quæ *Species* est *sexagesima tertia*.


11. De duobus Hyperbolismis Parabolæ.

Hyperbolismus Parabolæ per hanc æquationem definitur $xy^2 + ey = d$; & duas habet Asymptotos, Abscissam AB & Ordinatam primam & principalem AG. Hyperbolæ vero in hac figura sunt duæ, non in Asymptoton angulis oppositis sed in angulis qui sunt deinceps jacentes, idque ad utrumque latus abscissæ AB, & vel sine diametro si terminus ey habetur, (Fig. 68.) vel cum diametro si terminus ille deest (Fig. 69.) Quæ duæ *Species* sunt *sexagesima quarta* & *sexagesima quinta*.



12. De Tridente.

In Secundo æquationum casu habebatur æquatio $xy = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Et figura in hoc casu habet quatuor crura infinita quorum duo sunt Hyperbolica circa Asymptoton AG (Fig. 72.) in contrarias partes tendentia & duo Parabolica convergentia & cum prioribus speciem Tridentis fere efformantia. Estque hæc Figura Parabola illa per quam Cartesius æquationes sex dimensionum construxit. Hæc est igitur *Species sexagesima sexta*.



13. De Parabolis quinque divergentibus.

In Tertio casu æquatio erat $y^2 = ax^3 + bx^2 + cx + d$, & Parabolam designat cujus crura divergunt ab invicem & in contrarias partes infinite progrediuntur. Abscissa AB est ejus diameter & Species ejus sunt quinque sequentes.


Si æquationis $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, radices omnes Ar, AT, At sunt reales & inæquales, figura est Parabola divergens Campaniformis cum Ovali ad verticem (Fig. 70. 71.) Et Species est *sexagesima septima*.

Si radices duæ sunt æquales, Parabola prodit vel *Nodata* contingendo Ovalem (Fig. 73.) vel *Punctata* ob Ovalem infinite parvam

vam (Fig. 74.) Quæ duæ Species sunt *sexagesima octava* & *sexagesima nona*.

Si tres radices sunt æquales Parabola erit *Cuspidata* in vertice (Fig. 76.) Et hæc est Parabola *Neiliana* quæ vulgo *Semicubica* dicitur. Et est Species *septuagesima*.

Si radices duæ sunt impossibiles, habetur Parabola *Pura* campaniformis (Fig. 74. 75.) Speciem *septuagesimam primam* constituens.



14. De Parabola Cubica.

In Quarto casu æquatio erat $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, & hæc æquatio Parabolam designat quæ crura habet contraria & *Cubica* dici solet (Fig. 77.) Et sic Species omnino sunt *septuaginta duæ*.

V. Genesis Curvarum per Umbras.

Si in planum infinitum a puncto lucido illuminatum umbræ figurarum projiciantur, umbræ Sectionum Conicarum semper erunt Sectiones Conicæ, eæ Curvarum secundi Generis semper erunt Curvæ secundi Generis, eæ Curvarum tertii Generis semper erunt Curvæ tertii Generis, & sic deinceps in infinitum.

Et quemadmodum Circulus umbram projiciendo generat Sectiones omnes Conicas, sic Parabolæ quinque divergentes umbris suis generant & exhibent alias omnes secundi Generis Curvas; & sic Curvæ quædam simpliciores aliorum Generum inveniri possunt quæ alias omnes eorundem Generum Curvas umbris suis a puncto lucido in planum projectis formabunt.


De Curvarum Punctis duplicibus.

Diximus Curvas secundi Generis a Linea recta in punctis tribus secari posse. Horum duo nonnunquam coincidunt. Ut cum Recta per Ovalet infinite parvam transit vel per concursum duarum partium Curvæ se mutuo secantium vel in cuspidem coeuntium ducitur. Et siquando Rectæ omnes in plagam cruris alicujus infiniti tendentes Curvam in unico tantum puncto secant, (ut fit in ordinatis Parabolæ *Cartesianæ* & Parabolæ cubicæ, nec non in rectis Abscissæ Hyperbolicismorum Hyperbolæ & Parabolæ parallelis) concipiendum est quod Rectæ illæ per alia duo Curvæ puncta ad infinitam distantiam sita (ut ita dicam) transeunt. Hujusmodi intersectiones duas coincidentes sive ad finitam sint distantiam sive ad infinitam, vocabimus *Punctum Duplex*. Curvæ autem quæ habent Punctum Duplex describi possunt per sequentia Theoremata.

VI. *De Curvarum descriptione Organica.*

THEOR. I.

Si Anguli duo magnitudine dati PAD, PBD circa polos positione




datos A, B rotentur, & eorum crura AP, BP concursu suo P percurrant Lineam rectam, crura duo reliqua AD, BD concursu suo D describent Sectionem Conicam per polos A, B transeuntem: præterquam ubi Linea illa recta transit per polorum alterutrum A vel B, vel anguli BAD, ABD

simul evanescunt, quibus in casibus punctum D describet Lineam rectam.

THEOR. II.


Si crura prima AP, BP concursu suo P percurrant Sectionem Conicam per polum alterutrum A transeuntem, crura duo reliqua AD, BD

BD concursu suo D describet Curvam secundi Generis per polum alterum B transeuntem & Punctum duplex habentem in polo primo A, per quem sectio Conica transit: præterquam ubi anguli BAD, ABD simul evanescunt, quo casu punctum D describet aliam sectionem Conicam per polum A transeuntem.




THEOR. III.

At si sectio Conica quam punctum P percurrit transeat per neutrum polorum A, B, punctum D describet Curvam secundi vel tertii generis Punctum duplex habentem. Et Punctum illud duplex in concursu crurum describentium, AD, BD invenietur ubi anguli BAP, ABP simul evanescunt. Curva autem descripta secundi erit Generis si anguli BAD, ABD simul evanescunt, alias erit tertii Generis & alia duo habebit Puncta duplicia in polis A & B.

*Sectionum Conicarum descriptio per data quinque puncta.*

Jam sectio Conica determinatur ex datis ejus punctis quinque & per eadem sic describi potest. Dantur ejus puncta quinque A, B, C, D, E. Jungantur eorum tria quævis A, B, C, & trianguli ABC rotentur anguli duo quivis CAB, CBA circa vertexes suos A & B, & ubi crurum AC, BC intersectio C successive applicatur ad puncta duo reliqua D, E, incidat intersectio crurum reliquorum AB & BA in puncta P & Q. Agatur & infinite producat recta PQ, & anguli mobiles ita rotentur ut intersectio crurum AB, BA percurrat rectam PQ, & crurum reliquorum intersectio C describet propositam sectionem Conicam per *Theorema primum*.



Cur-

*Curvarum secundi generis Punctum duplex habentium
descriptio per data septem puncta.*

Curvæ omnes secundi generis Punctum Duplex habentes determinantur ex datis earum punctis septem quorum unum est Punctum illud duplex, & per eadem puncta sic describi possunt. Dantur Curvæ describendæ puncta quælibet septem A, B, C, D, E, F, G, quorum A est Punctum Duplex. Jungantur punctum A & alia duo quævis e punctis puta B & C; & trianguli ABC rotetur tum angulus CAB circa verticem suum A, tum angulorum reliquorum alteruter ABC circa verticem suum B. Et ubi crurum AC, BC concursus C successive applicatur ad puncta quatuor reliqua D, E, F, G incidat concursus crurum reliquorum AB & BA in puncta quatuor P, Q, R, S. Per puncta illa quatuor & quintum A describatur sectio Conica, & anguli præfati CAB, CBA ita rotentur ut crurum AB, BA concursus percurrat sectionem illam Conicam, & concursus reliquorum crurum AC, BC describet Curvam propositam per *Theorema* secundum.

Si vice puncti C datur positione recta BC quæ Curvam describendam tangit in B, lineæ AD, AP coincident, & vice anguli DAP habebitur linea recta circa polum A rotanda.

Si Punctum duplex A infinite distat debet Recta ad plagam puncti illius perpetuo dirigi & motu parallelo ferri interea dum angulus ABC circa polum B rotatur.

Describi etiam possunt hæ Curvæ paulo aliter per *Theorema* tertium, sed descriptionem simpliciore perquisisse sufficit.

Eadem methodo Curvas tertii, quarti & superiorum Generum describere licet, non omnes quidem sed quotquot ratione aliqua commoda per motum localem describi possunt. Nam Curvam aliquam secundi vel superioris generis Punctum duplex non habentem commode describere Problema est inter difficiliora numerandum.

VII. Con-

VII. Constructio æquationum per descriptionem Curvarum.

Curvarum usus in Geometria est ut per earum interfectiones Problemata solvantur. Proponatur æquatio construenda dimensionum novem

$$x^9 + bx^7 + cx^6 + dx^5 + ex^4 + fx^3 + gx^2 + bx + k = 0.$$

+ m

Ubi b, c, d , &c. significant quantitates quasvis datas signis suis + & — affectas. Assumatur æquatio ad Parabolam cubicam $x^3 = y$, & æquatio prior, scribendo y pro x^3 , evadet

$$y^3 + bxy^2 + cy^2 + dx^2y + exy + my + fx^3 + gx^2 + bx + k = 0,$$

æquatio ad Curvam aliam secundi Generis. Ubi m vel f deesse potest vel pro lubitu assumi. Et per harum Curvarum descriptiones & interfectiones dabuntur radices æquationis construendæ. Parabolam cubicam semel describere sufficit.

Si æquatio construenda per defectum duorum terminorum ultimorum bx & k reducatur ad septem dimensiones, Curva altera delendo m , habebit Punctum Duplex in principio Abscissæ, & inde facile describi potest ut supra.

Si æquatio construenda per defectum terminorum trium ultimorum $gx^2 + bx + k$ reducatur ad sex dimensiones, Curva altera delendo f evadet sectio Conica.

Et si per defectum sex ultimorum terminorum æquatio construenda reducatur ad tres dimensiones, incidetur in constructionem *Wal-lisianam* per Parabolam cubicam & Lineam rectam.

Construi etiam possunt æquationes per Hyperbolismum Parabolæ cum diametro. Ut si construenda sit hæc æquatio dimensionum novem termino penultimo carens,

$$a + cx^2 + dx^3 + ex^4 + fx^5 + gx^6 + bx^7 + kx^8 + lx^9 = 0;$$

+ m

Assumatur æquatio ad Hyperbolismum illum $x^2y = 1$, & scribendo y pro $\frac{1}{x^2}$, æquatio construenda vertetur in hanc

$$ay^3 + cy^2 + dxy^2 + ey + fxy + m \quad y + g + bx + kx^2 + lx^3 = 0,$$

quæ curvam secundi Generis designat cujus descriptione Problema

N

sol-

solvetur. Et quantitatum m ac g alterutra hic deesse potest, vel prohibitu assumi.

Per Parabolam cubicam & Curvas tertii Generis construuntur etiam æquationes omnes dimensionum non plusquam duodecim, & per eandem Parabolam & Curvas quarti Generis construuntur omnes dimensionum non plusquam quindecim; Et sic deinceps in infinitum. Et Curvæ illæ tertii, quarti & superiorum Generum describi semper possunt inveniendò eorum puncta per Geometriam planam. Ut si construenda sit æquatio

$$x^{12} + ax^{10} + bx^9 + cx^8 + dx^7 + ex^6 + fx^5 + gx^4 + hx^3 + ix^2 + kx + l = 0,$$

& descripta habeatur Parabola Cubica; sit æquatio ad Parabolam illam Cubicam $x^3 = y$, & scribendo y pro x^3 , æquatio construenda vertetur in hanc

$$\begin{array}{ccccccc} y^4 + axy^3 + cx^2y^2 + fx^3y + ix^4 = 0, \\ + b & + dx & + gx^2 & + kx \\ & + e & + b & + l \end{array}$$

quæ est æquatio ad Curvam tertii Generis cujus descriptione Problema solvetur. Describi autem potest hæc Curva inveniendò ejus puncta per Geometriam planam, propterea quod indeterminata quantitas x non nisi ad duas dimensiones ascendit.



METHODUS DIFFERENTIALIS.

P R O P. I.

S*I figuræ curvilineæ Abscissa componatur ex quantitate quavis data A, & quantitate indeterminata x, & Ordinata constet ex datis quocunque quantitatibus b, c, d, e, &c. in totidem terminos hujus progressionis Geometricæ $x, x^2, x^3, x^4, &c.$ respective ductis, & ad Abscissæ puncta totidem data erigantur Ordinatum applicatæ: dico quod Ordinarum differentię primæ dividi possint per earum intervalla, & differentiarum sic divisarum differentię dividi possint per Ordinarum binarum intervalla, & harum differentiarum sic divisarum differentię dividi possint per Ordinarum ternarum intervalla, & sic deinceps in infinitum.*

Etenim si pro Abscissæ parte indeterminata x ponantur quantitates quævis datæ $p, q, r, s, t, &c.$ successive, & ad Abscissarum sic datarum terminos erigantur Ordinatæ $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, &c.$ Hæ Abscissæ & Ordinatæ & Ordinarum differentię divisæ per Abscissarum differentias (quæ utique sunt Ordinarum intervalla) & quo-

torum differentiae divisa per Ordinarum alternarum differentias, & sic deinceps, exhibentur per Tabulam sequentem.

Abscissæ	Ordinatæ
$A+p$	$A+bp+cp^2+dp^3+ep^4=\alpha$
$A+q$	$A+bq+cq^2+dq^3+eq^4=\beta$
$A+r$	$A+br+cr^2+dr^3+er^4=\gamma$
$A+s$	$A+bs+cs^2+ds^3+es^4=\delta$
$A+t$	$A+bt+ct^2+dt^3+et^4=\epsilon$
Divisor. Diff. Ord.	Quoti per divisionem prodeuntes
$p-q) \alpha-\beta$	$b+c \times p+q+d \times pp+pq+qq+e \times p^3+p^2q+pq^2+q^3=\zeta$
$q-r) \beta-\gamma$	$b+c \times q+r+d \times qq+qr+rr+e \times q^3+q^2r+qr^2+r^3=\eta$
$r-s) \gamma-\delta$	$b+c \times r+s+d \times rr+rs+ss+e \times r^3+r^2s+rs^2+s^3=\theta$
$s-t) \delta-\epsilon$	$b+c \times s+t+d \times ss+st+tt+e \times s^3+s^2t+st^2+t^3=\pi$
$p-r) \zeta-\eta$	$c+d \times p+q+r+e \times pp+pq+qq+pr+qr+rr=\lambda$
$q-s) \eta-\theta$	$c+d \times q+r+s+e \times qq+qr+rr+qs+rs+ss=\mu$
$r-t) \theta-\pi$	$c+d \times r+s+t+e \times rr+rs+ss+rt+st+tt=\nu$
$p-s) \lambda-\mu$	$d+e \times p+q+r+s=\xi.$
$q-t) \mu-\nu$	$d+e \times q+r+s+t=\pi.$
$p-t) \xi-\pi$	$e=\sigma.$

P R O P. II.

Iisdem positis, & quod numerus terminorum b, c, d, e , &c. sit finitus, dico quod Quotorum ultimus æqualis erit ultimo terminorum b, c, d, e , &c. & quod per Quotos reliquos dabuntur termini reliqui b, c, d, e , &c. & his datis dabitur Linea Curva generis Parabolici quæ per Ordinarum omnium terminos transibit.

Etenim in Tabula superiore Quotus ultimus σ æqualis erat termino ultimo e . Et hic terminus ductus in summam datam $p+q+r+s$, & ablatus de Quoto ξ relinquit terminum penultimum d . Et quantitates


tates jam datæ $d \times p + q + r + e \times pp + pq + qq + pr + qr + rr$, si auferantur de Quoto λ , relinquunt terminorum antepenultimum c . Et quantitates jam datæ $c \times p + q + d \times pp + pq + qq + e \times p^3 + ppq + pqq + q^3$, si auferantur de Quoto ζ , relinquunt terminum b . Et simili compūto si plures essent termini, colligerentur omnes per Quotorum Ordines totidem. Deinde quantitates datæ $bp + cpp + dp^3 + ep^4$, si subducantur de Ordinata prima a , relinquunt Abscissæ terminum primum A . Et quantitas $A + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 + \&c.$ est Ordinata Curvæ generis Parabolici quæ per Ordinarum omnium datarum terminos transibit, existente Abscissa $A + x$.

Ex his Propositionibus quæ sequuntur facile colligi possunt.

P R O P. III.

Si recta aliqua AA9 in æquales quotcunque partes AA2, A2A3, A3A4, A4A5, &c. dividatur, & ad puncta divisionum erigantur parallelæ AB, A2B2, A3B3, &c. Invenire curvam Geometricam generis Parabolici quæ per omnium erectarum terminos B, B2, B3, &c. transibit.

Erectarum AB, A2B2, A3B3, &c. quære differentias Primas, b, b_2, b_3 , &c. Secundas c, c_2, c_3 , &c. Tertias d, d_2, d_3 , &c. & sic deinceps usque dum veneris ad ultimam differentiam, quæ hic sit i .



Tunc incipiendo ab ultima differentia excerpe medias differentias in alternis Columnis vel Ordinibus differentiarum, & Arithmetica media inter duas medias reliquarum, Ordine pergendo usque ad Seriem primorum terminorum AB, A2B2, A3B3, &c. sint hæc $k, l, m, n, o, p, q, r, s$, &c. quorum ultimus significet ultimam differentiam; penultimus medium Arithmeticum inter duas penultimas differentias; antepenultimus mediam trium antepenultimarum

N 3

dif-

differentiarum, & sic deinceps usque ad primum quod erit vel medius terminorum A, A_2, A_3 , &c. vel Arithmeticus medius inter duos medios. Prius accidit ubi numerum terminorum A, A_2, A_3 , &c. est impar; posterius ubi par.

C A S. I.

In Casu priori, sit A_5B_5 iste medius terminus, hoc est, $A_5B_5 = k$, $\frac{b_4+b_5}{2} = l$, $c_4 = m$, $\frac{d_3+d_4}{2} = n$, $e_3 = o$, $\frac{f_2+f_3}{2} = p$, $g_2 = q$, $\frac{h_1+h_2}{2} = r$, $i = s$. Et erecta Ordinatum applicata PQ, dic $A_5P = x$; & duc terminos hujus Progreffionis

$$1 \times \frac{x}{1} \times \frac{x}{2} \times \frac{x^2-1}{3x} \times \frac{x}{4} \times \frac{x^2-4}{5x} \times \frac{x}{6} \times \frac{x^2-9}{7x} \times \frac{x}{8} \times \frac{x^2-16}{9x} \times \frac{x}{10} \times \frac{x^2-25}{11x} \times \frac{x}{12} \times \frac{x^2-36}{13x}, \&c.$$

in se continuo; & orientur termini

$$1. x. \frac{x^3}{2} \cdot \frac{x^3-1}{6} \cdot \frac{x^3-8}{24} \cdot \frac{x^3-27}{120} \cdot \frac{x^3-64}{720} \cdot \frac{x^3-125}{5040} \cdot \&c.$$

per quos si termini seriei k, l, m, n, o, p , &c. respective multiplicentur, aggregatum factorum $k + xl + \frac{x^2}{2}m + \frac{x^3}{6}n + \frac{x^4}{24}o + \frac{x^5}{120}p + \&c.$ erit longitudo Ordinatum applicatæ PQ.

C A S. II.

In Casu posteriori, sint A_4B_4, A_5B_5 duo medii termini, hoc est, sit $\frac{A_4B_4+A_5B_5}{2} = k$, $b_4 = l$, $\frac{c_3+c_4}{2} = m$, $d_3 = n$, $e_2 + e_3 = o$, $f_2 = p$, $\frac{g_1+g_2}{2} = q$, & $h = r$. Et erecta Ordinatum applicata PQ, biseca A_4A_5 in O, & dicto $OP = x$, duc Terminos hujus Progreffionis

$$1 \times \frac{x}{1} \times \frac{xx-1}{2x} \times \frac{x}{3} \times \frac{xx-9}{4x} \times \frac{x}{5} \times \frac{xx-25}{6x} \times \frac{x}{7} \times \frac{xx-49}{8x}, \&c. \text{ in se continuo; \& orientur termini } 1. x. \frac{4xx-1}{8} \cdot \frac{4x^3-1}{24} \cdot \frac{16x^4-40x^2+9}{384} \cdot \&c. \text{ per quos si termini series}$$

k, l, m, n, o, p, q , &c. respective multiplicentur, aggregatum factorum $k + xl + \frac{4x^2-1}{8}m + \frac{4x^3-1}{24}n + \frac{16x^4-40x^2+9}{384}o + \&c.$ erit Longitudo Ordinatum applicatæ PQ.

Sed hic notandum est quod intervalla AA_2, A_2A_3, A_3A_4 , &c. hic supponantur esse unitates, & quod differentiæ colligi debent auferendo inferiores quantitates de superioribus, A_2B_2 de AB , A_3B_3 de

de A_2B_2 , b_2 de b , &c. & faciendo ut sint $AB - A_2B_2 = b$, $A_2B_2 - A_3B_3 = b_2$, $b - b_2 = c$, &c. adeoque quando differentiarum illarum hoc modo prodeunt negativæ signa earum mutanda sunt.

P R O P. IV.

Si recta aliqua in partes quotcunque inæquales AA_2 , A_2A_3 , A_3A_4 , A_4A_5 , &c. dividatur, & ad puncta divisionum erigantur parallelae AB , A_2B_2 , A_3B_3 , &c. Invenire Curvam Geometricam generis Parabolici quæ per omnium erectarum terminos B , B_2 , B_3 , &c. transibit.

Sunto puncta data B , B_2 , B_3 , B_4 , B_5 , B_6 , B_7 , &c. & ad Abscissam quamvis AA_7 demitte Ordinatæ perpendiculariter BA , B_2A_2 , &c.

Et fac $\frac{AB - A_2B_2}{AA_2} = b$, $\frac{A_2B_2 - A_3B_3}{A_2A_3} = b_2$,

$\frac{A_3B_3 - A_4B_4}{A_3A_4} = b_3$, $\frac{A_4B_4 - A_5B_5}{A_4A_5} = b_4$,


$\frac{A_5B_5 - A_6B_6}{A_5A_6} = b_5$, $\frac{A_6B_6 - A_7B_7}{A_6A_7} = b_6$,

$\frac{A_7B_7 - A_8B_8}{A_7A_8} = b_7$.

Deinde $\frac{b - b_2}{AA_3} = c$, $\frac{b_2 - b_3}{A_2A_4} = c_2$, $\frac{b_3 - b_4}{A_3A_5} = c_3$, &c.

Tunc $\frac{c - c_2}{AA_4} = d$, $\frac{c_2 - c_3}{A_2A_5} = d_2$, $\frac{c_3 - c_4}{A_3A_6} = d_3$, &c.

Et $\frac{d - d_2}{AA_5} = e$, $\frac{d_2 - d_3}{A_2A_6} = e_2$, $\frac{d_3 - d_4}{A_3A_7} = e_3$, &c.



Sic pergendum est ad ultimam differentiam.

Differentiis sic collectis & divisis per intervalla Ordinatum applicatarum; in alternis earum Columnis five Seriebus vel Ordinibus exerce medias, incipiendo ab ultima, & in reliquis Columnis excerpe media Arithmetica inter duas medias, pergendo usque ad seriem primorum terminorum, AB , A_2B_2 , &c. Sunto hæc k , l , m , n , o , p , q , r , &c. quorum ultimus terminus significet ultimam differentiam; penultimus medium Arithmeticum inter duas penultimas; antepenultimus mediam trium antepenultimarum, &c. Et primus k erit media Ordinatum applicata, si numerus datorum punctorum est im-

impar; vel medium Arithmeticum inter duas medias, si numerus eorum est par.

C A S. I.

In Casu priori, sit A_4B_4 ista media Ordinatum applicata, hoc est, sit $A_4B_4 = k$, $\frac{b_2 + b_4}{2} = l$, $c_3 = m$, $\frac{d_2 + d_4}{2} = n$, $e_2 = o$, $\frac{f + f_2}{2} = p$, $g = q$. Et erecta Ordinatum applicata PQ, & in Basi AA_5 sumpto quovis puncto O, dic $OP = x$, & duc in se gradatim terminos hujus Progressionis

$$1 \times x - OA_4 \times x - \frac{OA_3 + OA_5}{2} \times \frac{x - OA_3 \times x - OA_5}{x - \frac{1}{2}OA_3 + OA_5} \times x - \frac{OA_2 + OA_6}{2} \times \&c.$$

& ortam Progressionem asserva; vel quod perinde est duc terminos hujus Progressionis

$$1 \times x - OA_4 \times x - OA_3 \times x - OA_5 \times x - OA_2 \times x - OA_6 \times x - OA \times x - OA_7 \times \&c.$$

in se gradatim, & terminos exinde ortos duc respective in terminos hujus Progressionis

$$1. x - \frac{+OA_3 + OA_5}{2}. x - \frac{+OA_2 + OA_6}{2}. x - \frac{+OA + OA_7}{2}, \&c. \& \text{orientur ter-}$$

mini intermedii tota Progressione existente

$$1. x - OA_4. x^2 - \frac{+OA_3 + 2OA_4 + OA_5}{2}. x + \frac{OA_3 + OA_5}{2} \times OA_4, \&c.$$

Vel dic $OA = \alpha$, $OA_2 = \beta$, $OA_3 = \gamma$, $OA_4 = \delta$, $OA_5 = \epsilon$, $OA_6 = \zeta$, $OA_7 = \eta$: $\frac{OA_3 + OA_5}{2} = \theta$, $\frac{OA_2 + OA_6}{2} = \chi$, $\frac{OA + OA_7}{2} = \lambda$. Et ex Progressione

$1 \times x - \delta \times x - \gamma \times x - \epsilon \times x - \beta \times x - \zeta \times x - \alpha \times x - \eta$ &c. collige terminos quibus multiplicatis per $1. x - \theta$, $x - \chi$, $x - \lambda$, &c. collige alios terminos intermedios, tota serie prodeunte

$$1, x - \delta, x^2 - \delta + \theta x + \delta \theta, x^3 - \delta + 2\theta x^2 + \gamma \epsilon + 2\delta \theta x - \gamma \delta \epsilon, \&c.$$

per cujus terminos multiplica series k, l, m, n, o , &c. Et aggregatum productorum $k + x - \delta \times l + x^2 - \delta + \theta x + \delta \theta \times m + \&c.$ erit longitudo Ordinatum applicatae PQ.

C A S. II.

In Casu posteriori, sint A_4B_4 , A_5B_5 duae mediae Ordinatum appli-

plicatæ, hoc est, $\frac{A_4B_4+A_5B_5}{2} = k$, $b_4 = l$, $\frac{c_3+c_4}{2} = m$, $d_3 = n$, $\frac{e_2+e_3}{2} = o$, $f_2 = p$, &c. Et alternorum k , m , o , q , &c. Coefficientes oriuntur ex multiplicatione terminorum hujus Progreffionis in se

$$1 \times x - OA_4 \times x - OA_5 \times x - OA_3 \times x - OA_6 \times x - OA_2 \times x - OA_7 \times x - OA \times x - OA_8 \times x$$

Et reliquorum Coefficientes ex multiplicatione horum per terminos hujus Progreffionis

$$x - \frac{+OA_4+OA_5}{2}, x - \frac{+OA_3+OA_6}{2}, x - \frac{+OA_2+OA_7}{2}, x - \frac{+OA+OA_8}{2}, \&c.$$

$$\text{Hoc est, erit } k + x - \frac{+OA_4+OA_5}{2} \times l + x^2 - OA_4 + OA_5 x + OA_4 \times OA_5$$

$\times m$, &c. Ordinatum applicata PQ,

$$\text{vel } PQ = k + x \times l + x \times x \times m + x \times x \times x \times n + x \times x \times x \times o + x \times x \times x \times p + x \times x \times x \times q + x \times x \times x \times r + x \times x \times x \times s + \&c.$$

$$\begin{matrix} -\frac{1}{2}OA_4 & -OA_4 & -OA_5 & -OA_4 & -OA_5 & -\frac{1}{2}OA_3 \\ -\frac{1}{2}OA_5 & & & & & -\frac{1}{2}OA_6 \end{matrix}$$

$$\text{Sive dic } x - \frac{+OA_4+OA_5}{2} = \pi, \quad x - OA_4 \times x - OA_5 = \rho,$$

$$\rho \times x - \frac{+OA_3+OA_6}{2} = \sigma, \quad \rho \times x - OA_3 \times x - OA_6 = \tau,$$

$$\tau \times x - \frac{+OA_2+OA_7}{2} = \upsilon, \quad \tau \times x - OA_2 \times x - OA_7 = \phi,$$

$$\phi \times x - \frac{+OA+OA_8}{2} = \chi, \quad \phi \times x - OA \times x - OA_8 = \psi,$$

$$\text{Et erit } k + \pi l + \rho m + \sigma n + \tau o + \upsilon p + \phi q + \chi r + \psi s = PQ.$$

P R O P. V.

Datis aliquot terminis seriei cujuscunque ad data intervalla dispositis, invenire terminum quemvis intermedium quamproxime.

Ad rectam positione datam erigantur termini dati in dato angulo, interpositis datis intervallis, & per eorum puncta extrema, per Propositiones præcedentes, ducatur linea Curva generis Parabolici. Hæc enim continget terminos omnes intermedios per seriem totam.

P R O P. VI.

Figuram quamcunque Curvilineam quadrare quamproxime, cujus Ordinata aliquot inveniri possunt.

Per terminos Ordinarum ducatur linea Curva generis Parabolici ope Propositionum præcedentium. Hæc enim figuram terminabit quæ semper quadrari potest, & cujus Area æquabitur Areae figuræ propositæ quamproxime.

S C H O L I U M.


Utiles sunt hæ Propositiones ad Tabulas construendas per interpolationem Serierum, ut & ad solutiones Problematum quæ a quadraturis Curvarum dependent, præsertim si Ordinarum intervalla & parva sint & æqualia inter se, & Regulæ computentur, & in usum reserventur pro dato quocunque numero Ordinarum. Ut si quatuor sint Ordinatae ad æqualia intervalla sitæ, sit A summa primæ & quartæ, B summa secundæ & tertiæ, & R intervallum inter primam & quartam, & Ordinata nova in medio omnium erit $\frac{2B-A}{16}$, & Area tota inter primam & quartam erit $\frac{A+B}{8}R$.

Et nota quod ubi Ordinatae stant ad æquales ab invicem distantias, sumendo summas Ordinarum quæ ab Ordinata media hinc inde æqualiter distant, & duplum Ordinatae mediæ, componitur Curva nova cujus Area per pauciores Ordinatas determinatur, & æqualis est Areae Curvæ prioris quam invenire oportuit. Quinetiam si pro Ordinatis novis sumantur summa Ordinatae primæ & secundæ, & summa tertiæ & quartæ, & summa quintæ & sextæ, & sic deinceps; vel si sumantur summa trium primarum Ordinarum, & summa trium proximarum, & summa trium quæ sunt deinceps; vel si sumantur summae quaternarum Ordinarum, vel summae quinarum: Area Curvæ novæ æqualis erit Areae Curvæ primo propositæ. Et sic habitis Curvæ quadrandæ Ordinatis quotcunque quadratura ejus ad quadraturam Curvæ alterius per pauciores Ordinatas reducetur.

Per data vero puncta quotcunque non solum Curvæ lineæ generis

neris *Parabolici*, sed etiam Curvæ aliæ innumeræ diverforum generum duci possunt.

Sunto CDE, FGH Curvæ duæ Abscissam habentes communem AB, & Ordinatas in eadem recta jacentes BD, BG; & relatio inter has Ordinatas definiatur per æquationem quamcunque. Dentur puncta quotcunque per quæ Curva CDE transire debet, & per æquationem illam dabuntur puncta totidem nova per quæ Curva FGH transibit. Per propositiones superiores describatur Curva FGH generis *Parabolici* quæ per puncta illa omnia nova transeat, & per æquationem eandem dabitur Curva CDE quæ per puncta omnia primo data transibit.



F I N I S.







